**Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis**

►B

# KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2148/2004

## 2004 m. gruodžio 16 d.

## dėl nuolatinio ir laikino leidimo naudoti tam tikrus priedus ir dėl leidimo naudoti tam tikrus pašaruose jau leidžiamus priedus

**(Tekstas svarbus EEE)**

(OL L 370, 2004 12 17, p. 24)

iš dalies keičiamas:

| | | Oficialusis leidinys | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nr. | puslapis | data |
| ►M1 | 2005 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1980/2005 | L 318 | 3 | 2005 12 6 |
| ►M2 | 2012 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1018/2012 | L 307 | 56 | 2012 11 7 |
| ►M3 | 2015 m. birželio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1043 | L 167 | 63 | 2015 7 1 |
| ►M4 | 2015 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2305 | L 326 | 43 | 2015 12 11 |
| ►M5 | 2017 m. kovo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/447 | L 69 | 18 | 2017 3 15 |

▼B

# KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2148/2004

**2004 m. gruodžio 16 d.**

**dėl nuolatinio ir laikino leidimo naudoti tam tikrus priedus ir dėl leidimo naudoti tam tikrus pašaruose jau leidžiamus priedus**

**(Tekstas svarbus EEE)**

*1 straipsnis*

Preparatą, priskiriamą „rišiklių, sukepti neleidžiančių medžiagų ir koaguliantų“ grupei, leidžiama neribotą laiką naudoti kaip gyvūnų maisto priedą laikantis I priede nustatytų sąlygų.

*2 straipsnis*

Preparatus, priskiriamus „mikroorganizmų“ grupei, leidžiama neribotą laiką naudoti kaip gyvūnų maisto priedus laikantis II priede nustatytų sąlygų.

*3 straipsnis*

Preparatą, priskiriamą „mikroorganizmų“ grupei, leidžiama keturis metus naudoti kaip gyvūnų maisto priedą laikantis III priede nustatytų sąlygų.

*4 straipsnis*

Preparatus, priskiriamus „fermentų“ grupei, leidžiama neribotą laiką naudoti kaip gyvūnų maisto priedą laikantis IV priede nustatytų sąlygų.

*5 straipsnis*

Preparatą, priskiriamą „fermentų“ grupei, leidžiama keturis metus naudoti kaip gyvūnų maisto priedą laikantis V priede nustatytų sąlygų.

*6 straipsnis*

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

*I PRIEDAS*

| EB Nr. | Priedas | Cheminė formulė, aprašas | Gyvūno rūšis arba kategorija | Ne vyresni kaip | Mažiausias kiekis | Didžiausias kiekis | Kitos nuostatos | Leidimo galiojimo laiko pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mg/kg visaverčio pašaro | | | |
| **Rišikliai, sukepti neleidžiančios medžiagos, koaguliantai** | | | | | | | | |
| E 567 | Vulkaninės kilmės klinoptilolitas | Vulkaninės kilmės kalcio hidruotas aliumosilikatas, kuriame yra ne mažiau kaip 85 % klinoptilolito ir ne daugiau kaip 15 % lauko špato, žėručių ir molių be skaidulių ir kvarco ►**M1** ———— ◄ | Kiaulės | — | — | 20 000 | Visi pašarai | Neribotam laikui |
| | | | Triušiai | — | — | 20 000 | Visi pašarai | Neribotam laikui |
| | | | Naminiai paukščiai | — | — | 20 000 | Visi pašarai | Neribotam laikui |

▼B

*II PRIEDAS*

| EB Nr. | Priedas | Cheminė formulė, aprašymas | Gyvūno rūšis arba kategorija | Didžiausias amžius | Mažiausias kiekis | Didžiausias kiekis | Kitos nuostatos | Leidimo galiojimo terminas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kolonijas sudarančio vieneto (KSV)/kg visaverčio pašaro | | | |
| **Mikroorganizmai** | | | | | | | | |
| ▼M5 — | | | | | | | | |
| ▼B E 1702 | *Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47 | *Saccharomyces cerevisiae* preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip: $5 \times 10^9$ KSV/g priedo | Paršeliai (atjunkyti) | — | $5 \times 10^9$ | ►M2 — ◄ | Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. Naudoti atjunkytiems paršeliams maždaug iki 35 kg. | Neribotam laikui |
| E 1706 | *Enterococcus faecium* DSM 7134 *Lactobacillus rhamnosus* DSM 7133 | Mišinys: *Enterococcus faecium*, kuriame yra ne mažiau kaip: $7 \times 10^9$ CFU/g ir *Lactobacillus rhamnosus*, kuriame yra ne mažiau kaip: $3 \times 10^9$ CFU/g | Paršeliai (atjunkyti) | — | $2{,}5 \times 10^9$ | $5 \times 10^9$ | Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. Naudoti atjunkytiems paršeliams maždaug iki 35 kg. | Neribotam laikui |

▼B

*III PRIEDAS*

| Nr. (arba EB Nr.) | Priedas | Cheminė formulė, aprašymas | Gyvūno rūšis arba kategorija | Didžiausias amžius | Mažiausias kiekis | Didžiausias kiekis | Kitos nuostatos | Leidimo galiojimo terminas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kolonijas sudarančio vieneto (KSV)/kg visaverčio pašaro | | | |
| **Mikroorganizmai** | | | | | | | | |
| 24 | *Kluyveromyces marxianus* var. *lactisK1* BCCM/MUCL 39434 | *Kluyveromyces marxianus* var. *lactisK1* preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip: $1,0 \times 10^8$ CFU/g | Melžiamos karvės | — | $0,25 \times 10^6$ | $1,0 \times 10^6$ | Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką.<br>Nenaudoti dražuotame premikse ir dražuotuose pašaruose.<br>Naudoti melžiamoms karvėms, ypač kai jų paros pieno gamyba pasiekia maksimumą, mažiausiai 14 dienų.<br>Vienai karvei skiriamas paros racionas yra $1,0 \times 10^7$ KSV. | Iki 2008 m. gruodžio 20 d. |

▼B

*IV PRIEDAS*

| EB Nr. | Priedas | Cheminė formulė, aprašymas | Gyvūno rūšis arba kategorija | Didžiausias amžius | Mažiausias kiekis | Didžiausias kiekis | Kitos nuostatos | Leidimo galiojimo terminas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro | | | |
| **Fermentai** | | | | | | | | |
| E 1615 | Endo-1,3(4)-beta-glukanazė EC 3.2.1.6 | Endo-1,3(4)-beta-glucanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:<br>Kieto pavidalo:<br>70 000 BGN (1)/g<br>Skysto pavidalo:<br>14 000 BGN/ml | Mėsiniams viščiukams | — | 1 050 BGN | — | 1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.<br>2. Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro.<br>2 800 BGN.<br>3. Naudoti kombinuotuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač beta- gliukanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 35 % miežių. | Neribotam laikui |
| ▼M4 —— | | | | | | | | |
| ▼M3 —— | | | | | | | | |

▼B

(1) 1 BGN – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš miežių beta-gliukano, esant 4,8 pH ir 50 °C temperatūrai.

▼B

*V PRIEDAS*

| Nr. (arba EB Nr.) | Priedas | Cheminė formulė, aprašymas | Gyvūno rūšis arba kategorija | Didžiausias amžius | Mažiausias kiekis / Didžiausias kiekis<br>Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro | | Kitos nuostatos | Leidimo galiojimo terminas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fermentai** | | | | | | | | |
| 30 (arba E 1604 | Endo-1,3(4)-beta-glukanazė EC 3.2.1.6<br>Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8 | Endo-1,3(4)-beta-glucanazės ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 101), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:<br>Miltelių pavidalo:<br>Endo-1,3(4)-beta-glukanazė:<br>2 000 U ([1])/g<br>Endo-1,4-beta-ksilanazė:<br>1 400 U ([2])/g<br>Skysto pavidalo:<br>Endo-1,3(4)-beta-glukanazė:<br>500 U/ml<br>Endo-1,4-beta-ksilanazė:<br>350 U/ml | Paršeliai (atjunkyti) | | endo-1,3(4)-beta-glukanazė: 100 U<br>endo-1,4-beta-ksilanazė: 70 U | —<br>— | 1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.<br>2. Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro.<br>endo-1,3(4)-beta-glukanazė: 100 U<br>endo-1,4-beta-ksilanazė: 70 U.<br>3. Naudoti kombinuotuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač beta- gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 30 % kviečių.<br>4. Naudoti atjunkytiems paršeliams maždaug iki 35 kg svorio. | Iki 2008 m. gruodžio 20 d. |

▼B

| Nr. (arba EB Nr.) | Priedas | Cheminė formulė, aprašymas | Gyvūno rūšis arba kategorija | Didžiausias amžius | Mažiausias kiekis | Didžiausias kiekis | Kitos nuostatos | Leidimo galiojimo terminas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro | | | |
| | | | Mėsinėms antims | — | endo-1,3(4)-beta-glukanazė: 100 U<br><br>endo-1,4-beta-ksilanazė: 70 U | —<br><br>— | 1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.<br>2. Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro.<br>endo-1,3(4)-beta-glukanazė: 100 U<br>endo-1,4-beta-ksilanazė: 70 U<br>3. Naudoti kombinuotuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač beta-gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 60 % kviečių. | Iki 2008 m. gruodžio 20 d. |

([1]) 1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 5,55 mikromolio redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš miežių beta-gliukano, esant 5,0 pH ir 50 °C temperatūrai.
([2]) 1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 4,00 mikromolius redukuojančių cukrų (maltozės ekvivalentai) per minutę iš beržų ksilano, esant 5,5 pH ir 50 °C temperatūrai.