Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2148/2004

ze dne 16. prosince 2004

o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek a o povolení nových použití již povolené doplňkové látky v krmivech

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 24)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►M1	Nařízení Komise (ES) č. 1980/2005 ze dne 5. prosince 2005	L 318	3	6.12.2005
►M2	Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1018/2012 ze dne 5. listopadu 2012	L 307	56	7.11.2012
►M3	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1043 ze dne 30. června 2015	L 167	63	1.7.2015
►M4	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2305 ze dne 10. prosince 2015	L 326	43	11.12.2015
►M5	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/447 ze dne 14. března 2017	L 69	18	15.3.2017

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2148/2004

ze dne 16. prosince 2004

o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek a o povolení nových použití již povolené doplňkové látky v krmivech

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Bez časového omezení a za podmínek stanovených v příloze I se povoluje použití přípravku, který patří do kategorie „pojiva, protispékavé látky a koagulanty“, jako doplňkové látky ve výživě zvířat.

Článek 2

Bez časového omezení a za podmínek stanovených v příloze II se povoluje použití přípravků, které patří do skupiny „mikroorganismy“, jako doplňkových látek ve výživě zvířat.

Článek 3

Dočasně se na dobu čtyř let a za podmínek stanovených v příloze III povoluje použití přípravku, který patří do skupiny „mikroorganismy“, jako doplňkové látky ve výživě zvířat.

Článek 4

Bez časového omezení a za podmínek stanovených v příloze IV se povoluje použití přípravků, které patří do skupiny „enzymy“, jako doplňkových látek ve výživě zvířat.

Článek 5

Dočasně se na dobu čtyř let a za podmínek stanovených v příloze V povoluje použití přípravku, který patří do skupiny „enzymy“, jako doplňkové látky ve výživě zvířat.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼B

PŘÍLOHA I

Číslo ES	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec doby povolení
					mg/kg kompletního krmiva			
Pojiva, protispékavé látky a koagulanty								
E 567	Klinoptilolit sopečného původu	hydrát hlinitokřemičitanu vápenatého sopečného původu obsahující min. 85 % klinoptilolitu a max. 15 % živců, slíd a jílů, neobsahující vlákna a křemen.►M1 ——————— ◄	prasata	—	—	20 000	všechna krmiva	bez časového omezení
			králíci	—	—	20 000	všechna krmiva	bez časového omezení
			drůbež	—	—	20 000	všechna krmiva	bez časového omezení

▼B

PŘÍLOHA II

Číslo ES	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec doby povolení
					CFU/kg kompletního krmiva			
Mikroorganismy								
▼M5 —								
▼B E 1702	*Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47	přípravek ze *Saccharomyces cerevisiae* obsahující min.: 5×10^9 CFU/g doplňkové látky	selata (po odstavení)	—	5×10^9	►M2 —— ◄	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. Pro použití u selat po odstavení do zhruba 35 kg.	bez časového omezení
E 1706	*Enterococcus faecium* DSM 7134 *Lactobacillus rhamnosus* DSM 7133	směs: *Enterococcus faecium* obsahující min.: 7×10^9 CFU/g a *Lactobacillus rhamnosus* obsahující min.: 3×10^9 CFU/g	selata (po odstavení)	—	$2{,}5 \times 10^9$	5×10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. Pro použití u selat po odstavení do zhruba 35 kg.	bez časového omezení

▼B

PŘÍLOHA III

Číslo (nebo číslo ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec doby povolení
					CFU/kg kompletního krmiva			
Mikroorganismy								
24	*Kluyveromyces marxianus* rodu *lactisK1* BCCM/MUCL 39434	Přípravek z *Kluyveromyces marxianus* var. *lactisK1* s minimem aktivity pro: $1,0 \times 10^8$ CFU/g	dojnice	—	$0,25 \times 10^6$	$1,0 \times 10^6$	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti. Nepoužívat v granulovaném premixu a krmivech. U dojnic, zejména pokud dosahují maxima denní produkce mléka, používat nejméně po dobu 14 dní. Výše denní dávky podávané každé krávě je $1,0 \times 10^7$ CFU.	20. prosince 2008

▼B

PŘÍLOHA IV

Číslo ES	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec doby povolení
					Jednotky aktivity na kg kompletního krmiva			
Enzymy								
E 1615	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	přípravek z endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovaný *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W) s minimem aktivity pro: pevnou formu: 70 000 BGN ([1])/g kapalnou formu: 14 000 BGN/ml	výkrm kuřat	—	1 050 BGN	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 2 800 BGN. 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahujících více než 35 % ječmene.	bez časového omezení
▼M4 —								
▼M3 —								

▼B

([1]) 1 BGN je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 4,8 a teplotě 50 °C.

PŘÍLOHA V

Číslo (nebo číslo ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec doby povolení
					Jednotky aktivity na kg kompletního krmiva			
Enzymy								
30 (nebo E 1604)	endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	přípravek z endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaný *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101) s minimem aktivity pro: práškovou formu: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 2 000 U ([1])/g endo-1,4-beta-xylanáza: 1 400 U ([2])/g kapalnou formu: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 500 U/ml endo-1,4-beta-xylanáza: 350 U/ml	selata (po odstavení)		endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U	— —	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti. 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), např. obsahujících více než 30 % ječmene nebo 20 % pšenice. 4. U selat po odstavení do zhruba 35 kg.	20. prosince 2008

▼B

Číslo (nebo číslo ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec doby povolení
					Jednotky aktivity na kg kompletního krmiva			
			výkrm kachen	—	endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U	— —	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), např. obsahujících více než 50 % ječmene nebo 60 % pšenice.	20. prosince 2008

([1]) 1 U je množství enzymu, které uvolní 5,55 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty maltózy) za minutu z beta-glukanu ovsa při pH 5,0 a teplotě 50 °C.
([2]) 1 U je množství enzymu, které uvolní 4,00 mikromoly redukujících cukrů (ekvivalenty maltózy) za minutu z xylanu březového dřeva za minutu při pH 5,5 a teplotě 50 °C.