Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2148/2004

av den 16 december 2004

om permanenta och preliminära godkännanden av vissa fodertillsatser och godkännande av nya användningsområden för redan godkända fodertillsatser

(Text av betydelse för EES)

(EUT L 370, 17.12.2004, s. 24)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►M1	Kommissionens förordning (EG) nr 1980/2005 av den 5 december 2005	L 318	3	6.12.2005
►M2	Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1018/2012 av den 5 november 2012	L 307	56	7.11.2012
►M3	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1043 av den 30 juni 2015	L 167	63	1.7.2015
►M4	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2305 av den 10 december 2015	L 326	43	11.12.2015
►M5	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/447 av den 14 mars 2017	L 69	18	15.3.2017

▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2148/2004

av den 16 december 2004

om permanenta och preliminära godkännanden av vissa fodertillsatser och godkännande av nya användningsområden för redan godkända fodertillsatser

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Det preparat som hör till gruppen ”Bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel” skall godkännas utan tidsbegränsning för användning som fodertillsats enligt de villkor som anges i bilaga I.

Artikel 2

De preparat som hör till gruppen ”Mikroorganismer” skall godkännas för användning utan tidsbegränsning som fodertillsatser enligt de villkor som anges i bilaga II.

Artikel 3

De preparat som hör till gruppen ”Mikroorganismer” skall godkännas tillfälligt i fyra år för användning som fodertillsatser enligt de villkor som anges i bilaga III.

Artikel 4

De preparat som hör till gruppen ”Enzymer” skall godkännas för användning utan tidsbegränsning som fodertillsatser enligt de villkor som anges i bilaga IV.

Artikel 5

De preparat som hör till gruppen ”Enzymer” skall godkännas tillfälligt i fyra år för användning som fodertillsatser enligt de villkor som anges i bilaga V.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼B

BILAGA I

EG-nr	Tillsats	Kemisk formel och beskrivning	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Högsta halt	Godkännandet gäller till och med
					mg/kg helfoder			
Bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel								
E 567	Klinoptilit av vulkaniskt ursprung	Hydratiserat kalciumaluminiumsilikat av vulkaniskt ursprung med minst 85 % klinoptilit och högst 15 % fältspat, glimmer och lera, fritt från fibrer och kvarts.►**M1** ——————— ◄	Svin	—	—	20 000	Allt foder	Utan tidsbegränsning
			Kaniner	—	—	20 000	Allt foder	Utan tidsbegränsning
			Fjäderfä	—	—	20 000	Allt foder	Utan tidsbegränsning

▼B

BILAGA II

EG-nr	Tillsats	Kemisk formel och beskrivning	Djurart eller -djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg helfoder			
Mikroorganismer								
▼M5 —								
▼B								
E 1702	*Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47	Preparat av *Saccharomyces cerevisiae* som innehåller minst: 5×10^9 CFU/g tillsats	Smågrisar (avvanda)	—	5×10^9	►M2 — ◄	Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering. För användning hos avvanda smågrisar på upp till ca 35 kg.	Utan tidsbegränsning
E 1706	*Enterococcus faecium* DSM 7134 *Lactobacillus rhamnosus* DSM 7133	Blandning av: *Enterococcus faecium* som innehåller minst 7×10^9 CFU/g och av *Enterococcus faecium* som innehåller minst 3×10^9 CFU/g	Smågrisar (avvanda)	—	$2{,}5 \times 10^9$	5×10^9	Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering. För användning hos avvanda smågrisar på upp till ca 35 kg.	Utan tidsbegränsning

▼B

BILAGA III

Nr (eller EG-nr)	Tillsats	Kemisk formel och beskrivning	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg helfoder			
Mikroorganismer								
24	*Kluyveromyces marxianus* BCCM/MUCL 39434	Preparat av *Kluyveromyces marxianus* var. *lactisK1* Minsta aktivitet: $1,0 \times 10^8$ CFU/g	Mjölkkor	—	$0,25 \times 10^6$	$1,0 \times 10^6$	I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur och lagringstid anges Använd inte i pelleterad förblandning och foder. Använd för mjölkkor, särskilt vid högsta dagliga mjölkproduktion, i minst 14 dagar. Daglig dos till varje ko $1,0 \times 10^7$ CFU.	20 december 2008

▼B

BILAGA IV

EG-nr	Tillsats	Kemisk formel och beskrivning	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					Aktivitetsenheter/kg helfoder			
Enzymer								
E 1615	Endo-1,3(4)-betaglukanas EC 3.2.1.6	Preparat av endo-1,3(4)-betaglukanas framställt av *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W). Minsta aktivitet: Fast form: 70 000 BGN (1)/g Flytande form: 14 000 BGN/ml	Slaktkycklingar	—	1 050 BGN	—	1. I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges. 2. Rekommenderad dos/kg helfoder: 2 800 BGN. 3. För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelse-polysackarider (huvudsakligen beta-glukaner), t.ex. sådana som innehåller mer än 35 % korn.	Utan tidsbegränsning
▼M4 —								
▼M3 —								

▼B

(1) 1 BGN motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (glukosekvivalenter) per minut från korn-betaglukan vid pH 4,8 och 50 °C.

BILAGA V

Nr (eller EG-nr)	Tillsats	Kemisk formel och beskrivning	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	God-kännandet gäller till och med
					Aktivitetsenheter/kg helfoder			
Enzymer								
30 (eller E 1604)	Endo-1,3(4)-betaglukanas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-betaxylanas EC 3.2.1.8	Preparat av endo-1,3(4)-beta-glukanas och endo-1,4-beta-xylanas framställt av *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101). Minsta aktivitet: Pulverform: Endo-1,3(4)-betaglukanas: 2 000 U ([1])/g Endo-1,4-betaxylanas: 1 400 U ([2])/g Flytande form: Endo-1,3(4)-betaglukanas: 500 U/ml Endo-1,4-betaxylanas: 350 U/ml	Smågrisar (avvanda)		Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 100 U Endo-1,4-betaxylanas: 70 U	— —	1. I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges. 2. Rekommenderad dos/kg helfoder: endo-1,3(4)-betaglukanas: 100 U endo-1,4 -betaxylanas: 70 U. 3. För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelse-polysackarider, (huvudsakligen beta-glukaner och arabinoxylaner), t.ex. sådana som innehåller mer än 30 % korn eller 20 % vete. 4. För avvanda smågrisar på upp till ca 35 kg.	20 december 2008

▼B

Nr (eller EG-nr)	Tillsats	Kemisk formel och beskrivning	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	God-kännandet gäller till och med
					Aktivitetsenheter/kg helfoder			
			Slaktankor	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 100 U Endo-1,4-betaxylanas: 70 U	— —	1. I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges. 2. Rekommenderad dos/kg helfoder: endo-1,3(4)-betaglukanas: 100 U endo-1,4 -betaxylanas: 70 U. 3. För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelse-polysackarider, (huvudsakligen betaglukaner och arabinoxylaner), t.ex. sådana som innehåller mer än 50 % korn eller 60 % vete.	20 december 2004

([1]) 1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 5,55 mikromol reducerande sockerarter (maltosekvivalenter) per minut från korn-betaglukan vid pH 5,0 och 50° C.
([2]) 1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 4,00 mikromol reducerande sockerarter (maltosekvivalenter) per minut från björkträ-xylan vid pH 5,5 och 50° C.