Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►**B**

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2148/2004 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2004 година

относно постоянните и временните разрешителни за някои добавки и разрешаването на нови употреби на дадена добавка, която вече е разрешена при храненето на животни

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 370, 17.12.2004 г., стр. 24)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Регламент (ЕО) № 1980/2005 на Комисията от 5 декември 2005 година	L 318	3	6.12.2005 г.
►**M2**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 1018/2012 на Комисията от 5 ноември 2012 година	L 307	56	7.11.2012 г.
►**M3**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1043 на Комисията от 30 юни 2015 година	L 167	63	1.7.2015 г.
►**M4**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2305 на Комисията от 10 декември 2015 година	L 326	43	11.12.2015 г.
►**M5**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/447 на Комисията от 14 март 2017 година	L 69	18	15.3.2017 г.

▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2148/2004 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2004 година

относно постоянните и временните разрешителни за някои добавки и разрешаването на нови употреби на дадена добавка, която вече е разрешена при храненето на животни

(текст от значение за ЕИП)

Член 1

Препаратът, принадлежащ към групата „Свързващи вещества, противослепващи агенти и коагуланти“, се разрешава за употреба за неограничен период от време като добавка при храненето на животните съгласно условията, определени в приложение I.

Член 2

Препаратите, принадлежащи към групата „Микроорганизми“, се разрешават за употреба за неограничен период от време като добавки в храненето на животните съгласно условията, определени в приложение II.

Член 3

Препаратът, принадлежащ към групата „Микроорганизми“, се разрешава за употреба за срок от четири години като добавка в храненето на животните съгласно условията, определени в приложение III.

Член 4

Препаратите, принадлежащи към групата „Ензими“, се разрешават за употреба за неограничен период от време като добавки в храненето на животните съгласно условията, определени в приложение IV.

Член 5

Препаратът, принадлежащ към групата „Ензими“, се разрешава за употреба за срок от четири години като добавка в храненето на животните съгласно условията, определени в приложение V.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Номер ЕО	Добавка	Химическа формула, описание	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Край на периода на разрешението
					(mg/kg) пълноценна храна			
Свързващи вещества, противослепващи агенти и коагуланти								
E 567	Клиноптилолит от вулканичен произход	Калциев хидриран алуминосиликат от вулканичен произход, съдържащ минимум 85 % от клиноптилолит и максимум 15 % фелдшпат, слюда и глина, без влакна и кварц. ►M1 ——————— ◄	Прасета за угояване	—	—	20 000	Всички храни	Неограничен период от време
			Зайци	—	—	20 000	Всички храни	Неограничен период от време
			Птици	—	—	20 000	Всички храни	Неограничен период от време

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Номер ЕО	Добавка	Химическа формула, описание	Видове или категория животни	Максимална възраст	Максимално съдържание	Минимално съдържание	Други разпоредби	Край на периода на разрешението
					CFU/kg пълноценна храна			
Микроорганизми								
▼M5 —								
▼B								
E 1702	*Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47	Препарат от *Saccharomyces cerevisiae*, съдържащ минимум: 5×10^9 CFU/g добавка	Прасенца (отбити)	—	5×10^9	►M2 —— ◄	В упътването за употреба на добавката и премиксите посочете температурата при съхраняване на склад, срока за съхранение и стабилността при гранулиране Да се употребява при отбити прасенца до приблизително 35 kg.	Неограничен период от време
E 1706	*Enterococcus faecium* DSM 7134 *Lactobacillus rhamnosus* DSM 7133	Смес от: *Enterococcus faecium*, съдържащ минимум: 7×10^9 CFU/g и от *Lactobacillus rhamnosus*, съдържащ минимум: 3×10^9 CFU/g	Прасенца (отбити)	—	$2{,}5 \times 10^9$	5×10^9	В упътването за употреба на добавката и премиксите посочете температурата при съхраняване на склад, срока за съхранение и стабилността при гранулиране. Да се употребява при отбити прасенца до приблизително 35 kg.	Неограничен период от време

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Номер (или номер ЕО)	Добавка	Химическа формула, описание	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Край на периода на разрешението
					CFU/kg пълноценна храна			
Микроорганизми								
24	*Kluyveromyces marxianus* var. *lactisK1* BCCM/MUCL 39434	Препарат от *Kluyveromyces-marxianus* var. *lactisK1*, имащ минимална активност от: $1,0 \times 10^8$ CFU/g	Млечни крави	—	$0,25 \times 10^6$	$1,0 \times 10^6$	В упътването за употреба на добавката и премиксите посочете температурата при съхраняване на склад и срока за съхранение. Да не се използва в премикси и храни, които са гранулирани. Да се използва при млечни крави, по-специално когато те достигнат максималното ниво на ежедневното им производство на мляко, за минимален период от 14 дни. Размерът на дневната дажба, която трябва да се даде на всяка крава, е $1,0 \times 10^7$ CFU.	20 декември 2008 г.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Номер ЕО	Добавка	Химическа формула, описание	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Край на периода на разрешението
					Единици активност/kg пълноценна храна			
Ензими								
E 1615	Ендо-1,3(4)-бетаглюконаза EC 3.2.1.6	Препарат от ендо-1,3(4)-бетаглюконаза, произведен от *Trichodermalongibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W), имащ минимална активност от: Твърда форма: 70 000 BGNg ([1]) Течна форма: 14 000 BGN/ml	Пилета за угояване	—	1 050 BGN	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите посочете температурата при съхраняване на склад, срока за съхранение и стабилността при гранулиране. 2. Препоръчителната доза на kg пълноценна храна е: 2 800 BGN. 3. Да се използва в комбинираните храни за животни, богати на полизахариди, несъдържащи нишесте (главно бета-глюкани), т.е. съдържащи повече от 35 % ечемик.	Неограничен период от време
▼M4 —								
▼M3 —								

▼B

([1]) 1 BGN е количеството ензими, което освобождава 1 микромол редуциращи захари (измерени в еквивалент глюкоза) на минута от бета-глюкан на ечемика при pH 4,8 и при 50 °C.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Номер (или номер ЕО)	Добавка	Химическа формула, описание	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Край на периода на разрешението
					Единици активност/kg пълноценна храна			
Ензими								
30 (или E 1604)	Ендо-1,3(4)-бетаглюконаза ЕС 3.2.1.6 Ендо-1,4-бетаксиланаза ЕС 3.2.1.8	Препарат от ендо-1,3(4)-бета-глюконаза и ендо-1,4-бета-ксиланаза, произведени от *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101), имащ минимална активност от: Прахообразна форма: Ендо-1,3(4)- бета-глюконаза: 2 000 U ([1])/g Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 1 400 U ([2])/g Течна форма: Ендо-1,3(4)- бета-глюконаза: 500 U/g Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 350 U/ml	Прасенца (отбити)	—	ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 100 U ендо-1,4-бета-ксиланаза: 70 U	— —	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите посочете температурата при съхраняване на склад, срока за съхранение и стабилността при гранулиране. 2. Препоръчителната доза на kg пълноценна храна е: ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 100 U ендо-1,4-бета-ксиланаза: 70 U 3. Да се използва в комбинираните храни за животни, богати на полизахариди, несъдържащи нишесте (главно бета-глюкан или арабиноксилани), т.е. съдържащи повече от 30 % ечемик или 20 % пшеница. 4. При отбитите прасенца до приблизително 35 kg.	20 декември 2008 г.

▼B

Номер (или номер ЕО)	Добавка	Химическа формула, описание	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Край на периода на разрешението
					Единици активност/kg пълноценна храна			
			Патици за угояване	—	ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 100 U ендо-1,4-бета-ксиланаза: 70 U	— —	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите посочете температурата при съхраняване на склад, срока за съхранение и стабилността при гранулиране. 2. Препоръчителната доза на kg пълноценна храна е: ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 100 U ендо-1,4-бета-ксиланаза: 70 U 3. Да се използва в комбинираните храни за животни, богати на полизахариди, несъдържащи нишесте (главно бета-глюкан или арабиноксилани), т.е. съдържащи повече от 50 % ечемик или 60 % пшеница.	20 декември 2008 г.

([1]) 1 U е количеството ензими, което освобождава 5,55 микромола редуциращи захари (измерени в еквивалент малтоза) на минута от бета-глюкан на ечемика при pH 5,0 и при 50 °C.
([2]) 1 U е количеството ензими, което освобождава 4,00 микромола редуциращи захари (измерени в еквивалент малтоза) на минута от ксилан на бреза, при pH 5,5 и при 50 °C.