Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2148/2004,

16. detsember 2004,

mis käsitleb teatud söödalisandite ajutisi ja alalisi kasutuslube ning söödas juba lubatud söödalisandite uute kasutusviiside lubamist

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 370, 17.12.2004, lk 24)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1980/2005, 5. detsember 2005	L 318	3	6.12.2005
►M2	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1018/2012, 5. november 2012	L 307	56	7.11.2012
►M3	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1043, 30. juuni 2015	L 167	63	1.7.2015
►M4	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2305, 10. detsember 2015	L 326	43	11.12.2015
►M5	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/447, 14. märts 2017	L 69	18	15.3.2017

▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2148/2004,

16. detsember 2004,

mis käsitleb teatud söödalisandite ajutisi ja alalisi kasutuslube ning söödas juba lubatud söödalisandite uute kasutusviiside lubamist

(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1

Sideainete, paakumisvastaste ainete ja koagulantide rühma kuuluvat preparaati lubatakse tähtajatult kasutada söödalisandina loomasöödas I lisas ettenähtud tingimustel.

Artikkel 2

Mikroorganismide rühma kuuluvaid preparaate lubatakse tähtajatult kasutada söödalisandina loomasöödas II lisas ettenähtud tingimustel.

Artikkel 3

Mikroorganismide rühma kuuluvat preparaati lubatakse ajutiselt kasutada söödalisandina loomasöödas nelja aasta jooksul III lisas ettenähtud tingimustel.

Artikkel 4

Ensüümide rühma kuuluvaid preparaate lubatakse tähtajatult kasutada söödalisandina loomasöödas IV lisas ettenähtud tingimustel.

Artikkel 5

Ensüümide rühma kuuluvat preparaati lubatakse ajutiselt kasutada söödalisandina loomasöödas nelja aasta jooksul V lisas ettenähtud tingimustel.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

I LISA

EÜ nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldu	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					täissöödas (mg/kg)			
Sideained, paakumisvastased ained ja koagulandid								
E 567	Vulkaaniline klinoptiloliit	Kiu- ja kvartsivaba vulkaaniline hüdraatunud kaltsium-alumosilikaat, mis sisaldab vähemalt 85 % klinoptiloliiti ja kuni 15 % päevakivi, vilke ja savisid ►M1 ——— ◄	Sead	—	—	20 000	Kõik söödad	Tähtajatu
			Küülikud	—	—	20 000	Kõik söödad	Tähtajatu
			Kodulinnud	—	—	20 000	Kõik söödad	Tähtajatu

02004R2148 — ET — 04.04.2017 — 005.001 — 3

▼B

II LISA

EÜ nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus (CFU/kg täissöödas)	Maksimumsisaldus (CFU/kg täissöödas)	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
Mikroorganismid								
▼M5 —								
▼B E 1702	*Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47	*Saccharomyces cerevisiae* valmistis, mis sisaldab vähemalt: 5×10^9 CFU/g lisandit	Põrsad (võõrutatud)	—	5×10^9	►M2 — ◄	Söödalisandi ja eelsegu kasutusjuhenditesse märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus. Lubatakse kasutada umbes kuni 35 kg võõrutatud põrsaste puhul.	Tähtajatu
E 1706	*Enterococcus faecium* DSM 7134 *Lactobacillus rhamnosus* DSM 7133	Valmistis koosneb: *Enterococcus faecium*, mis sisaldab vähemalt 7×10^9 CFU/g ja *Lactobacillus rhamnosus*, mis sisaldab vähemalt 3×10^9 CFU/g	Põrsad (võõrutatud)	—	$2{,}5 \times 10^9$	5×10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutusjuhenditesse märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus. Lubatakse kasutada umbes kuni 35 kg võõrutatud põrsaste puhul.	Tähtajatu

▼B

III LISA

EÜ nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					CFU/kg täissöödas			
Mikroorganismid								
24	*Kluyveromyces marxianus* var. *lactisK1* BCCM/MUCL 39434	*Kluyveromyces marxianus* var. *lactisK1* valmistis minimaalse aktiivsusega $1,0 \times 10^8$ CFU/g	Lüpsilehmad	—	$0,25 \times 10^6$	$1,0 \times 10^6$	Söödalisandi ja eelsegu kasutusjuhenditesse märkida säilitustemperatuur ja kõlblikkusaeg. Granuleeritud eelsegudes ja söötades mitte kasutada. Kasutada lüpsilehmade puhul vähemalt 14 päeva jooksul, ennekõike siis, kui nende päevane väljalüps hakkab jõudma ülemise piirini. Päevane aktiivsusühikute kogus lehma kohta on $1,0 \times 10^7$ CFU.	20. detsember 2008

▼B

IV LISA

EÜ nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta			
Ensüümid								
E 1615	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6	*Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W) abil toodetud preparaat endo-1,3(4)-beeta-glükanaas minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul: 70 000 BGN ([1])/g Vedelal kujul: 14 000 BGN/ml	Broilerkanad	—	1 050 BGN	—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutusjuhenditesse märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus. 2. Soovituslik annus ühe kilogrammi täissööda kohta: 2 800 BGN. 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid) jõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 35 % otra.	Tähtajatu
▼M4 —								
▼M3 —								

▼B

([1]) 1 BGN on ensüümi hulk, mis vabastab 1 mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) odra beeta-glükaanist minutis pH taseme 4,8 ja temperatuuri 50 °C juures.

V LISA

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta			
Ensüümid								
E 1604	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4- beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Penicillium funiculosum* (IMI SD 101) abil toodetud preparaat endo-1,3(4)-beeta-glükanaas ja endo-1,4- beeta-ksülanaas minimaalse aktiivsusega: Pulbrilisel kujul: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 2 000 U ([1])/g Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 400 U ([2])/g Vedelal kujul: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 500 U/ml Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 350 U/ml	Põrsad (võõrutatud)		endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 70 U	— —	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutusjuhenditesse märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus. 2. Soovituslik annus ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)- beeta-glükanaas: 100 U endo-1,4- beeta-ksülanaas: 70 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) jõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 30 % otra või 20 % nisu. 4. Lubatakse kasutada umbes kuni 35 kg võõrutatud põrsaste puhul.	20. detsember 2008

▼B

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta			
			Broilerpardid	—	endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 70 U	— —	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutusjuhenditesse märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus. 2. Soovituslik annus ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)- beeta-glükanaas: 100 U endo-1,4- beeta-ksülanaas: 70 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) jõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % otra või 60 % nisu.	20. detsember 2008

([1]) 1 U on ensüümi hulk, mis vabastab 5,55 mikromooli redutseerivaid suhkruid (maltoosa ekvivalendid) odra beeta-glükaanist minutis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 50 °C juures.
([2]) 1 U on ensüümi hulk, mis vabastab 4,00 mikromooli redutseerivaid suhkruid (maltoosa ekvivalendid) kasepuidu ksülaanist minutis pH taseme 5,5 ja temperatuuri 50 °C juures.