# REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/839 AL COMISIEI

## din 5 mai 2025

## de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide „Oxivir Excel BPF” în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

**(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide ([1]), în special articolul 44 alineatul (5) primul paragraf,

întrucât:

(1) La 16 decembrie 2016, Diversey Europe Operations B.V. a transmis Agenției Europene pentru Produse Chimice („agenția”), în conformitate cu articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, o cerere de autorizație a Uniunii pentru o familie de produse biocide denumită „Oxivir Excel BPF” din tipurile de produs 2 și 4, astfel cum sunt descrise în anexa V la respectivul regulament, punând la dispoziție confirmarea scrisă că autoritatea competentă din Țările de Jos a fost de acord să evalueze cererea. Cererea a fost înregistrată în Registrul produselor biocide cu numărul de caz BC-DL028504-45.

(2) „Oxivir Excel BPF” conține peroxid de hidrogen ca substanță activă, care este inclus în lista Uniunii de substanțe active aprobate menționată la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, pentru tipurile de produse 2 și 4.

(3) La 25 septembrie 2023, autoritatea competentă responsabilă de evaluare a transmis agenției, în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, un raport de evaluare și concluziile evaluării sale.

(4) La 20 martie 2024, agenția a prezentat Comisiei avizul său ([2]), proiectul de rezumat al caracteristicilor produsului biocid (denumit în continuare „RCP”) pentru „Oxivir Excel BPF” și raportul final de evaluare privind familia de produse biocide, în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(5) Avizul concluzionează că „Oxivir Excel BPF” este o familie de produse biocide în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (s) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, că este eligibilă pentru a primi o autorizație a Uniunii în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din respectivul regulament și că, sub rezerva conformității cu proiectul de RCP, îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (6) din regulamentul respectiv.

(6) La 15 aprilie 2024, agenția a transmis Comisiei proiectul de SPC în toate limbile oficiale ale Uniunii, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(7) Comisia este de acord cu avizul agenției și consideră, prin urmare, că este necesar să se acorde o autorizație a Uniunii pentru familia de produse biocide „Oxivir Excel BPF”.

(8) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

([1]) JO L 167, 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) ECHA opinion of 29 February 2024 on the Union authorisation of ‘Oxivir Excel BPF’ (Avizul ECHA din 29 februarie 2024 privind autorizația Uniunii pentru „Oxivir Excel BPF”) (ECHA/BPC/417/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

Societății Diversey Europe Operations B.V. i se acordă o autorizație a Uniunii cu numărul EU-0032483-0000 pentru punerea la dispoziție pe piață și utilizarea familiei de produse biocide „Oxivir Excel BPF”, în conformitate cu rezumatul caracteristicilor produsului biocid prevăzut în anexă.

Autorizația Uniunii este valabilă de la 26 mai 2025 până la 30 aprilie 2035.

*Articolul 2*

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 mai 2025.

*Pentru Comisie*
*Președinta*
Ursula VON DER LEYEN

*ANEXĂ*

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI PENTRU O FAMILIE DE PRODUSE BIOCIDE**

Oxivir Excel BPF

**Tip(uri) de produs**

TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

TP 4: Industria alimentară și a furajelor

**Numărul autorizației** EU-0032483-0000

**Numărul deciziei de reglementare R4BP** EU-0032483-0000

PARTEA I

**PRIMUL NIVEL DE INFORMARE**

1. **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Denumirea familiei de produse**

| | |
|---|---|
| Denumire | Oxivir Excel BPF |

1.2. **Tip(uri) de produs**

| | |
|---|---|
| Tip(uri) de produs | TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale<br>TP 4: Industria alimentară și a furajelor |

1.3. **Deținătorul autorizației**

| | | |
|---|---|---|
| Denumirea și adresa deținătorului autorizației | Denumire | Diversey Europe Operations B.V. |
| | Adresă | De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen, NL |
| Numărul autorizației | EU-0032483-0000 | |
| *Numărul deciziei de reglementare R4BP* | EU-0032483-0000 | |
| Data autorizației | 26 mai 2025 | |
| Data de expirare a autorizației | 30 aprilie 2035 | |

1.4. **Producătorul (producătorii) produsului**

| | |
|---|---|
| Denumirea producătorului | Diversey Europe Operations B.V. |
| Adresa producătorului | De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen, Țările de Jos |
| Adresa locurilor de producție | |

| | |
|---|---|
| Denumirea producătorului | Multifill BV |
| Adresa producătorului | Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht, Țările de Jos |
| Adresa locurilor de producție | Multifill BV site 1<br>Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht, Țările de Jos |

| | |
|---|---|
| Denumirea producătorului | Pluswipes LTD |
| Adresa producătorului | Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord |
| Adresa locurilor de producție | Pluswipes LTD site 1<br>Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord |

| | |
|---|---|
| Denumirea producătorului | Flexible Medical Packaging Ltd |
| Adresa producătorului | Unit 8, Hightown - White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanster, Lancashire, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord |
| Adresa locurilor de producție | Flexible Medical Packaging Ltd site 1<br>Unit 8, Hightown - White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanter, Lancashire, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord |

| | |
|---|---|
| Denumirea producătorului | Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S |
| Adresa producătorului | 395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier, Franța |
| Adresa locurilor de producție | Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S site 1<br>395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier, Franța |

| | |
|---|---|
| Denumirea producătorului | Cheport spol s.r.o. |
| Adresa producătorului | Lhotsko 93 76312 Vizovice, Cehia |
| Adresa locurilor de producție | Cheport spol s.r.o. site 1<br>Lhotsko 93 76312 Vizovice, Cehia |

| | |
|---|---|
| Denumirea producătorului | Helichem |
| Adresa producătorului | Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld, Țările de Jos |

| | |
|---|---|
| Adresa locurilor de producție | Helichem site 1<br>Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld, Țările de Jos |

| | |
|---|---|
| Denumirea producătorului | LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. |
| Adresa producătorului | Türkgücü Organize San. Bölgesi 123.Sokak No 4/1<br>59580 Çorlu, Tekirdağ, Turcia |
| Adresa locurilor de producție | LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. site 1<br>Türkgücü Organize San. Bölgesi 123.Sokak No:4/1<br>59580 Çorlu, Tekirdağ, Turcia |

| | |
|---|---|
| Denumirea producătorului | SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Adresa producătorului | Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 27 34592 Silivri, Istanbul, Turcia |
| Adresa locurilor de producție | SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. site 1<br>Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 27 34592 Silivri, Istanbul, Turcia |

| | |
|---|---|
| Denumirea producătorului | ITW Contamination Control BV |
| Adresa producătorului | Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp, Țările de Jos |
| Adresa locurilor de producție | ITW Contamination Control BV site 1<br>Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp, Țările de Jos |

| | |
|---|---|
| Denumirea producătorului | Arkema |
| Adresa producătorului | Tankhoofd 10 Haven 3255 3196 KE Rotterdam, Țările de Jos |
| Adresa locurilor de producție | Arkema site 1<br>Morschheimer Strasse 19 D-67292 Kirchheimbolanden, Germania |

1.5. **Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active**

| | |
|---|---|
| Substanță activă | Peroxid de hidrogen |
| Denumirea producătorului | Evonik Operations GmbH |
| Adresa producătorului | Evonik Resource Efficiency GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11 D-45128 Essen, Germania |
| Adresa locurilor de producție | Evonik Resource Efficiency GmbH site 1<br>Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden, Germania |

| | |
|---|---|
| Substanță activă | Peroxid de hidrogen |
| Denumirea producătorului | Solvay Chemicals International SA |
| Adresa producătorului | Solvay Chemicals International SA, Rue Ransbeek 310 1120 Brussels, Belgia |
| Adresa locurilor de producție | Solvay Chemicals International site 1<br>Via Piave 6 57013 Rosignano Solvay, Italia<br>Solvay Chemicals International site 2<br>Köthensche Strasse 1-3 06406 Bernburg, Germania<br>Solvay Chemicals International site 3<br>Baronet Road WA4 6HB Warrington, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord<br>Solvay Chemicals International site 4<br>Yrjonojantie 2 45911 Voikkaa, Finlanda<br>Solvay Chemicals International site 5<br>Rua Eng. Clement Dumoulin, 2625-106 Povoa de Santa Iria, Portugalia |

| | |
|---|---|
| Substanță activă | Peroxid de hidrogen |
| Denumirea producătorului | Kemira Oyj |
| Adresa producătorului | Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, PL 330 00101 Helsinki, Finlanda |
| Adresa locurilor de producție | Kemira Oyj site 1<br>Moezelweg 151 3198 LS Rotterdam, Țările de Jos<br>Kemira Oyj site 2<br>Typpitie PL 171 90101 Oulu, Finlanda<br>Kemira Oyj site 3<br>Industrigatan 83 25109 Helsingborg, Suedia |

| | |
|---|---|
| Substanță activă | Peroxid de hidrogen |
| Denumirea producătorului | Arkema France |
| Adresa producătorului | 420, rue dÉstienne dÓrves F-92705 Colombes Cedex, Franța |
| Adresa locurilor de producție | Arkema b.v. site 1<br>Route National 85 38560 Jarrie Franța<br>Arkema b.v. site 2<br>Am Haupttor, Bau 2410 06237 Leuna, Germania |

| | |
|---|---|
| Substanță activă | Peroxid de hidrogen |
| Denumirea producătorului | Arkema GmbH |
| Adresa producătorului | Tersteegenstr. 28 D-40474 Düsseldorf, Germania |

| | |
|---|---|
| Adresa locurilor de producție | Arkema b.v site 1<br>Route National 85 3856 Jarrie, Franța<br>Arkema b.v. site 2<br>Am Haupttor, Bau 2410 0623 Leuna, Germania |

| | |
|---|---|
| Substanță activă | Peroxid de hidrogen |
| Denumirea producătorului | Evonik Antwerpen NV |
| Adresa producătorului | Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen, Belgia |
| Adresa locurilor de producție | Evonik Antwerpen site 1<br>Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen, Belgia |

| | |
|---|---|
| Substanță activă | Peroxid de hidrogen |
| Denumirea producătorului | Evonik Peroxid GmbH |
| Adresa producătorului | Industriestraße 1 9721 Weißenstein, Austria |
| Adresa locurilor de producție | Evonik Peroxid GmbH site 1<br>Industriestrasse 1 9721 Weissenstein, Austria |

| | |
|---|---|
| Substanță activă | Peroxid de hidrogen |
| Denumirea producătorului | Evonik Peroxide Netherlands BV |
| Adresa producătorului | Hettenheuvelweg 37 /39 1101 BM Amsterdam, Țările de Jos |
| Adresa locurilor de producție | Evonik Peroxide Netherlands BV site 1<br>Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum, Țările de Jos |

| | |
|---|---|
| Substanță activă | Peroxid de hidrogen |
| Denumirea producătorului | Evonik Peroxide Spain, S.L.U. |
| Adresa producătorului | C/ Afueras s/h. 50784 La Zaida, Spania |
| Adresa locurilor de producție | Evonik Peroxide Spain, S.L.U. site 1<br>Calle Afueras s/n 50784 La Zaida, Spania |

2. **COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA FAMILIEI DE PRODUSE**

2.1. **Informații calitative și cantitative despre compoziția familiei de produse**

| Denumire comună | Denumire IUPAC | Funcție | Număr CAS | Număr CE | Conținut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroxid de hidrogen | | substanță activă | 7722-84-1 | 231-765-0 | 0,36-7,2 % (de greutate) |

| Denumire comună | Denumire IUPAC | Funcție | Număr CAS | Număr CE | Conținut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (C9-C11) etoxilatul de alcool alchilic | (C9-C11) etoxilatul de alcool alchilic | Substanța inactivă | 68439-46-3 | | 0,09-1,8 % (de greutate) |
| Acidul alchil benzen sulfonic | 2-Dodecyl Benzen Acid Sulphonic | Substanța inactivă | 85536-14-7 | 287-494-3 | 0,97-19,4 % (de greutate) |
| acidul metansulfonic | | Substanța inactivă | 75-75-2 | 200-898-6 | 0,12-2,4 % (de greutate) |

2.2. **Tip(uri) de formulare**

| | |
|---|---|
| Tip(uri) de formulare | AL Orice alt lichid<br>SL Concentrat solubil<br>AL (Orice alt lichid)-Șervețele RTU |

PARTEA II

**AL DOILEA NIVEL DE INFORMARE - META-RCP(-URI)**

1. **META-RCP 1 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 1 identificator**

| | |
|---|---|
| Identificator | Meta SPC: Meta-SPC 1: Concentrate |

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

| | |
|---|---|
| Număr | 1-1 |

1.3. **Tip(uri) de produs**

| | |
|---|---|
| Tip(uri) de produs | TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale<br>TP 4: Industria alimentară și a furajelor |

2. **COMPOZIȚIA META RCP 1**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 1**

| Denumire comună | Denumire IUPAC | Funcție | Număr CAS | Număr CE | Conținut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroxid de hidrogen | | substanță activă | 7722-84-1 | 231-765-0 | 7,2-7,2 % (de greutate) |

| Denumire comună | Denumire IUPAC | Funcție | Număr CAS | Număr CE | Conținut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acidul alchil benzen sulfonic | 2-Dodecyl Benzen Acid Sulphonic | Substanța inactivă | 85536-14-7 | 287-494-3 | 19,4-19,4 % (de greutate) |
| (C9-C11) etoxilatul de alcool alchilic | (C9-C11) etoxilatul de alcool alchilic | Substanța inactivă | 68439-46-3 | | 1,8-1,8 % (de greutate) |
| acidul metansulfonic | | Substanța inactivă | 75-75-2 | 200-898-6 | 2,4-2,4 % (de greutate) |

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 1**

| | |
|---|---|
| Tip(uri) de formulare | SL Concentrat solubil |

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 1**

| | |
|---|---|
| Fraze de pericol | H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.<br>H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.<br>H290: Poate fi coroziv pentru metale. |
| Fraze de precauție | P234: Păstrați numai în recipientul original.<br>P273: Evitați dispersarea în mediu.<br>P280: Purtați mănuşi de protecție, îmbrăcăminte de protecție, echipament de protecție a ochilor sau echipament de protecție a feței.<br>P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].<br>P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.<br>P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.<br>P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.<br>P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați voma.<br>P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.<br>P363: Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare.<br>P390: Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.<br>P501: Aruncați conținutul la un centru de colectare a deșeurilor periculoase în conformitate cu reglementarile în vigoare.<br>P501: Aruncați recipientul la un centru de colectare a deșeurilor periculoase în conformitate cu reglementarile în vigoare. |

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 1*

**Utilizare # 1.1 – Curățarea și dezinfectarea cu mopul în zonele de asistență medicală**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>Produs dezinfectant mai curat pentru suprafețe dure pentru zonele de asistență medicală. |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Spălare cu mopul<br><br>Descriere detaliata:<br>Spălare cu un mop înmuiat. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 11 până la 40 ml/m$^2$ Diluați produsul cu apă până ajungeți la 4,5 % produs.<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br><br>Frecvență de utilizare: de 7 ori pe zi.<br><br>A se utiliza la temperatura camerei |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri - 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>HDPE Flacon(J-Flex): 1,5 litri<br>HDPE Flacon(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri |

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluția produsului: bactericid, fungicid și virucid 4,5% produs

Pentru a preveni spumarea, umpleți un recipient trei sferturi cu apă. Adăugați cantitatea corectă de produs concentrat pentru a ajunge la diluția de 4,5 %. Adăugați cu grijă cu restul de apă.

Adăugați produsul concentrat în apă pentru a evita stropirea cu produs concentrat.

Scufundați mopul în recipient. Stoarceți soluția în exces.

Curățați și dezinfectați podeaua cu mopul umed.

Asigurați-vă că udați complet suprafața.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Lăsați să se usuce la aer.

Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

Pentru pachetele cu sistem de diluare (semi-)automat cu 2 setări:

Selectați setarea corectă pe echipamentul de dozare.

Umpleți recipientul cu produsul diluat (4,5%).

Scufundați mopul în recipient. Stoarceți soluția în exces.

Curățați și dezinfectați podeaua cu mopul umed.

Asigurați-vă că udați complet suprafața.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Lăsați să se usuce la aer.

Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.2. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 2*

**Utilizare # 1.2 – Curățarea și dezinfectarea cu o lavetă sau un burete pentru zonele de asistență medicală**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br>Produs dezinfectant mai curat pentru suprafețe dure pentru zonele de asistență medicală. |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: răspândire<br>Descriere detaliata:<br>Distribuire cu o lavetă îmbibată sau cu un burete. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 11 până la 40 ml/m² Diluați produsul cu apă până ajungeți la 4,5% produs.<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Frecvență de utilizare: de 7 ori pe zi.<br>A se utiliza la temperatura camerei |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>HDPE Flacon(J-Flex): 1,5 litri<br>HDPE Flacon(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri |

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluarea produsului:

Bactericid,

Drojdicid și

Virucid 4,5%

Pentru pachetele cu sistem de diluare manuală:

Pentru a preveni spumarea, umpleți un recipient trei sferturi cu apă. Adăugați cantitatea corectă de produs concentrat pentru a ajunge la diluția de 4,5 %. Adăugați cu grijă cu restul de apă.

Înmuiați cârpa sau buretele în soluție.

Distribuiți lichidul pe suprafață.

Asigurați-vă că udați complet suprafața.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer.

Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

Pentru pachetele cu sistem (semi)automat de diluare

Selectați setarea corectă pe echipamentul de dozare.

Umpleți recipientul cu produsul diluat (4,5 %).

Înmuiați cârpa sau buretele în soluție.

Distribuiți lichidul pe suprafață.

Asigurați-vă că udați complet suprafața.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer.

Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.3. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 3*

**Utilizare # 1.3 – Curățarea și dezinfectarea obiectelor mici prin înmuiere sau scufundare pentru zonele de asistență medicală**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea ițiințifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>“Produs dezinfectant mai curat pentru obiecte mici (de exemplu, foarfece și perii) pentru zonele de asistență medicală.<br>Utilizarea biocidă exclude dezinfectarea dispozitivelor medicale.” |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Înmuiere sau scufundare<br><br>Descriere detaliata:<br>Înmuiere sau scufundare în soluție. |

| | |
|---|---|
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: până la 3 litri Diluați produsul cu apă până ajungeți la 4,5% produs.<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Frecvență de utilizare: De 1 ori pe zi.<br>A se utiliza la temperatura camerei. |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri - 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>HDPE Flacon(J-Flex): 1,5 litri<br>HDPE Flacon(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri |

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluarea produsului: bactericid, drojdicid și virucid 4,5%.

Pentru pachetele cu sistem de diluare manuală:

Pentru a preveni formarea spumei, umpleți un recipient pe trei sferturi cu apă. Adăugați cantitatea corectă de produs pentru a ajunge la diluția de 4,5 %. Adăugați cu grijă cu restul de apă.

Adăugați produsul în apă pentru a evita stropirea cu produs concentrat.

Acoperiți baia de scufundare cu un capac după introducerea obiectelor în soluția dezinfectantă.

Asigurați-vă că articolele care trebuie dezinfectate sunt complet scufundate în soluție timp de 5 minute.

Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer.

Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

Pentru pachetele cu sistem (semi)automat de diluare

Selectați setarea corectă pe echipamentul de dozare.

Umpleți recipientul cu produsul diluat (4,5 %).

Acoperiți baia de scufundare cu un capac după introducerea obiectelor în soluția dezinfectantă.

Asigurați-vă că articolele care trebuie dezinfectate sunt complet scufundate în soluție timp de 5 minute.

Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer.

Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

Soluțiile pentru înmuiere sau scufundare pot fi utilizate o singură dată.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.3.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.3.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.3.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.4. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 4*

**Utilizare # 1.4 – Curățarea și dezinfectarea prin formarea de spumă pentru zonele de asistență medicală**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>Produs dezinfectant mai curat pentru suprafețe dure pentru zonele de asistență medicală. |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: pulverizare<br><br>Descriere detaliata:<br>Pulverizare folosind o spumă de declanșare. Opțional, ștergeți pentru a distribui soluția. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 11 ml/m² Diluați produsul cu apă până ajungeți la 4,5% produs.<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br><br>Frecvența utilizării:<br>Pentru utilizare în toalete și băi: de 4 ori pe zi.<br>Pentru utilizare în spitale și cabinete medicale: de 8 ori pe zi.<br>Pentru utilizare în laboratoare: de 10 ori pe zi.<br>Pentru utilizare în camere sterile: de 10 ori pe zi.<br><br>A se utiliza la temperatura camerei |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>HDPE Flacon(J-Flex): 1,5 litri<br>HDPE Flacon(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri |

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluarea produsului: bactericid, drojdicid și virucid 4,5%

Pentru pachetele cu sistem de diluare manuală:

Pentru a preveni spumarea, umpleți un pulverizator de spumă trei sferturi cu apă. Adăugați cantitatea corectă de produs concentrat pentru a ajunge la diluția de 4,5 %.

Umpleți cu grijă cu restul de apă.

Aplicați produsul diluat. Opțional, ștergeți pentru a distribui soluția.

Asigurați-vă că udați complet suprafața.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer.

Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

Doar pentru dezinfectarea suprafețelor mici.

Pentru pachetele cu sistem (semi)automat de diluare

Selectați setarea corectă pe echipamentul de dozare.

Umpleți un pulverizator de spumă cu produsul diluat.

Aplicați produsul diluat. Opțional, ștergeți pentru a distribui soluția.

Asigurați-vă că udați complet suprafața.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer.

Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

Doar pentru dezinfectarea suprafețelor mici.

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.4.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.4.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.4.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.5. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 5*

**Utilizare # 1.5 - Curățarea și dezinfectarea cu șervețele umede (inclusiv zonele de asistență medicală)**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>Produs de curățare și dezinfectare pentru suprafețe dure. |

| | |
|---|---|
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Ștergere<br>Descriere detaliata:<br>Ștergerea cu șervețele umede pregătite. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 1,5 m² per ștergere Diluați produsul cu apă pentru a ajunge la o concentrație de 5 %.<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Frecvență de utilizare: De 8 ori pe zi<br>A se utiliza la temperatura camerei |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Lichid<br>Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>HDPE Flacon(J-Flex): 1,5 litri<br>HDPE Flacon(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri<br>Șervețelele uscate sunt ambalate într-un recipient din PEÎD cu 125 de șervețele (polipropilenă (PP)).<br>(se vinde separat) |

4.5.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Pregătiți 1,5 litri de diluție adăugând 75 ml Oxivir Excel la 1.425 litri de apă.

Aplicați 1,5 litri de produs diluat în recipientul cu șervețele uscate.

Distribuiți lichidul în mod egal. Închideți recipientul.

Deschideți capacul. Scoateți un singur șervețel. Închideți capacul după ce ați scos un șervețel.

Folosiți doar șervețele umede.

Ștergeți suprafațașiAsigurați-vă că udați complet suprafața.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Lăsați să se usuce la aer.

Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

4.5.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.5.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.5.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.5.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.6. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 6*

**Utilizare # 1.6 – Curățarea și dezinfectarea cu un mop a suprafețelor care intră în contact cu alimentele**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 4: Industria alimentară și a furajelor |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |

| | |
|---|---|
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>Produs de curățare și dezinfectare pentru suprafețe dure care intră în contact cu alimente |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Spălare cu mopul<br><br>Descriere detaliata:<br>Spălare cu un mop înmuiat. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 11 până la 40 ml/$m^2$ Diluați produsul cu apă până ajungeți la 3,75% produs.<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br><br>Frecvență de utilizare: De 7 ori pe zi<br>A se utiliza la temperatura camerei |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri - 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>HDPE Flacon(J-Flex): 1,5 litri<br>HDPE Flacon(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri |

4.6.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluția produsului: bactericid, fungicid & virucid 3,75%

Pentru pachetele cu sistem de diluare manuală:

Pentru a preveni spumarea, umpleți un recipient trei sferturi cu apă. Adăugați cantitatea corectă de produs concentrat pentru a ajunge la diluția de 3,75 %. Adăugați cu grijă cu restul de apă.

Adăugați produsul concentrat în apă pentru a evita stropirea cu produs concentrat.

Scufundați mopul în recipient. Stoarceți soluția în exces.

Curățați și dezinfectați podeaua cu mopul umed.

Asigurați-vă că udați complet suprafața.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Lăsați să se usuce la aer.

Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

Pentru pachetele cu sistem (semi)automat de diluare

Selectați setarea corectă pe echipamentul de dozare.

Umpleți un recipient cu produsul diluat (3,75 %).

Înmuiați mopul în soluție.

Distribuiți lichidul.

Asigurați-vă că udați complet suprafața.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer.

Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

4.6.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.6.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.6.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.6.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.7. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 7*

**Utilizare # 1.7 – Curățarea și dezinfectarea cu o lavetă sau un burete a suprafețelor care intră în contact cu alimentele**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 4: Industria alimentară și a furajelor |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>Produs de curățare și dezinfectare pentru suprafețe dure care intră în contact cu alimente |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: răspândire<br><br>Descriere detaliata:<br>Distribuire cu o lavetă îmbibată sau cu un burete. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 11 până la 40 ml/m² Diluați produsul cu apă până ajungeți la 3,75 % produs.<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br><br>Frecvență de utilizare: de 7 ori pe zi<br>A se utiliza la temperatura camerei |

| | |
|---|---|
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Cutie de tablă 1 litru - 1,5 litri – 2 litri - 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>HDPE Flacon(J-Flex): 1,5 litri<br>HDPE Flacon(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri |

4.7.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluția produsului: bactericid, fungicid & virucid 3,75 %

Pentru pachetele cu sistem de diluare manuală:

Pentru a preveni spumarea, umpleți un recipient trei sferturi cu apă. Adăugați cantitatea corectă de produs concentrat pentru a ajunge la diluția de 3,75%. Adăugați cu grijă cu restul de apă.

Adăugați produsul concentrat în apă pentru a evita stropirea cu produs concentrat.

Înmuiați cârpa sau buretele în soluție.

Distribuiți lichidul.

Asigurați-vă că udați complet suprafața.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer.

Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

Pentru pachetele cu sistem (semi)automat de diluare

Selectați setarea corectă pe echipamentul de dozare.

Umpleți un recipient cu produsul diluat (3,75 %).

Înmuiați cârpa sau buretele în soluție.

Distribuiți lichidul.

Asigurați-vă că udați complet suprafața.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer.

Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

4.7.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.7.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.7.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.7.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.8. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 8*

**Utilizare #1.8 – Curățarea și dezinfectarea obiectelor mici care intră în contact cu alimentele prin înmuiere sau scufundare**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 4: Industria alimentară și a furajelor |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>Produs de curățare și dezinfectare pentru obiecte mici (de ex. ustensile de bucătărie) care intră în contact cu alimentele. |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Înmuiere sau scufundare<br><br>Descriere detaliata:<br>Înmuiere sau scufundare în soluție. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: până la 3 litri Diluați produsul cu apă până ajungeți la 3,75% produs.<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br><br>A se utiliza la temperatura camerei<br><br>Frecvență de utilizare: De 1 ori pe zi |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>HDPE Flacon(J-Flex): 1,5 litri<br>HDPE Flacon(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri |

4.8.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluția produsului: bactericid, fungicid & virucid 3,75%

Pentru pachetele cu sistem de diluare manuală:

Pentru a preveni spumarea, umpleți un recipient trei sferturi cu apă. Adăugați cantitatea corectă de produs concentrat pentru a ajunge la diluția de 3,75 %. Adăugați cu grijă cu restul de apă.

Acoperiți baia de scufundare cu un capac după introducerea obiectelor în soluția dezinfectantă.Asigurați-vă că articolele care trebuie dezinfectate sunt complet scufundate în soluție timp de 5 minute.

Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer.

Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

Pentru pachetele cu sistem (semi)automat de diluare

Selectați setarea corectă pe echipamentul de dozare.Umpleți un recipient cu produsul diluat (3,75 %).

Acoperiți baia de scufundare cu un capac după introducerea obiectelor în soluția dezinfectantă. Asigurați-vă că articolele care trebuie dezinfectate sunt complet scufundate în soluție timp de 5 minute. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

Soluțiile pentru înmuiere sau scufundare pot fi utilizate o singură dată.

4.8.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.8.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.8.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.8.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.9. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 9*

**Utilizare # 1.9 – Curățarea și dezinfectarea cu spumă a suprafețelor care intră în contact cu alimentele**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 4: Industria alimentară și a furajelor |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>Produs de curățare și dezinfectare pentru suprafețe dure care intră în contact cu alimente |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: pulverizare<br><br>Descriere detaliata:<br>Pulverizare folosind o spumă de declanșare. Opțional, ștergeți pentru a distribui soluția. |

| | |
|---|---|
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 11 ml/m² Diluați produsul cu apă până ajungeți la 3,75% produs.<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>A se utiliza la temperatura camerei<br>Frecvența utilizării:<br>Pentru utilizare în bucătării și cantine: de 4 ori pe zi<br>Pentru utilizare în industriile de procesare a alimentelor: de 4 ori pe zi.<br>Pentru utilizare pe un blat într-un magazin/supermarket: de 8 ori pe zi. |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>HDPE Flacon(J-Flex): 1,5 litri<br>HDPE Flacon(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri |

4.9.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluarea produsului: 3,75%

Pentru pachetele cu sistem de diluare manuală:

Pentru a preveni spumarea, umpleți un pulverizator de spumă trei sferturi cu apă. Adăugați cantitatea corectă de produs concentrat pentru a ajunge la diluția de 3,75 %.

Doar pentru dezinfectarea suprafețelor mici.

Pentru pachetele cu sistem (semi)automat de diluare

Selectați setarea corectă pe echipamentul de dozare. Umpleți un pulverizator de spumă cu produsul diluat. Aplicați produsul diluat. Opțional, ștergeți pentru a distribui soluția. Asigurați-vă că udați complet suprafața. Lăsați să acționeze timp de 5 minute.Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

Doar pentru dezinfectarea suprafețelor mici.

4.9.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.9.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.9.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.9.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.10. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 10*

**Utilizare # 1.10 - Curățarea și dezinfectarea suprafețelor care intră în contact cu alimentele cu șervețele umede**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 4: Industria alimentară și a furajelor |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>Produs de curățare și dezinfectare pentru suprafețe dure care intră în contact cu alimente |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Ștergere<br><br>Descriere detaliata:<br>Ștergerea cu șervețele umede pregătite. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 1,5 $m^2$ per ștergere Diluați produsul cu apă pentru a ajunge la o concentrație de 5%.<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br><br>Frecvență de utilizare: De 8 ori pe zi<br><br>A se utiliza la temperatura camerei |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Oxivir Excel:<br>**Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri**<br>HDPE Flacon(J-Flex): 1,5 litri<br>HDPE Flacon(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri<br>Șervețelele uscate sunt ambalate într-un recipient din PEÎD cu 125 de șervețele (polipropilenă (PP)).<br>(se vinde separat) |

4.10.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluarea produsului: 5%

Pregătiți 1,5 litri de diluție adăugând 75 ml de produs concentrat la 1,425 litri de apă.

Pentru a preveni spumarea, umpleți un recipient trei sferturi cu apă. Adăugați cantitatea corectă de produs.Umpleți cu grijă cu restul de apă.

Puneți 1,5 litri de produs diluat în recipientul pentru șervețele uscate.

Distribuiți lichidul în mod egal. Închideți recipientul.Deschideți capacul. Scoateți un singur șervețel. Închideți capacul după ce ați scos un șervețel. Folosiți doar șervețele umede. Ștergeți suprafața. Asigurați-vă că udați complet suprafața. Lăsați să acționeze timp de 5 minute. Lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

4.10.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.10.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.10.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.10.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.11. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 11*

**Utilizare # 1.11 – Curățarea și dezinfectarea cu un mop a suprafețelor dure din zonele care nu sunt destinate asistenței medicale**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>Produs de curățare și dezinfectare pentru suprafețe dure. |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Spălare cu mopul<br><br>Descriere detaliata:<br>Spălare cu un mop înmuiat. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 11 to 40 ml/$m^2$ Diluați produsul cu apă pentru a ajunge la următoarele concentrații ale produsului Bactericid – 1,5% produs Fungicid – 3,75% produs Virucid – 2% produs |

| | |
|---|---|
| | Numărul și calendarul de aplicare:<br>Frecvență de utilizare: de 7 ori pe zi<br>A se utiliza la temperatura camerei |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>HDPE Flacon(J-Flex): 1,5 litri<br>HDPE Flacon(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri |

4.11.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluarea produsului:

Bactericid - 1,5% produs

Drojdicid - 3,75% produs

Virucid - 2% produs

Pentru pachetele cu sistem de diluare manuală:

Pentru a preveni spumarea, umpleți un recipient trei sferturi cu apă. Adăugați cantitatea corectă de produs concentrat pentru a ajunge la diluția corespunzătoare a produsului. Adăugați produsul concentrat în apă pentru a evita stropirea cu produs concentrat. Scufundați mopul în recipient. Stoarceți soluția în exces. Curățați și dezinfectați podeaua cu mopul umed. Asigurați-vă că udați complet suprafața. Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

Pentru pachetele cu sistem (semi)automat de diluare:

Selectați setarea corectă pe echipamentul de dozare. Umpleți recipientul cu produsul diluat. Scufundați mopul în recipient. Stoarceți soluția în exces. Curățați și dezinfectați podeaua cu mopul umed. Asigurați-vă că udați complet suprafața. Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

4.11.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.11.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.11.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.11.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1C 1

4.12. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 12*

**Utilizare # 1.12– Curățarea și dezinfectarea cu o lavetă sau un burete a suprafețelor dure din zonele care nu sunt destinate asistenței medicale**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>Produs de curățare și dezinfectare pentru suprafețe dure. |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: răspândire<br><br>Descriere detaliata:<br>Distribuire cu o lavetă îmbibată sau cu un burete. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 11 până la 40 ml/$m^2$ Diluați produsul cu apă pentru a ajunge la următoarele concentrații ale produsului Bactericid – 1,5% produs Fungicid – 3,75% produs Virucid – 2% produs<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br><br>Frecvență de utilizare: de 7 ori pe zi<br><br>A se utiliza la temperatura camerei |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>HDPE Flacon(J-Flex): 1,5 litri<br>HDPE Flacon(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri |

4.12.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluarea produsului:

Bactericid - 1,5% produs

Drojdicid - 3,75% produs

Virucid - 2% produs

Pentru pachetele cu sistem de diluare manuală:

Pentru a preveni spumarea, umpleți un recipient trei sferturi cu apă. Adăugați cantitatea corectă de produs concentrat pentru a ajunge la diluția corespunzătoare a produsului.

Înmuiați cârpa sau buretele în soluție. Distribuiți lichidul. Asigurați-vă că udați complet suprafața. Lăsați să acționeze timp de 5 minute. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

Pentru pachetele cu sistem (semi)automat de diluare:

Selectați setarea corectă pe echipamentul de dozare. Umpleți recipientul cu produsul diluat. Înmuiați cârpa sau buretele în soluție. Distribuiți lichidul.

Asigurați-vă că udați complet suprafața. Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer.Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

4.12.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.12.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.12.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.12.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.13. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 13*

**Utilizare # 1.13 – Curățarea și dezinfectarea prin înmuiere sau scufundare a obiectelor mici din zone care nu sunt destinate asistenței medicale**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>Produs de curățare și dezinfectare pentru obiecte mici (de ex. foarfece și perii). |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Înmuiere sau scufundare<br><br>Descriere detaliata:<br>Înmuiere sau scufundare în soluție. |

| | |
|---|---|
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: până la 3 litri Diluați produsul cu apă pentru a ajunge la următoarele concentrații ale produsului Bactericid – 1,5% produs Fungicid – 3,75 % produs Virucid – 2 % produs<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Frecvență de utilizare: o dată pe zi<br>A se utiliza la temperatura camerei |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>HDPE Flacon(J-Flex): 1,5 litri<br>HDPE Flacon(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri |

4.13.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluarea produsului:

Bactericid - 1,5% produs

Drojdicid - 3,75% produs

Virucid - 2% produs

Pentru pachetele cu sistem de diluare manuală:

Pentru a preveni spumarea, umpleți un recipient trei sferturi cu apă.

Adăugați cantitatea corectă de produs concentrat pentru a ajunge la diluția corespunzătoare a produsului. Acoperiți baia de scufundare cu un capac după introducerea obiectelor în soluția dezinfectantă. Asigurați-vă că articolele care trebuie dezinfectate sunt complet scufundate în soluție timp de 5 minute. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

Pentru pachetele cu sistem (semi)automat de diluare

Selectați setarea corectă pe echipamentul de dozare. Umpleți recipientul cu produsul diluat. Acoperiți baia de scufundare cu un capac după introducerea obiectelor în soluția dezinfectantă. Asigurați-vă că articolele care trebuie dezinfectate sunt complet scufundate în soluție timp de 5 minute.Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea după dezinfectare. Soluțiile pentru înmuiere sau scufundare pot fi utilizate o singură dată.

4.13.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.13.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.13.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.13.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.14. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 14*

**Utilizare # 1.14 – Curățarea și dezinfectarea cu spumă a suprafețelor din zone care nu sunt destinate asistenței medicale**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>Produs de curățare și dezinfectare pentru suprafețe dure. |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: pulverizare<br><br>Descriere detaliata:<br>Pulverizare folosind o spumă de declanșare. Opțional, ștergeți pentru a distribui soluția. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 11 ml/m² Diluați produsul cu apă pentru a ajunge la următoarele concentrații ale produsului Bactericid – 1,5 % produs Fungicid – 3,75 % produs Virucid – 2 % produs<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br><br>A se utiliza la temperatura camerei<br><br>Frecvență de utilizare:<br>Dacă produsul este destinat utilizării în toaletă și băi: de 4 ori pe zi<br>Dacă produsul este destinat utilizării în unități de producție de cosmetice/farmaceutice: de 8 ori pe zi<br>Dacă produsul este destinat utilizării în laboratoare: de 10 ori pe zi<br>Dacă produsul este destinat utilizării în camere curate: de 10 ori pe zi |

| | |
|---|---|
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>HDPE Flacon(J-Flex): 1,5 litri<br>HDPE Flacon(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri |

4.14.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluarea produsului:

Bactericid - 1,5% produs

Drojdicid - 3,75% produs

Virucid - 2% produs

Pentru pachetele cu sistem de diluare manuală:

Pentru a preveni spumarea, umpleți un pulverizator de spumă trei sferturi cu apă. Adăugați cantitatea corectă de produs concentrat pentru a ajunge la diluția corespunzătoare a produsului.

Adăugați cu grijă cu restul de apă. Aplicați produsul diluat.

Opțional, ștergeți pentru a întinde soluția.

Asigurați-vă că udați complet suprafața. Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Ștergeți până se usucă suprafața sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

Doar pentru dezinfectarea suprafețelor mici.

Pentru pachete cu sistem de diluare (semi) automat:

Selectați setarea corectă pe echipamentul de dozare. Umpleți un pulverizator de spumă cu produsul diluat. Aplicați produsul diluat. Opțional, ștergeți pentru a întinde soluția.

Asigurați-vă că udați complet suprafața. Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Ștergeți până se usucă suprafața sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

Doar pentru dezinfectarea suprafețelor mici.

Pentru pachetele cu sistem (semi)automat de diluare

Selectați setarea corectă pe echipamentul de dozare.

Utilizați o sticlă cu pulverizator cu cap pentru spumă. Aplicați produsul diluat. Opțional, ștergeți pentru a distribui soluția. Asigurați-vă că udați complet suprafața. Lăsați să acționeze timp de 5 minute. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea după dezinfectare. Doar pentru dezinfectarea suprafețelor mici.

4.14.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.14.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.14.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.14.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.15. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 15*

**Utilizare # 1.15 – Dezinfectarea suprafețelor dure curățate anterior**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>Produs dezinfectant pentru suprafețe dure curățate anterior (inclusiv zone de asistență medicală, industria farmaceutică, industria cosmetică, laboratoare și camere curate) |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Distribuire, scufundare și pulverizare a spumei<br><br>Descriere detaliata:<br>Distribuire folosind un mop înmuiat. Distribuire folosind o lavetă sau un burete înmuiate. Scufundarea într-o soluție. Pulverizare cu spumă, opțional ștergere pentru a distribui soluția |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: Aplicare folosind un mop înmuiat: 11 până la 40 ml/m$^2$, aplicare folosind o lavetă sau un burete înmuiat: 11 până la 40 ml/m$^2$, scufundare într-o soluție: 3 litri, pulverizare cu spumă: 11 ml/m$^2$. Diluați produsul cu apă până ajungeți la 2,5 % produs.<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Frecvență de utilizare:<br>Aplicare folosind un mop înmuiat: de 7 ori pe zi<br>Aplicare folosind o lavetă/un burete înmuiat: de 7 ori pe zi<br>Scufundare: o dată pe zi<br>Pulverizarea spumei:<br>băi și toalete: de 4 ori pe zi<br>asistență medicală: de 8 ori pe zi<br>laboratoare și camere curate: de 10 ori pe zi<br>A se utiliza la temperatura camerei.<br>A se utiliza la temperatura camerei |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>HDPE Flacon(J-Flex): 1,5 litri<br>HDPE Flacon(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri |

4.15.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Diluarea produsului:

Bactericid,

Drojdicid și

Virucid 2,5 %

Pentru pachetele cu sistem de diluare manuală:

Pentru a preveni spumarea, umpleți un recipient trei sferturi cu apă. Adăugați cantitatea corectă de produs concentrat pentru a ajunge la diluția de 2,5 %. Adăugați cu grijă cu restul de apă.

Pentru pachetele cu sistem (semi)automat de diluare

Selectați setarea corectă pe echipamentul de dozare.

Aplicare folosind un mop înmuiat:

Scufundați mopul în recipient. Stoarceți soluția în exces. Aplicați pe podea. Asigurați-vă că udați complet suprafața. Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Aplicare folosind o lavetă/un burete înmuiat: Înmuiați cârpa sau buretele în soluție. Distribuiți lichidul pe suprafață. Asigurați-vă că udați complet suprafața. Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Scufundare: Acoperiți baia de scufundare cu un capac după introducerea obiectelor în soluția dezinfectantă. Asigurați-vă că articolele care trebuie dezinfectate sunt complet scufundate în soluție timp de 5 minute. Soluțiile pentru înmuiere sau scufundare pot fi utilizate o singură dată.

Pulverizarea spumei: Pentru pachetele cu sistem (semi)automat de diluare: Selectați setarea corectă pe echipamentul de dozare. Utilizați o sticlă cu pulverizator cu cap pentru spumă. Asigurați-vă că udați complet suprafața. Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

4.15.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.15.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.15.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

4.15.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 1

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 1**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Pentru uz profesional:

Se va păstra la distanță de mâncare, băutură inclusiv cele pentru animale.

Spălați-vă pe mâini bine după utilizare.

A se păstra numai în ambalajul original.

Nu amestecați cu alte produse.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Următoarele echipamente de protecție personală (EPP) sunt prevăzute fără a aduce atingere aplicării de către angajatori a Directivei Consiliului 98/24/CE și a altor acte legislative ale Uniunii în domeniul sănătății și securității la locul de muncă."Utilizarea protecției pentru ochi (conformă cu standardul european EN 16 321 sau echivalent, în timpul manipulării produsului concentrat, este obligatorie. Purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice, clasificate conform standardului european EN ISO 374 sau echivalent, în timpul fazei de manipulare a produsului (materialul mănușilor va fi specificat de către deținătorul autorizației în informațiile despre produs). Purtați haine rezistente la substanțe chimice, conforme cu standardul european EN 14605 sau echivalent, și purtați încălțăminte de protecție adecvată, conformă cu standardele europene EN 13832 sau echivalent, atunci când manipulați produse concentrate.

Consultați secțiunea 6 pentru titlurile complete ale standardelor EN.

Țineți animalele de companie departe de suprafețele tratate până când se usucă.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Primul ajutor:

ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație.În cazul apariției simptomelor: Sunați la 112/salvare pentru asistență medicală. În cazul în care nu există simptome: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic.

ÎN CAZ DE INGESTIE: Clătiți imediat gura. Dați victimei ceva de băut, dacă persoana expusă este capabilă să înghită. NU provocați voma. Sunați la 112/salvare pentru asistență medicală.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați imediat cu apă din abundență.

Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de utilizare.

Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute.

Scoateți lentilele de contact, dacă există și dacă acest lucru este ușor de făcut. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați la 112/salvare pentru asistență medicală.

Informații pentru personalul medical/medic: ochii trebuie, de asemenea, clătiți în mod repetat în drum spre medic în cazul expunerii ochilor la substanțe chimice alcaline (pH > 11), amine și acizi, precum acidul acetic, acidul formic sau acidul propionic.

Precauții pentru mediul înconjurător

Nu permiteți pătrunderea în sistemul de canalizare, în apele de suprafață sau subterane. Nu permiteți pătrunderea în pământ/sol. Diluați cu multă apă. Informați autoritățile responsabile în cazul în care produsul nediluat ajunge în sistemul de canalizare, în apele de suprafață sau subterane sau în pământ/sol.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Eliminați conținutul/recipientul la un serviciu de eliminare a deșeurilor periculoase în conformitate cu reglementările legale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

Dată de valabilitate 24 de luni.

A se păstra la întuneric.

A nu se păstra la temperaturi peste 30 °C.

6. **ALTE INFORMAȚII**

Produsele acestei meta-SPC pot fi destinate și dezinfectării suprafețelor dispozitivelor medicale în zonele medicale și clinice. În acest caz, comercializarea sau utilizarea trebuie să respecte Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor Consiliului 90/385/CEE și 93/42/CEE (JO L 117, 05.05.2017, p. 1) și sunt dispozitive medicale clasificate ca clasa a II-a. Aceste utilizări sunt în afara domeniului de aplicare al autorizației acestei familii de produse biocide și nu sunt acoperite de aceasta.

În ceea ce privește nota „Categoria(ile) de utilizatori": „Profesioniști (inclusiv utilizatori industriali) înseamnă profesioniști instruiți dacă acest lucru este cerut de legislația națională."

Titlurile complete ale standardelor EN menționate în secțiunea 5.2 „Măsuri de reducere a riscului" sunt:

EN 13832 - Încălțăminte de protecție împotriva substanțelor chimice

EN ISO 374 - Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase și microorganismelor

EN ISO 16321 - Protecția ochilor și feței pentru utilizare profesională

EN 14605 - Haine de protecție împotriva substanțelor chimice lichide - Cerințe de performanță pentru îmbrăcăminte cu conexiuni etanșe la lichide (Tip 3) sau etanșe la pulverizare (Tip 4), inclusiv articole care oferă protecție doar anumitor părți ale corpului (Tipuri PB [3] și PB [4]).

Directiva Consiliului 98/24/CE din 7 Aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă (a paisprezecea directivă individuală în sensul articolului 16(1) din Directiva 89/391/CEE) (JO L 131, 5.5.1998, p. 11).

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 1**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

| | | |
|---|---|---|
| Denumire (denumiri) comerciale | Oxivir Excel | zona Piața: UE |
| | Oxivir Excel H+ | zona Piața: UE |
| | Oxivir Excel J-flex | zona Piața: UE |
| | Oxivir Excel Smart-Dose | zona Piața: UE |

| | | |
|---|---|---|
| | Oxivir Excel SD | zona Piața: UE |
| | Oxivir Excel Conc | zona Piața: UE |
| | Oxivir Excel Concen-trate | zona Piața: UE |
| | Oxivir Excel IBC | zona Piața: UE |
| | Oxivir Excel Acti | zona Piața: UE |
| | Oxivir Excel Des | zona Piața: UE |
| | Oxivir Excel Duo | zona Piața: UE |
| | Clinell H2O2 concen-trate | zona Piața: UE |
| | Antibac Oxivir concen-trate | zona Piața: UE |
| | Divosan AHP VS70 | zona Piața: UE |
| | TASKI Sani AHP-Des | zona Piața: UE |
| | TASKI Sprint AHP-Des | zona Piața: UE |
| | Suma AHP D10.7 | zona Piața: UE |
| | Suma AHP | zona Piața: UE |
| | Suma San AHP D10.7 | zona Piața: UE |
| | Suma San AHP | zona Piața: UE |

| | | |
|---|---|---|
| | ClearKlens AHP Conc | zona Piața: UE |
| | ClearKlens Excel Conc | zona Piața: UE |
| | DOMES-TOS Expert Conc | zona Piața: UE |
| | GLORIX Expert Conc | zona Piața: UE |
| | KLINEX Expert Conc | zona Piața: UE |
| | LYSO-FORM Expert Conc | zona Piața: UE |
| | SAVO Expert Conc | zona Piața: UE |
| | CIF Expert Conc | zona Piața: UE |
| | VISS Expert Conc | zona Piața: UE |
| | JIF Expert Conc | zona Piața: UE |
| | FLORAS-ZEPT Expert Conc | zona Piața: UE |
| | ANDY Expert Conc | zona Piața: UE |
| | SUPER-ANDY Expert Conc | zona Piața: UE |
| | LIFEBUOY Expert Conc | zona Piața: UE |

| | | |
|---|---|---|
| | ANDY-SAN Expert Conc | zona Piața: UE |
| Numărul autorizației | EU-0032483-0001 1-1 | |

| Denumire comună | Denumire IUPAC | Funcție | Număr CAS | Număr CE | Conținut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroxid de hidrogen | | substanță activă | 7722-84-1 | 231-765-0 | 7,2 % (de greutate) |
| Acidul alchil benzen sulfonic | 2-Dodecyl Benzen Acid Sulphonic | Substanța inactivă | 85536-14-7 | 287-494-3 | 19,4 % (de greutate) |
| (C9-C11) etoxilatul de alcool alchilic | (C9-C11) etoxilatul de alcool alchilic | Substanța inactivă | 68439-46-3 | | 1,8 % (de greutate) |
| acidul metansulfonic | | Substanța inactivă | 75-75-2 | 200-898-6 | 2,4 % (de greutate) |

1. **META-RCP 2 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 2 identificator**

| | |
|---|---|
| Identificator | Meta SPC: Meta-SPC 2: RTU |

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

| | |
|---|---|
| Număr | 1-2 |

1.3. **Tip(uri) de produs**

| | |
|---|---|
| Tip(uri) de produs | TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale<br>TP 4: Industria alimentară și a furajelor |

2. **COMPOZIȚIA META RCP 2**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 2**

| Denumire comună | Denumire IUPAC | Funcție | Număr CAS | Număr CE | Conținut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroxid de hidrogen | | substanță activă | 7722-84-1 | 231-765-0 | 0,36-0,36 % (de greutate) |

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 2**

| | |
|---|---|
| Tip(uri) de formulare | AL Orice alt lichid |

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 2**

| | |
|---|---|
| Fraze de pericol | H290: Poate fi coroziv pentru metale. |
| Fraze de precauție | P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.<br>P234: Păstrați numai în recipientul original.<br>P390: Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere. |

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 1*

**Utilizare # 2.1 – Curățarea și dezinfectarea cu mopul (inclusiv zonele de asistență medicală)**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br>Produs de curățare și dezinfectare pentru suprafețe dure. (incl. zone de îngrijire medicală) |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Spălare cu mopul<br>Descriere detaliata:<br>Spălare cu un mop înmuiat. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 11 până la 40 ml/m$^2$ Produs preparat, gata de utilizare<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>A se utiliza la temperatura camerei<br>Frecvență de utilizare: de 7 ori pe zi |

| | |
|---|---|
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist ; publicul larg (neprofesioniști) |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Utilizatori profesioniști și neprofesioniști:<br>Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri<br>Utilizatori profesioniști:<br>HDPE Cutie de tablă 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri |

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Utilizatori profesioniști și neprofesioniști:

Umpleți un recipient cu produsul.

Introduceți mopul în recipient. Stoarceți surplusul de produs. Spălați podeaua cu mopul umed.

Asigurați-vă că udați complet suprafața. Lăsați să acționeze timp de 5 minute. Lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.2. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 2*

**Utilizare # 2.2 – Curățarea și dezinfectarea cu o lavetă sau un burete (inclusiv zonele de asistență medicală)**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |

| | |
|---|---|
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br>Produs de curățare și dezinfectare pentru suprafețe dure. (incl. zone de îngrijire medicală) |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: răspândire<br>Descriere detaliata:<br>Distribuire cu o lavetă îmbibată sau cu un burete. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 11 până la 40 ml/m² Produs preparat, gata de utilizare<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>A se utiliza la temperatura camerei<br>Frecvență de utilizare: o dată pe zi |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist ; publicul larg (neprofesioniști) |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Utilizatori profesioniști și neprofesioniști:<br>Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri<br>Utilizatori profesioniști:<br>HDPE Cutie de tablă 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri |

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Utilizatori profesioniști și neprofesioniști:

Îmbibați cârpa sau buretele în produs prin scufundare.

Distribuiți lichidul pe suprafață.

Asigurați-vă că udați complet suprafața.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer.

Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.3. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 3*

**Utilizare # 2.3 – Curățarea și dezinfectarea obiectelor mici prin înmuiere sau scufundare (inclusiv zonele de asistență medicală)**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>Produs de curățare și dezinfectare pentru obiecte mici (de exemplu, foarfece, perii) incl. obiecte pentru zonele de asistență medicală. Utilizarea biocidală exclude dezinfectarea dispozitivelor medicale. |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Înmuiere sau scufundare<br><br>Descriere detaliata:<br>Înmuiere sau scufundare în soluție. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: până la 3 litri Produs preparat, gata de utilizare<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br><br>A se utiliza la temperatura camerei<br><br>Frecvență de utilizare: o dată pe zi |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist ; publicul larg (neprofesioniști) |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Utilizatori profesioniști și neprofesioniști:<br>Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri<br>Utilizatori profesioniști:<br>HDPE Cutie de tablă 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri |

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Utilizatori profesioniști și neprofesioniști:

Asigurați-vă că articolele care trebuie dezinfectate sunt complet scufundate în soluție timp de 5 minute.

Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer.

Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

Soluțiile pentru înmuiere sau scufundare pot fi utilizate o singură dată.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.3.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.3.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.3.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.4. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 4*

**Utilizare # 2.4 – Curățarea și dezinfectarea cu spumă (inclusiv zonele de asistență medicală)**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>Produs de curățare și dezinfectare gata de utilizare pentru suprafețe dure (inclusiv pentru zone de asistență medicală). |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: pulverizare<br><br>Descriere detaliata:<br>Pulverizare folosind o spumă de declanșare. Opțional, ștergeți pentru a distribui soluția. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 11 ml/m² Produs preparat, gata de utilizare<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>A se utiliza la temperatura camerei<br>Frecvența utilizării:<br>Pentru utilizare în toalete și băi: de 4 ori pe zi.<br>pentru utilizare în unități de producție cosmetică/farmaceutică: de 8 ori pe zi<br>Pentru utilizare în laboratoare: de 10 ori pe zi.<br>Pentru utilizare în camere sterile: de 10 ori pe zi. |

| | |
|---|---|
| | Pentru utilizare pe un blat într-un magazin/supermarket: de 8 ori pe zi.<br>Pentru utilizare în spitale și cabinete medicale: de 8 ori pe zi. |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist ; publicul larg (neprofesioniști) |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Utilizatori profesioniști și neprofesioniști:<br>Spray cu declanșare de 750 ml din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) cu cap pentru spumă.<br>HDPE Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri<br>Utilizatori profesioniști:<br>HDPE Cutie de tablă 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri |

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Utilizatori profesioniști și neprofesioniști:

Aplicați produsul pe suprafață. Opțional, ștergeți pentru a distribui soluția. Asigurați-vă că udați complet suprafața.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer.

Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

Doar pentru dezinfectarea suprafețelor mici.

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.4.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.4.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.4.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.5. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 5*

**Utilizare # 2.5 – Curățarea și dezinfectarea cu șervețele umede (inclusiv zonele de asistență medicală)**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date |

| | |
|---|---|
| | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br>Produs de curățare și dezinfectare gata de utilizare pentru suprafețe dure (inclusiv pentru zone de asistență medicală). |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Ștergere<br>Descriere detaliata:<br>Ștergerea cu șervețele umede pregătite. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 1,5 $m^2$ per ștergere Produs preparat, gata de utilizare<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Frecvență de utilizare: de 8 ori pe zi<br>A se utiliza la temperatura camerei |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Lichid RTU:<br>Utilizatori profesioniști:<br>HDPE Cutie de tablă 1L – 1.5 L – 2 L – 2.5 L – 3 L – 5 L – 10 L - 20 L – 50 L – 100 L – 200 L<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri<br>Șervețelele uscate sunt ambalate într-un recipient din PEÎD cu 125 de șervețele (polipropilenă (PP)).<br>(se vinde separat) |

4.5.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicați 1,5 litri de produs în recipientul cu șervețele uscate.

Distribuiți lichidul în mod egal. Închideți recipientul.

Deschideți capacul. Scoateți un singur șervețel. Închideți capacul după ce ați scos un șervețel.

Folosiți doar șervețele umede.

Ștergeți suprafața și asigurați-vă că udați complet suprafața.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute. Lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

4.5.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.5.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.5.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.5.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.6. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 6*

**Utilizare # 2.6 – Curățarea și dezinfectarea cu mopul (inclusiv suprafețele care intră în contact cu alimentele)**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 4: Industria alimentară și a furajelor |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>Produs dezinfectant gata de utilizare (inclusiv suprafețe care intră în contact cu alimentele) |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Spălare cu mopul<br><br>Descriere detaliata:<br>Spălare cu un mop înmuiat. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 11 până la 40 ml/m² Produs preparat, gata de utilizare<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br><br>A se utiliza la temperatura camerei<br><br>Frecvență de utilizare: o dată pe zi |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist ; publicul larg (neprofesioniști) |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Utilizatori profesioniști și neprofesioniști:<br>HDPE Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri<br>Utilizatori profesioniști:<br>HDPE Cutie de tablă 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri |

4.6.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Umpleți un recipient cu produsul. Introduceți mopul în recipient. Stoarceți surplusul de produs. Spălați podeaua cu mopul umed.

Asigurați-vă că udați complet suprafața. Lăsați să acționeze timp de 5 minute. Lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

4.6.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.6.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.6.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.6.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.7. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 7*

**Utilizare # 2.7 – Curățarea și dezinfectarea cu o lavetă sau un burete (inclusiv suprafețele care intră în contact cu alimentele)**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 4: Industria alimentară și a furajelor |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>Produs dezinfectant gata de utilizare (inclusiv suprafețe care intră în contact cu alimentele) |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: răspândire<br><br>Descriere detaliata:<br>Distribuire cu o lavetă îmbibată sau cu un burete. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 11 până la 40 ml/m² Produs preparat, gata de utilizare<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br><br>A se utiliza la temperatura camerei<br><br>Frecvență de utilizare: o dată pe zi |

| | |
|---|---|
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist ; publicul larg (neprofesioniști) |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Utilizatori profesioniști și neprofesioniști:<br>HDPE Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri<br>Utilizatori profesioniști:<br>HDPE Cutie de tablă 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri |

4.7.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Îmbibați cârpa sau buretele în produs prin scufundare.

Distribuiți lichidul pe suprafață.

Asigurați-vă că udați complet suprafața. Lăsați să acționeze timp de 5 minute. Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

4.7.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.7.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.7.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.7.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.8. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 8*

**Utilizare # 2.8 – Curățarea și dezinfectarea prin înmuierea sau scufundarea obiectelor mici (inclusiv suprafețele care intră în contact cu alimentele)**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 4: Industria alimentară și a furajelor |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |

| | |
|---|---|
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br>Produs dezinfectant gata de utilizare pentru obiecte mici (de exemplu, ustensile de bucătărie), inclusiv suprafețe de contact cu alimentele)). |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Înmuiere sau scufundare<br>Descriere detaliata:<br>Înmuiere sau scufundare în soluție. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: până la 3 litri Produs preparat, gata de utilizare<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>A se utiliza la temperatura camerei<br>Frecvență de utilizare: o dată pe zi |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist ; publicul larg (neprofesioniști) |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Utilizatori profesioniști și neprofesioniști:<br>Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri<br>Utilizatori profesioniști:<br>HDPE Cutie de tablă 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri |

4.8.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Asigurați-vă că articolele care trebuie dezinfectate sunt complet scufundate în soluție timp de 5 minute.

Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea după dezinfectare. Soluțiile pentru înmuiere sau scufundare pot fi utilizate o singură dată.

4.8.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.8.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.8.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.8.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.9. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 9*

**Utilizare # 2.9 – Curățarea și dezinfectarea cu spumă (inclusiv suprafețele care intră în contact cu alimentele)**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 4: Industria alimentară și a furajelor |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>Produs dezinfectant gata de utilizare pentru suprafețe dure (inclusiv suprafețe care intră în contact cu alimentele). |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: pulverizare<br><br>Descriere detaliata:<br>Pulverizare folosind o spumă de declanșare. Opțional, ștergeți pentru a distribui soluția. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 11 ml/m² Produs preparat, gata de utilizare<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br><br>A se utiliza la temperatura camerei<br><br>Frecvența utilizării pentru:<br>Utilizare în bucătării și cantine: de 4 ori pe zi.<br>Utilizare în industriile de prelucrare a alimentelor: de 4 ori pe zi<br>Utilizare pe un tejghea într-un magazin sau supermarket: de 8 ori pe zi. |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist ; publicul larg (neprofesioniști) |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Utilizatori profesioniști și neprofesioniști:<br>Spumă cu declanșare de 750 ml din polietilenă de înaltă densitate (HDPE)<br>HDPE Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri<br>Utilizatori profesioniști:<br>HDPE Cutie de tablă 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri |

4.9.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicați produsul pe suprafață. Opțional, ștergeți pentru a distribui soluția.

Asigurați-vă că udați complet suprafața.

Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer.

Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

Doar pentru dezinfectarea suprafețelor mici.

4.9.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.9.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.9.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.9.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.10. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 10*

**Utilizare # 2.10 – Curățarea și dezinfectarea cu șervețele umede (inclusiv suprafețele care intră în contact cu alimentele)**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 4: Industria alimentară și a furajelor |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>Produs dezinfectant gata de utilizare pentru suprafețe dure (inclusiv suprafețe care intră în contact cu alimentele). |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Ștergere<br><br>Descriere detaliata:<br>Ștergerea cu șervețele umede pregătite. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 1,5 $m^2$ per ștergere Produs preparat, gata de utilizare<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br><br>A se utiliza la temperatura camerei<br><br>Frecvență de utilizare: de 8 ori pe zi |

| | |
|---|---|
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Lichid RTU:<br>**Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri**<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri<br>Șervețelele uscate sunt ambalate într-un recipient din PEÎD cu 125 de șervețele (polipropilenă (PP)).<br>(se vinde separat) |

4.10.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicați 1,5 litri de produs diluat în recipientul cu șervețele uscate. Distribuiți lichidul în mod egal. Închideți recipientul. Deschideți capacul. Scoateți un singur șervețel. Închideți capacul după ce ați scos un șervețel. Folosiți doar șervețele umede. Ștergeți suprafața

Asigurați-vă că udați complet suprafața. Lăsați să acționeze timp de 5 minute. Lăsați să se usuce la aer.

Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

4.10.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.10.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.10.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.10.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.11. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 11*

**Utilizare # 2.11 – Dezinfectarea suprafețelor dure curățate anterior**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |

| | |
|---|---|
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br>Produs dezinfectant pentru suprafețe dure curățate anterior (inclusiv zone de asistență medicală, industria farmaceutică, industria cosmetică, laboratoare și camere curate) |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Distribuire, scufundare și pulverizare a spumei<br>Descriere detaliata:<br>Distribuire folosind un mop înmuiat. Distribuire folosind o lavetă sau un burete înmuiate. Scufundarea într-o soluție. Pulverizare cu spumă, opțional ștergere pentru a distribui soluția |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: Aplicare folosind un mop înmuiat: 11 până la 40 ml/m$^2$, aplicare folosind o lavetă sau un burete înmuiat: 11 până la 40 ml/m$^2$, scufundare într-o soluție: 3 litri, pulverizare cu spumă: 11 ml/m$^2$. Produs preparat, gata de utilizare<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Frecvență de utilizare:<br>Aplicare folosind un mop înmuiat: de 7 ori pe zi<br>Aplicare folosind o lavetă/un burete înmuiat: de 7 ori pe zi<br>Scufundare: o dată pe zi<br>Pulverizarea spumei:<br>băi și toalete de 4 ori pe zi<br>asistență medicală de 8 ori pe zi<br>laboratoare și camere curate de 10 ori pe zi<br>A se utiliza la temperatura camerei |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) Cutie de tablă 1 litru – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri<br>HDPE Flacon(J-Flex): 1,5 litri<br>HDPE Flacon(Smart Dose): 1,4 litri – 1,5 litri<br>Bazin IBC, HDPE: 100-1 000 litri |

4.11.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Timpul de contact: 5 minute

Curățați ștergând cu un mop. Scufundați mopul în recipient. Stoarceți soluția în exces. Aplicați pe podea. Asigurați-vă că udați complet suprafața. Permiteți să acționeze pentru timpul de contact necesar.

Aplicare cu lavetă/burete: Înmuiați cârpa sau buretele în soluție. Distribuiți lichidul pe suprafață. Asigurați-vă că udați complet suprafața. Permiteți să acționeze pentru timpul de contact necesar.

Scufundare: Acoperiți baia de scufundare cu un capac după introducerea obiectelor în soluția dezinfectantă. Asigurați-vă că articolele care trebuie dezinfectate sunt complet scufundate în soluție timp de 5 minute.

Soluțiile pentru înmuiere sau scufundare pot fi utilizate o singură dată.

Pulverizarea spumei:

Aplicați produsul. Opțional, ștergeți pentru a distribui soluția. Asigurați-vă că udați complet suprafața. Permiteți să acționeze pentru timpul de contact necesar. Numai pentru dezinfectarea suprafețelor mici.

Ștergeți sau lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

4.11.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.11.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.11.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

4.11.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 2

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 2**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Pentru uz profesional:

Se va păstra la distanță de mâncare, băutură inclusiv cele pentru animale.

Spălați-vă pe mâini bine după utilizare.

A se păstra numai în ambalajul original.

Nu amestecați cu alte produse.

Consultați instrucțiuni specifice de utilizare.

Pentru utilizare neprofesională:

Respectați instrucțiunile de utilizare.

Se va păstra la distanță de mâncare, băutură inclusiv cele pentru animale.

Spălați-vă pe mâini bine după utilizare.

A se păstra numai în ambalajul original.

Nu amestecați cu alte produse.

Consultați instrucțiuni specifice de utilizare.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Nu permiteți accesul animalelor de companie în suprafețele tratate până la uscare.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

ÎN CAZ DE INHALARE: În cazul apariției simptomelor sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic.

ÎN CAZ DE INGESTIE: În cazul apariției simptomelor sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu apă. În cazul apariției simptomelor sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: În cazul apariției simptomelor clătiți cu apă. Scoateți lentilele de contact, dacă există și dacă acest lucru este ușor de făcut. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic.

Dacă este necesar sfatul medicului, trebuie să aveți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Eliminați conținutul/recipientul la un serviciu de eliminare a deșeurilor periculoase în conformitate cu reglementările legale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

Dată de valabilitate 24 de luni.

A se păstra la întuneric. A nu se păstra la temperaturi peste 50 °C.

A nu se lasa la îndemâna copiilor si animalelor.

6. **ALTE INFORMAȚII**

Produsele acestei meta-SPC pot fi destinate și dezinfectării suprafețelor dispozitivelor medicale în zonele medicale și clinice. În acest caz, comercializarea sau utilizarea trebuie să respecte Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor Consiliului 90/385/CEE și 93/42/CEE (JO L 117, 5.5.2017, p. 1) și sunt dispozitive medicale clasificate ca clasa a II-a. Aceste utilizări sunt în afara domeniului de aplicare al autorizației acestei familii de produse biocide și nu sunt acoperite de aceasta.

În ceea ce privește nota „Categoria(ile) de utilizatori": „Profesioniști (inclusiv utilizatori industriali)" înseamnă profesioniști instruiți dacă acest lucru este cerut de legislația națională.

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 2**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

| | | |
|---|---|---|
| Denumire (denumiri) comerciale | Oxivir Excel Foam | zona Piața: UE |
| | Oxivir Excel Foam H+ | zona Piața: UE |
| | Oxivir Excel Spray | zona Piața: UE |
| | Oxivir Excel Spray H+ | zona Piața: UE |
| | Oxivir Excel RTU | zona Piața: UE |
| | Oxivir Excel RTU H+ | zona Piața: UE |
| | Oxivir Excel RTU IBC | zona Piața: UE |

| | | |
|---|---|---|
| | Oxivir Excel Foam Acti | zona Piața: UE |
| | Oxivir Excel Foam Des | zona Piața: UE |
| | Oxivir Excel Foam Duo | zona Piața: UE |
| | Clinell H2O2 RTU | zona Piața: UE |
| | Antibac Oxivir RTU | zona Piața: UE |
| | Divosan AHP Foam RTU VS71 | zona Piața: UE |
| | TASKI Sani AHP-Des Spray | zona Piața: UE |
| | TASKI Sprint AHP-Des Spray | zona Piața: UE |
| | Suma AHP RTU D10.7 | zona Piața: UE |
| | Suma AHP Spray D10.7 | zona Piața: UE |
| | Suma AHP RTU | zona Piața: UE |
| | Suma AHP Spray | zona Piața: UE |
| | ClearKlens AHP RTU | zona Piața: UE |

| | | |
|---|---|---|
| | ClearKlens Excel RTU | zona Piața: UE |
| | DOMES-TOS Expert | zona Piața: UE |
| | GLORIX Expert | zona Piața: UE |
| | KLINEX Expert | zona Piața: UE |
| | LYSO-FORM Expert | zona Piața: UE |
| | SAVO Expert | zona Piața: UE |
| | CIF Expert | zona Piața: UE |
| | VISS Expert | zona Piața: UE |
| | JIF Expert | zona Piața: UE |
| | FLORAS-ZEPT Expert | zona Piața: UE |
| | ANDY Expert | zona Piața: UE |
| | SUPER-ANDY Expert | zona Piața: UE |
| | LIFEBUOY Expert | zona Piața: UE |
| | ANDY-SAN Expert | zona Piața: UE |
| Numărul autorizației | EU-0032483-0002 1-2 | |

| Denumire comună | Denumire IUPAC | Funcție | Număr CAS | Număr CE | Conținut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroxid de hidrogen | | substanță activă | 7722-84-1 | 231-765-0 | 0,36 % (de greutate) |

1. **META-RCP 3 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 3 identificator**

| | |
|---|---|
| Identificator | Meta SPC: Meta-SPC 3: Wipes |

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

| | |
|---|---|
| Număr | 1-3 |

1.3. **Tip(uri) de produs**

| | |
|---|---|
| Tip(uri) de produs | TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale<br>TP 4: Industria alimentară și a furajelor |

2. **COMPOZIȚIA META RCP 3**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 3**

| Denumire comună | Denumire IUPAC | Funcție | Număr CAS | Număr CE | Conținut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroxid de hidrogen | | substanță activă | 7722-84-1 | 231-765-0 | 0,36-0,36 % (de greutate) |

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 3**

| | |
|---|---|
| Tip(uri) de formulare | AL (Orice alt lichid)-Șervețele RTU |

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 3**

| | |
|---|---|
| Fraze de pericol | H290: Poate fi coroziv pentru metale. |
| Fraze de precauție | P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.<br>P234: Păstrați numai în recipientul original. |

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 1*

**Utilizare # 3.1 – Curățarea și dezinfectarea cu șervețele umede pe suprafețe dure, inclusiv în zonele de asistență medicală**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |

| | |
|---|---|
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>Șervețele pentru curățarea-dezinfectarea suprafețelor dure, inclusiv zone de asistență medicală. |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Ștergere<br><br>Descriere detaliata:<br>Ștergerea cu șervețele umede pregătite. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 1,5 $m^2$ per ștergere Șervețel gata de utilizare.<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br><br>Frecvență de utilizare: de 8 ori pe zi<br><br>A se utiliza la temperatura camerei |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist ; publicul larg (neprofesioniști) |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Recipient sau tub din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) cu 100 de șervețele PP<br>Pachet din tereftalat de polietilenă (PET)/polietilenă de joasă densitate (LDPE) cu 100 de șervețele din polipropilenă (PP)<br>Pungă fixă PET/LDPE cu 100 de șervețele PP<br>Toate pachetele sunt atât pentru uz profesional, cât și neprofesional |

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Deschideți capacul. Scoateți un singur șervețel. Închideți capacul după ce ați scos un șervețel. Folosiți doar șervețele umede. Ștergeți suprafața. Asigurați-vă că udați complet suprafața. Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 3

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 3

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 3

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 3

4.2. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 2*

**Utilizare # 3.2 – Curățarea și dezinfectarea cu șervețele umede pe suprafețe dure, inclusiv suprafețe care intră în contact cu alimentele**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 4: Industria alimentară și a furajelor |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>Șervețele umede pentru curățarea-dezinfectarea suprafețelor dure (inclusiv suprafețele care intră în contact cu alimentele) |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Ștergere<br><br>Descriere detaliata:<br>Ștergerea cu șervețele umede pregătite. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 1,5 $m^2$ per ștergere Șervețel gata de utilizare.<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br><br>A se utiliza la temperatura camerei<br><br>Frecvență de utilizare: de 8 ori pe zi |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist ; publicul larg (neprofesioniști) |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Recipient sau tub din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) cu 100 de șervețele PP<br>Pachet din tereftalat de polietilenă (PET)/polietilenă de joasă densitate (LDPE) cu 100 de șervețele din polipropilenă (PP)<br>Pungă fixă PET/LDPE cu 100 de șervețele PP<br>Toate pachetele sunt atât pentru uz profesional, cât și neprofesional |

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Deschideți capacul. Scoateți un singur șervețel. Închideți capacul după ce ați scos un șervețel. Folosiți doar șervețele umede. Ștergeți suprafața. Asigurați-vă că udați complet suprafața. Lăsați să acționeze timp de 5 minute.

Lăsați să se usuce la aer.Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 3

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 3

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 3

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 3

4.3. **Descrierea utilizării**

*Tabelul 3*

**Utilizare # 3.3 – Șervețel pentru dezinfectarea suprafețelor dure curățate anterior**

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | - |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Bacterii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Drojdii<br>Etapă de dezvoltare: fără date<br><br>Denumirea științifică: fără date<br>Denumirea comună: Virusuri<br>Etapă de dezvoltare: fără date |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior<br><br>Șervețele dezinfectante pentru suprafețe dure curățate anterior (inclusiv zone de asistență medicală, industria farmaceutică, industria cosmetică, laboratoare și camere curate) |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Ștergere<br><br>Descriere detaliata:<br>Ștergerea cu șervețele umede pregătite. |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 1,5 $m^2$ per ștergere Gata de utilizare.<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br><br>A se utiliza la temperatura camerei<br><br>Frecvență de utilizare: de 8 ori pe zi |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |

| | |
|---|---|
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Recipient sau tub din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) cu 100 de șervețele PP<br>Pachet din tereftalat de polietilenă (PET)/polietilenă de joasă densitate (LDPE) cu 100 de șervețele din polipropilenă (PP)<br>Pungă fixă PET/LDPE cu 100 de șervețele PP |

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Timpul de contact:5 minute

Deschideți capacul. Scoateți un singur șervețel. Închideți capacul după ce ați scos un șervețel. Folosiți doar șervețele umede. Ștergeți suprafața. Asigurați-vă că udați complet suprafața. Permiteți să acționeze pentru timpul de contact necesar.

Lăsați să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea după dezinfectare.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 3

4.3.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 3

4.3.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 3

4.3.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare a Meta-SPC 3

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 3**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Pentru uz profesional:

Se va păstra la distanță de mâncare, băutură inclusiv cele pentru animale.

Spălați-vă pe mâini bine după utilizare.

A se păstra numai în ambalajul original.

Nu amestecați cu alte produse.

Consultați instrucțiuni specifice de utilizare.

Pentru utilizare neprofesională:

Respectați instrucțiunile de utilizare.

Spălați-vă pe mâini bine după utilizare.

A se păstra numai în ambalajul original.

Nu amestecați cu alte produse.

Consultați instrucțiuni specifice de utilizare.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Nu permiteți accesul animalelor de companie în suprafețele tratate până la uscare.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

ÎN CAZ DE INHALARE: În cazul apariției simptomelor sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE INGESTIE: În cazul apariției simptomelor sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu apă. În cazul apariției simptomelor sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: În cazul apariției simptomelor clătiți cu apă. Scoateți lentilele de contact, dacă există și dacă acest lucru este ușor de făcut. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Dacă este necesar sfatul medicului, trebuie să aveți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Eliminați conținutul/recipientul la un serviciu de eliminare a deșeurilor periculoase în conformitate cu reglementările legale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

Dată de valabilitate 24 de luni.

A se păstra la întuneric. A nu se păstra la temperaturi peste 50 °C.

A nu se lasa la îndemâna copiilor si animalelor.

6. **ALTE INFORMAȚII**

Produsele acestei meta-SPC pot fi destinate și dezinfectării suprafețelor dispozitivelor medicale în zonele medicale și clinice. În acest caz, comercializarea sau utilizarea trebuie să respecte Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 Aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor Consiliului 90/385/CEE și 93/42/CEE (JO L 117, 05.05.2017, p. 1) și sunt dispozitive medicale clasificate ca clasa a II-a. Aceste utilizări sunt în afara domeniului de aplicare al autorizației acestei familii de produse biocide și nu sunt acoperite de aceasta.

În ceea ce privește nota „Categoria(ile) de utilizatori": „Profesioniști (inclusiv utilizatori industriali) înseamnă profesioniști instruiți dacă acest lucru este cerut de legislația națională."

Sunt incluse următoarele tipuri de șervețele:

Șervețele cu dimensiunea de 15 x 25 cm; greutatea este de 1,52 g; 3,75 ml lichid pe șervețel (sarcina lichidului de șters este de 250 %)

Șervețele cu dimensiunea de 15,2 x 17,7 cm; greutatea este de 1,51 gr; 3,75 ml lichid pe șervețel (sarcina lichidului de șters este de 250 %)

Șervețele cu dimensiunea de 15,2 x 20,3 cm; greutatea este de 1,51 gr; 3,75 ml lichid pe șervețel (sarcina lichidului de șters este de 250 %)

Șervețele cu dimensiunea de 17,7 x 20,3 cm; greutatea este de 1,50 gr; 3,75 ml lichid pe șervețel (sarcina lichidului de șters este de 250 %)

Șervețele cu dimensiunea de 19 x 25,4 cm; greutatea este de 1,49 gr; 3,75 ml lichid pe șervețel (sarcina lichidului de șters este de 250 %)

Șervețele cu dimensiunea de 20 x 26,7 cm; greutatea este de 1,49 gr; 3,75 ml lichid pe șervețel (sarcina lichidului de șters este de 250 %)

Șervețele cu dimensiunea de 20 x 30 cm; greutatea este de 1,50 g; 3,75 ml lichid pe șervețel (sarcina lichidului de șters este de 250 %)

Șervețele cu dimensiunea de 25 x 25 cm; greutatea este de 1,51 g; 3,75 ml lichid pe șervețel (sarcina lichidului de șters este de 250 %)

Șervețele cu dimensiunea de 25,4 x 25,4 cm; greutatea este de 1,51 g; 3,75 ml lichid pe șervețel (sarcina lichidului de șters este de 250%) Șervețele cu dimensiunea de 15 x 25 cm; greutatea este de 1,52 g; 6 ml lichid pe șervețel (sarcina lichidului de șters este de 400 %)

Șervețele cu dimensiunea de 15,2 x 17,7 cm; greutatea este de 1,51 gr; 6 ml lichid pe șervețel (sarcina lichidului de șters este de 400 %)

Șervețele cu dimensiunea de 15,2 x 20,3 cm; greutatea este de 1,51 gr; 6 ml lichid pe șervețel (sarcina lichidului de șters este de 400 %)

Șervețele cu dimensiunea de 17,7 x 20,3 cm; greutatea este de 1,50 gr; 6 ml lichid pe șervețel (sarcina lichidului de șters este de 400 %)

Șervețele cu dimensiunea de 19 x 25,4 cm; greutatea este de 1,49 gr; 6 ml lichid pe șervețel (sarcina lichidului de șters este de 400 %)

Șervețele cu dimensiunea de 20 x 26,7 cm; greutatea este de 1,49 gr; 6 ml lichid pe șervețel (sarcina lichidului de șters este de 400 %)

Șervețele cu dimensiunea de 20 x 30 cm; greutatea este de 1,50 g; 6 ml lichid pe șervețel (sarcina lichidului de șters este de 400 %)

Șervețele cu dimensiunea de 25 x 25 cm; greutatea este de 1,51 g; 6 ml lichid pe șervețel (sarcina lichidului de șters este de 400 %)

Șervețele cu dimensiunea de 25,4 x 25,4 cm; greutatea este de 1,51 g; 6 ml lichid pe șervețel (sarcina lichidului de șters este de 400 %)

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 3**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

| | | |
|---|---|---|
| Denumire (denumiri) comerciale | Oxivir Excel Wipe | zona Piața: UE |
| | Oxivir Excel Wipe H+ | zona Piața: UE |
| | Oxivir Excel Wipe Acti | zona Piața: UE |
| | Oxivir Excel Wipe Des | zona Piața: UE |
| | Oxivir Excel Wipe Duo | zona Piața: UE |
| | Clinell H2O2 wipes | zona Piața: UE |
| | Antibac Oxivir wipes | zona Piața: UE |
| | Divosan AHP Wipes VS72 | zona Piața: UE |
| | Suma AHP Wipes | zona Piața: UE |
| | Suma San AHP Wipes | zona Piața: UE |

| | | |
|---|---|---|
| | ClearKlens AHP Wipes | zona Piața: UE |
| | ClearKlens Excel Wipes | zona Piața: UE |
| | DOMES-TOS Expert Wipes | zona Piața: UE |
| | GLORIX Expert Wipes | zona Piața: UE |
| | KLINEX Expert Wipes | zona Piața: UE |
| | LYSO-FORM Expert Wipes | zona Piața: UE |
| | SAVO Expert Wipes | zona Piața: UE |
| | CIF Expert Wipes | zona Piața: UE |
| | VISS Expert Wipes | zona Piața: UE |
| | JIF Expert Wipes | zona Piața: UE |
| | FLORAS-ZEPT Expert Wipes | zona Piața: UE |
| | ANDY Expert Wipes | zona Piața: UE |
| | SUPER-ANDY Expert Wipes | zona Piața: UE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LIFEBUOY Expert Wipes | zona Piața: UE | |
| | | | ANDYSAN Expert Wipes | zona Piața: UE | |
| Numărul autorizației | | | EU-0032483-0003 1-3 | | |
| Denumire comună | Denumire IUPAC | Funcție | Număr CAS | Număr CE | Conținut (%) |
| Peroxid de hidrogen | | substanță activă | 7722-84-1 | 231-765-0 | 0,36 % (de greutate) |