VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2025/839

z 5. mája 2025,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 udeľuje autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „Oxivir Excel BPF“

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní ([1]), a najmä na jeho článok 44 ods. 5 prvý pododsek,

keďže:

(1) Spoločnosť Diversey Europe Operations B.V. predložila 16. decembra 2016 v súlade s článkom 43 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 Európskej chemickej agentúre (ďalej len „agentúra“) žiadosť o autorizáciu Únie pre skupinu biocídnych výrobkov s názvom „Oxivir Excel BPF“, ktoré patria medzi výrobky typu 2 a 4 opísané v prílohe V k uvedenému nariadeniu, a poskytla písomné potvrdenie o tom, že príslušný orgán Holandska súhlasil s vykonaním hodnotenia žiadosti. Žiadosť bola zaregistrovaná v Registri pre biocídne výrobky pod číslom BC-DL028504-45.

(2) „Oxivir Excel BPF“ obsahuje peroxid vodíka ako účinnú látku, ktorá je zaradená do zoznamu schválených účinných látok Únie podľa článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 pre výrobky typu 2 a 4.

(3) V súlade s článkom 44 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 hodnotiaci príslušný orgán predložil agentúre 25. septembra 2023 hodnotiacu správu a závery svojho hodnotenia.

(4) V súlade s článkom 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 predložila agentúra Komisii 20. marca 2024 svoje stanovisko ([2]), návrh zhrnutia charakteristík skupiny biocídnych výrobkov (*summary of the biocidal product characteristics* – SPC) pre skupinu biocídnych výrobkov „Oxivir Excel BPF“ a záverečnú hodnotiacu správu o tejto skupine.

(5) Agentúra vo svojom stanovisku dospela k záveru, že „Oxivir Excel BPF“ je skupinou biocídnych výrobkov v zmysle článku 3 ods. 1 písm. s) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, že jej možno udeliť autorizáciu Únie podľa článku 42 ods. 1 uvedeného nariadenia a že, ak táto skupina biocídnych výrobkov spĺňa podmienky uvedené v návrhu zhrnutia charakteristík skupiny biocídnych výrobkov, spĺňa podmienky stanovené v článku 19 ods. 6 uvedeného nariadenia.

(6) V súlade s článkom 44 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 predložila agentúra Komisii 15. apríla 2024 návrh zhrnutia charakteristík biocídneho výrobku vo všetkých úradných jazykoch Únie.

(7) Komisia súhlasí so stanoviskom agentúry a zastáva preto názor, že je vhodné udeliť skupine biocídnych výrobkov „Oxivir Excel BPF“ autorizáciu Únie.

(8) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

([1]) Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) ECHA opinion of 29 February 2024 on the Union authorisation of ‘Oxivir Excel BPF’ (Stanovisko agentúry ECHA z 29. februára 2024 k autorizácii Únie pre „Oxivir Excel BPF“) (ECHA/BPC/417/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Spoločnosti Diversey Europe Operations B.V. sa týmto udeľuje autorizácia Únie s autorizačným číslom EU-0032483-0000 na sprístupnenie skupiny biocídnych výrobkov „Oxivir Excel BPF“ na trhu a jej používanie v súlade so zhrnutím charakteristík biocídnych výrobkov stanoveným v prílohe.

Autorizácia Únie je platná od 26. mája 2025 do 30. apríla 2035.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. mája 2025

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

ZHRNUTIE CHARAKTERISTÍK SKUPINY BIOCÍDNYCH VÝROBKOV

Oxivir Excel BPF

Typ(y) výrobku

PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá

PT04: Oblasť potravín a krmív

Číslo autorizácie EU-0032483-0000

Číslo položky v R4BP EU-0032483-0000

ČASŤ I.

PRVÁ INFORMAČNÁ ÚROVEŇ

Kapitola 1. **ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Názov skupiny**

Názov	Oxivir Excel BPF

1.2. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá PT04: Oblasť potravín a krmív

1.3. **Držiteľ autorizácie**

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	Diversey Europe Operations B.V.
	Adresa	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen NL
Číslo autorizácie	EU-0032483-0000	
Číslo položky v R4BP	EU-0032483-0000	
Dátum autorizácie	26. máj 2025	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	30. apríl 2035	

1.4. **Výrobca(-ovia) výrobku**

Názov výrobcu	Diversey Europe Operations B.V.
Adresa výrobcu	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen Holandsko
Miesto výrobných priestorov	

Názov výrobcu	Multifill BV
Adresa výrobcu	Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Holandsko
Miesto výrobných priestorov	Multifill BV site 1 Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Holandsko

Názov výrobcu	Pluswipes LTD
Adresa výrobcu	Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Miesto výrobných priestorov	Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Názov výrobcu	Flexible Medical Packaging Ltd
Adresa výrobcu	Unit 8, Hightown - White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanster, Lancashire Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Miesto výrobných priestorov	Flexible Medical Packaging Ltd site 1 Unit 8, Hightown - White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanter, Lancashire Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Názov výrobcu	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S
Adresa výrobcu	395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Francúzsko
Miesto výrobných priestorov	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S site 1 395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Francúzsko

Názov výrobcu	Cheport spol s.r.o.
Adresa výrobcu	Lhotsko 93 76312 Vizovice Česko
Miesto výrobných priestorov	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Česko

Názov výrobcu	Helichem
Adresa výrobcu	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Holandsko

Miesto výrobných priestorov	Helichem site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Holandsko

Názov výrobcu	LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
Adresa výrobcu	Türkgücü Organize San. Bölgesi 123.Sokak No 4/1 59580 Çorlu, Tekirdağ Turecko
Miesto výrobných priestorov	LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. site 1 Türkgücü Organize San. Bölgesi 123.Sokak No:4/1 59580 Çorlu, Tekirdağ Turecko

Názov výrobcu	SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresa výrobcu	Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 27 34592 Silivri, Istanbul Turecko
Miesto výrobných priestorov	SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. site 1 Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 27 34592 Silivri, Istanbul Turecko

Názov výrobcu	ITW Contamination Control BV
Adresa výrobcu	Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Holandsko
Miesto výrobných priestorov	ITW Contamination Control BV site 1 Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Holandsko

Názov výrobcu	Arkema
Adresa výrobcu	Tankhoofd 10 Haven 3255 3196 KE Rotterdam Holandsko
Miesto výrobných priestorov	Arkema site 1 Morschheimer Strasse 19 D-67292 Kirchheimbolanden Nemecko

1.5. **Výrobca(-ovia) účinnej(-ých) látky(-ok)**

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Evonik Operations GmbH
Adresa výrobcu	Evonik Resource Efficiency GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11 D-45128 Essen Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Evonik Resource Efficiency GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Nemecko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Solvay Chemicals International SA
Adresa výrobcu	Solvay Chemicals International SA, Rue Ransbeek 310 1120 Brussels Belgicko
Miesto výrobných priestorov	Solvay Chemicals International site 1 Via Piave 6 57013 Rosignano Solvay Taliansko Solvay Chemicals International site 2 Köthensche Strasse 1-3 06406 Bernburg Nemecko Solvay Chemicals International site 3 Baronet Road WA4 6HB Warrington Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Solvay Chemicals International site 4 Yrjonojantie 2 45911 Voikkaa Fínsko Solvay Chemicals International site 5 Rua Eng. Clement Dumoulin, 2625-106 Povoa de Santa Iria Portugalsko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Kemira Oyj
Adresa výrobcu	Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, PL 330 00101 Helsinki Fínsko
Miesto výrobných priestorov	Kemira Oyj site 1 Moezelweg 151 3198 LS Rotterdam Holandsko Kemira Oyj site 2 Typpitie PL 171 90101 Oulu Fínsko Kemira Oyj site 3 Industrigatan 83 25109 Helsingborg Švédsko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Arkema France
Adresa výrobcu	420, rue dÉstienne dÓrves F-92705 Colombes Cedex Francúzsko
Miesto výrobných priestorov	Arkema b.v. site 1 Route National 85 38560 Jarrie Francúzsko Arkema b.v. site 2 Am Haupttor, Bau 2410 06237 Leuna Nemecko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Arkema GmbH
Adresa výrobcu	Tersteegenstr. 28 D-40474 Düsseldorf Nemecko

Miesto výrobných priestorov	Arkema b.v site 1 Route National 85 3856 Jarrie Francúzsko Arkema b.v. site 2 Am Haupttor, Bau 2410 0623 Leuna Nemecko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Evonik Antwerpen NV
Adresa výrobcu	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgicko
Miesto výrobných priestorov	Evonik Antwerpen site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgicko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Evonik Peroxid GmbH
Adresa výrobcu	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Rakúsko
Miesto výrobných priestorov	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestrasse 1 9721 Weissenstein Rakúsko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Evonik Peroxide Netherlands BV
Adresa výrobcu	Hettenheuvelweg 37 /39 1101 BM Amsterdam Holandsko
Miesto výrobných priestorov	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Holandsko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Evonik Peroxide Spain, S.L.U.
Adresa výrobcu	C/ Afueras s/h. 50784 La Zaida Španielsko
Miesto výrobných priestorov	Evonik Peroxide Spain, S.L.U. site 1 Calle Afueras s/n 50784 La Zaida Španielsko

Kapitola 2. **ZLOŽENIE A ÚPRAVA SKUPINY VÝROBKOV**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení skupiny**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	0,36 - 7,2 % (w/w)

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
(C9-C11) etoxylát alkylalkoholu	(C9-C11) etoxylát alkylalkoholu	Iná ako účinná látka	68439-46-3		0,09 - 1,8 % (w/w)
Kyselina alkylbenzén-sulfónová	Kyselina 2-dodecylben-zénsulfónová	Iná ako účinná látka	85536-14-7	287-494-3	0,97 - 19,4 % (w/w)
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	0,12 - 2,4 % (w/w)

2.2. **Typ(y) úpravy**

Typ(y) úpravy	AL Akákoľvek iná kvapalina SL Rozpustný koncentrát AL (Iné tekutiny) - RTU utierky

ČASŤ II.

DRUHÁ INFORMAČNÁ ÚROVEŇ META SPC

Kapitola 1. **META SPC 1 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Meta SPC 1 Identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: Meta-SPC 1: Concentrate

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-1

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá PT04: Oblasť potravín a krmív

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 1**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 1**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	7,2 - 7,2 % (w/w)

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
Kyselina alkylbenzén-sulfónová	Kyselina 2-dodecylben-zénsulfónová	Iná ako účinná látka	85536-14-7	287-494-3	19,4 - 19,4 % (w/w)
(C9-C11) etoxylát alkylalkoholu	(C9-C11) etoxylát alkylalkoholu	Iná ako účinná látka	68439-46-3		1,8 - 1,8 % (w/w)
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	2,4 - 2,4 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 4 1**

Typ(y) úpravy	SL Rozpustný koncentrát

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 1**

Výstražné upozornenia	H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H290: Môže byť korozívna pre kovy.
Bezpečnostné upozornenia	P234: Uchovávajte iba v pôvodnom obale. P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia P280: Noste ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare alebo ochranu tváre P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Ihneď vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou [alebo sprchou]. P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára P363: Kontaminovaný odev pred ďalším použitím umyte. P390: Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám. P501: Zneškodnite obsah zlikvidujte na zbernom mieste nebezpečného alebo špeciálneho. P501: Zneškodnite nádobu zlikvidujte na zbernom mieste nebezpečného alebo špeciálneho.

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1.

Použitie č. 1.1 – Čistenie a dezinfekcia pomocou mopu pre zdravotnícke priestory.

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci dezinfekčný výrobok na tvrdé povrchy pre zdravotnícke priestory.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia mopom Detailný opis: Podrobný popis: Aplikácia pomocou namočeného mopu.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 11 až 40 ml/m^2 Výrobok zrieďte vodou, aby ste dosiahli 4,5 % prípravok. Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia používania: 7-krát denne. Používajte pri izbovej teplote.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE Fľaša (J-Flex): 1,5 litra. HDPE Fľaša (Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov.

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Riedenie výrobku:

baktericídne, kvasinkocídne a virucídne 4,5 % výrobok.

Pre balenia s manuálnym systémom riedenia:

Na zabránenie penenia naplňte nádobu z troch štvrtín vodou. Pridajte správne množstvo koncentrovaného výrobku, aby ste dosiahli zriedenie 4,5 %. Opatrne dolejte zvyšok vody.

Pridajte koncentrovaný výrobok do vody, aby nedošlo k postriekaniu koncentrovaným výrobkom.

Ponorte mop do nádoby. Vytlačte nadbytočný roztok.

Vyčistite a dezinfikujte podlahu mokrým mopom. Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili.

Nechajte pôsobiť 5 minút. Nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

Pre balenia s (polo)automatickým systémom riedenia s 2 nastaveniami:

Vyberte správne nastavenie na dávkovacom zariadení. Naplňte nádobu zriedeným výrobkom (4,5 %). Ponorte mop do nádoby. Vytlačte nadbytočný roztok. Vyčistite a dezinfikujte podlahu mokrým mopom. Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút.

Nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 2.

Použitie č. 1.2 – Čistenie a dezinfekcia handričkou alebo špongiou pre zdravotnícke priestory.

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci dezinfekčný výrobok na tvrdé povrchy pre zdravotnícke priestory.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: rozotieranie Detailný opis: Roztieranie namočenou handričkou alebo špongiou.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 11 to 40 ml/m^2 Zrieďte výrobok vodou, aby ste dosiahli 4,5 % prípravok. Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia používania: 7-krát denne. Používajte pri izbovej teplote.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE Fľaša (J-Flex): 1,5 litra. HDPE Fľaša (Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov.

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Riedenie výrobku:

Baktericídne, Kvasinkocídne a Virucídne 4,5 %.

Pre balenia s manuálnym systémom riedenia:

Na zabránenie penenia naplňte nádobu z troch štvrtín vodou. Pridajte správne množstvo koncentrovaného výrobku, aby ste dosiahli zriedenie 4,5 %. Opatrne dolejte zvyšok vody.

Namočte handričku alebo špongiu do roztoku. Rozotrite kvapalinu po povrchu. Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili.

Nechajte pôsobiť 5 minút.

Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

Pre balenia s (polo)automatickým systémom riedenia:

Vyberte správne nastavenie na dávkovacom zariadení. Naplňte nádobu zriedeným výrobkom (4,5 %). Namočte handričku alebo špongiu do roztoku. Rozotrite kvapalinu po povrchu.

Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút.

Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.3. **Opis použitia**

Tabuľka 3.

Použitie č. 1.3 – Čistenie a dezinfekcia malých predmetov namáčaním alebo ponáraním pre zdravotnícke priestory

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci dezinfekčný výrobok na malé predmety (napr. nožnice a kefy) pre zdravotnícke priestory. Biocídne použitie vylučuje dezinfekciu zdravotníckych pomôcok.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Namáčanie alebo ponáranie Detailný opis: Namáčanie alebo ponáranie v roztoku.

Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: až do 3 litrov Zrieďte výrobok vodou, aby ste dosiahli 4,5 % prípravok. Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia používania: 1-krát denne. Používajte pri izbovej teplote.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE Fľaša (J-Flex): 1,5 litra. HDPE Fľaša (Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov.

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Riedenie výrobku:

Baktericídne, Kvasinkocídne a Virucídne 4,5%

Pre balenia s manuálnym systémom riedenia:

Aby nedochádzalo k peneniu, naplňte nádobu z troch štvrtín vodou. Pridajte správne množstvo výrobku, aby ste dosiahli zriedenie 4,5 %. Opatrne dolejte zvyšok vody.

Pridajte výrobok do vody, aby nedošlo k postriekaniu koncentrovaným výrobkom.

Po ponorení predmetov do dezinfekčného roztoku prikryte namáčací kúpeľ vekom.

Dbajte na to, aby položky, ktoré sa majú dezinfikovať, boli úplne ponorené v roztoku po dobu 5 minút.

Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

Pre balenia s (polo)automatickým systémom riedenia:

Vyberte správne nastavenie na dávkovacom zariadení. Naplňte nádobu zriedeným výrobkom (4,5 %).

Po ponorení predmetov do dezinfekčného roztoku prikryte namáčací kúpeľ vekom.

Dbajte na to, aby položky, ktoré sa majú dezinfikovať, boli úplne ponorené v roztoku po dobu 5 minút.

Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

Roztoky na namáčanie alebo ponáranie je možné použiť len raz.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.4. **Opis použitia**

Tabuľka 4.

Použitie č. 1.4 – Čistenie a dezinfekcia napenením pre zdravotnícke priestory.

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci dezinfekčný výrobok na tvrdé povrchy pre zdravotnícke priestory.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: sprejovanie Detailný opis: Rozprašovanie pomocou spúšťacej peny. Prípadne utrite a roztok rozotrite.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 11 ml/m² Zrieďte výrobok vodou, aby ste dosiahli 4,5 % prípravok. Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia používania: Na toaletách a v kúpeľniach: 4-krát denne. V nemocniciach a lekárskych ordináciách: 8-krát denne. V laboratóriách: 10-krát denne. V čistých miestnostiach: 10-krát denne. Používajte pri izbovej teplote.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE Fľaša (J-Flex): 1,5 litra. HDPE Fľaša (Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov.

4.4.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Riedenie výrobku:

Baktericídne, Kvasinkocídne a Virucídne 4,5 %.

Pre balenia s manuálnym systémom riedenia:

Na zabránenie peneniu naplňte peniaci rozprašovač z troch štvrtín vodou. Pridajte správne množstvo koncentrovaného výrobku, aby ste dosiahli zriedenie 4,5 %. Opatrne doplňte zvyšok vody.

Aplikujte zriedený výrobok. Prípadne roztok rozotrite.

Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút.

Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

Len na dezinfekciu malých plôch.

Pre balenia s (polo)automatickým systémom riedenia:

Vyberte správne nastavenie na dávkovacom zariadení. Naplňte peniaci rozprašovač zriedeným výrobkom. Aplikujte zriedený výrobok. Prípadne roztok rozotrite.

Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút.

Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

Len na dezinfekciu malých plôch.

4.4.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.4.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.4.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.4.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.5. **Opis použitia**

Tabuľka 5.

Použite č. 1.5 – Čistenie a dezinfekcia pomocou vlhkých utierok (vrátane zdravotníckych priestorov).

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci a dezinfekčný výrobok pre tvrdé povrchy.

Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: utieranie Detailný opis: Utieranie pripravenými vlhkými utierkami.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 1,5 m^2 na utierku Zrieďte výrobok vodou tak, aby ste dosiahli 5 % prípravok. Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia používania: 8-krát denne. Používajte pri izbovej teplote.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Kvapalina: Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE Fľaša (J-Flex): 1,5 litra. HDPE Fľaša (Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov. Suché utierky sú balené v HDPE vedre so 125 utierkami (polypropylén (PP)) - predáva sa samostatne.

4.5.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pripravte 1,5 litra roztoku pridaním 75 ml výrobku Oxivir Excel do 1,425 litra vody.

Do vedra so suchými utierkami aplikujte 1,5 litra zriedeného výrobku. Rovnomerne rozmiestnite kvapalinu. Zatvorte vedro.

Otvorte veko. Vezmite jednu utierku. Po odobratí utierky zatvorte veko. Používajte len vlhké utierky. Utrite povrch a dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili.

Nechajte pôsobiť 5 minút. Nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

4.5.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.5.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.5.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.5.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.6. **Opis použitia**

Tabuľka 6.

Použitie č. 1.6 – Čistenie a dezinfekcia povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami pomocou mopu.

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-

Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci a dezinfekčný produkt pre tvrdé povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia mopom Detailný opis: Aplikácia pomocou namočeného mopu.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 11 až 40 ml/m² Zrieďte výrobok vodou, aby ste dosiahli 3,75 % výrobok. Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia používania: 7-krát denne. Používajte pri izbovej teplote.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Polyetylén s vyskokou hustotou (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE Fľaša (J-Flex): 1,5 litra. HDPE Fľaša (Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov.

4.6.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Riedenie výrobku: baktericídne, kvasinkocídne a virucídne 3,75 %.

Pre balenia s manuálnym systémom riedenia:

Na zabránenie penenia naplňte nádobu z troch štvrtín vodou. Pridajte správne množstvo koncentrovaného výrobku, aby ste dosiahli zriedenie 3,75 %. Opatrne dolejte zvyšok vody.

Pridajte koncentrovaný výrobok do vody, aby nedošlo k postriekaniu koncentrovaným výrobkom.

Ponorte mop do nádoby. Vytlačte nadbytočný roztok. Vyčistite a dezinfikujte podlahu mokrým mopom.

Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút. Nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

Pre balenia s (polo)automatickým systémom riedenia:

Vyberte správne nastavenie na dávkovacom zariadení. Naplňte nádobu zriedeným výrobkom (3,75 %). Namočte mop do roztoku. Rozotrite kvapalinu.

Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút.

Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

4.6.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.6.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.6.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.6.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.7. **Opis použitia**

Tabuľka 7.

Použitie č. 1.7 – Čistenie a dezinfekcia povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami pomocou handričky alebo špongie.

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci a dezinfekčný výrobok pre tvrdé povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: rozotieranie Detailný opis: Roztieranie namočenou handričkou alebo špongiou.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 11 až 40 ml/m^2 Zrieďte výrobok vodou, aby ste dosiahli 3,75 % prípravok. Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia používania: 7-krát denne. Používajte pri izbovej teplote.

Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE Fľaša (J-Flex): 1,5 litra. HDPE Fľaša (Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov.

4.7.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Riedenie produktu: baktericídne, kvasinkocídne a virucídne 3,75 %

Pre balenia s manuálnym systémom riedenia:

Na zabránenie penenia naplňte nádobu z troch štvrtín vodou. Pridajte správne množstvo koncentrovaného výrobku, aby ste dosiahli zriedenie 3,75 %. Opatrne dolejte zvyšok vody.

Pridajte koncentrovaný výrobok do vody, aby nedošlo k postriekaniu koncentrovaným výrobkom.

Namočte handričku alebo špongiu do roztoku. Rozotrite kvapalinu.

Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút.

Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

Pre balenia s (polo)automatickým systémom riedenia:

Vyberte správne nastavenie na dávkovacom zariadení. Naplňte nádobu zriedeným výrobkom (3,75 %). Namočte handričku alebo špongiu do roztoku. Rozotrite kvapalinu.

Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút.

Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

4.7.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobkou Meta-SPC 1.

4.7.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.7.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.7.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.8. **Opis použitia**

Tabuľka 8.

Použitie č. 1.8 – Čistenie a dezinfekcia malých predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami namáčaním alebo ponáraním.

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci a dezinfekčný výrobok na malé predmety (napr. kuchynské pomôcky), ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: namáčanie alebo ponáranie Detailný opis: Namáčanie alebo ponáranie v roztoku.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: max. 3 litre Zrieďte výrobok vodou, aby ste dosiahli 3,75 % prípravok. Počet a časový rozvrh aplikácie: Používajte pri izbovej teplote. Frekvencia používania: 1-krát denne.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE Fľaša (J-Flex): 1,5 litra. HDPE Fľaša (Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov.

4.8.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Riedenie produktu: baktericídne, kvasinkocídne a virucídne 3,75 %.

Pre balenia s manuálnym systémom riedenia:

Na zabránenie penenia naplňte nádobu z troch štvrtín vodou. Pridajte správne množstvo koncentrovaného výrobku, aby ste dosiahli zriedenie 3,75 %. Opatrne dolejte zvyšok vody.

Po ponorení predmetov do dezinfekčného roztoku prikryte namáčací kúpeľ vekom.Dbajte na to, aby položky, ktoré sa majú dezinfikovať, boli úplne ponorené v roztoku po dobu 5 minút.

Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu.

Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

Pre balenia s (polo)automatickým systémom riedenia:

Vyberte správne nastavenie na dávkovacom zariadení. Naplňte nádobu zriedeným výrobkom (3,75 %).

Po ponorení predmetov do dezinfekčného roztoku prikryte namáčací kúpeľ vekom.Dbajte na to, aby položky, ktoré sa majú dezinfikovať, boli úplne ponorené v roztoku po dobu 5 minút. Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

Roztoky na namáčanie alebo ponáranie je možné použiť len raz.

4.8.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.8.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.8.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.8.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.9. **Opis použitia**

Tabuľka 9.

Použitie č. 1.9 – Čistenie a dezinfekcia povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami napenením.

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci a dezinfekčný výrobok pre tvrdé povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: sprejovanie Detailný opis: Postrekovanie pomocou spúšťacej peny. Prípadne utrite a roztok rozotrite.

Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 11 ml/m² Zrieďte výrobok vodou, aby ste dosiahli 3,75 % prípravok. Počet a časový rozvrh aplikácie: Používajte pri izbovej teplote. Frekvencia používania: V kuchyniach a jedálňach: 4-krát denne. V potravinárskom spracovateľskom odvetví: 4-krát denne. Na pultoch v obchodoch a supermarketoch: 8-krát denne.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE Fľaša (J-Flex): 1,5 litra. HDPE Fľaša (Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov.

4.9.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Riedenie výrobku: 3,75 %.

Pre balenia s manuálnym systémom riedenia:

Na zabránenie penenia naplňte peniaci rozprašovač z troch štvrtín vodou. Pridajte správne množstvo koncentrovaného výrobku, aby ste dosiahli zriedenie 3,75 %.

Opatrne doplňte zvyšok vody. Aplikujte zriedený výrobok. Prípadne roztok rozotrite. Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút.

Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

Len na dezinfekciu malých plôch.

Pre balenia s (polo)automatickým systémom riedenia:

Vyberte správne nastavenie na dávkovacom zariadení. Naplňte peniaci rozprašovač zriedeným výrobkom.

Aplikujte zriedený výrobok. Prípadne roztok rozotrite. Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút.

Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

Len na dezinfekciu malých plôch.

4.9.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.9.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.9.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.9.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.10. **Opis použitia**

Tabuľka 10.

Použitie č. 1.10 – Čistenie a dezinfekcia povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami vlhkými utierkami

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci a dezinfekčný výrobok pre tvrdé povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: utieranie Detailný opis: Utieranie pripravenými vlhkými utierkami.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 1,5 m^2 na utierku Zrieďte výrobok vodou tak, aby ste dosiahli 5 % prípravok. Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia používania: 8-krát denne. Používajte pri izbovej teplote.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	**Oxivir Excel:** Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE Fľaša (J-Flex): 1,5 litra. HDPE Fľaša (Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov. **Suché utierky** sú balené v HDPE vedre so 125 utierkami (polypropylén (PP)). (predáva sa samostatne)

4.10.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Riedenie výrobku: 5%.

Pripravte 1,5 litra roztoku pridaním 75 ml koncentrovaného výrobku do 1,425 litra vody.

Na zabránenie penenia naplňte nádobu z troch štvrtín vodou.

Aplikujte 1,5 litra zriedeného výrobku do vedra so suchými utierkami.

Rovnomerne rozmiestnite kvapalinu. Zatvorte vedro. Otvorte veko. Vezmite jednu utierku. Po odobratí utierky zatvorte veko.

Používajte len vlhké utierky. Utrite povrch. Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút. Nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

4.10.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.10.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.10.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.10.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.11. **Opis použitia**

Tabuľka 11.

Použitie č. 1.11 – Čistenie a dezinfekcia tvrdých povrchov pomocou mopu v priestoroch, ktoré nie sú zdravotnícke

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci a dezinfekčný výrobok pre tvrdé povrchy.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia mopom Detailný opis: Vytieranie namočeným mopom.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 11 až 40 ml/m^2 Zrieďte výrobok vodou tak, aby ste dosiahli nasledovnú koncentráciu: Baktericídne – 1,5 % roztok Kvasinkocídne – 3,75 % roztok Virucídne – 2 % roztok

	Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia používania: 7-krát denne. Používajte pri izbovej teplote.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE Fľaša (J-Flex): 1,5 litra. HDPE Fľaša (Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov.

4.11.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Riedenie výrobku:

Baktericídne - 1,5 % roztok

Kvasinkocídne - 3,75 % roztok

Virucídne - 2 % roztok

Pre balenia s manuálnym systémom riedenia:

Na zabránenie penenia naplňte nádobu z troch štvrtín vodou. Pridajte správne množstvo koncentrovaného výrobku, aby ste dosiahli správne nariedenie výrobku.

Opatrne doplňte zvyšok vody.Pridajte koncentrovaný výrobok do vody, aby nedošlo k postriekaniu koncentrovaným výrobkom. Ponorte mop do nádoby. Vytlačte nadbytočný roztok. Vyčistite a dezinfikujte podlahu mokrým mopom. Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút.

Nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

Pre balenia s (polo)automatickým systémom riedenia:

Vyberte správne nastavenie na dávkovacom zariadení. Naplňte nádobu zriedeným výrobkom. Ponorte mop do nádoby. Vytlačte nadbytočný roztok. Vyčistite a dezinfikujte podlahu mokrým mopom. Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút.

Nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

4.11.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.11.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.11.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.11.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.12. **Opis použitia**

Tabuľka 12.

Použitie č. 1.12 – Čistenie a dezinfekcia tvrdých povrchov handričkou alebo špongiou v priestoroch, ktoré nie sú zdravotnícke.

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci a dezinfekčný výrobok pre tvrdé povrchy.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: rozotieranie Detailný opis: Roztieranie namočenou handričkou alebo špongiou.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 11 až 40 ml/m^2 Zrieďte výrobok vodou tak, aby ste dosiahli nasledovnú koncentráciu: Baktericídne – 1,5 % roztok Kvasinkocídne – 3,75 % roztok Virucídne – 2 % roztok Počet a časový rozvrh aplikácie: Používajte pri izbovej teplote. Frekvencia používania: 7-krát denne.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Polyetylén s vyskou hustotou (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE Fľaša (J-Flex): 1,5 litra. HDPE Fľaša (Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov.

4.12.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Riedenie výrobku:

Baktericídne - 1,5 % roztok Kvasinkocídne - 3,75 % roztok Virucídne - 2 % roztok

Pre balenia s manuálnym systémom riedenia:

Na zabránenie penenia naplňte nádobu z troch štvrtín vodou. Pridajte správne množstvo koncentrovaného výrobku, aby ste dosiahli správne nariedenie výrobku.

Opatrne doplňte zvyšok vody. Namočte handričku alebo špongiu do roztoku. Rozotrite kvapalinu. Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút. Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

Pre balenia s (polo)automatickým systémom riedenia:

Vyberte správne nastavenie na dávkovacom zariadení. Naplňte nádobu zriedeným výrobkom.

Namočte handričku alebo špongiu do roztoku. Rozotrite kvapalinu.

Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili.Nechajte pôsobiť 5 minút.

Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

4.12.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1

4.12.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1

4.12.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1

4.12.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1

4.13. **Opis použitia**

Tabuľka 13.

Použitie č. 1.13 – Čistenie a dezinfekcia malých predmetov namáčaním alebo ponáraním v priestoroch, ktoré nie sú zdravotnícke.

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci a dezinfekčný výrobok na malé predmety (napr. nožnice a kefky).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Namáčanie alebo ponáranie Detailný opis: Namáčanie alebo ponáranie.

Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: max. 3 litre Zrieďte výrobok vodou tak, aby ste dosiahli nasledovnú koncentráciu: Baktericídne – 1,5 % roztok Kvasinkocídne – 3,75 % roztok Virucídne – 2 % roztok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia používania: 1-krát denne. Používajte pri izbovej teplote.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Polyetylén s vyskou hustotou (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE Fľaša (J-Flex): 1,5 litra. HDPE Fľaša (Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov.

4.13.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Riedenie výrobku:

Baktericídne - 1,5 % roztok

Kvasinkocídne - 3,75 % roztok

Virucídne - 2 % roztok

Pre balenia s manuálnym systémom riedenia:

Na zabránenie penenia naplňte nádobu z troch štvrtín vodou. Pridajte správne množstvo koncentrovaného výrobku, aby ste dosiahli správne nariedenie výrobku. Opatrne doplňte zvyšok vody. Po ponorení predmetov do dezinfekčného roztoku prikryte namáčací kúpeľ vekom.

Dbajte na to, aby položky, ktoré sa majú dezinfikovať, boli úplne ponorené v roztoku po dobu 5 minút.

Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

Pre balenia s (polo)automatickým systémom riedenia

Vyberte správne nastavenie na dávkovacom zariadení.Naplňte nádobu zriedeným produktom.

Po ponorení predmetov do dezinfekčného roztoku prikryte namáčací kúpeľ vekom.

Dbajte na to, aby položky, ktoré sa majú dezinfikovať, boli úplne ponorené v roztoku po dobu 5 minút.

Utrite do sucha a nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

Roztoky na namáčanie alebo ponáranie je možné použiť len raz.

4.13.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.13.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.13.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.13.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.14. **Opis použitia**

Tabuľka 14.

Use # 1.14 – Čistenie a dezinfekcia povrchov napenením v priestoroch, ktoré nie sú zdravotnícke.

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci a dezinfekčný výrobok pre tvrdé povrchy.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: sprejovanie Detailný opis: Postrekovanie pomocou spúšťacej peny. Prípadne roztok rozotrite.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 11 ml/m² Zrieďte výrobok vodou tak, aby ste dosiahli nasledovnú koncentráciu: Baktericídne – 1,5 % roztok Kvasinkocídne – 3,75 % roztok Virucídne – 2 % roztok Počet a časový rozvrh aplikácie: Používajte pri izbovej teplote. Frekvencia používania: Ak je výrobok určený na použitie na toalete a v kúpeľni: 4-krát denne. Ak je výrobok určený na použitie v kozmetických/ farmaceutických výrobných zariadeniach: 8-krát denne. Ak je výrobok určený na použitie v laboratóriách: 10-krát denne. Ak je výrobok určený na použitie v čistých priestoroch: 10-krát denne.

Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE Fľaša (J-Flex): 1,5 litra. HDPE Fľaša (Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov.

4.14.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Riedenie výrobku:

Baktericídne - 1,5 % roztok Kvasinkocídne - 3,75 % roztok Virucídne - 2 % roztok

Pre balenia s manuálnym systémom riedenia:

Na zabránenie penenia naplňte peniaci rozprašovač z troch štvrtín vodou. Pridajte správne množstvo koncentrovaného výrobku, aby ste dosiahli správne nariedenie výrobku.

Opatrne dolejte zvyšok vody. Aplikujte zriedený výrobok. Prípadne utrite a roztok rozotrite.

Povrch musí byť úplne mokrý. Nechajte pôsobiť 5 minút.

Utrite do sucha alebo nechajte vyschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

Len na dezinfekciu malých povrchov.

Pre balenia s (polo)automatickým systémom riedenia:

Vyberte správne nastavenie na dávkovacom zariadení. Naplňte peniaci rozprašovač zriedeným výrobkom. Aplikujte zriedený výrobok. Prípadne utrite a roztok rozotrite.

Povrch musí byť úplne mokrý. Nechajte pôsobiť 5 minút.

Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovať.

Len na dezinfekciu malých povrchov.

4.14.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.14.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.14.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.14.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.15. **Opis použitia**

Tabuľka 15.

Použitie č. 1.15 – Dezinfekcia vopred vyčistených tvrdých povrchov.

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekčný výrobok na vopred vyčistené tvrdé povrchy (vrátane zdravotníckych priestorov, farmaceutického priemyslu, kozmetického priemyslu, laboratórií a čistých priestorov).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: rozotieranie, namáčanie, sprejovanie Detailný opis: Roztieranie pomocou namočeného mopu. Roztieranie pomocou namočenej handričky alebo špongie. Ponorenie do roztoku. Sprejovanie penou, prípadne rozotretie roztoku.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikácia namočeným mopom: 11 až 40 ml/m^2, aplikácia namočenou handričkou alebo špongiou: 11 až 40 ml/m^2, ponorenie do roztoku: 3 litre, sprejovanie penou: 11 ml/m^2. Zrieďte výrobok vodou, aby ste dosiahli 2,5 % prípravok. Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia používania: Aplikácia namočeným mopom: 7-krát denne. Aplikácia pomocou namočenej handričky/špongie: 7-krát denne. Ponorenie: 1-krát denne. Sprejovanie penou: kúpeľne a toalety 4-krát denne; zdravotnícke priestory 8-krát denne; laboratóriá a čisté priestory 10-krát denne. Používajte pri izbovej teplote
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Polyetylén s vyskou hustotou (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE Fľaša (J-Flex): 1,5 litra. HDPE Fľaša (Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov.

4.15.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Riedenie produktu:

baktericídne, kvasinkocídne a virucídne 2,5 %.

Pre balenia s manuálnym systémom riedenia:

Na zabránenie penenia naplňte nádobu z troch štvrtín vodou. Pridajte správne množstvo koncentrovaného výrobku, aby ste dosiahli zriedenie 2,5 %. Opatrne dolejte zvyšok vody.

Pre balenia s (polo)automatickým systémom riedenia:

Vyberte správne nastavenie na dávkovacom zariadení.

Aplikácia namočeným mopom:

Ponorte mop do nádoby. Vytlačte nadbytočný roztok. Naneste na podlahu.

Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút.

Aplikácia pomocou namočenej handričky/špongie: Namočte handričku alebo špongiu do roztoku.

Rozotrite kvapalinu po povrchu. Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút.

Ponorenie: Po ponorení predmetov do dezinfekčného roztoku prikryte namáčací kúpeľ vekom. Dbajte na to, aby položky, ktoré sa majú dezinfikovať, boli úplne ponorené v roztoku po dobu 5 minút. Roztoky na namáčanie alebo ponáranie je možné použiť len raz.

Sprejovanie penou: Použite rozprašovač s penovou hlavicou. Použite zriedený výrobok. Prípadne roztok rozotrite. Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút.

Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

4.15.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.15.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.15.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

4.15.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 1.

Kapitola 5. **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 1**

5.1. **Návod na použitie**

Na profesionálne použitie:

Udržujte mimo kontaktu s potravinami, nápojmi a krmivami pre zvieratá.

Po manipulácii si starostlivo umyte ruky.

Uchovávajte iba v pôvodnom balení.

Nemiešajte s inými výrobkami.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Nasledujúce osobné ochranné prostriedky (OOP) sú stanovené bez toho, aby bolo ovplyvnené uplatňovanie Smernice Rady 98/24/ES a iných právnych predpisov Únie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnávateľmi.

Používanie ochrany očí (v súlade s európskou normou EN 16 321, resp. zodpovedajúcou normou) počas manipulácie s koncentrovaným výrobkom je povinné.

Pri manipulácii s výrobkom noste ochranné chemicky odolné rukavice klasifikované podľa európskej normy EN ISO 374 alebo zodpovedajúcej normy (materiál rukavíc má byť špecifikovaný držiteľom autorizácie v informáciách o výrobku).

Pri manipulácii s koncentrovanými výrobkami noste chemicky odolný odev v súlade s európskou normou EN 14605 alebo zodpovedajúcou normou a vhodnú ochrannú obuv v súlade s európskou normou EN 13832 alebo zodpovedajúcou normou.

V oddieli 6 nájdete úplné znenie názvov noriem EN.

Zvieratá držte mimo ošetrených povrchov, až do vysušenia.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Prvá pomoc:

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju oddychovať v polohe, ktorá umožňuje pohodlné dýchanie. Pri príznakoch: Volajte 112/záchrannú službu kvôli lekárskej pomoci.

Bez príznakov: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO POŽITÍ: Okamžite vypláchnite ústa. Podajte niečo na pitie, ak je postihnutá osoba schopná prehĺtať. Nevyvolávajte zvracanie. Volajte 112/záchrannú službu kvôli lekárskej pomoci.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Okamžite umyte pokožku veľkým množstvom vody. Potom vyzlečte všetok kontaminovaný odev a pred opätovným použitím ho vyperte. Pokračujte v umývaní pokožky vodou po dobu 15 minút. Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Okamžite niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní aspoň 15 minút. Volajte na číslo 112/zdravotnícku záchrannú službu kvôli lekárskej pomoci.

Informácie pre zdravotnícky personál/lekára:

Oči by sa mali opakovane vyplachovať aj na ceste k lekárovi, ak sú oči vystavené alkalickým chemikáliám (pH > 11), amínom a kyselinám, ako je kyselina octová, kyselina mravčia alebo kyselina propiónová.

Opatrenia na ochranu životného prostredia:

Zabráňte preniknutiu do kanalizačného systému, povrchových alebo podzemných vôd. Zabráňte preniknutiu do zeme/pôdy. Zrieďte veľkým množstvom vody. V prípade, že sa nezriedený výrobok dostane do kanalizačného systému, povrchových alebo podzemných vôd alebo do zeme/pôdy, informujte zodpovedné orgány.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Obsah/nádobu odovzdajte na likvidáciu nebezpečného odpadu v súlade so zákonnými predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Skladovateľnosť: 2 roky.

Skladujte v tme.

Neuchovávajte pri teplotách nad 30 °C.

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Výrobky tejto meta-SPC možno použiť aj na dezinfekciu povrchov zdravotníckych pomôcok v zdravotníckych a klinických zariadeniach. V takom prípade musí ich uvedenie na trh alebo uvedenie do používania byť v súlade s nariadením (EÚ) 2017/745 Európskeho parlamentu a Rady z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, ktorým sa mení smernica 2001/83/ES, nariadenie (ES) č. 178/2002 a nariadenie (ES) č. 1223/2009 a zrušujú smernice Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Ú. v. EÚ L 117, 05.05.2017, s. 1) a sú klasifikované ako zdravotnícke pomôcky triedy IIa. Takéto použitie nie je súčasťou autorizácie tejto skupiny biocídnych výrobkov a nie je ňou pokryté.

Pokiaľ ide o „kategórie používateľov“: Pod „profesionálmi“ (vrátane priemyselných používateľov) sa rozumejú vyškolení profesionáli, ak to vyžaduje národná legislatíva.

Úplné názvy noriem EN uvedených v oddieli 5.2 „Opatrenia na zmiernenie rizík“ sú:

EN 13832 - Obuv na ochranu proti chemikáliám

EN ISO 374 - Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom

EN ISO 16321 - Ochrana očí a tváre pre pracovné použitie

EN 14605 - Ochranný odev proti kvapalným chemikáliám - Kvalitatívne požiadavky na odev so švami odolnými voči kvapalinám (typ 3) alebo sprejom (typ 4), vrátane predmetov poskytujúcich ochranu len určitým častiam tela (typy PB [3] a PB [4]).

Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými látkami pri práci (štrnásta individuálna smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. EÚ L 131, 5.5.1998, s. 11).

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 1**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	Oxivir Excel	Oblasť trhu: EÚ
	Oxivir Excel H+	Oblasť trhu: EÚ
	Oxivir Excel J-flex	Oblasť trhu: EÚ
	Oxivir Excel Smart-Dose	Oblasť trhu: EÚ

	Oxivir Excel SD	Oblasť trhu: EÚ
	Oxivir Excel Conc	Oblasť trhu: EÚ
	Oxivir Excel Concen-trate	Oblasť trhu: EÚ
	Oxivir Excel IBC	Oblasť trhu: EÚ
	Oxivir Excel Acti	Oblasť trhu: EÚ
	Oxivir Excel Des	Oblasť trhu: EÚ
	Oxivir Excel Duo	Oblasť trhu: EÚ
	Clinell H2O2 concen-trate	Oblasť trhu: EÚ
	Antibac Oxivir concen-trate	Oblasť trhu: EÚ
	Divosan AHP VS70	Oblasť trhu: EÚ
	TASKI Sani AHP-Des	Oblasť trhu: EÚ
	TASKI Sprint AHP-Des	Oblasť trhu: EÚ
	Suma AHP D10.7	Oblasť trhu: EÚ
	Suma AHP	Oblasť trhu: EÚ
	Suma San AHP D10.7	Oblasť trhu: EÚ
	Suma San AHP	Oblasť trhu: EÚ

	ClearKlens AHP Conc	Oblasť trhu: EÚ
	ClearKlens Excel Conc	Oblasť trhu: EÚ
	DOME-STOS Expert Conc	Oblasť trhu: EÚ
	GLORIX Expert Conc	Oblasť trhu: EÚ
	KLINEX Expert Conc	Oblasť trhu: EÚ
	LYSO-FORM Expert Conc	Oblasť trhu: EÚ
	SAVO Expert Conc	Oblasť trhu: EÚ
	CIF Expert Conc	Oblasť trhu: EÚ
	VISS Expert Conc	Oblasť trhu: EÚ
	JIF Expert Conc	Oblasť trhu: EÚ
	FLORAS-ZEPT Expert Conc	Oblasť trhu: EÚ
	ANDY Expert Conc	Oblasť trhu: EÚ
	SUPE-RANDY Expert Conc	Oblasť trhu: EÚ
	LIFEBUOY Expert Conc	Oblasť trhu: EÚ

		ANDY-SAN Expert Conc	Oblasť trhu: EÚ		
Číslo autorizácie		EU-0032483-0001 1-1			
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	7,2 % (w/w)
Kyselina alkylbenzén-sulfónová	Kyselina 2-dodecylben-zénsulfónová	Iná ako účinná látka	85536-14-7	287-494-3	19,4 % (w/w)
(C9-C11) etoxylát alkylalkoholu	(C9-C11) etoxylát alkylalkoholu	Iná ako účinná látka	68439-46-3		1,8 % (w/w)
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	2,4 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 2 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Meta SPC 2 Identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: Meta-SPC 2: RTU

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-2

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá PT04: Oblasť potravín a krmív

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 2**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 2**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	0,36 - 0,36 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 4 2**

Typ(y) úpravy	AL Akákoľvek iná kvapalina

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 2**

Výstražné upozornenia	H290: Môže byť korozívna pre kovy.
Bezpečnostné upozornenia	P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P234: Uchovávajte iba v pôvodnom obale. P390: Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1.

Použitie č. 2.1 – Čistenie a dezinfekcia pomocou mopu (vrátane zdravotníckych priestorov).

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci a dezinfekčný výrobok na tvrdé povrchy (vrátane oblastí zdravotnej starostlivosti).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia mopom Detailný opis: Vytieranie namočeným mopom.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 11 až 40 ml/m² Výrobok na okamžité použitie. Počet a časový rozvrh aplikácie: Používajte pri izbovej teplote. Frekvencia používania: 7-krát denne.

Kategória(-ie) používateľov	odborník ; široká verejnosť (neodborná)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Profesionálni a neprofesionálni používatelia: Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov. Profesionálni používatelia: HDPE Kanister 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov.

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Profesionálni a neprofesionálni používatelia: Naplňte nádobu výrobkom.

Namočte mop do nádoby. Vyžmýkajte nadbytočný výrobok. Utrite podlahu mokrým mopom. Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút. Nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 2.

Použitie č. 2.2 – Čistenie a dezinfekcia handričkou alebo špongiou (vrátane zdravotníckych priestorov).

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje

Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci a dezinfekčný výrobok na tvrdé povrchy (vrátane zdravotníckych priestorov).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: rozotieranie Detailný opis: Roztieranie namočenou handričkou alebo špongiou.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 11 až 40 ml/m² Výrobok na okamžité použitie. Počet a časový rozvrh aplikácie: Používajte pri izbovej teplote. Frekvencia používania: 1-krát denne.
Kategória(-ie) používateľov	odborník ; široká verejnosť (neodborná)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Profesionálni a neprofesionálni používatelia: Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov. Profesionálni používatelia: HDPE Kanister 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov.

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Profesionálni a neprofesionálni používatelia: Namočte handričku alebo špongiu do výrobku ponorením. Rozotrite kvapalinu po povrchu.

Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút.

Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.3. **Opis použitia**

Tabuľka 3.

Použitie č. 2.3 – Čistenie a dezinfekcia malých predmetov namáčaním alebo ponáraním (vrátane zdravotníckych priestorov).

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci a dezinfekčný výrobok na malé predmety (napr. nožnice, kefy) vrátane predmetov v oblasti zdravotnej starostlivosti. Biocídne použitie vylučuje dezinfekciu zdravotníckych pomôcok.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Namáčanie alebo ponáranie Detailný opis: Namáčanie alebo ponáranie v roztoku.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: max. 3 litre Výrobok na okamžité použitie Počet a časový rozvrh aplikácie: Používajte pri izbovej teplote. Frekvencia používania: 1-krát denne.
Kategória(-ie) používateľov	odborník ; široká verejnosť (neodborná)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Profesionálni a neprofesionálni používatelia: Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov – 10 litrov. Profesionálni používatelia: HDPE Kanister 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov.

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Profesionálni a neprofesionálni používatelia:

Dbajte na to, aby položky, ktoré sa majú dezinfikovať, boli úplne ponorené v roztoku po dobu 5 minút.

Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu.

Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

Roztoky na namáčanie alebo ponáranie je možné použiť len raz.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.4. **Opis použitia**

Tabuľka 4.

Použitie č. 2.4 – Čistenie a dezinfekcia napenením (vrátane zdravotníckych priestorov).

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci a dezinfekčný výrobok na tvrdé povrchy pripravený na použitie (vrátane oblastí zdravotnej starostlivosti).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: sprejovanie Detailný opis: Postrekovanie pomocou spúšťacej peny. Prípadne roztok rozotrite.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 11 ml/m² Výrobok na okamžité použitie Počet a časový rozvrh aplikácie: Používajte pri izbovej teplote. Frekvencia používania: Na toaletách a v kúpeľniach: 4-krát denne. Na pultoch v kozmetických/farmaceutických výrobných zariadeniach: 8-krát denne. V laboratóriách: 10-krát denne. V čistých miestnostiach: 10-krát denne.

	Na pultoch v obchodoch a supermarketoch: 8-krát denne. V nemocniciach a lekárskych ordináciách: 8-krát denne.
Kategória(-ie) používateľov	odborník ; široká verejnosť (neodborná)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Profesionálni a neprofesionálni používatelia: 750 ml sprej so spúšťacím mechanizmom z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) s penovou hlavicou. HDPE Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov. Profesionálni používatelia: HDPE Kanister 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov.

4.4.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Profesionálni a neprofesionálni používatelia:

Aplikujte výrobok po povrchy. Prípadne roztok rozotrite.

Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili.

Nechajte pôsobiť 5 minút. Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu.

Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

Len na dezinfekciu malých plôch.

4.4.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.4.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.4.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.4.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.5. **Opis použitia**

Tabuľka 5.

Použitie č. 2.5 – Čistenie a dezinfekcia pomocou vlhkých utierok (vrátane zdravotníckych priestorov).

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje

	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci a dezinfekčný výrobok na tvrdé povrchy pripravený na použitie (vrátane oblastí zdravotnej starostlivosti).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie Detailný opis: Utieranie pripravenými vlhkými utierkami.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 1,5 m^2 na utierku Výrobok na okamžité použitie Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia používania: 8-krát denne. Používajte pri izbovej teplote.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	HDPE Kanister 1L - 1,5 L – 2 L - 2,5 L – 3 L – 5 L – 10 L - 20 L – 50 L – 100 L – 200 L. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov. Suché utierky sú balené v HDPE vedre so 125 utierkami (polypropylén (PP)). (predáva sa samostatne)

4.5.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Do vedra na suché utierky aplikujte 1,5 litra výrobku. Rovnomerne rozomiestnite kvapalinu. Zatvorte vedro.

Otvorte veko. Vezmite jednu utierku. Po odobratí utierky zatvorte veko. Používajte len vlhké utierky. Utrite povrch. Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili.

Nechajte pôsobiť 5 minút. Nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

4.5.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.5.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.5.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.5.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.6. **Opis použitia**

Tabuľka 6.

Použitie č. 2.6 – Čistenie a dezinfekcia pomocou mopu (vrátane povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami).

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci a dezinfekčný výrobok pripravený na použitie (vrátane povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia mopom Detailný opis: Vytieranie namočeným mopom.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 11 až 40 ml/m² Výrobok na okamžité použitie Počet a časový rozvrh aplikácie: Používajte pri izbovej teplote. Frekvencia používania: 1-krát denne.
Kategória(-ie) používateľov	odborník ; široká verejnosť (neodborná)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Profesionálni a neprofesionálni používatelia: Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov. Profesionálni používatelia: HDPE Kanister 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov.

4.6.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Naplňte nádobu produktom. Namočte mop do nádoby. Vyžmýkajte nadbytočný produkt. Utrite podlahu mokrým mopom.

Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút. Nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

4.6.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.6.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.6.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.6.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.7. **Opis použitia**

Tabuľka 7.

Použitie č. 2.7 – Čistenie a dezinfekcia handričkou alebo špongiou (vrátane povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami).

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci a dezinfekčný výrobok pripravený na použitie (vrátane povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: rozotieranie Detailný opis: Rozotieranie namočenou handričkou alebo špongiou.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 11 až 40 ml/m^2 Výrobok na okamžité použitie Počet a časový rozvrh aplikácie: Používajte pri izbovej teplote. Frekvencia používania: 1-krát denne.

Kategória(-ie) používateľov	odborník ; široká verejnosť (neodborná)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Profesionálni a neprofesionálni používatelia: Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov – 10 litrov. Profesionálni používatelia: HDPE Kanister 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov.

4.7.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Namočte hanričku alebo špongiu do výrobku ponorením.

Rozotrite kvapalinu po povrchu.

Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút. Utrite do sucha a nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

4.7.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.7.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.7.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.7.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.8. **Opis použitia**

Tabuľka 8.

Použitie č. 2.8 – Čistenie a dezinfekcia namáčaním alebo ponáraním malých predmetov (vrátane povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami).

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje

Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci a dezinfekčný výrobok pripravený na použitie na malé predmety (napr. kuchynský riad) vrátane povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Namáčanie alebo ponáranie Detailný opis: Namáčanie alebo ponáranie do výrobku.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: max. 3 litre Výrobok na okamžité použitie Počet a časový rozvrh aplikácie: Používajte pri izbovej teplote. Frekvencia používania: 1-krát denne.
Kategória(-ie) používateľov	odborník ; široká verejnosť (neodborná)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Profesionálni a neprofesionálni používatelia: Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov – 10 litrov. Profesionálni používatelia: HDPE Kanister 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov.

4.8.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Dbajte na to, aby predmety, ktoré sa majú dezinfikovať, boli úplne ponorené v roztoku po dobu 5 minút.

Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie. Roztoky na namáčanie alebo ponáranie je možné použiť len raz.

4.8.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.8.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.8.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.8.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.9. **Opis použitia**

Tabuľka 9.

Použitie č. 2.9 – Čistenie a dezinfekcia napenením (vrátane povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami).

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci a dezinfekčný výrobok pripravený na použitie na tvrdé povrchy (vrátane povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: sprejovanie Detailný opis: Postrekovanie pomocou spúšťacej peny. Prípadne roztok rozotrite.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 11 ml/m² Výrobok na okamžité použitie Počet a časový rozvrh aplikácie: Používajte pri izbovej teplote. Frekvencia používania: V kuchyniach a jedálňach: 4 krát denne. V potravinárskom priemysle: 4 krát denne. Na pultoch v obchodoch alebo supermarketoch: 8 krát denne.
Kategória(-ie) používateľov	odborník ; široká verejnosť (neodborná)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Profesionálni a neprofesionálni používatelia: 750 ml spúšťacia pena z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE). HDPE Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov – 10 litrov. Profesionálni používatelia: HDPE Kanister 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov.

4.9.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Aplikujte výrobok na povrchy. Prípadne roztok rozotrite.

Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút.

Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

Len na dezinfekciu malých plôch.

4.9.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.9.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.9.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.9.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.10. **Opis použitia**

Tabuľka 10.

Použitie č. 2.10 – Čistenie a dezinfekcia vlhkými utierkami (vrátane povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami).

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistiaci a dezinfekčný výrobok pripravený na použitie na tvrdé povrchy (vrátane povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: utieranie Detailný opis: Utieranie pripravenými vlhkými utierkami.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 1,5 m^2 na utierku Výrobok na okamžité použitie Počet a časový rozvrh aplikácie: Používajte pri izbovej teplote. Frekvencia používania: 8-krát denne.

Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	**Kvapalina RTU:** Profesionálni používatelia: Vysokohustý polyetylén (HDPE) Kanister 1 litrov - 1,5 litrov – 2 litrov - 2,5 litrov – 3 litrov – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE IBC nádrž: 100-1 000 litrov **Suché utierky** sú balené v HDPE vedre so 125 utierkami (polypropylén (PP)). (predáva sa samostatne)

4.10.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Do vedra na suché utierky aplikujte 1,5 litra výrobku. Rovnomerne rozmiestnite kvapalinu. Zatvorte vedro. Otvorte veko.

Vezmite jednu utierku. Po odobratí utierky zatvorte veko. Používajte len vlhké utierky. Utrite povrch

Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút.

Nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

4.10.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.10.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.10.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.10.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.11. **Opis použitia**

Tabuľka 11.

Použitie č. 2.11 – Dezinfekcia vopred vyčistených tvrdých povrchov.

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje

Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekčný výrobok na vopred vyčistené tvrdé povrchy (vrátane zdravotníckych priestorov, farmaceutického priemyslu, kozmetického priemyslu, laboratórií a čistých priestorov).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: rozotieranie, namáčanie, sprejovenie Detailný opis: Roztieranie pomocou namočeného mopu. Roztieranie pomocou namočenej handričky alebo špongie. Ponorenie do roztoku. Sprejovanie penou, prípadne rozotretie roztoku.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: Aplikácia namočeným mopom: 11 až 40 ml/m^2, aplikácia namočenou handričkou alebo špongiou: 11 až 40 ml/m^2, ponorenie do roztoku: 3 litre, sprejovanie penou: 11 ml/m^2. Výrobok na okamžité použitie Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia používania: Aplikácia namočeným mopom: 7-krát denne. Aplikácia pomocou namočenej handričky/špongie: 7-krát denne. Ponorenie: 1-krát denne. Sprejovanie penou: kúpeľne a toalety 4-krát denne, zdravotnícke priestory 8-krát denne, laboratóriá a čisté priestory 10-krát denne. Používajte pri izbovej teplote.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litre - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov – 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov. HDPE Fľaša (J-Flex): 1,5 litra. HDPE Fľaša (Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra. HDPE IBC nádrž: 100 - 1 000 litrov.

4.11.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Kontaktný čas: 5 minút.

Aplikácia mopom: Ponorte mop do nádoby. Vytlačte nadbytočný roztok. Naneste na podlahu.

Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť počas požadovaného kontaktného času.

Použitie handričky/špongie: Namočte handričku alebo špongiu do roztoku. Rozotrite kvapalinu po povrchu.

Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť počas požadovaného kontaktného času.

Ponorenie:

Po ponorení predmetov do dezinfekčného roztoku prikryte namáčací kúpeľ vekom.

Dbajte na to, aby predmety, ktoré sa majú dezinfikovať, boli úplne ponorené v roztoku po dobu 5 minút.

Roztoky na namáčanie alebo ponáranie je možné použiť len raz.

Sprejovanie penou: Aplikujte výrobok. Prípadne roztok rozotrite.

Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť počas požadovaného kontaktného času.

Len na dezinfekciu malých povrchov.

Utrite do sucha alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

4.11.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.11.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.11.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

4.11.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 2.

Kapitola 5. **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 2**

5.1. **Návod na použitie**

Na profesionálne použitie:

Udržujte mimo kontaktu s potravinami, nápojmi a krmivami pre zvieratá.

Po manipulácii si starostlivo umyte ruky.

Uchovávajte iba v pôvodnom balení.

Nemiešajte s inými výrobkami.

Pozrite pokyny na používanie špecifické pre dané použitie.

Na neprofesionálne použitie:

Dodržiavajte návod na použitie.

Udržujte mimo kontaktu s potravinami, nápojmi a krmivami pre zvieratá.

Po manipulácii si starostlivo umyte ruky.

Uchovávajte iba v pôvodnom balení.

Nemiešajte s inými výrobkami.

Pozrite pokyny na používanie špecifické pre dané použitie.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Zvieratá držte mimo ošetrených povrchov, až do vysušenia.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

PO VDÝCHNUTÍ: Ak sa objavia príznaky volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO POŽITÍ: Ak sa objavia príznaky volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte pokožku vodou. Ak sa objavia príznaky volajte NÁRODNÉ TOXOKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Ak sa objavia príznaky, vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní 5 minút. Volajte NÁRODNÉ TOXOKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Obsah/nádobu odovzdajte na likvidáciu nebezpečného odpadu v súlade so zákonnými predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Skladovateľnosť: 2 roky.

Skladujte v tme. Neuchovávajte pri teplotách nad 50 °C.

Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Výrobky tejto meta-SPC možno použiť aj na dezinfekciu povrchov zdravotníckych pomôcok v zdravotníckych a klinických zariadeniach. V takom prípade musí ich uvedenie na trh alebo uvedenie do používania byť v súlade s nariadením (EÚ) 2017/745 Európskeho parlamentu a Rady z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, ktorým sa mení smernica 2001/83/ES, nariadenie (ES) č. 178/2002 a nariadenie (ES) č. 1223/2009 a zrušujú smernice Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Ú. v. EÚ L 117, 05.05.2017, s. 1) a sú klasifikované ako zdravotnícke pomôcky triedy IIa. Takéto použitie nie je súčasťou autorizácie tejto skupiny biocidnych výrobkov a nie je ňou pokryté.

Pokiaľ ide o „kategórie používateľov“: Pod „profesionálmi“ (vrátane priemyselných používateľov) sa rozumejú vyškolení profesionáli, ak to vyžaduje národná legislatíva.

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 2**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	Oxivir Excel Foam	Oblasť trhu: EÚ
	Oxivir Excel Foam H+	Oblasť trhu: EÚ
	Oxivir Excel Spray	Oblasť trhu: EÚ
	Oxivir Excel Spray H+	Oblasť trhu: EÚ
	Oxivir Excel RTU	Oblasť trhu: EÚ
	Oxivir Excel RTU H+	Oblasť trhu: EÚ
	Oxivir Excel RTU IBC	Oblasť trhu: EÚ

	Oxivir Excel Foam Acti	Oblasť trhu: EÚ
	Oxivir Excel Foam Des	Oblasť trhu: EÚ
	Oxivir Excel Foam Duo	Oblasť trhu: EÚ
	Clinell H2O2 RTU	Oblasť trhu: EÚ
	Antibac Oxivir RTU	Oblasť trhu: EÚ
	Divosan AHP Foam RTU VS71	Oblasť trhu: EÚ
	TASKI Sani AHP-Des Spray	Oblasť trhu: EÚ
	TASKI Sprint AHP-Des Spray	Oblasť trhu: EÚ
	Suma AHP RTU D10.7	Oblasť trhu: EÚ
	Suma AHP Spray D10.7	Oblasť trhu: EÚ
	Suma AHP RTU	Oblasť trhu: EÚ
	Suma AHP Spray	Oblasť trhu: EÚ
	ClearKlens AHP RTU	Oblasť trhu: EÚ

	ClearKlens Excel RTU	Oblasť trhu: EÚ
	DOME-STOS Expert	Oblasť trhu: EÚ
	GLORIX Expert	Oblasť trhu: EÚ
	KLINEX Expert	Oblasť trhu: EÚ
	LYSO-FORM Expert	Oblasť trhu: EÚ
	SAVO Expert	Oblasť trhu: EÚ
	CIF Expert	Oblasť trhu: EÚ
	VISS Expert	Oblasť trhu: EÚ
	JIF Expert	Oblasť trhu: EÚ
	FLORAS-ZEPT Expert	Oblasť trhu: EÚ
	ANDY Expert	Oblasť trhu: EÚ
	SUPE-RANDY Expert	Oblasť trhu: EÚ
	LIFEBUOY Expert	Oblasť trhu: EÚ
	ANDY-SAN Expert	Oblasť trhu: EÚ
Číslo autorizácie	EU-0032483-0002 1-2	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	0,36 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 3 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Meta SPC 3 Identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: Meta-SPC 3: Wipes

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-3

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá PT04: Oblasť potravín a krmív

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 3**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 3**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	0,36 - 0,36 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 4 3**

Typ(y) úpravy	AL (Iné tekutiny) - RTU utierky

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 3**

Výstražné upozornenia	H290: Môže byť korozívna pre kovy.
Bezpečnostné upozornenia	P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P234: Uchovávajte iba v pôvodnom obale.

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1.

Použitie č. 3.1 – Čistenie a dezinfekcia pomocou vlhkých utierok na tvrdých povrchoch vrátane zdravotníckych priestorov.

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-

Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Utierka na čistenie a dezinfekciu tvrdých povrchov vrátane zdravotníckych priestorov.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie Detailný opis: Utieranie pripravenými vlhkými utierkami.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 1,5 m^2 na utierku Utierka pripravená na použitie. Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia používania: 8-krát denne. Používajte pri izbovej teplote.
Kategória(-ie) používateľov	odborník ; široká verejnosť (neodborná)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Vedro alebo vaňa z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) so 100 utierkami z PP. Polyetyléntereftalát (PET)/polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) v sériovom balení so 100 polypropylénovými (PP) utierkami Stojace vrecko PET/LDPE so 100 PP utierkami. Všetky balenia sú určené na profesionálne aj neprofesionálne použitie.

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Otvorte veko. Vezmite jednu utierku. Po odobratí utierky zatvorte veko.

Používajte len vlhké utierky. Utrite povrch. Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút.

Nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 3.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 3.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 3.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 3.

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 2.

Použitie č. 3.2 – Čistenie a dezinfekcia pomocou vlhkých utierok na tvrdých povrchoch vrátane povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Utierka na čistenie a dezinfekciu tvrdých povrchov (vrátane povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie Detailný opis: Utieranie pripravenými vlhkými utierkami.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 1,5 m^2 na utierku Utierka pripravená na použitie. Počet a časový rozvrh aplikácie: Používajte pri izbovej teplote. Frekvencia používania: 8-krát denne.
Kategória(-ie) používateľov	odborník ; široká verejnosť (neodborná)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Vedro alebo vaňa z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) so 100 utierkami z PP. Polyetyléntereftalát (PET)/polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) v sériovom balení so 100 polypropylénovými (PP) utierkami. Stojace vrecko PET/LDPE so 100 PP utierkami. Všetky balenia sú určené na profesionálne aj neprofesionálne použitie.

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Otvorte veko. Vezmite jednu utierku. Po odobratí utierky zatvorte veko.

Používajte len vlhké utierky. Utrite povrch. Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť 5 minút.

Nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 3.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 3.

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 3.

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 3.

4.3. **Opis použitia**

Tabuľka 3.

Použitie č. 3.3 – Utierka na dezinfekciu vopred vyčistených tvrdých povrchov

Typ výrobku	PT02: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí ani zvieratá
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Vírusy Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekčná utierka na vopred vyčistené tvrdé povrchy (vrátane zdravotníckych priestorov, farmaceutického priemyslu, kozmetického priemyslu, laboratórií a čistých priestorov).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie Detailný opis: Utieranie pripravenými vlhkými utierkami.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 1,5 m^2 na utierku Pripravené na okamžité použitie. Počet a časový rozvrh aplikácie: Používajte pri izbovej teplote. Frekvencia používania: 8-krát denne.
Kategória(-ie) používateľov	odborník

Veľkosti balenia a obalový materiál	Vedro alebo vaňa z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) so 100 utierkami z PP. Polyetyléntereftalát (PET)/polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) v sériovom balení so 100 polypropylénovými (PP) utierkami. Stojace vrecko PET/LDPE so 100 PP utierkami.

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Kontaktný čas:5 minút.

Otvorte veko. Vezmite jednu utierku. Po odobratí utierky zatvorte veko.

Používajte len vlhké utierky. Utrite povrch. Dbajte na to, aby ste povrch úplne navlhčili. Nechajte pôsobiť počas požadovaného kontaktného času.

Nechajte uschnúť na vzduchu. Po dezinfekcii nie je potrebné oplachovanie.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 3.

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 3.

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 3.

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny na použitie výrobku Meta-SPC 3.

Kapitola 5. **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 3**

5.1. **Návod na použitie**

Na profesionálne použitie:

Udržujte mimo kontaktu s potravinami, nápojmi a krmivami pre zvieratá.

Po manipulácii si starostlivo umyte ruky.

Uchovávajte iba v pôvodnom balení.

Nemiešajte s inými výrobkami.

Pozrite pokyny na používanie špecifické pre dané použitie.

Na neprofesionálne použitie:

Dodržiavajte návod na použitie.

Po manipulácii si starostlivo umyte ruky.

Uchovávajte iba v pôvodnom balení.

Nemiešajte s inými výrobkami.

Pozrite pokyny na používanie špecifické pre dané použitie.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Zvieratá držte mimo ošetrených povrchov, až do vysušenia.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

PO VDÝCHNUTÍ: Ak sa objavia príznaky volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO POŽITÍ: Ak sa objavia príznaky volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte pokožku vodou. Ak sa objavia príznaky volajte NÁRODNÉ TOXOKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Ak sa objavia príznaky, vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní 5 minút. Volajte NÁRODNÉ TOXOKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Obsah/nádobu odovzdajte na likvidáciu nebezpečného odpadu v súlade so zákonnými predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Skladovateľnosť: 2 roky.

Skladujte v tme. Neuchovávajte pri teplotách nad 50 °C.

Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Výrobky tejto meta-SPC možno použiť aj na dezinfekciu povrchov zdravotníckych pomôcok v zdravotníckych a klinických zariadeniach. V takom prípade musí ich uvedenie na trh alebo uvedenie do používania byť v súlade s nariadením (EÚ) 2017/745 Európskeho parlamentu a Rady z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, ktorým sa mení smernica 2001/83/ES, nariadenie (ES) č. 178/2002 a nariadenie (ES) č. 1223/2009 a zrušujú smernice Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Ú. v. EÚ L 117, 05.05.2017, s. 1) a sú klasifikované ako zdravotnícke pomôcky triedy IIa. Takéto použitie nie je súčasťou autorizácie tejto skupiny biocídnych výrobkov a nie je ňou pokryté.

Pokiaľ ide o „kategórie používateľov“: Pod „profesionálmi“ (vrátane priemyselných používateľov) sa rozumejú vyškolení profesionáli, ak to vyžaduje národná legislatíva.

Súčasťou sú tieto typy utierok:

Utierka s rozmermi 15 x 25 cm, hmotnosť je 1,52 gr; 3,75 ml kvapaliny na utierku (kvapalná náplň utierky je 250 %)

Utierka s rozmermi 15,2 x 17,7 cm, hmotnosť je 1,51 gr; 3,75 ml kvapaliny na utierku (kvapalná náplň utierky je 250 %)

Utierka s rozmermi 15,2 x 20,3 cm, hmotnosť je 1,51 gr; 3,75 ml kvapaliny na utierku (kvapalná náplň utierky je 250 %)

Utierka s rozmermi 17,7 x 20,3 cm, hmotnosť je 1,50 gr; 3,75 ml kvapaliny na utierku (kvapalná náplň utierky je 250 %)

Utierka s rozmermi 19 x 25,4 cm, hmotnosť je 1,49 gr; 3,75 ml kvapaliny na utierku (kvapalná náplň utierky je 250 %)

Utierka s rozmermi 20 x 26,7 cm, hmotnosť je 1,49 gr; 3,75 ml kvapaliny na utierku (kvapalná náplň utierky je 250 %)

Utierka s rozmermi 20 x 30 cm, hmotnosť je 1,50 gr; 3,75 ml kvapaliny na utierku (kvapalná náplň utierky je 250 %)

Utierka s rozmermi 25 x 25 cm, hmotnosť je 1,51 gr; 3,75 ml kvapaliny na utierku (kvapalná náplň utierky je 250 %)

Utierka s rozmermi 25,4 x 25,4 cm, hmotnosť je 1,51 gr; 3,75 ml kvapaliny na utierku (kvapalná náplň utierky je 250 %)

Utierka s rozmermi 15 x 25 cm, hmotnosť je 1,52 g, 6 ml kvapaliny na utierku (kvapalná náplň utierky je 400 %)

Utierka s rozmermi 15,2 x 17,7 cm, hmotnosť je 1,51 gr; 6 ml kvapaliny na utierku (kvapalná náplň utierky je 400 %)

Utierka s rozmermi 15,2 x 20,3 cm, hmotnosť je 1,51 gr; 6 ml kvapaliny na utierku (kvapalná náplň utierky je 400 %)

Utierka s rozmermi 17,7 x 20,3 cm, hmotnosť je 1,50 gr; 6 ml kvapaliny na utierku (kvapalná náplň utierky je 400 %)

Utierka s rozmermi 19 x 25,4 cm, hmotnosť je 1,49 gr; 6 ml kvapaliny na utierku (kvapalná náplň utierky je 400 %)

Utierka s rozmermi 20 x 26,7 cm, hmotnosť je 1,49 gr; 6 ml kvapaliny na utierku (kvapalná náplň utierky je 400 %)

Utierka s rozmermi 20 x 30 cm, hmotnosť je 1,50 gr; 6 ml kvapaliny na utierku (kvapalná náplň utierky je 400 %)

Utierka s rozmermi 25 x 25 cm, hmotnosť je 1,51 gr; 6 ml kvapaliny na utierku (kvapalná náplň utierky je 400 %)

Utierka s rozmermi 25,4 x 25,4 cm, hmotnosť je 1,51 gr; 6 ml kvapaliny na utierku (kvapalná náplň utierky je 400 %)

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 3**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	Oxivir Excel Wipe	Oblasť trhu: EÚ
	Oxivir Excel Wipe H+	Oblasť trhu: EÚ
	Oxivir Excel Wipe Acti	Oblasť trhu: EÚ
	Oxivir Excel Wipe Des	Oblasť trhu: EÚ
	Oxivir Excel Wipe Duo	Oblasť trhu: EÚ
	Clinell H2O2 wipes	Oblasť trhu: EÚ
	Antibac Oxivir wipes	Oblasť trhu: EÚ
	Divosan AHP Wipes VS72	Oblasť trhu: EÚ
	Suma AHP Wipes	Oblasť trhu: EÚ
	Suma San AHP Wipes	Oblasť trhu: EÚ

	ClearKlens AHP Wipes	Oblasť trhu: EÚ
	ClearKlens Excel Wipes	Oblasť trhu: EÚ
	DOME-STOS Expert Wipes	Oblasť trhu: EÚ
	GLORIX Expert Wipes	Oblasť trhu: EÚ
	KLINEX Expert Wipes	Oblasť trhu: EÚ
	LYSO-FORM Expert Wipes	Oblasť trhu: EÚ
	SAVO Expert Wipes	Oblasť trhu: EÚ
	CIF Expert Wipes	Oblasť trhu: EÚ
	VISS Expert Wipes	Oblasť trhu: EÚ
	JIF Expert Wipes	Oblasť trhu: EÚ
	FLORAS-ZEPT Expert Wipes	Oblasť trhu: EÚ
	ANDY Expert Wipes	Oblasť trhu: EÚ
	SUPE-RANDY Expert Wipes	Oblasť trhu: EÚ

			LIFEBUOY Expert Wipes	Oblasť trhu: EÚ	
			ANDYSAN Expert Wipes	Oblasť trhu: EÚ	
Číslo autorizácie			EU-0032483-0003 1-3		
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	0,36 % (w/w)