IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2025/839

z dne 5. maja 2025

o izdaji dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „Oxivir Excel BPF“ v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov ([1]) ter zlasti člena 44(5), prvi pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Družba Diversey Europe Operations B.V. je 16. decembra 2016 v skladu s členom 43(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 pri Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) vložila vlogo za izdajo dovoljenja za družino biocidnih proizvodov z imenom „Oxivir Excel BPF“ vrst proizvodov 2 in 4, kot sta opredeljeni v Prilogi V k navedeni uredbi, in predložila pisno potrdilo, da se pristojni organ Nizozemske strinja, da bo ocenil vlogo. Vloga je bila v registru biocidnih proizvodov evidentirana pod številko zadeve BC-DL028504-45.

(2) „Oxivir Excel BPF“ vsebuje vodikov peroksid kot aktivno snov, ki je vključena na seznam odobrenih aktivnih snovi Unije iz člena 9(2) Uredbe (EU) št. 528/2012 za vrsti proizvodov 2 in 4.

(3) Ocenjevalni pristojni organ je Agenciji 25. septembra 2023 v skladu s členom 44(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 predložil poročilo o oceni in ugotovitve ocenjevanja.

(4) Agencija je 20. marca 2024 v skladu s členom 44(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 Komisiji predložila mnenje ([2]), osnutek povzetka značilnosti biocidnega proizvoda (v nadaljnjem besedilu: SPC) „Oxivir Excel BPF“ in končno poročilo o oceni družine biocidnih proizvodov.

(5) V mnenju je ugotovljeno, da je „Oxivir Excel BPF“ družina biocidnih proizvodov v smislu člena 3(1), točka (s), Uredbe (EU) št. 528/2012, da se zanjo lahko izda dovoljenje Unije v skladu s členom 42(1) navedene uredbe in da ob upoštevanju skladnosti z osnutkom SPC izpolnjuje pogoje iz člena 19(6) navedene uredbe.

(6) Agencija je v skladu s členom 44(4) Uredbe (EU) št. 528/2012 Komisiji 15. aprila 2024 predložila osnutek SPC v vseh uradnih jezikih Unije.

(7) Komisija se strinja z mnenjem Agencije in torej meni, da je primerno izdati dovoljenje Unije za družino biocidnih proizvodov „Oxivir Excel BPF“.

(8) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne proizvode –

([1]) UL L 167, 27.6.2012, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Mnenje ECHA z dne 29. februarja 2024 o dovoljenju Unije za „Oxivir Excel BPF“ (ECHA/BPC/417/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Družbi Diversey Europe Operations B.V. se izda dovoljenje Unije s številko dovoljenja EU-0032483-0000 za dostopnost na trgu in uporabo družine biocidnih proizvodov „Oxivir Excel BPF“ v skladu s povzetkom značilnosti biocidnega proizvoda iz Priloge.

Dovoljenje Unije velja od 26. maja 2025 do 30. aprila 2035.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. maja 2025

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI DRUŽINE BIOCIDNEGA PROIZVODA

Oxivir Excel BPF

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih

Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

Številka dovoljenja EU-0032483-0000

Številka proizvoda v R4BP EU-0032483-0000

DEL I.

PRVA RAVEN INFORMACIJ

Poglavje 1. **UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Ime družine**

Ime	Oxivir Excel BPF

1.2. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

1.3. **Imetnik dovoljenja**

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Diversey Europe Operations B.V.
	Naslov	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen NL
Številka dovoljenja	EU-0032483-0000	
Številka proizvoda v R4BP	EU-0032483-0000	
Datum dovoljenja	26. maj 2025	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	30. april 2035	

1.4. **Proizvajalec(-ci) proizvoda**

Ime proizvajalca	Diversey Europe Operations B.V.
Naslov proizvajalca	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen Nizozemska
Kraj proizvodnih obratov	

Ime proizvajalca	Multifill BV
Naslov proizvajalca	Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Nizozemska
Kraj proizvodnih obratov	Multifill BV site 1 Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Nizozemska

Ime proizvajalca	Pluswipes LTD
Naslov proizvajalca	Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Kraj proizvodnih obratov	Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

Ime proizvajalca	Flexible Medical Packaging Ltd
Naslov proizvajalca	Unit 8, Hightown - White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanster, Lancashire Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Kraj proizvodnih obratov	Flexible Medical Packaging Ltd site 1 Unit 8, Hightown - White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanter, Lancashire Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

Ime proizvajalca	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S
Naslov proizvajalca	395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Francija
Kraj proizvodnih obratov	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S site 1 395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Francija

Ime proizvajalca	Cheport spol s.r.o.
Naslov proizvajalca	Lhotsko 93 76312 Vizovice Češka
Kraj proizvodnih obratov	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Češka

Ime proizvajalca	Helichem
Naslov proizvajalca	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Nizozemska

Kraj proizvodnih obratov	Helichem site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Nizozemska

Ime proizvajalca	LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
Naslov proizvajalca	Türkgücü Organize San. Bölgesi 123.Sokak No 4/1 59580 Çorlu, Tekirdağ Turčija
Kraj proizvodnih obratov	LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. site 1 Türkgücü Organize San. Bölgesi 123.Sokak No:4/1 59580 Çorlu, Tekirdağ Turčija

Ime proizvajalca	SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Naslov proizvajalca	Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 27 34592 Silivri, Istanbul Turčija
Kraj proizvodnih obratov	SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. site 1 Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 27 34592 Silivri, Istanbul Turčija

Ime proizvajalca	ITW Contamination Control BV
Naslov proizvajalca	Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Nizozemska
Kraj proizvodnih obratov	ITW Contamination Control BV site 1 Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Nizozemska

Ime proizvajalca	Arkema
Naslov proizvajalca	Tankhoofd 10 Haven 3255 3196 KE Rotterdam Nizozemska
Kraj proizvodnih obratov	Arkema site 1 Morschheimer Strasse 19 D-67292 Kirchheimbolanden Nemčija

1.5. **Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi**

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Evonik Operations GmbH
Naslov proizvajalca	Evonik Resource Efficiency GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11 D-45128 Essen Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Evonik Resource Efficiency GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Nemčija

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Solvay Chemicals International SA
Naslov proizvajalca	Solvay Chemicals International SA, Rue Ransbeek 310 1120 Brussels Belgija
Kraj proizvodnih obratov	Solvay Chemicals International site 1 Via Piave 6 57013 Rosignano Solvay Italija Solvay Chemicals International site 2 Köthensche Strasse 1-3 06406 Bernburg Nemčija Solvay Chemicals International site 3 Baronet Road WA4 6HB Warrington Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske Solvay Chemicals International site 4 Yrjonojantie 2 45911 Voikkaa Finska Solvay Chemicals International site 5 Rua Eng. Clement Dumoulin, 2625-106 Povoa de Santa Iria Portugalska

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Kemira Oyj
Naslov proizvajalca	Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, PL 330 00101 Helsinki Finska
Kraj proizvodnih obratov	Kemira Oyj site 1 Moezelweg 151 3198 LS Rotterdam Nizozemska Kemira Oyj site 2 Typpitie PL 171 90101 Oulu Finska Kemira Oyj site 3 Industrigatan 83 25109 Helsingborg Švedska

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Arkema France
Naslov proizvajalca	420, rue dÉstienne dÓrves F-92705 Colombes Cedex Francija
Kraj proizvodnih obratov	Arkema b.v. site 1 Route National 85 38560 Jarrie Francija Arkema b.v. site 2 Am Haupttor, Bau 2410 06237 Leuna Nemčija

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Arkema GmbH
Naslov proizvajalca	Tersteegenstr. 28 D-40474 Düsseldorf Nemčija

Kraj proizvodnih obratov	Arkema b.v site 1 Route National 85 3856 Jarrie Francija Arkema b.v. site 2 Am Haupttor, Bau 2410 0623 Leuna Nemčija

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Evonik Antwerpen NV
Naslov proizvajalca	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgija
Kraj proizvodnih obratov	Evonik Antwerpen site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgija

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Evonik Peroxid GmbH
Naslov proizvajalca	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Avstrija
Kraj proizvodnih obratov	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestrasse 1 9721 Weissenstein Avstrija

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Evonik Peroxide Netherlands BV
Naslov proizvajalca	Hettenheuvelweg 37 /39 1101 BM Amsterdam Nizozemska
Kraj proizvodnih obratov	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Nizozemska

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Evonik Peroxide Spain, S.L.U.
Naslov proizvajalca	C/ Afueras s/h. 50784 La Zaida Španija
Kraj proizvodnih obratov	Evonik Peroxide Spain, S.L.U. site 1 Calle Afueras s/n 50784 La Zaida Španija

Poglavje 2. **SESTAVA IN FORMULACIJA DRUŽINE PROIZVODOV**

2.1. **Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi družine**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	0,36 - 7,2 % (m/m)

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
(C9-C11)alkil alkohol etoksilat	(C9-C11)alkil alkohol etoksilat	Neaktivna snov	68439-46-3		0,09 - 1,8 % (m/m)
Alkil benzen sulfonska kislina	2-Dodecil benzen sulfonska kislina	Neaktivna snov	85536-14-7	287-494-3	0,97 - 19,4 % (m/m)
Metānsulfoskābe		Neaktivna snov	75-75-2	200-898-6	0,12 - 2,4 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine SL Topen koncentrat AL (druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene)-RTU robčki

DEL II.

DRUGA RAVEN INFORMACIJ – META SPC(-ji)

Poglavje 1. **META SPC 1 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 1 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: Meta-SPC 1: Concentrate

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-1

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

Poglavje 2. **SESTAVA META SPC 1**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 1**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	7,2 - 7,2 % (m/m)

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Alkil benzen sulfonska kislina	2-Dodecil benzen sulfonska kislina	Neaktivna snov	85536-14-7	287-494-3	19,4 - 19,4 % (m/m)
(C9-C11)alkil alkohol etoksilat	(C9-C11)alkil alkohol etoksilat	Neaktivna snov	68439-46-3		1,8 - 1,8 % (m/m)
Metānsulfoskābe		Neaktivna snov	75-75-2	200-898-6	2,4 - 2,4 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 1**

Vrsta(-e) formulacije	SL Topen koncentrat

Poglavje 3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 1**

Stavki o nevarnosti	H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H290: Lahko je jedko za kovine.
Previdnostni stavki	P234: Hraniti samo v originalni embalaži. P273: Preprečiti sproščanje v okolje. P280: Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za oči ali za obraz.. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P301 + P330 + P331: PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja. P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. P390: Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. P501: Odstraniti vsebino na mesto zbiranja nevarnih ali posebnih odpadkov v skladu z nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo na mesto zbiranja nevarnih ali posebnih odpadkov v skladu z nacionalnimi predpisi.

Poglavje 4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Uporaba # 1.1 – Čiščenje in razkuževanje z brisanjem za območja zdravstvenega varstva

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Čistilo za razkuževanje trdih površin za zdravstvene ustanove.
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje Podroben opis: Brisanje z namočenim brisalom.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 11 do 40 ml/m² Izdelek razredčite z vodo, da dosežete 4,5% koncentracijo izdelka. Število in časovni razpored uporabe: 7-krat na dan Uporaba pri sobni temperaturi
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Polietilen visoke gostote (HDPE) Kanister 1 liter (l) - 1,5 l – 2 l - 2,5 l – 3 l – 5 litrov - 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE Plastenka(J-Flex): 1,5 litra HDPE Plastenka(Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Redčenje izdelka: 4,5 % izdelek za baktericidno, virucidno delovanje in delovanje na kvasovke

Za pakiranja z ročnim redčenjem:

Da bi preprečili penjenje, napolnite posodo do treh četrtin z vodo. Dodajte pravilno količino koncentrata, da dosežete redčenje 4,5 %. Previdno dolijte preostanek vode.

Dodajte koncentrirani izdelek v vodo, da se izognete brizganju koncentriranega izdelka.

Potopite brisalo v posodo. Stisnite presežno raztopino.

Očistite in razkužite tla z mokrim brisalom.

Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra.

Pustite delovati 5 minut.

Pustite, da se posuši na zraku.

Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

Za pakiranja s (polavtomatskim)sistemom redčenja z dvema nastavitvama:

Izberite pravo nastavitev na dozirni opremi.

Napolnite posodo z razredčenim izdelkom (4,5 %). Potopite brisalo v posodo. Stisnite presežno raztopino.

Očistite in razkužite tla z mokrim čistilcem.

Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra.

Pustite delovati 5 minut.

Pustite, da se posuši na zraku.

Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Uporaba # 1.2 - Čiščenje in razkuževanje s krpo ali gobico za območja zdravstvenega varstva

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Čistilo za razkuževanje trdih površin za zdravstvene ustanove.
Način(-i) uporabe	Metoda: Porazdeljevanje/porazdelitev Podroben opis: Namažite z namočeno krpo ali gobo.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 11 do 40 ml/m² Izdelek razredčite z vodo, da dosežete 4,5% izdelek. Število in časovni razpored uporabe: 7-krat na dan Uporaba pri sobni temperaturi
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Polietilen visoke gostote (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE Plastenka(J-Flex): 1,5 litra HDPE Plastenka(Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Redčenje izdelka: 4,5 % izdelek za baktericidno, virucino delovanje in delovanje na kvasovke

Za pakiranja z ročnim redčenjem

Da bi preprečili penjenje, napolnite posodo do treh četrtin z vodo. Dodajte pravilno količino koncentrata, da dosežete redčenje 4,5 %. Previdno dolijte preostanek vode.

Krpo ali gobo namočite v raztopino.

Tekočino razporedite po površini.

Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra.

Pustite delovati 5 minut.

Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku.

Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

Za pakiranja s (polavtomatskim) sistemom redčenja

Izberite pravo nastavitev na dozirni opremi.

Napolnite posodo z razredčenim izdelkom (4,5 %).

Krpo ali gobo namočite v raztopino.

Tekočino razporedite po površini.

Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra.

Pustite delovati 5 minut.

Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku.

Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Uporaba # 1.3 – Čiščenje in razkuževanje majhnih predmetov z namakanjem ali potapljanjem za območja zdravstvenega varstva

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih “Čistilo za razkuževanje majhnih predmetov (npr. škarij in ščetk) za področje zdravstvenega varstva. Biocidna uporaba izključuje dezinfekcijo medicinskih pripomočkov.”
Način(-i) uporabe	Metoda: Namakanje ali potapljanje Podroben opis: Namakanje ali namakanje v raztopini.

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: do 3 litre Izdelek razredčite z vodo, da dosežete 4,5% koncentracijo izdelka. Število in časovni razpored uporabe: 1-krat na dan Uporaba pri sobni temperaturi
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Polietilen visoke gostote (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litra – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE Plastenka(J-Flex): 1,5 litra HDPE Plastenka(Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Redčenje izdelka: 4,5 % izdelek za baktericidno, virucino delovanje in delovanje na kvasovke

Za pakiranja z ročnim redčenjem:

Da preprečite penjenje, napolnite tri četrtine posode z vodo. Dodajte pravilno količino izdelka, da dosežete redčenje 4,5 %. Previdno dolijte preostanek vode.

Dodajte izdelek v vodo, da se izognete brizganju koncentriranega izdelka.

Kopel za namakanje pokrijte s pokrovom, potem ko položite predmete v raztopino za razkuževanje.

Prepričajte se, da so predmeti, ki jih želite razkužiti, popolnoma potopljeni v raztopino za 5 minut.

Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku.

Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

Za pakiranja s (polavtomatskim)sistemom redčenja

Izberite pravo nastavitev na dozirni opremi.

Napolnite posodo z razredčenim izdelkom (4,5 %).

Kopel za namakanje pokrijte s pokrovom, potem ko položite predmete v raztopino za razkuževanje.

Prepričajte se, da so predmeti, ki jih želite razkužiti, popolnoma potopljeni v raztopino za 5 minut.

Obrišite do suhega ali pustite, da se posušijo na zraku.

Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

Raztopine za namakanje ali potapljanje lahko uporabite samo enkrat.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Uporaba # 1.4 – Čiščenje in razkuževanje s penjenjem za področja zdravstvenega varstva

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Čistilo za razkuževanje trdih površin za zdravstvene ustanove.
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis: Pršenje s sprožilno peno. Po želji obrišite, da se raztopina razmaže.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 11 ml/m² Izdelek razredčite z vodo, da dosežete 4,5% koncentracijo izdelka. Število in časovni razpored uporabe: Pogostost uporabe: Uporaba v straniščih in kopalnicah: 4-krat na dan. Uporaba v bolnišnicah in zdravstvenih ordinacijah: 8-krat na dan. Uporaba v laboratorijih: 10-krat na dan. Uporaba v čistih prostorih: 10-krat na dan. Uporaba pri sobni temperaturi
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Polietilen visoke gostote (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE Plastenka(J-Flex): 1,5 litra HDPE Plastenka(Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Redčenje izdelka: 4,5 % izdelek za baktericidno, virucino delovanje in delovanje proti kvasovkam.

Za pakiranja z ročnim redčenjem:

Za preprečevanje penjenja napolnite razpršilno stekleničko za penjenje do treh četrtin z vodo. Dodajte pravilno količino koncentriranega proizvoda, da dosežete redčenje 4,5 %.

Previdno napolnite s preostalo vodo.

Razredčen proizvod nanesite. Po želji obrišite, da se raztopina razmaže.

Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra.

Pustite delovati 5 minut.

Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku.

Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

Samo za razkuževanje majhnih površin.

Za pakiranja s (polavtomatskim)sistemom redčenja

Izberite pravo nastavitev na dozirni opremi.

Napolnite razpršilno stekleničko za penjenje z razredčenim izdelkom.

Razredčen proizvod nanesite. Po želji obrišite, da se raztopina razmaže.

Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra.

Pustite delovati 5 minut.

Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku.

Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

Samo za razkuževanje majhnih površin.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.5. **Opis uporabe**

Tabela 5.

Uporaba # 1.5 - Čiščenje in razkuževanje z vlažnimi robčki (vključno z zdravstvenimi območji)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Čistilo za razkuževanje trdih površin.

Način(-i) uporabe	Metoda: Obrišite Podroben opis: Brisanje s pripravljenimi vlažnimi robčki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 1,5 m^2 na robček Izdelek razredčite z vodo, da dosežete 5 % koncentracijo izdelka. Število in časovni razpored uporabe: 8-krat na dan Uporaba pri sobni temperaturi
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Tekočina Polietilen visoke gostote (HDPE) Kanister 1 litrer - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE Plastenka(J-Flex): 1,5 litra HDPE Plastenka(Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov Suhi robčki so pakirani v HDPE vedro s 125 robčki (polipropilen (PP)). (prodaja se ločeno)

4.5.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Pripravite 1,5-litrsko razredčitev z dodajanjem 75 ml Oxivir Excela v 1,425 litra vode.

Na vedro za suhe robčke nanesite 1,5 litra razredčenega izdelka.

Tekočino enakomerno razporedite. Zaprite vedro.

Odprite pokrov. Vzemite en robček. Potem zaprite pokrov.

Uporabljajte samo mokre robčke.

Obrišite površino in se prepričajte, da je površina popolnoma mokra.

Pustite delovati 5 minut.

Pustite, da se posuši na zraku.

Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

4.5.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.5.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.5.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.5.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.6. **Opis uporabe**

Tabela 6.

Uporaba # 1.6 – Čiščenje in razkuževanje površin, ki so v stiku z živili, z brisalom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Čistilo za razkuževanje trdih površin, ki pridejo v stik z živili
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje Podroben opis: Brisanje z namočenim brisalom.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 11 do 40 ml/m^2 Izdelek razredčite z vodo, da dosežete 3,75% izdelek. Število in časovni razpored uporabe: Pogostost uporabe: 7-krat na dan Uporaba pri sobni temperaturi
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Polietilen visoke gostote (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE Plastenka(J-Flex): 1,5 litra HDPE Plastenka(Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov

4.6.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Redčenje izdelka: 3,75 % izdelek za baktericidno, virucidno delovanje in delovanje proti kvasovkam

Za pakiranja z ročnim redčenjem:

Da bi preprečili penjenje, napolnite posodo do treh četrtin z vodo. Dodajte pravilno količino koncentrata, da dosežete redčenje 3,75 %. Previdno dolijte preostanek vode.

Koncentrirani izdelek dodajte v vodo, da se izognete njegovemu brizganju.

Potopite brisalo v posodo. Stisnite presežno raztopino.

Očistite in razkužite tla z mokrim brisalom.

Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra.

Pustite delovati 5 minut.

Pustite, da se posuši na zraku.

Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

Za pakiranja s (polavtomatskim)sistemom redčenja

Izberite pravo nastavitev na dozirni opremi.

Napolnite posodo z razredčenim izdelkom (3,75 %).

Brisalo namočite v raztopino.

Razporedite tekočino.

Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra.

Pustite delovati 5 minut.

Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku.

Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

4.6.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.6.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.6.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.6.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.7. **Opis uporabe**

Tabela 7.

Uporaba # 1.7 – Čiščenje in razkuževanje površin, ki so v stiku z živili, s krpo ali gobico

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Čistilo za razkuževanje trdih površin, ki pridejo v stik z živili
Način(-i) uporabe	Metoda: Porazdeljevanje/porazdelitev Podroben opis: Namažite z namočeno krpo ali gobo.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 11 do 40 ml/m^2 Izdelek razredčite z vodo, da dosežete 3,75% koncentracijo izdelka. Število in časovni razpored uporabe: 7-krat na dan Uporaba pri sobni temperaturi

Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Polietilen visoke gostote (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE Plastenka(J-Flex): 1,5 litra HDPE Plastenka(Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov

4.7.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Redčenje izdelka: 3,75 % izdelek za baktericidno, virucidno delovanje in delovanje proti kvasovkam

Za pakiranja z ročnim redčenjem:

Da bi preprečili penjenje, napolnite posodo do treh četrtin z vodo. Dodajte pravilno količino koncentrata, da dosežete redčenje 3,75 %. Previdno dolijte preostanek vode.

Dodajte koncentrirani izdelek v vodo, da se izognete njegovemu brizganju.

Krpo ali gobo namočite v raztopino.

Razporedite tekočino.

Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra.

Pustite delovati 5 minut.

Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku.

Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

Za pakiranja s (polavtomatskim)sistemom redčenja

Izberite pravo nastavitev na dozirni opremi.

Napolnite posodo z razredčenim izdelkom (3,75 %).

Krpo ali gobo namočite v raztopino.

Razporedite tekočino.

Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra.

Pustite delovati 5 minut.

Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku.

Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

4.7.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.7.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.7.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.7.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.8. **Opis uporabe**

Tabela 8.

Uporaba # 1.8 – Čiščenje in razkuževanje manjših predmetov v stiku z živili z namakanjem ali potapljanjem

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Čistilo za razkuževanje manjših predmetov (npr. kuhinjskih pripomočkov), ki pridejo v stik z živili.
Način(-i) uporabe	Metoda: Namakanje ali potapljanje Podroben opis: Namakanje ali potapljanje v raztopini.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: do 3 litre Izdelek razredčite z vodo, da dosežete 3,75% koncentracijo izdelka. Število in časovni razpored uporabe: Uporaba pri sobni temperaturi Pogostost uporabe: 1-krat na dan
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Polietilen visoke gostote (HDPE) Kanister 1 litra - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE Plastenka(J-Flex): 1,5 litrov HDPE Plastenka(Smart Dose): 1,4 litrov – 1,5 litrov HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov

4.8.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Redčenje izdelka: 3,75 % izdelek za baktericidno, virucidno delovanje in delovanje proti kvasovkam

Za pakiranja z ročnim redčenjem:

Da bi preprečili penjenje, napolnite posodo do treh četrtin z vodo. Dodajte pravilno količino koncentrata, da dosežete redčenje 3,75 %. Previdno dolijte preostanek vode.

Kopel za potapljanje pokrijte s pokrovom, potem ko predmete položite v raztopino za razkuževanje. Prepričajte se, da so predmeti, ki jih želite razkužiti, popolnoma potopljeni v raztopino za 5 minut.

Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku.

Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

Za pakiranja s (polavtomatskim)sistemom redčenja

Izberite pravo nastavitev na dozirni opremi.

Napolnite posodo z razredčenim izdelkom (3,75 %).

Kopel za potapljanje pokrijte s pokrovom, potem ko predmete položite v raztopino za razkuževanje. Prepričajte se, da so predmeti, ki jih želite razkužiti, popolnoma potopljeni v raztopino za 5 minut. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

Raztopine za namakanje ali potapljanje lahko uporabite samo enkrat.

4.8.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.8.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

SGlejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.8.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.8.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.9. **Opis uporabe**

Tabela 9.

Uporaba # 1.9 – Čiščenje in razkuževanje površin, ki so v stiku z živili, s penjenjem.

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Čistilo za razkuževanje trdih površin, ki pridejo v stik z živili
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis: Pršenje s sprožilno peno. Po želji obrišite, da se raztopina razmaže.

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 11 ml/m² Izdelek razredčite z vodo, da dosežete 3,75% koncentracijo izdelka. Število in časovni razpored uporabe: Uporaba pri sobni temperaturi. Pogostost uporabe: uporaba v kuhinjah in menzah: 4-krat na dan, uporaba v predelovalni industriji hrane: 4-krat na dan, uporaba na pultu v trgovini ali supermarketu: 8-krat na dan.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Polietilen visoke gostote (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE Plastenka(J-Flex): 1,5 litra HDPE Plastenka(Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov

4.9.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Redčenje izdelka: 3,75%

Za pakiranja z ročnim redčenjem

Za preprečevanje penjenja napolnite razpršilno stekleničko za penjenje do treh četrtin z vodo. Dodajte pravilno količino koncentrata, da dosežete redčenje 3,75 %. Previdno napolnite s preostalo vodo. Razredčen proizvod nanesite. Po želji obrišite, da se raztopina razmaže. Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra. Pustite delovati 5 minut. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Po razkuževanju ni potrebno izpiranje. Samo za razkuževanje majhnih površin.

Za pakiranja s (polavtomatskim)sistemom redčenja

Izberite pravo nastavitev na dozirni opremi.Napolnite razpršilno stekleničko za penjenje z razredčenim izdelkom. Razredčen proizvod nanesite. Po želji obrišite, da se raztopina razmaže. Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra. Pustite delovati 5 minut. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

Samo za razkuževanje majhnih površin.

4.9.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.9.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.9.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.9.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.10. **Opis uporabe**

Tabela 10.

Uporaba # 1.10 - Čiščenje in razkuževanje površin, ki so v stiku z živili, z vlažnimi robčki

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Čistilo za razkuževanje trdih površin, ki pridejo v stik z živili
Način(-i) uporabe	Metoda: Obrišite Podroben opis: Brisanje s pripravljenimi vlažnimi robčki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 1,5 m^2 na robček Izdelek razredčite z vodo, da dosežete 5 % koncentracijo izdelka. Število in časovni razpored uporabe: 8-krat na dan Uporaba pri sobni temperaturi
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Oxivir Excel: Polietilen visoke gostote (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE Plastenka(J-Flex): 1,5 litra HDPE Plastenka(Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov Suhi robčki so pakirani v HDPE vedro s 125 robčki (polipropilen (PP)). (prodaja se ločeno)

4.10.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Redčenje izdelka: 5%

Pripravite 1,5-litrsko raztopino z dodajanjem 75 ml koncentriranega izdelka v 1,425 litra vode. Da bi preprečili penjenje, napolnite posodo do treh četrtin z vodo. Dodajte ustrezno količino izdelka. Previdno napolnite s preostalo vodo.

Nanesite 1,5 litra razredčenega izdelka v vedro za suhe robčke.

Tekočino enakomerno razporedite. Zaprite vedro. Odprite pokrov. Vzemite en robček. Potem zaprite pokrov. Uporabljajte samo mokre robčke. Obrišite površino in se prepričajte, da je površina popolnoma mokra. Pustite delovati 5 minut. Pustite, da se posuši na zraku. Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

4.10.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.10.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.10.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.10.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.11. **Opis uporabe**

Tabela 11.

Uporaba # 1.11 – Čiščenje in razkuževanje trdih površin z brisanjem na ne-zdravstvenih območjih.

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Čistilo in razkužilo za razkuževanje trdih površin.
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje Podroben opis: Brisanje z namočenim brisalom.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 11 do 40 ml/m² Izdelek razredčite z vodo za dosego naslednjih koncentracij izdelka: baktericidno delovanje – 1,5% izdelek delovanje na kvasovke – 3,75% izdelek virucidno delovanje – 2% izdelek

	Število in časovni razpored uporabe: 7-krat na dan Uporaba pri sobni temperaturi
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Polietilen visoke gostote (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE Plastenka(J-Flex): 1,5 litra HDPE Plastenka(Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov

4.11.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Redčenje izdelka:

baktericidno delovanje – 1,5% izdelek

delovanje na kvasovke – 3,75% izdelek

virucidno delovanje – 2% izdelek

Za pakiranja z ročnim redčenjem

Da bi preprečili penjenje, napolnite posodo do treh četrtin z vodo. Dodajte pravilno količino koncentrata, da dosežete ustrezno redčenje izdelka. Koncentrirani izdelek dodajte v vodo, da se izognete njegovemu brizganju. Potopite brisalo v posodo. Stisnite presežno raztopino. Očistite in razkužite tla z mokrim brisalom. Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra. Pustite delovati 5 minut.

Pustite, da se posuši na zraku. Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

Za pakiranja s (polavtomatskim)sistemom redčenja

Izberite pravo nastavitev na dozirni opremi. Napolnite posodo z razredčenim izdelkom. Potopite brisalo v posodo. Iztisnite presežno raztopino. Očistite in razkužite tla z mokrim brisalom. Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra. Pustite delovati 5 minut. Pustite, da se posuši na zraku. Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

4.11.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.11.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.11.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.11.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.12. **Opis uporabe**

Tabela 12.

Uporaba # 1.12 – Čiščenje in razkuževanje trdih površin s krpo ali gobo na ne-zdravstvenih območjih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Čistilo za razkuževanje trdih površin.
Način(-i) uporabe	Metoda: Porazdeljevanje/porazdelitev Podroben opis: Namažite z namočeno krpo ali gobo.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 11 do 40 ml/m² Izdelek razredčite z vodo za dosego naslednjih koncentracij izdelka: baktericidno delovanje – 1,5% izdelek delovanje na kvasovke – 3,75% izdelek virucidno delovanje – 2% izdelek Število in časovni razpored uporabe: Uporaba pri sobni temperaturi Pogostost uporabe: 7-krat na dan
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Polietilen visoke gostote (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE Plastenka(J-Flex): 1,5 litra HDPE Plastenka(Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov

4.12.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Redčenje izdelka:

baktericidno delovanje– 1,5% izdelek

delovanje na kvasovke – 3,75% izdelek

virucidno delovanje– 2% izdelek

Za pakiranja z ročnim redčenjem

Da bi preprečili penjenje, napolnite posodo do treh četrtin z vodo. Dodajte pravilno količino koncentriranega proizvoda, da dosežete ustrezno redčenje izdelka. Previdno napolnite s preostalo vodo. Krpo ali gobo namočite v raztopino. Razporedite tekočino. Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra. Pustite delovati 5 minut. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

Za pakiranja s (polavtomatskim) sistemom redčenja

Izberite pravo nastavitev na dozirni opremi. Posodo napolnite z razredčenim izdelkom. Krpo ali gobo namočite v raztopino. Razporedite tekočino. Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra. Pustite delovati 5 minut.

Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

4.12.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.12.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.12.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.12.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.13. **Opis uporabe**

Tabela 13.

Uporaba # 1.13 – Čiščenje in razkuževanje majhnih predmetov z namakanjem ali potapljanjem na ne-zdravstvenih območjih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Čistilo za razkuževanje majhnih predmetov (npr. škarij in ščetk).
Način(-i) uporabe	Metoda: Namakanje ali potapljanje Podroben opis: Namakanje ali potapljanje v raztopini.

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: do 3 litre Izdelek razredčite z vodo za dosego naslednjih koncentracij izdelka: baktericidno delovanje – 1,5% izdelek delovanje na kvasovke – 3,75% izdelek virucidno delovanje– 2% izdelek Število in časovni razpored uporabe: 1-krat na dan Uporaba pri sobni temperaturi.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Polietilen visoke gostote (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE Plastenka(J-Flex): 1,5 litra HDPE Plastenka(Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov

4.13.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Redčenje izdelka:

baktericidno delovanje– 1,5% izdelek

delovanje na kvasovke – 3,75% izdelek

virucidno delovanje – 2% izdelek

Za pakiranja z ročnim redčenjem

Da bi preprečili penjenje, napolnite posodo do treh četrtin z vodo. Dodajte pravilno količino koncentriranega proizvoda, da dosežete ustrezno redčenje. Previdno napolnite s preostalo vodo. Kopel za namakanje pokrijte s pokrovom, potem ko predmete položite v raztopino za razkuževanje. Prepričajte se, da so predmeti, ki jih želite razkužiti, popolnoma potopljeni v raztopino za 5 minut. Obrišite jih do suhega ali pustite, da se posušijo na zraku. Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

Za pakiranja s (polavtomatskim) sistemom redčenja

Izberite pravo nastavitev na dozirni opremi. Napolnite posodo z razredčenim izdelkom. Kopel za namakanje pokrijte s pokrovom, potem ko predmete položite v raztopino za razkuževanje. Prepričajte se, da so predmeti, ki jih želite razkužiti, popolnoma potopljeni v raztopino za 5 minut. Obrišite jih do suhega ali pustite, da se posušijo na zraku. Po razkuževanju ni potrebno izpiranje. Raztopine za namakanje ali potapljanje lahko uporabite samo enkrat.

4.13.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.13.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.13.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.13.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.14. **Opis uporabe**

Tabela 14.

Uporaba # 1.14 – Čiščenje in razkuževanje površin s penjenjem na ne-zdravstvenih območjih.

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Čistilo za razkuževanje trdih površin.
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis: Pršenje s sprožilno peno. Po želji obrišite, da se raztopina razmaže.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 11 ml/m² Izdelek razredčite z vodo za dosego naslednjih koncentracij izdelka: baktericidno delovanje– 1,5% izdelek delovanje na kvasovke – 3,75% izdelek virucidno delovanje – 2% izdelek Število in časovni razpored uporabe: Uporaba pri sobni temperaturi Pogostost uporabe: če je izdelek namenjen za uporabo v straniščih in kopalnicah: 4-krat na dan če je izdelek namenjen za uporabo v kozmetičnih/ farmacevtskih proizvodnih obratih: 8-krat na dan če je izdelek namenjen za uporabo v laboratorijih: 10-krat na dan če je izdelek namenjen za uporabo v čistih prostorih: 10-krat na dan

Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Polietilen visoke gostote (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE Plastenka(J-Flex): 1,5 litra HDPE Plastenka(Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov

4.14.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Redčenje izdelka:baktericidno delovanje– 1,5% izdelek

delovanje na kvasovke – 3,75% izdelek

virucidno delovanje – 2% izdelek

Za pakiranja z ročnim redčenjem

Za preprečevanje penjenja napolnite razpršilno stekleničko za penjenje do treh četrtin z vodo. Dodajte pravilno količino koncentriranega proizvoda, da dosežete ustrezno redčenje. Previdno dolijte preostanek vode. Uporabite razredčen izdelek. Po potrebi obrišite, da se raztopina porazdeli. Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra. Pustite delovati 5 minut. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

Samo za razkuževanje majhnih površin.

Za pakiranja s (pol)samodejnim sistemom redčenja

Izberite pravo nastavitev na opremi za doziranje. Napolnite razpršilno stekleničko za penjenje z razredčenim izdelkom. Nanesite razredčen izdelek. Po želji obrišite, da se raztopina porazdeli. Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra. Pustite delovati 5 minut. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

Samo za razkuževanje majhnih površin.

4.14.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.14.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.14.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.14.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.15. **Opis uporabe**

Tabela 15.

Uporaba # 1.15 – Dezinfekcija predhodno očiščenih trdih površin

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcijsko sredstvo za predhodno očiščene trde površine (vključno z zdravstvenimi področji, farmacevtsko industrijo, kozmetično industrijo, laboratoriji in čistimi prostori)
Način(-i) uporabe	Metoda: Razmazanje, potapljanje in pršenje pene Podroben opis: Razmazanje z namočenim brisalom. Namažite z namočeno krpo ali gobo. Potapljanje v raztopini. Pršenje s peno, po želji obrišite, da se raztopina razmaže.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Nanos z namočenim brisalom: 11 do 40 ml/m^2, nanesite z namočeno krpo ali gobo: 11 do 40 ml/m^2, namakanje v raztopini: 3 litre, brizganje pene: 11 ml/m^2. Izdelek razredčite z vodo, da dosežete 2,5% koncentracijo izdelka. Število in časovni razpored uporabe: Pogostost uporabe: nanos z namočenim čistilcem: 7-krat na dan nanesite z namočeno krpo/gobo: 7 -krat na dan potapljanje: 1-krat na dan pršenje s peno: kopalnice in stranišča 4-krat na dan zdravstvena oskrba 8-krat na dan laboratoriji in čiste sobe 10-krat na dan Uporaba pri sobni temperaturi.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Polietilen visoke gostote (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE Plastenka(J-Flex): 1,5 litra HDPE Plastenka(Smart Dose): 1,4 litra – 1,5 litra HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov

4.15.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Redčenje izdelka:

baktericidno delovanje, delovanje na kvasovke, virucidno delovanje – 2,5 %

Za pakiranja z ročnim redčenjem

Da bi preprečili penjenje, napolnite posodo do treh četrtin z vodo. Dodajte pravilno količino koncentrata, da dosežete redčenje 2,5 %. Previdno dolijte preostanek vode.

Za pakiranja s (polavtomatskim)sistemom redčenja

Izberite pravo nastavitev na dozirni opremi. Napolnite posodo z razredčenim izdelkom (2,5 %).

Nanos z namočenim brisalom: potopite brisalo v posodo. Stisnite presežno raztopino. Nanesite na tla. Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra. Pustite delovati 5 minut.

Nanesite z namočeno krpo/gobo: krpo ali gobo namočite v raztopino. Tekočino razporedite po površini. Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra. Pustite delovati 5 minut.

Potapljanje: kopel za namakanje pokrijte s pokrovom, potem ko predmete položite v raztopino za razkuževanje. Prepričajte se, da so predmeti, ki jih želite razkužiti, popolnoma potopljeni v raztopino za 5 minut. Raztopine za namakanje ali potapljanje uporabite samo enkrat.

Pršenje s peno: za pakiranja s (polavtomatskim)sistemom redčenja izberite pravo nastavitev na dozirni opremi. Uporabite razpršilno steklenico s penasto glavo. Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra. Pustite delovati 5 minut.

Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

4.15.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.15.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.15.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

4.15.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 1

Poglavje 5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 1**

5.1. **Navodila za uporabo**

Za poklicno uporabo:

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

Po uporabi temeljito umiti roke.

Hraniti samo v originalni embalaži.

Ne mešajte z drugimi sredstvi.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Naslednja osebna zaščitna oprema (OZO) je določena brez poseganja v uporabo Direktive Sveta 98/24/ES in druge zakonodaje Unije na področju zdravja in varnosti pri delu s strani delodajalcev.

Uporaba zaščite za oči (v skladu z evropskim standardom EN 16 321 ali enakovrednim) je obvezna med ravnanjem s koncentriranim izdelkom.

V času ravnanja z izdelkom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, ki so razvrščene po evropskem standardu EN ISO 374 ali enakovrednem (material rokavic določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku).

Med ravnanjem s koncentriranimi izdelki nosite oblačila, odporna na kemikalije, skladna z evropskim standardom EN 14605 ali enakovrednim, in nosite ustrezno zaščitno obutev skladno z evropskimi standardi EN 13832 ali enakovrednim.

Glejte poglavje 6 za celotne nazive EN standardov.

Dokler se obdelane površine ne posušijo, se jim domače živali ne smejo približati.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Prva pomoč:

PRI VDIHAVANJU: umaknite se na svež zrak in počivajte v položaju, udobnem za dihanje. Če imate simptome: pokličite 112.

Če nimate simptomov, se posvetujte z zdravnikom.

PRI ZAUŽITJU: izperite usta. Po požirkih popijte do 2 dcl hladne vode, če lahko požirate. NE izzivajte bruhanja. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI STIKU S KOŽO: kožo takoj sperite z veliko vode. Slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo 15 minut spirajte z vodo. Posvetujte se z zdravnikom. Kontaminirana oblačila pred vnovično uporabo operite.

PRI STIKU Z OČMI: s palcem in kazalcem razprite veke, oko spirajte pod tekočo vodo nekaj minut. Previdno odstranite kontaktne leče. Nadaljujte s spiranjem vsaj 15 minut. Nato nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Informacije za zdravstveno osebje/zdravnika: oči je treba spirati tudi med prevezom.

Okoljevarstveni ukrepi

Ne dovolite vstopa v drenažni sistem, površinske ali podzemne vode. Ne dovolite vstopa v tla/zemljo. Razredčite z veliko vode. Obvestite pristojne organe v primeru, da nerazredčen izdelek doseže drenažni sistem, površinsko vodo ali podtalnico ali tla.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Vsebino/posodo predajte odgovornim za odstranjevanje nevarnih odpadkov v skladu z veljavnimi predpisi.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Rok uporabe: 2 leti

Shranjujte v temi.

Ne shranjujte pri temperaturi nad 30 °C.

Poglavje 6. **DRUGE INFORMACIJE**

Proizvodi iz tega meta-SPC so lahko namenjeni tudi razkuževanju površin medicinskih pripomočkov v medicinskih in kliničnih območjih. V takem primeru morata biti njihovo dajanje v promet ali dajanje v uporabo skladna z Uredbo (EU) 2017/745 evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih napravah, s spremembo Direktive 2001/83/ES, Uredbo (ES) št. 178/2002 in Uredbo (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvijo direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L 117, 05/05/2017, str. 1), in so medicinske naprave razvrščene kot razred IIa. Te uporabe so izven okvira avtorizacije te družine biocidnega proizvoda in niso pokrite z njo.

Kar zadeva opombo »Kategorija/-e uporabnikov«: »Strokovnjaki« (vključno z industrijskimi uporabniki) označuje usposobljene poklicne uporabnike, če to zahtevajo nacionalni predpisi.

Celotni nazivi EN standardov, omenjenih v poglavju 5.2 »Ukrepi za zmanjšanje tveganja«, so:

EN 13832 – Obutev za varovanje pred kemikalijami

EN ISO 374 – Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom

EN ISO 16321 – Zaščita za oči in obraz za poklicno rabo

EN 14605 – Zaščitna oblačila za zaščito pred tekočimi kemikalijami – Zahteve glede zmogljivosti za kemična zaščitna oblačila z neprepustnimi povezavami med različnimi deli obleke (Oprema tipa 3) ali s povezavami, neprepustnimi za pršenje med različnimi deli obleke. (Oprema tipa 4), vključno z oblačili, ki zagotavljajo zaščito delov telesa (Oprema tipa PB [3] in PB [4]).

Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o zaščiti zdravja in varnosti delavcev pred nevarnostmi zaradi kemičnih dejavnikov pri delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 131, 5.5.1998, str. 11).

Poglavje 7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 1**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Oxivir Excel	Področje trženja: EU
	Oxivir Excel H+	Področje trženja: EU
	Oxivir Excel J-flex	Področje trženja: EU
	Oxivir Excel Smart-Dose	Področje trženja: EU

	Oxivir Excel SD	Področje trženja: EU
	Oxivir Excel Conc	Področje trženja: EU
	Oxivir Excel Concen-trate	Področje trženja: EU
	Oxivir Excel IBC	Področje trženja: EU
	Oxivir Excel Acti	Področje trženja: EU
	Oxivir Excel Des	Področje trženja: EU
	Oxivir Excel Duo	Področje trženja: EU
	Clinell H2O2 concen-trate	Področje trženja: EU
	Antibac Oxivir concen-trate	Področje trženja: EU
	Divosan AHP VS70	Področje trženja: EU
	TASKI Sani AHP-Des	Področje trženja: EU
	TASKI Sprint AHP-Des	Področje trženja: EU
	Suma AHP D10.7	Področje trženja: EU
	Suma AHP	Področje trženja: EU
	Suma San AHP D10.7	Področje trženja: EU
	Suma San AHP	Področje trženja: EU

	ClearKlens AHP Conc	Področje trženja: EU
	ClearKlens Excel Conc	Področje trženja: EU
	DOME-STOS Expert Conc	Področje trženja: EU
	GLORIX Expert Conc	Področje trženja: EU
	KLINEX Expert Conc	Področje trženja: EU
	LYSO-FORM Expert Conc	Področje trženja: EU
	SAVO Expert Conc	Področje trženja: EU
	CIF Expert Conc	Področje trženja: EU
	VISS Expert Conc	Področje trženja: EU
	JIF Expert Conc	Področje trženja: EU
	FLORAS-ZEPT Expert Conc	Področje trženja: EU
	ANDY Expert Conc	Področje trženja: EU
	SUPER-ANDY Expert Conc	Področje trženja: EU
	LIFEBUOY Expert Conc	Področje trženja: EU

			ANDY-SAN Expert Conc	Področje trženja: EU	
Številka dovoljenja			EU-0032483-0001 1-1		
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	7,2 % (m/m)
Alkil benzen sulfonska kislina	2-Dodecil benzen sulfonska kislina	Neaktivna snov	85536-14-7	287-494-3	19,4 % (m/m)
(C9-C11)alkil alkohol etoksilat	(C9-C11)alkil alkohol etoksilat	Neaktivna snov	68439-46-3		1,8 % (m/m)
Metānsul-foskābe		Neaktivna snov	75-75-2	200-898-6	2,4 % (m/m)

Poglavje 1. **META SPC 2 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 2 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: Meta-SPC 2: RTU

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-2

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

Poglavje 2. **SESTAVA META SPC 2**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 2**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	0,36 - 0,36 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 2**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

Poglavje 3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 2**

Stavki o nevarnosti	H290: Lahko je jedko za kovine.
Previdnostni stavki	P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P234: Hraniti samo v originalni embalaži. P390: Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda.

Poglavje 4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Uporaba # 2.1 – Čiščenje in razkuževanje z brisanjem (vključno z zdravstvenimi območji)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Čistilo za razkuževanje trdih površin (vključno z zdravstvenimi območji)
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje Podroben opis: Brisanje z namočenim brisalom.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 11 do 40 ml/m^2 Izdelek, pripravljen za uporabo Število in časovni razpored uporabe: Uporaba pri sobni temperaturi 7-krat na dan.

Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak ; splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Poklicni in nepoklicni uporabniki: Polietilen visoke gostote (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra– 2 litra - 2,5 litra – 3 litri – 5 litrov– 10 litrov Poklicni uporabniki: HDPE Kanister 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Napolnite posodo z izdelkom. Namočite brisalo v posodi. Iztisnite odvečni izdelek. Pomijte tla z mokrim brisalom.

Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra.

Pustite delovati 5 minut. Pustite, da se posuši na zraku. Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Uporaba # 2.2 – Čiščenje in razkuževanje s krpo ali gobo (vključno z zdravstvenimi območji)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Čistilo za razkuževanje trdih površin (vključno z zdravstvenimi območji)
Način(-i) uporabe	Metoda: Porazdeljevanje/porazdelitev Podroben opis: Porazdelite z namočeno krpo ali gobo.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 11 do 40 ml/m^2 Izdelek, pripravljen za uporabo Število in časovni razpored uporabe: Uporaba pri sobni temperaturi 1-krat na dan.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak ; splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Poklicni in nepoklicni uporabniki: Polietilen visoke gostote (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov Poklicni uporabniki: HDPE Kanister 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Krpo ali gobico namočite v proizvod s potopitvijo.

Tekočino razporedite po površini.

Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra.

Pustite delovati 5 minut.

Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku.

Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Uporaba # 2.3 – Čiščenje in razkuževanje majhnih predmetov z namakanjem ali potapljanjem (vključno z zdravstvenimi območji)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih “Čistilo za razkuževanje majhnih predmetov (npr. škarij, ščetk) vključno s predmeti za področje zdravstvenega varstva. Biocidna uporaba izključuje dezinfekcijo medicinskih pripomočkov.”
Način(-i) uporabe	Metoda: Namakanje ali potapljanje Podroben opis: Namakanje ali potapljanje v raztopini.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: do 3 litre Izdelek, pripravljen za uporabo Število in časovni razpored uporabe: Uporaba pri sobni temperaturi 1-krat na dan.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak ; splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Poklicni in nepoklicni uporabniki: Polietilen visoke gostote (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov Poklicni uporabniki: HDPE Kanister 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Prepričajte se, da so predmeti, ki jih želite razkužiti, popolnoma potopljeni v raztopino za 5 minut.

Obrišite do suhega ali pustite, da se posušijo na zraku.

Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

Raztopine za namakanje ali potapljanje lahko uporabite samo enkrat.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Uporaba # 2.4 – Čiščenje in razkuževanje s penjenjem (vključno z zdravstvenimi območji)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Pripravljeno za uporabo čistilo za dezinfekcijo trdih površin (vključno z zdravstvenimi območji).
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis: Pršenje s sprožilno peno. Po želji obrišite, da se raztopina razmaže.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 11 ml/m^2 Izdelek, pripravljen za uporabo Število in časovni razpored uporabe: Uporaba pri sobni temperaturi. Pogostost uporabe: uporaba v straniščih in kopalnicah: 4-krat na dan. uporaba v kozmetičnih/farmacevtskih proizvodnih obratih: 8x na dan uporaba v laboratorijih: 10-krat na dan. uporaba v čistih prostorih: 10-krat na dan.

	uporabo na pultu v trgovini ali supermarketu: 8-krat na dan. uporaba v bolnišnicah in zdravstvenih ordinacijah: 8-krat na dan.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak ; splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Poklicni in nepoklicni uporabniki: 750 ml pršilo iz polietena visoke gostote (HDPE) s penasto glavo. HDPE Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov Poklicni uporabniki: HDPE Kanister 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Nanesite izdelek po površini. Po želji obrišite, da se raztopina razmaže. Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra.

Pustite delovati 5 minut. Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku.

Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

Samo za razkuževanje majhnih površin.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.5. **Opis uporabe**

Tabela 5.

Uporaba # 2.5 – Čiščenje in razkuževanje z vlažnimi robčki (vključno z zdravstvenimi območji).

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov

	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Pripravljeno za uporabo čistilo za dezinfekcijo trdih površin (vključno z zdravstvenimi območji).
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje Podroben opis: Brisanje s pripravljenimi vlažnimi robčki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 1,5 m^2 na robček Izdelek, pripravljen za uporabo Število in časovni razpored uporabe: 8-krat na dan uporaba pri sobni temperaturi
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	HDPE kanister 1l - 1,5 l – 2 l - 2,5 l – 3 l – 5 l – 10 l - 20 L – 50 l – 100 l – 200 l HDPE IBC cisterne: 100-1 000 l Suhi robčki so pakirani v HDPE vedro s 125 robčki (polipropilen (PP). (prodaja se ločeno)

4.5.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

V vedro za suhe robčke dodajte 1,5 litra izdelka.

Tekočino enakomerno porazporedite. Zaprite vedro.

Odprite pokrov. Vzemite en robček. Po odvzemu robčka zaprite pokrov.

Uporabljajte samo mokre robčke.

Obrišite površinoin in se prepričajte, da je površina popolnoma mokra.

Pustite delovati 5 minut. Pustite, da se posuši na zraku. Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

4.5.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.5.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.5.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.5.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.6. **Opis uporabe**

Tabela 6.

Uporaba # 2.6 – Čiščenje in razkuževanje z brisanjem (vključno s površinami, ki so v stiku z živili)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Pripravljeno za uporabo čistilo za dezinfekcijo (vključno s površinami, ki so v stiku z živili)
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje Podroben opis: Brisanje z namočenim brisalom.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 11do 40 ml/m² Redčenje (%): Izdelek, pripravljen za uporabo Število in časovni razpored uporabe: Uporaba pri sobni temperaturi 1-krat na dan.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak ; splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Poklicni in nepoklicni uporabniki: HDPE Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov Poklicni uporabniki: HDPE Kanister 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov

4.6.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Napolnite posodo z izdelkom. Namočite krpo v posodi. Iztisnite odvečni izdelek. Pomijte tla z mokro krpo.

Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra. Pustite delovati 5 minut. Pustite, da se posuši na zraku. Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

4.6.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.6.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.6.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.6.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.7. **Opis uporabe**

Tabela 7.

Uporaba # 2.7 – Čiščenje in razkuževanje s krpo ali gobico (vključno s površinami, ki so v stiku z živili)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Pripravljeno za uporabo čistilo za dezinfekcijo trdih površin (vključno s površinami, ki so v stiku z živili).
Način(-i) uporabe	Metoda: Porazdeljevanje/porazdelitev Podroben opis: Namažite z namočeno krpo ali gobo.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 11 do 40 ml/m^2 Izdelek, pripravljen za uporabo Število in časovni razpored uporabe: uporaba pri sobni temperaturi 1-krat na dan

Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak ; splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Profesionalni in neprofesionalni uporabniki: HDPE Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litra – 5 litrov– 10 litrov Profesionalni uporabniki: HDPE Kanister 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov

4.7.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Namočite krpo ali gobico v izdelek.

Tekočino razporedite po površini.

Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra.

Pustite delovati 5 minut.

Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku.

Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

4.7.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.7.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.7.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.7.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.8. **Opis uporabe**

Tabela 8.

Uporaba # 2.8 – Čiščenje in razkuževanje z namakanjem ali potapljanjem majhnih predmetov (vključno s površinami, ki so v stiku z živili)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Pripravljeno za uporabo čistilo za razkuževanje majhnih predmetov (npr. kuhinjskih pripomočkov), vključno s površinami, ki so v stiku z živili).
Način(-i) uporabe	Metoda: Namakanje ali potapljanje Podroben opis: Namakanje ali potapljanje z izdelkom.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: do 3 litre Izdelek, pripravljen za uporabo Število in časovni razpored uporabe: uporaba pri sobni temperaturi 1-krat na dan
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak ; splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Profesionalni in neprofesionalni uporabniki: Polietilen visoke gostote (HDPE) Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov Profesionalni uporabniki: HDPE Kanister 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov

4.8.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Prepričajte se, da so predmeti, ki jih želite razkužiti, popolnoma potopljeni v raztopino za 5 minut.

Obrišite do suhega ali pustite, da se posušijo na zraku. Po razkuževanju ni potrebno izpiranje. Raztopine za namakanje ali potapljanje lahko uporabite samo enkrat.

4.8.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.8.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.8.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.8.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.9. **Opis uporabe**

Tabela 9.

Uporaba # 2.9 – Čiščenje in razkuževanje s penjenjem (vključno s površinami, ki so v stiku z živili)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Pripravljeno za uporabo čistilo za dezinfekcijo trdih površin (vključno s površinami, ki so v stiku z živili).
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis: Pršenje s sprožilno peno. Po želji obrišite, da se raztopina razmaže.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 11 ml/m² Izdelek, pripravljen za uporabo Število in časovni razpored uporabe: Uporaba pri sobni temperaturi Pogostost uporabe za: uporabo v kuhinjah in menzah: 4-krat na dan. uporabo v predelovalni industriji hrane: 4-krat na dan uporabo na pultu v trgovini ali supermarketu: 8-krat na dan.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak ; splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Profesionalni in neprofesionalni uporabniki: 750 ml sprožilna pena iz polietena visoke gostote (HDPE) HDPE Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov Profesionalni uporabniki: HDPE Kanister 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov

4.9.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Nanesite izdelek po površini. Po želji obrišite, da se raztopina razmaže.

Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra.

Pustite delovati 5 minut.

Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku.

Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

Samo za razkuževanje majhnih površin.

4.9.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.9.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.9.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.9.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.10. **Opis uporabe**

Tabela 10.

Uporaba # 2.10 – Čiščenje in razkuževanje z vlažnimi robčki (vključno s površinami, ki so v stiku z živili)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Pripravljeno za uporabo čistilo za dezinfekcijo trdih površin (vključno s površinami, ki so v stiku z živili).
Način(-i) uporabe	Metoda: Obrišite Podroben opis: Brisanje s pripravljenimi vlažnimi robčki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 1,5 m^2 na robček Izdelek, pripravljen za uporabo Število in časovni razpored uporabe: uporaba pri sobni temperaturi 8-krat na dan

Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Tekočina RTU: Polietilen visoke gostote (HDPE) HDPE Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov Suhi robčki so pakirani v HDPE vedro s 125 robčki (polipropilen (PP). (prodaja se ločeno)

4.10.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

V vedro za suhe robčke nanesite 1,5 litra razredčenega izdelka. Tekočino enakomerno razporedite. Zaprite vedro. Odprite pokrov. Vzemite en robček. Potem zaprite pokrov. Uporabljajte samo mokre robčke. Obrišite površino

Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra. Pustite delovati 5 minut. Pustite, da se posuši na zraku.

Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

4.10.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.10.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.10.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.10.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.11. **Opis uporabe**

Tabela 11.

Uporaba # 2.11 – Dezinfekcija predhodno očiščenih trdih površin

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcijsko sredstvo za predhodno očiščene trde površine (vključno z zdravstvenimi področji, farmacevtsko industrijo, kozmetično industrijo, laboratoriji in čistimi prostori)
Način(-i) uporabe	Metoda: Porazdelitev, namakanje in pršenje s peno Podroben opis: Razmazanje z namočenim brisalom. Porazdelite z namočeno krpo ali gobo. Potapljanje v raztopini. Pršenje s peno, po želji obrišite, da se raztopina razširi
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek: Nanos z namočenim brisalom: 11 do 40 ml/m^2, nanesite z namočeno krpo ali gobo: 11 do 40 ml/m^2, namakanje v raztopini: 3 litre, brizganje pene: 11 ml/m^2. Izdelek, pripravljen za uporabo Število in časovni razpored uporabe: Pogostost uporabe: Nanos z namočenim brisalom: 7-krat na dan Nanesite z namočeno krpo/gobo: 7 -krat na dan Potapljanje: 1-krat na dan Pršenje s peno: kopalnice in stranišča 4-krat na dan zdravstvena oskrba 8-krat na dan laboratoriji in čiste sobe 10-krat na dan Uporaba pri sobni temperaturi.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Polietilen visoke gostote (HDPE) Kanister HDPE Kanister 1 liter - 1,5 litra – 2 litra - 2,5 litra – 3 litre – 5 litrov– 10 litrov – 20 litrov – 50 litrov – 100 litrov – 200 litrov HDPE Plastenka(J-Flex): 1,5 litrov HDPE Plastenka(Smart Dose): 1,4 litrov – 1,5 litrov HDPE IBC cisterne: 100-1 000 litrov

4.11.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Kontaktni čas: 5 minut

Potapljanje: potopite brisalo v posodo. Stisnite presežno raztopino. Nanesite na tla. Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra. Omogočite delovanje v zahtevanem času stika.

Nanos krpo/gobico: krpo ali gobo namočite v raztopino. Tekočino razporedite po površini. Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra. Omogočite delovanje v zahtevanem času stika.

Potapljanje: kopel za namakanje pokrijte s pokrovom, potem ko predmete položite v raztopino za razkuževanje. Prepričajte se, da so predmeti, ki jih želite razkužiti, popolnoma potopljeni v raztopino za 5 minut.

Raztopine za namakanje ali potapljanje lahko uporabite samo enkrat.

Pršenje s peno: nanesite izdelek. Po želji obrišite, da se raztopina razmaže. Prepričajte se, da je površina popolnoma mokra. Omogočite delovanje v zahtevanem času stika. Samo za razkuževanje majhnih površin.

Obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku. Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

4.11.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.11.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.11.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

4.11.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 2

Poglavje 5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 2**

5.1. **Navodila za uporabo**

Za poklicno uporabo:

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

Po uporabi temeljito umiti roke.

Hraniti samo v originalni embalaži.

Ne mešajte z drugimi sredstvi.

Za uporabo glejte uporbna - posebna navodila.

Za splošno uporabo:

Upoštevajte navodila za uporabo.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

Po uporabi temeljito umiti roke.

Hraniti samo v originalni embalaži.

Ne mešajte z drugimi sredstvi.

Glejte posebna navodila za uporabo.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Domače živali držite stran od obdelanih površin, dokler se ne posušijo.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

PRI VDIHAVANJU: če imate simptome, se posvetujte z zdravnikom.

PRI ZAUŽITJU: če imate simptome, se posvetujte z zdravnikom.

PRI STIKU S KOŽO: kožo sperite z vodo. Če imate simptome, se posvetujte z zdravnikom.

PRI STIKU Z OČMI: če se pojavijo simptomi sperite z vodo. Previdno odstranite kontaktne leče. Posvetujte se z zdravnikom.

Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki posodo ali etiketo izdelka.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Vsebino/posodo predajte odgovornim za odstranjevanje nevarnih odpadkov v skladu z veljavnimi predpisi.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Rok uporabe: 2 leti

Shranjujte v temi. Ne shranjujte pri temperaturi nad 50 °C.

Hranite izven dosega otrok ter neciljnih in domačih živali.

Poglavje 6. **DRUGE INFORMACIJE**

Proizvodi iz tega meta-SPC so lahko namenjeni tudi razkuževanju površin medicinskih pripomočkov v medicinskih in kliničnih območjih. V takem primeru morata biti njihovo dajanje v promet ali dajanje v uporabo skladna z Uredbo (EU) 2017/745 evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih napravah, s spremembo Direktive 2001/83/ES, Uredbo (ES) št. 178/2002 in Uredbo (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvijo direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L 117, 05/05/2017, str. 1), in so medicinske naprave razvrščene kot razred IIa. Te uporabe so izven okvira avtorizacije te družine biocidnega prizvoda in niso pokrite z njo.

Kar zadeva opombo »Kategorija/-e uporabnikov«: »Strokovnjaki« (vključno z industrijskimi uporabniki) označuje usposobljene poklicne uporabnike, če to zahtevajo nacionalni predpisi.

Poglavje 7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 2**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Oxivir Excel Foam	Področje trženja: EU
	Oxivir Excel Foam H+	Področje trženja: EU
	Oxivir Excel Spray	Področje trženja: EU
	Oxivir Excel Spray H+	Področje trženja: EU
	Oxivir Excel RTU	Področje trženja: EU
	Oxivir Excel RTU H+	Področje trženja: EU
	Oxivir Excel RTU IBC	Področje trženja: EU

	Oxivir Excel Foam Acti	Področje trženja: EU
	Oxivir Excel Foam Des	Področje trženja: EU
	Oxivir Excel Foam Duo	Področje trženja: EU
	Clinell H2O2 RTU	Področje trženja: EU
	Antibac Oxivir RTU	Področje trženja: EU
	Divosan AHP Foam RTU VS71	Področje trženja: EU
	TASKI Sani AHP-Des Spray	Področje trženja: EU
	TASKI Sprint AHP-Des Spray	Področje trženja: EU
	Suma AHP RTU D10.7	Področje trženja: EU
	Suma AHP Spray D10.7	Področje trženja: EU
	Suma AHP RTU	Področje trženja: EU
	Suma AHP Spray	Področje trženja: EU
	ClearKlens AHP RTU	Področje trženja: EU

	ClearKlens Excel RTU	Področje trženja: EU
	DOME-STOS Expert	Področje trženja: EU
	GLORIX Expert	Področje trženja: EU
	KLINEX Expert	Področje trženja: EU
	LYSO-FORM Expert	Področje trženja: EU
	SAVO Expert	Področje trženja: EU
	CIF Expert	Področje trženja: EU
	VISS Expert	Področje trženja: EU
	JIF Expert	Področje trženja: EU
	FLORAS-ZEPT Expert	Področje trženja: EU
	ANDY Expert	Področje trženja: EU
	SUPER-ANDY Expert	Področje trženja: EU
	LIFEBUOY Expert	Področje trženja: EU
	ANDY-SAN Expert	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja		EU-0032483-0002 1-2

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	0,36 % (m/m)

Poglavje 1. **META SPC 3 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 3 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: Meta-SPC 3: Wipes

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-3

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

Poglavje 2. **SESTAVA META SPC 3**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 3**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	0,36 - 0,36 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 3**

Vrsta(-e) formulacije	AL (druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene)-RTU robčki

Poglavje 3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 3**

Stavki o nevarnosti	H290: Lahko je jedko za kovine.
Previdnostni stavki	P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P234: Hraniti samo v originalni embalaži.

Poglavje 4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Uporaba # 3.1 – Čiščenje in razkuževanje z vlažnimi robčki na trdih površinah, vključno z zdravstvenimi območji

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Obrišite za čiščenje in razkuževanje trdih površin, vključno z zdravstvenimi območji.
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje Podroben opis: Brisanje s pripravljenimi vlažnimi robčki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 1,5 m^2 na robček Pripravljeno za uporabo robček. Število in časovni razpored uporabe: 8-krat na dan uporaba pri sobni temperaturi
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak ; splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Vedro ali kad iz polietena visoke gostote (HDPE) s 100 PP robčki Pretočno pakiranje iz polietilen tereftalata (PET)/polietilena nizke gostote (LDPE) s 100 polipropilenskimi (PP) robčki Pet/LDPE stoječa vreča s 100 PP robčki Vsi paketi so za profesionalno in neprofesionalno uporabo

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Odprite pokrov. Vzemite en robček in zaprite pokrov. Uporabljajte samo mokre robčke. Obrišite površino in se prepričajte, da je površina popolnoma mokra. Pustite delovati 5 minut.

Pustite, da se posuši na zraku. Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

See general directions for use of Meta-SPC 3

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 3

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 3

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 3

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Uporaba # 3.2 – Čiščenje in razkuževanje z vlažnimi robčki na trdih površinah, vključno s površinami, ki so v stiku z živili

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Krpa za čiščenje in razkuževanje trdih površin (vključno s površinami, ki so v stiku s hrano)
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje Podroben opis: Brisanje s pripravljenimi vlažnimi robčki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 1,5 m^2 na robček Pripravljeno za uporabo robček. Število in časovni razpored uporabe: uporaba pri sobni temperaturi 8-krat na dan
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak ; splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Vedro ali kad iz polietena visoke gostote (HDPE) s 100 PP robčki Pretočno pakiranje iz polietilen tereftalata (PET)/polietilena nizke gostote (LDPE) s 100 polipropilenskimi (PP) robčki Pet/LDPE stoječa vreča s 100 PP robčki Vsi paketi so za profesionalno in neprofesionalno uporabo

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Odprite pokrov. Vzemite en robček in zaprite pokrov. Uporabljajte samo mokre robčke. Obrišite površino in se prepričajte, da je površina popolnoma mokra. Pustite delovati 5 minut.

Pustite, da se posuši na zraku. Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 3

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 3

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 3

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 3

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Uporaba # 3.3 – Robček za razkuževanje predhodno očiščenih trdih površin

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcijski robček za predhodno očiščene trde površine (vključno z zdravstvenimi področji, farmacevtsko industrijo, kozmetično industrijo, laboratoriji in čistimi prostori)
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje Podroben opis: Brisanje s pripravljenimi vlažnimi robčki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 1,5 m^2 na robček Redčenje (%): Pripravljeno za uporabo. Število in časovni razpored uporabe: uporaba pri sobni temperaturi 8-krat na dan
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak

Velikosti in material embalaže	Vedro ali kad iz polietena visoke gostote (HDPE) s 100 PP robčki Pretočno pakiranje iz polietilen tereftalata (PET)/polietilena nizke gostote (LDPE) s 100 polipropilenskimi (PP) robčki Pet/LDPE stoječa vreča s 100 PP robčki

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Kontaktni čas:5 minut

Odprite pokrov. Vzemite en robček in zaprite pokrov. Uporabljajte samo mokre robčke. Obrišite površino in se prepričajte, da je površina popolnoma mokra. Pustite, da deluje v zahtevanem času stika.

Pustite, da se posuši na zraku. Po razkuževanju ni potrebno izpiranje.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 3

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 3

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 3

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo Meta-SPC 3

Poglavje 5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 3**

5.1. **Navodila za uporabo**

Za poklicno uporabo:

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

Po uporabi temeljito umiti roke.

Hraniti samo v originalni embalaži.

Ne mešajte z drugimi sredstvi.

Glejte posebna navodila za uporabo.

Za splošno uporabo:

Upoštevajte navodila za uporabo.

Po uporabi temeljito umiti roke.

Hraniti samo v originalni embalaži.

Ne mešajte z drugimi sredstvi.

Glejte posebna navodila za uporabo.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Domače živali držite stran od obdelanih površin, dokler se ne posušijo.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

PRI VDIHAVANJU: če imate simptome, se posvetujte z zdravnikom.

PRI ZAUŽITJU: če imate simptome, se posvetujte z zdravnikom.

PRI STIKU S KOŽO: kožo sperite z vodo. Če imate simptome, se posvetujte z zdravnikom.

PRI STIKU Z OČMI: če se pojavijo simptomi, sperite z vodo. Previdno odstranite kontaktne leče. Posvetujte se z zdravnikom.

Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki posodo ali etiketo izdelka.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Vsebino/posodo predajte odgovornim za odstranjevanje nevarnih odpadkov v skladu z veljavnimi predpisi.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Rok uporabe: 2 leti

Shranjujte v temi. Ne shranjujte pri temperaturi nad 50 °C.

Hranite izven dosega otrok ter neciljnih in domačih živali.

Poglavje 6. **DRUGE INFORMACIJE**

Proizvodi iz tega meta-SPC so lahko namenjeni tudi razkuževanju površin medicinskih pripomočkov v medicinskih in kliničnih območjih. V takem primeru morata biti njihovo dajanje na trg ali dajanje v uporabo skladna z Uredbo (EU) 2017/745 evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih napravah, s spremembo Direktive 2001/83/ES, Uredbo (ES) št. 178/2002 in Uredbo (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvijo direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L 117, 05/05/2017, str. 1), in so medicinske naprave razvrščene kot razred IIa. Te uporabe so izven okvira avtorizacije te družine biocidnega proizvoda in niso pokrite z njo.

Kar zadeva opombo »Kategorija/-e uporabnikov«: »Strokovnjaki« (vključno z industrijskimi uporabniki) označuje usposobljene poklicne uporabnike, če to zahtevajo nacionalni predpisi.

Vključene so naslednje vrste robčkov:

Obrišite z velikostjo 15 x 25 cm; teža je 1,52 gr; 3,75 ml tekočine na robček (obremenitev s tekočino za brisanje je 250%)

Obrišite z velikostjo 15,2 x 17,7 cm; teža je 1,51 gr; 3,75 ml tekočine na robček (obremenitev s tekočino za brisanje je 250%)

Obrišite z velikostjo 15,2 x 20,3 cm; teža je 1,51 gr; 3,75 ml tekočine na robček (obremenitev s tekočino za brisanje je 250%)

Obrišite z velikostjo 17,7 x 20,3 cm; teža je 1,50 gr; 3,75 ml tekočine na robček (obremenitev s tekočino za brisanje je 250%)

Obrišite z velikostjo 19 x 25,4 cm; teža je 1,49 gr; 3,75 ml tekočine na robček (obremenitev s tekočino za brisanje je 250%)

Obrišite z velikostjo 20 x 26,7 cm; teža je 1,49 gr; 3,75 ml tekočine na robček (obremenitev s tekočino za brisanje je 250%)

Obrišite z velikostjo 20 x 30 cm; teža je 1,50 gr; 3,75 ml tekočine na robček (obremenitev s tekočino za brisanje je 250%)

Obrišite z velikostjo 25 x 25 cm; teža je 1,51 gr; 3,75 ml tekočine na robček (obremenitev s tekočino za brisanje je 250%)

Obrišite z velikostjo 25,4 x 25,4 cm; teža je 1,51 gr; 3,75 ml tekočine na robček (obremenitev s tekočino za brisanje je 250%)

Obrišite z velikostjo 15 x 25 cm; teža je 1,52 gr; 6 ml tekočine na robček (obremenitev s tekočino za brisanje je 400%)

Obrišite z velikostjo 15,2 x 17,7 cm; teža je 1,51 gr; 6 ml tekočine na robček (obremenitev s tekočino za brisanje je 400%)

Obrišite z velikostjo 15,2 x 20,3 cm; teža je 1,51 gr; 6 ml tekočine na robček (obremenitev s tekočino za brisanje je 400%)

Obrišite z velikostjo 17,7 x 20,3 cm; teža je 1,50 gr; 6 ml tekočine na robček (obremenitev s tekočino za brisanje je 400%)

Obrišite z velikostjo 19 x 25,4 cm; teža je 1,49 gr; 6 ml tekočine na robček (obremenitev s tekočino za brisanje je 400%)

Obrišite z velikostjo 20 x 26,7 cm; teža je 1,49 gr; 6 ml tekočine na robček (obremenitev s tekočino za brisanje je 400%)

Obrišite z velikostjo 20 x 30 cm; teža je 1,50 gr; 6 ml tekočine na robček (obremenitev s tekočino za brisanje je 400%)

Obrišite z velikostjo 25 x 25 cm; teža je 1,51 gr; 6 ml tekočine na robček (obremenitev s tekočino za brisanje je 400%)

Obrišite z velikostjo 25,4 x 25,4 cm; teža je 1,51 gr; 6 ml tekočine na robček (obremenitev s tekočino za brisanje je 400%)

Poglavje 7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 3**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Oxivir Excel Wipe	Področje trženja: EU
	Oxivir Excel Wipe H+	Področje trženja: EU
	Oxivir Excel Wipe Acti	Področje trženja: EU
	Oxivir Excel Wipe Des	Področje trženja: EU
	Oxivir Excel Wipe Duo	Področje trženja: EU
	Clinell H2O2 wipes	Področje trženja: EU
	Antibac Oxivir wipes	Področje trženja: EU
	Divosan AHP Wipes VS72	Področje trženja: EU
	Suma AHP Wipes	Področje trženja: EU
	Suma San AHP Wipes	Področje trženja: EU

	ClearKlens AHP Wipes	Področje trženja: EU
	ClearKlens Excel Wipes	Področje trženja: EU
	DOME-STOS Expert Wipes	Področje trženja: EU
	GLORIX Expert Wipes	Področje trženja: EU
	KLINEX Expert Wipes	Področje trženja: EU
	LYSO-FORM Expert Wipes	Področje trženja: EU
	SAVO Expert Wipes	Področje trženja: EU
	CIF Expert Wipes	Področje trženja: EU
	VISS Expert Wipes	Področje trženja: EU
	JIF Expert Wipes	Področje trženja: EU
	FLORAS-ZEPT Expert Wipes	Področje trženja: EU
	ANDY Expert Wipes	Področje trženja: EU
	SUPER-ANDY Expert Wipes	Področje trženja: EU

			LIFEBUOY Expert Wipes	Področje trženja: EU	
			ANDYSAN Expert Wipes	Področje trženja: EU	
Številka dovoljenja			EU-0032483-0003 1-3		
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	0,36 % (m/m)