Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1284/2006 AL COMISIEI

din 29 august 2006

privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 235, 30.8.2006, p. 3)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/429 al Comisiei din 10 martie 2017	L 66	4	11.3.2017

▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1284/2006 AL COMISIEI

din 29 august 2006

privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

Articolul 1

Preparatul care aparține grupului „Enzime”, astfel cum este prevăzut la anexa I, este autorizat fără limită de timp în calitate de aditiv în hrana animalelor, în condițiile stabilite la anexa menționată anterior.

▼M1

—————

▼B

Articolul 3

Preparatul care aparține grupului „Enzime”, astfel cum este prevăzut la anexa III, este autorizat fără limită de timp în calitate de aditiv în hrana animalelor, în condițiile stabilite la anexa menționată anterior.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

ANEXA I

Nr. CE	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specie sau categorie de animale	Vârstă maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					Unități de activitate/kg de furaj complet			
Enzime								
E 1638	Endo-1,3(4)-beta-glucanază EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8 Alfa-amilază EC 3.2.1.1	Preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanază produsă de *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) și alfa-amilază produsă de *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), cu o activitate minimă de: endo-1,3(4)-beta-glucanază: 250 U (1)/g endo-1,4-beta-xilanază: 400 U (2)/g alfa-amilază: 1 000 U (3)/g	Purcei (înțărcați)	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 250 U Endo-1,4-beta-xilanază: 400 U Alfa-amilază: 1 000 U	— — —	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, se precizează temperatura de depozitare, durata conservării și stabilitatea la granulare. 2. Doză recomandată pe kg de furaj complet: — endo-1,3(4)-beta-glucanază: 250 U — endo-1,4-beta-xilanază: 400 U — alfa-amilază: 1 000 U. 3. Se utilizează în furajele combinate care conțin cereale bogate în polizaharide amilacee și nonamilacee (în special arabinoxilani și beta-glucani), de exemplu, conținând mai mult de 50 % orz. 4. Pentru purceii înțărcați până la aproximativ 35 kg.	Fără limită de timp

(1) 1 U este cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de zaharuri reductoare (măsurate în echivalenți glucoză) pe minut din beta-glucan de orz, la pH 5,0 și la 30 °C.
(2) 1 U este cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de zaharuri reductoare (măsurate în echivalenți xiloză) pe minut din xilan de tărâțe de ovăz, la pH 5,3 și la 50 °C.
(3) 1 U este cantitatea de enzimă care hidrolizează 1 micromol de legături glucozidice pe minut dintr-un substrat de polimer amilaceu reticulat și insolubil în apă, la pH 6,5 și la 37 °C.

▼M1

—————

▼B

ANEXA III

Nr. CE	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specie sau categorie de animale	Vârstă maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					Unități de activitate/kg de furaj complet			
Enzime								
E 1628	Endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8	Preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), cu o activitate minimă de: praf: endo-1,4-beta-xilanază: 8 000 U ([1])/g lichid: endo-1,4-beta-xilanază: 8 000 U/ml	Porci la îngrășat	—	Endo-1,4-beta-xilanază: 1 000 U	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, se precizează temperatura de depozitare, durata conservării și stabilitatea la granulare. 2. Doză recomandată pe kg de furaj complet: — endo-1,4-beta-xilanază: 1 000-4 000 U. 3. Se utilizează în furajele combinate bogate în polizaharide nonamilacee (în special arabinoxilani), de exemplu, care conțin mai mult de 35 % grâu.	Fără limită de timp

([1]) 1 U este cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de zaharuri reductoare (măsurate în echivalenți xiloză) pe minut din xilan de tărâțe de ovăz, la pH 5,3 și la 50 °C.