# REGOLAMENTO (CEE) N. 1577/86 DEL CONSIGLIO

**del 23 maggio 1986**

**che fissa, per il raccolto 1986, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli nonché le qualità di riferimento e le zone di produzione**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1576/86 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 8,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, nel fissare i prezzi per il settore del tabacco greggio, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune, ha, più particolarmente, lo scopo di procurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento del tabacco in foglia devono essere fissati secondo i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 727/70, per promuovere l'orientamento della produzione, in particolare nel senso della riconversione delle colture verso le varietà più richieste e più competitive;

considerando che è opportuno fissare, anche per il raccolto 1986, prezzi d'intervento derivati per le varietà che, prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati o, per le varietà coltivate in Grecia, Spagna e Portogallo, prima dell'adesione, beneficiavano di una garanzia di prezzo nella fase del tabacco in colli, nonché per le varietà principalmente coltivate in Germania, al fine di tener conto degli usi commerciali vigenti in tale paese;

considerando che il premio concesso agli acquirenti di tabacco comunitario deve consentire loro di pagare ai produttori di tabacco in foglia un prezzo che raggiunga il livello del prezzo d'obiettivo, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale e del livello dei prezzi risultante dal gioco dell'offerta e della domanda sul mercato comunitario;

considerando che i prezzi di cui sopra e l'importo del premio devono essere fissati per ciascuna varietà coltivata nelle zone di produzione riconosciute in rapporto ad una qualità di riferimento definita in modo da consentire la valutazione più obiettiva possibile della qualità del tabacco;

considerando che, per il raccolto 1986, è opportuno indicare le zone di produzione riconosciute di ogni varietà di tabacco e utilizzare le definizioni delle qualità di riferimento stabilite dal regolamento (CEE) n. 1505/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985 che fissa, per il raccolto 1985, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, nonché le qualità di riferimento (6); che queste indicazioni concernenti le zone di produzione riconosciute e le qualità di riferimento devono essere menzionate anche per le varietà spagnole e portoghesi;

considerando che la normativa vigente prevede che quando è condizionato in colli il tabacco della varietà Kentucky deve essere presentato in botti da 280 a 450 kg circa o in balle da 170 a 200 kg circa; che è opportuno mantenere la presentazione in botti o in balle e prevedere però, come per altre varietà italiane, una presentazione in cartoni da 150 a 200 kg;

considerando che, a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, e dell'articolo 296 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, i prezzi d'intervento applicabili in Spagna e in Portogallo sono fissati ad un livello che consenta ai produttori di tabacco stabiliti nei due paesi citati di ottenere dei prezzi di mercato equivalenti a quelli ottenuti, durante un periodo rappresentativo da stabilire, in base al regime nazionale precedentemente in vigore; che, per stabilire detto periodo, è opportuno prendere in considerazione i raccolti 1983, 1984 e 1985;

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 40.
(4) GU n. C 120 del 20. 5. 1986.
(5) GU n. C 118 del 20. 5. 1986, pag. 1.
(6) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 31.

considerando che, a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, e dell'articolo 297 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, i prezzi di obiettivo corrispondenti ai prezzi d'intervento di cui sopra sono fissati in Spagna e in Portogallo, per il raccolto 1986, ad un livello che rifletta il rapporto esistente fra il prezzo di obiettivo e il prezzo d'intervento, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 727/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il raccolto 1986, le qualità di riferimento e le zone di produzione riconosciute ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 727/70, per ciascuna varietà di tabacco in foglia prodotta nella Comunità sono quelle stabilite rispettivamente negli allegati I e III del presente regolamento.

*Articolo 2*

Per il raccolto 1986, le qualità di riferimento e le zone di produzione riconosciute ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 727/70, per ciascuna varietà di tabacco in colli prodotta nella Comunità per le quali è fissato un prezzo d'intervento derivato sono quelle stabilite negli allegati II e III del presente regolamento.

*Articolo 3*

1. Per il raccolto 1986, i prezzi d'obiettivo e d'intervento e gli importi dei premio concesso agli acquirenti di tabacco in foglia di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 727/70 nonché i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento sono indicati nell'allegato IV del presente regolamento.

2. I prezzi e i premi si applicano solo a condizione che ciascuna delle suddette varietà sia stata coltivata nelle zone di produzione corrispondenti indicate nell'allegato III.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1986.

*Per il Consiglio*
*Il Presidente*
G. BRAKS

*ALLEGATO I*

**Tabacco in foglia: varietà e rispettive qualità di riferimento per il raccolto 1986**

| Numero d'ordine | Varietà | Qualità di riferimento |
|---|---|---|
| 1 | Badischer Geudertheimer e ibridi derivati | Hauptgut (Leaves) di classe 1<br>Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo a tonalità scura, di lunghezza uniforme<br>Allestimento: tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso<br>Umidità: 26 % |
| 2 | Badischer Burley E e ibridi derivati | Hauptgut (Leaves) di classe 1<br>Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo al giallo-rosso; bruno rossastro al bruno chiaro, di lunghezza uniforme<br>Allestimento: tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso<br>Umidità: 25 % |
| 3 | Virgin D | Foglie di classe 1<br>Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo al giallo-rosso; sono ammesse differenze di colorazione, come il brunastro o il giallo verdognolo, con una tolleranza di un terzo della superficie della foglia<br>Allestimento: tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso<br>Umidità: 19 % |
| 4 | a) Paraguay e ibridi derivati<br>b) Dragon Vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre | Foglie mediane (Leaves) di classe 2<br>Classe 2: foglie sane con leggeri difetti di colorazione, di natura di tessuto, di maturità, ma di combustibilità soddisfacente<br>Allestimento: foglie cernite, a manocchi o a foglie sciolte orientate<br>Umidità: 27 % |
| 5 | Nijkerk | Foglie apicali (Tips) di classe 2<br>Classe 2: — sia foglie di seconda lunghezza (inferiore o uguale a 45 cm), con tessuto molto gommoso, sostanzioso, integro, resistente ed elastico, con nervature poco accentuate, di buona maturazione, di colorazione da marrone a marrone scuro, di tonalità vivace<br>— sia foglie di prima lunghezza (di oltre 45 cm), con tessuto ancora gommoso, sostanzioso, ancora integro, resistente, con nervature più o meno accentuate, di varia colorazione (ad esclusione del verde bottiglia)<br>Allestimento: tabacco cernito, o manocchi o a foglie sciolte orientate<br>Umidità: 27 % |

| Numero d'ordine | Varietà | Qualità di riferimento |
|---|---|---|
| 6 | a) Misionero e ibridi derivati<br>b) Rio Grande e ibridi derivati | Foglie di seconda qualità<br>Seconda qualità: foglie di oltre 45 cm di lunghezza, di tessuto non grossolano, di colorazione chiara leggermente giallastra, di tonalità vivace o abbastanza vivace, sufficientemente resistente e abbastanza integro, di discreta combustibilità<br>Allestimento: tabacco cernito, a manocchi o a foglie sciolte orientate<br>Umidità: 27 % |
| 7 | Bright | Foglie di grado A<br>Grado A: foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni<br>Allestimento: in balle provvisorie di 30/40 kg<br>Umidità: 16 % |
| 8 | Burley I | Foglie di grado A<br>Grado A: foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace<br>Allestimento: in balle provvisorie di 30/40 kg o in fascicoli di 25/30 foglie<br>Umidità: 19 % |
| 9 | Maryland | Foglie di grado A<br>Grado A: foglie di maturità sufficiente, anche con leggero difetto di cura, con vaghe sfumature verdastre, tessuto di media consistenza, costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colorazione marrone rossastra piuttosto vivace<br>Allestimento: in balle provvisorie di 30/40 kg o in fascicoli di 25/30 foglie<br>Umidità: 19 % |
| 10 | a) Kentucky e ibridi derivati<br>b) Moro di Cori<br>c) Salento | Foglie di grado B<br>Grado B: foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità, di buona combustibilità<br>Allestimento: in fascicoli di 25/30 foglie<br>Umidità: 23 % |

| Numero d'ordine | Varietà | Qualità di riferimento |
|---|---|---|
| 11 | a) Forchheimer Havana II c<br>b) Nostrano del Brenta<br>c) Resistente 142<br>d) Gojano | Foglie di grado B<br>Grado B: foglie con tessuto consistente o leggero, sane, senza difetto di essiccazione, di colore bruno verdognolo, con difetti di integrità<br>Allestimento: tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso<br>Umidità: 26 % |
| 12 | a) Beneventano<br>b) Brasile Selvaggio e varietà simili | Foglie di grado B<br>Grado B: foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso od anche grossolano o magro con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità<br>Allestimento: in fascicoli di 25/30 foglie<br>Umidità: 24 % |
| 13 | Xanti-Yaka | Foglie di grado B<br>Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale ellittica, a costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità<br>La lunghezza delle foglie mediane non supera i 20 cm<br>Allestimento: in balle provvisorie di 15/20 kg o in casse di «ghirlande» di foglie di 30/40 kg<br>Umidità: 17 % |
| 14 | a) Perustitza<br>b) Samsun | Foglie di grado B<br>Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili (Perustitza) o picciolate (Samsun), di forma ellittica lanceolata a punta sfilata (Perustitza) o ellittica arrotondate (Samsun), costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo quasi acuto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone (Perustitza) o tendente al rossiccio (Samsun), con difetti accentuati di integrità ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità<br>La lunghezza delle foglie mediane non supera i 25 cm<br>Allestimento: in balle provvisorie di 15/20 kg o in casse di «ghirlande» di foglie di 30/40 kg<br>Umidità: 17 % |

| Numero d'ordine | Varietà | Qualità di riferimento |
|---|---|---|
| 15 | Erzegovina e varietà simili | Foglie di grado B<br>Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale o ellittica, costole mediamente accentuate, nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità<br>La lunghezza delle foglie mediane non supera i 35 cm<br>Allestimento: in balle provvisorie di 15/20 kg o in casse di «ghirlande» di foglie di 30/40 kg<br>Umidità: 17 % |
| 16 | a) Round Tip<br>b) Scafati<br>c) Sumatra I | Foglie di grado B<br>Grado B: foglie mediane inferiori suddivise per lunghezza secondo le proporzioni seguenti:<br>1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm) 60 %<br>2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm) 35 %<br>3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm) 5 %<br>foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fino, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto ed aroma tipici, idonee per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa 25 % di foglie non integre<br>Allestimento: in fascicoli<br>Umidità: 22 % |
| 17 | Basmas | Foglie della qualità I/III<br>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 15 cm, di colore dal giallo oro all'arancio e al rosso giallastro, elastiche e brillanti, di sostanza media, a grana aperta, di tessuto gentile, di aroma tipico e pronunciato e di buona combustibilità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III<br>foglie mature, con qualche lieve difetto d'integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro al giallo verde, al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di aroma tipico e pronunciato e di ottima combustibilità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III<br>Allestimento: in ballette campagnole di 15/25 kg costituite di manocchi di foglie spianate in due ranghi. (Si noti che nei distretti di Astakos e Chrysoupolis la presentazione si effettua secondo il metodo «armathodema»)<br>Umidità: 17 % |

| Numero d'ordine | Varietà | Qualità di riferimento |
|---|---|---|
| 18 | Katerini e varietà simili | Foglie della qualità I/III<br>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio e al rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di buona combustibilità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III<br>foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, arancio, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, a grana aperta, di sostanza media, mediamente elastiche e brillanti e di ottima combustibilità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III<br>Allestimento: le filze sono generalmente raccolte secondo il metodo «Baski» prima dell'imballaggio<br>Presentazione in balle di 25/35 kg secondo il metodo tradizionale «Kaloup»<br>Umidità: 16 % |
| 19 | a) Kaba Koulak classico<br>b) Elassona | Foglie della qualità I/III<br>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 25 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 20 cm per l'Elassona, il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo medio al giallo carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III<br>foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 25 cm per l'Elassona, il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo al giallo-verde o al rossastro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III<br>Allestimento: in ballette campagnole di 15/30 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo tradizionale «armathodema»<br>Umidità: 17 % |
| 20 | a) Kaba Koulak non classico<br>b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi I | Foglie della qualità I/III<br>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 20 cm per il Phi I e a 15 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo chiaro al rossastro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III<br>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 35 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 25 cm per il Phi I e a 20 cm per il Myrodata |

| Numero d'ordine | Varietà | Qualità di riferimento |
|---|---|---|
| 20 *(segue)* | a) Kaba Koulak non classico<br>b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi I | Smyrne, di colore giallo-verde o marrone chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III<br>Allestimento: in ballette campagnole di 25/35 kg, condizionate secondo il metodo tradizionale «armathodema» ovvero di 35/50 kg secondo il metodo «Kaloup»<br>Umidità: 17 % |
| 21 | Myrodata Agrinion | Foglie della qualità I/III<br>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo all'arancio carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III<br>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm, di colore giallo, giallo-verde o rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III<br>Allestimento: in ballette campagnole di 15/30 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo tradizionale «armathodema»<br>Umidità: 15 % |
| 22 | Zichnomyrodata | Foglie della qualità I/III<br>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio chiaro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III<br>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, giallo verde o rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III<br>Allestimento: in ballette campagnole di 15/30 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo tradizionale «armathodema»<br>Umidità: 17 % |
| 23 | Tsebelia | Foglie della qualità I/III<br>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima, lunghe fino a 35 cm, di colore rosso-giallo, arancio o rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di media sostanza, di tessuto gentile e di ottima combustibilità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III |

| Numero d'ordine | Varietà | Qualità di riferimento |
|---|---|---|
| 23 *(segue)* | Tsebelia | foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore giallo chiaro, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, di grana relativamente aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto sufficientemente gentile, di ottima combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie leggermente danneggiate e/o con lievi difetti d'integrità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III<br>Allestimento: in ballette campagnole di 30/40 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo «armathodema»<br>Umidità: 14 % |
| 24 | Mavra | Foglie della qualità I/III<br>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore dal rosso giallo all'arancio o al rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile, elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III<br>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore giallo-verde (limone), rossastro o marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie leggermente danneggiate e/o con lievi difetti d'integrità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III<br>Allestimento: in ballette campagnole di 30/50 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo «armathodema»<br>Umidità: 14 % |
| 25 | Burley GR | Foglie della qualità A<br>Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, integre, sane, ben curate, provenienti dalle corone fogliari mediane, di colore uniforme dal marroncino al marroncino rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità<br>Allestimento: in ballette campagnole di 40 kg, condizionate in due ranghi senza spago (foglia sciolta) secondo il metodo «armathodema»<br>Umidità: 22 % |
| 26 | Virginia GR | Foglie della qualità A<br>Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, sane, integre, ben curate, colore uniforme dal giallo limone all'arancio medio, sostanziose, di tessuto gentile e di buona combustibilità, provenienti essenzialmente dalle corone mediane<br>Allestimento: in ballette campagnole di 30/40 kg, condizionate in due ranghi senza spago (foglia sciolta) secondo il metodo «armathodema»<br>Umidità: 19 % |

| Numero d'ordine | Varietà | Qualità di riferimento |
|---|---|---|
| 27 | Santafé | Foglie di classe 1<br>Classe 1: foglie mature, sane, senza difetti di cura, costola completamente ridotta, di colore marrone, con qualche difetto di integrità<br>Presentazione: tabacco cernito in balle provvisorie omogenee<br>Umidità: 18 % |
| 28 | Burley fermentato | Foglie di classe 1<br>Classe 1: foglie mature, sane, senza difetti di cura, costola completamente ridotta, di buona combustibilità, di colore da nocciola a cannella, con qualche difetto di integrità<br>Presentazione: tabacco cernito in balle provvisorie omogenee<br>Umidità: 18 % |
| 29 | Havana ESP | Foglie di classe 1<br>Classe 1: foglie mature, sane, con tessuto fine, con la costola e le nervature poco accentuate, senza difetti di essiccazione, costola completamente ridotta, di colore marrone, marrone chiaro o verdastro, con qualche difetto di integrità<br>Presentazione: tabacco cernito in balle provvisorie uniformi<br>Umidità: 18 % |
| 28 | Round Scafati | Foglie di classe 1<br>Classe 1: foglie sufficientemente ampie, di buona maturità, di colore uniforme, sane, senza difetti d'integrità, di tessuto sottile, elastiche e resistenti, con costola e nervature poco accentuate, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto ed aroma tipici, utilizzabili per le fasce dei sigari. È tollerata una percentuale del 25 % circa di foglie non integre<br>Presentazione: in balle provvisorie e omogenee contenenti fascicoli legati con materiale diverso<br>Umidità: 18 % |
| 31 | Virginia ESP | Foglie di classe 1<br>Classe 1: foglie sufficientemente mature, senza difetti di essiccazione, a tessuto aperto, con la costola e le nervature poco accentuate, sane, di color cammello, nelle varie gradazioni<br>Presentazione: in balle provvisorie omogenee di 35—45 kg di tabacco non legato in fascicoli e separato per corona fogliare<br>Umidità: 16 % |
| 32 | Burley ESP | Foglie di classe 1<br>Classe 1: foglie sufficientemente mature, senza difetti di essiccazione, tessuto a grana aperta, con la costola e le nervature poco accentuate, sane, di color cannella, nelle varie gradazioni<br>Presentazione: in balle provvisorie omogenee di 35—45 kg di tabacco non legato in fascicoli e separato per corona fogliare<br>Umidità: 18 % |

| Numero d'ordine | Varietà | Qualità di riferimento |
|---|---|---|
| 33 | Virginia PORT | Foglie di classe 1<br>Classe 1: foglie mature, tessuto a grana aperta ed elastico, oleose, di colore da giallo limone a arancio, brillanti, di lunghezza superiore a 40 cm, escluse la prima e l'ultima delle corone fogliari<br>Presentazione: in balle provvisorie di 45 kg con le foglie ordinate<br>Umidità: 17 % |
| 34 | Burley PORT | Foglie di classe 1<br>Classe 1: foglie mature, tessuto a grana aperta ed elastico, colore brillante, lunghezza superiore a 40 çm, esclusa la prima e l'ultima corona fogliare<br>Presentazione: in balle provvisorie di 35 kg con le foglie ordinate<br>Umidità: 20 % |

*ALLEGATO II*

**Tabacco in colli: varietà e rispettive qualità di riferimento per il raccolto 1986**

| Numero d'ordine | Varietà | Qualità di riferimento |
|---|---|---|
| 1 | Badischer Geudertheimer e ibridi derivati | Hauptgut (Leaves) di classe 1<br>Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal tenue giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale<br>Allestimento: in balle, casse o cartoni di 75/200 kg circa o in botti di 225/450 kg circa<br>Umidità: 16 % |
| 2 | Badischer Burley E e ibridi derivati | Hauptgut (Leaves) di classe 1<br>Classe 1: foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno chiaro, bruno rossastro al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale<br>Allestimento: in balle o casse di 75/175 kg circa o in botti di 225/450 kg circa<br>Umidità: 15 % |
| 3 | Virgin D | Foglie di classe 1<br>Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo, giallo-rosso al giallo brunastro e fermentazione normale<br>Allestimento: in balle o casse di 75/175 kg circa o in botti di 225/450 kg circa<br>Umidità: 13 % |
| 7 | Bright | Foglie di grado A<br>Grado A: foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni<br>Allestimento: botti di 280/450 kg circa o in cartoni di 150/210 kg circa<br>Umidità: 13 % |
| 8 | Burley I | Foglie di grado A<br>Grado A: foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace<br>Allestimento: botti di 280/450 kg circa o in cartoni di 150/210 kg circa<br>Umidità: 13 % |

| Numero d'ordine | Varietà | Qualità di riferimento |
|---|---|---|
| 9 | Maryland | Foglie di grado A<br>Grado A: foglie di sufficiente maturazione, con qualche lieve difetto di cura ed anche con sfumature verdastre, di tessuto di media consistenza con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone rossiccio più o meno vivace<br>Allestimento: botti di 280/450 kg circa o in cartoni di 150/210 kg circa<br>Umidità: 13 % |
| 10 | a) Kentucky e ibridi derivati<br>b) Moro di Cori<br>c) Salento | Foglie di grado B<br>Grado B: foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità, di buona combustibilità<br>Allestimento: botti di 280/450 kg circa o balle di 170/200 kg circa o cartoni di 150/200 kg<br>Umidità: 16 % |
| 11 | a) Forcheimer Havana II c<br>b) Nostrano del Brenta<br>c) Resistente 142<br>d) Gojano | Foglie di grado B<br>Grado B: foglie con tessuto consistente o leggero, sane, senza difetto di essiccazione, di colore bruno-verdognolo, con difetti di integrità<br>Allestimento: in balle, casse o cartoni di 75/200 kg circa o in botti di 225/450 kg circa<br>Umidità: 16 % |
| 12 | a) Beneventano<br>b) Brasile Selvaggio e varietà simili | Foglie di grado B<br>Grado B: foglie sufficientemente mature, di tessuto sostanzioso od anche grossolano e magro con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità<br>Allestimento: balle di 120 kg circa o botti di 330 kg circa<br>Umidità: 16 % |
| 13 | Xanti-Yakà | Foglie di grado B<br>Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale-ellittica, costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità<br>La lunghezza delle foglie mediane non supera i 20 cm<br>Allestimento: ballette di 18/50 kg circa<br>Umidità: 13 % |

| Numero d'ordine | Varietà | Qualità di riferimento |
|---|---|---|
| 14 | a) Perustitza<br>b) Samsun | Foglie di grado B<br>Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili (Perustitza) o picciolate (Samsun), di forma ellittica lanceolata a punta sfilata (Perustitza) o ellittica arrotondata (Samsun), con costole poco accentuate e nervature secondarie ad angolo quasi acuto, che possono presentare alcuni difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone (Perustitza) o tendente al rossiccio (Samsun), con accentuati difetti di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità<br>La lunghezza delle foglie mediane non supera i 25 cm<br>Allestimento: ballette di 18/50 kg circa<br>Umidità: 13 % |
| 15 | Erzegovina e varietà simili | Foglie di grado B<br>Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale o ellittica, costole mediamente accentuate, nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con accentuati difetti di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità<br>La lunghezza delle foglie mediane non supera i 35 cm<br>Allestimento: ballette di 18/50 kg circa<br>Umidità: 13 % |
| 16 | a) Round Tip<br>b) Scafati<br>c) Sumatra I | Foglie di grado B<br>Grado B: foglie mediane inferiori suddivise per lunghezza secondo le proporzioni seguenti:<br>1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm) 60 %<br>2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm) 35 %<br>3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm) 5 %<br>foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, senza difetti di integrità, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto ed aroma tipici, idonee per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa 25 % di foglie non integre<br>Allestimento: in balle di 70/90 kg circa o in cartoni di 180/210 kg circa<br>Umidità: 16 % |
| 17 | Basmas | Foglie della qualità I/III<br>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 15 cm, di colore dal giallo oro all'arancio e al rosso giallastro, elastiche e brillanti, di sostanza media, a grana aperta, di tessuto gentile, di aroma tipico e pronunciato e di buona combustibilità |

| Numero d'ordine | Varietà | Qualità di riferimento |
|---|---|---|
| 17 *(segue)* | Basmas | Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 45 % della qualità I/III<br>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura e qualche traccia di malattia, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di aroma tipico e pronunciato e di ottima combustibilità<br>Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 55 % della qualità I/III<br>Allestimento: in balle di circa 30 kg dette «Tongas»<br>Umidità: 13 % |
| 18 | Katerini e varietà simili | Foglie della qualità I/III<br>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio e al rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di buona combustibilità<br>Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 45 % della qualità I/III<br>foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e di cura e con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, arancio, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, a grana aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di ottima combustibilità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III<br>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»<br>Umidità: 13 % |
| 19 | a) Kaba Koula classico<br>b) Elassona | Foglie della qualità I/III<br>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 25 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 20 cm per l'Elassona, il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo medio al giallo carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III<br>foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 25 cm per l'Elassona, il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo ai rossastro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III<br>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»<br>Umidità: 13 % |

| Numero d'ordine | Varietà | Qualità di riferimento |
|---|---|---|
| 20 | a) Kaba Koulak non classico<br>b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi I | Foglie della qualità I/III<br>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 20 cm per il Phi I e a 15 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo chiaro al rossastro, elastiche e brillanti, a grana relativamente aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità<br>Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 47 % della qualità I/III<br>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 35 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 25 cm per il Phi I e a 20 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo al marrone chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità<br>Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III<br>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»<br>Umidità: 13 % |
| 21 | Myrodata Agrinion | Foglie della qualità I/III<br>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 25 cm di colore dal giallo all'arancio carico, elastiche e brillanti, a grana aperta di tessuto gentile e di eccellente combustibilità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III<br>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm, di colore dal giallo al rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità<br>Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III<br>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»<br>Umidità: 14 % |
| 22 | Zichnomyrodata | Foglie dalla qualità I/III<br>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio chiaro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III<br>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo al rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità<br>Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III<br>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»<br>Umidità: 13 % |

| Numero d'ordine | Varietà | Qualità di riferimento |
|---|---|---|
| 23 | Tsebelia | Foglie della qualità I/III<br>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore rosso giallo, arancio o rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di ottima combustibilità<br>Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 45 % della qualità I/III<br>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore dal giallo chiaro al rossastro o al marrone chiaro, di grana relativamente aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto sufficientemente gentile, di ottima combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie con lievi difetti dovuti a malattie e/o con lievi difetti d'integrità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III<br>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»<br>Umidità: 13 % |
| 24 | Mavra | Foglie della qualità I/III<br>Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore dal rosso-giallo all'arancio o al rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile, elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III<br>foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore dal giallastro al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie con lievi difetti dovuti a malattie e/o con lievi difetti d'integrità<br>Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III<br>Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas»<br>Umidità: 13 % |
| 25 | Burley GR | Foglie della qualità A<br>Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, integre, sane, ben curate, provenienti dalle corone fogliari mediane, di colore uniforme dal marroncino al marroncino rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità<br>Allestimento: in balle di 100 kg o in casse di 200 kg o in botti di 240/280 kg circa<br>Umidità: 13 % |
| 26 | Virginia GR | Foglie della qualità A<br>Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, sane, integre, ben curate, provenienti dalle corone fogliari mediane, di colore uniforme dal giallo limone all'arancio medio, di tessuto gentile e di buona combustibilità<br>Allestimento: in balle di 100 kg circa<br>Umidità: 13 % |

| Numero d'ordine | Varietà | Qualità di riferimento |
|---|---|---|
| 27 | Santafé | Foglie di classe 1<br>Classe 1: foglie mature, sane, ben fermentate, di colore marrone o marrone scuro, con qualche difetto di integrità<br>Presentazione: in balle di 80-100 kg o in cartoni di 150-210 kg<br>Umidità: 14 % |
| 28 | Burley fermentato | Foglie di classe 1<br>Classe 1: foglie mature, sane, ben fermentate, di colore marrone, con qualche difetto di integrità<br>Presentazione: in balle di 80-100 kg o in cartoni di 150-210 kg<br>Umidità: 14 % |
| 29 | Havana ESP | Foglie di classe 1<br>Classe 1: foglie mature, sane, tessuto fine, con la costola e le nervature poco accentuate, ben fermentate, di colore marrone, marrone chiaro, o con tonalità verdastre, con qualche difetto di integrità<br>Presentazione: in balle di 80-100 kg o in cartoni di 150-210 kg<br>Umidità: 14 % |
| 30 | Round Scafati | Foglie di classe 1<br>Classe 1: foglie sufficientemente ampie, di buona maturità, di colore uniforme, sane, senza gravi difetti di integrità, di tessuto fine, elastiche e resistenti con la costola e le nervature fini, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e di aroma tipici, ben fermentate, utilizzabili per le fasce dei sigari. È ammessa una percentuale del 25 % circa di foglie non integre<br>Presentazione: in balle di 70-100 kg o in cartoni di 180-210 kg<br>Umidità: 14 % |
| 31 | Virginia ESP | Foglie di classe 1<br>Classe 1: foglie abbastanza mature, di tessuto a grana aperta, con la costola e le nervature poco accentuate, sane, di colore giallo, con diverse gradazioni da limone a arancio<br>Presentazione: in cartoni di 170-210 kg<br>Umidità: 14 % |
| 32 | Burley ESP | Foglie di classe 1<br>Classe 1: foglie abbastanza mature, tessuto a grana aperta, con la costola e le nervature poco accentuate, sane, nelle varie gradazioni, di colore cannella<br>Presentazione: in cartoni di 150-210<br>Umidità: 14 % |

| Numero d'ordine | Varietà | Qualità di riferimento |
|---|---|---|
| 33 | Virginia PORT | Foglie di classe 1<br>Classe 1: foglie mature, ben curate, tessuto a grana aperta, elastiche, oleose, di color da giallo limone a arancio, brillanti, di lunghezza superiore a 40 cm, escluse la prima e l'ultima delle corone fogliari<br>Presentazione: in cartoni di tabacco non legato in mannocchi di 200 kg<br>Umidità: 12,5 % |
| 34 | Burley PORT | Foglie di classe 1<br>Classe 1: foglie mature, ben curate, tessuto a grana aperta, elastico, colore brillante, lunghezza superiore a 40 cm, esclusa la prima e l'ultima delle corone fogliari<br>Presentazione: in cartoni di tabacco non legato in mannocchi di 180 kg<br>Umidità: 13 % |

*ALLEGATO III*

**Zone di coltivazione riconosciute per ciascuna delle varietà di tabacco prodotte nella Comunità**

| Varietà | Stato membro | Zone di produzione |
|---|---|---|
| 1. Badischer Geudertheimer e ibridi derivati | R.f. di Germania | Pianura del Reno e valli adiacenti, Franconia centrale |
| | Francia | Pas-de-Calais, Piccardia, Champagne-Ardenne, Alsazia-Lorena, Valle della Loira e Poitou-Bretagna |
| | Italia | Veneto, Toscana, Molise, Campania e Puglie |
| 2. Badischer Burley e ibridi derivati | R.f. di Germania | Pianura del Reno e delle valli adiacenti, Franconia centrale |
| | Francia | Aquitania, Midi-Pirenei, Alvernia-Limosino, Alsazia-Lorena, Rodano-Alpi, Franca-Contea, Valle della Loira, Centro, Poitou-Bretagna e Borgogna e Charante |
| | Italia | Piemonte, Lombardia, Veneto |
| 3. Virgin D | R.f. di Germania | Schleswig-Holstein, Bassa-Sassonia, Franconia e pianura del Reno |
| | Francia | Aquitania, Midi-Pirenei, Limosino, Champagne-Ardenne, Alsazia-Lorena, Rodano-Alpi, Franca-Contea, Provenza, Valle della Loira, Centro, Poitou-Bretagna, Linguadoca-Rossiglione, Normandia, Borgogna, Charente, Nord-Pas-de-Calais e Piccardia |
| 4. a) Paraguay<br>b) Dragon Vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre | Francia | Aquitania, Midi-Pirenei, Linguadoca-Rossiglione, Alvergna-Limosino, Poitou-Bretagna, Valle della Loira, Centro, Rodano-Alpi, Provenza, Franca-Contea, Alsazia-Lorena, Champagne-Ardenne, Piccardia, Nord-Pas-de-Calais, Normandia, Borgogna e Charente |
| | Italia | Molise e Campania |
| | Belgio | |
| 5. Nijkerk | Francia | Dipartimenti Lot e Aveyron |
| 6. Misionero | Francia | Isole della Riunione |
| 7. Bright | Italia | Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglie e Calabria |
| 8. Burley I | Italia | Veneto, Lombardia, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglie e Sicilia |
| 9. Maryland | Italia | Friuli, Lombardia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise e Campania |
| 10. Kentucky | Italia | Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania |
| 11. F. Havana | Italia | Friuli, Trentino, Veneto, Toscana, Lazio, Molise e Campania |
| 12. Beneventano<br>Brasile selvaggio | Italia | Campania<br>Sicilia |
| 13. Xanti-Yaka | Italia | Abruzzo, Campania, Basilicata e Puglie |
| 14. a) Perustitza<br>b) Samsun | Italia | Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglie e Sicilia |
| 15. Erzegovina | Italia | Lazio, Abruzzo e Puglie |

| Varietà | Stato membro | Zone di produzione |
|---|---|---|
| 16. Round Tip | Grecia<br>Italia | Macedonia centrale<br>Campania |
| 17. Basma | Grecia | Tracia, Macedonia, Grecia continentale |
| 18. Katerini | Grecia | Macedonia |
| 19. Kaba Koulak classico | Grecia | Macedonia |
| 20. Elassona | Grecia | Tessaglia |
| 21. Kaba Koulak non classico | Grecia | Macedonia, Tessaglia, Grecia continentale, Tracia, Epiro, Peloponneso, Isole |
| 22. Myrodata Agrinion | Grecia | Grecia continentale |
| 23. Zichnomyrodata | Grecia | Tessaglia |
| 24. Tsebelia | Grecia | Epiro, Grecia continentale |
| 25. Mavra | Grecia | Tessaglia, Peloponneso, Grecia continentale |
| 26. Burley GR | Grecia | Macedonia, Tessaglia |
| 27. Virginia GR | Grecia | Grecia continentale, Tessaglia, Macedonia, Tracia, Peloponneso |
| 28. Santa Fé | Spagna | Andalusia |
| 29. Burley Ferment. | Spagna | Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon, Castiglia-Mancia, Comunità di Valencia, Navarra, Rioja, Catalonia e Madrid |
| 30. Havana ESP | Spagna | Castiglia-Léon, Navarra, Galizia, Asturie e Cantabria |
| 31. Round Scafati | Spagna | Galizia, Asturie, Navarra, Castiglia-Léon e Cantabria |
| 32. Virginia ESP | Spagna | Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon e Castiglia-Mancia |
| 33. Burley ESP | Spagna | Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon e Castiglia-Mancia |
| 34. Virginia PORT | Portogallo | Beira Interior, Ribatejo Oeste, Alentejo e Regione autonoma delle Azzorre |
| 35. Burley PORT | Portogallo | Beiras, Ribatejo Oeste, Entre-Douro-e-Minho, Trás-os-Montes e Regione autonoma delle Azzorre |

*ALLEGATO IV*

**Prezzi d'obiettivo, prezzi d'intervento e premi per i tabacchi in foglia del raccolto 1986**

**Prezzi d'intervento derivati per i tabacchi in colli del raccolto 1986**

*(in ECU/kg)*

| Numero d'ordine | Varietà | Prezzi d'obiettivo | Prezzi d'intervento | Importo del premio | Prezzi di intervento derivati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badischer Geudertheimer e ibridi derivati | 3,572 | 3,036 | 2,484 | 4,570 |
| 2 | Badischer Burley E e ibridi derivati | 4,512 | 3,835 | 2,847 | 5,426 |
| 3 | Virgin D | 4,491 | 3,817 | 2,733 | 5,052 |
| 4 | a) Paraguay e suoi ibridi<br>b) Dragon vert e suoi ibridi, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre | 3,333 | 2,833 | 2,306 | – |
| 5 | Nijkerk | 3,291 | 2,797 | 2,090 | – |
| 6 | a) Misionero e suoi ibridi<br>b) Rio Grande e suoi ibridi | 3,067 | 2,607 | 2,117 | – |
| 7 | Bright | 3,951 | 3,358 | 2,298 | 4,650 |
| 8 | Burley I | 2,848 | 2,421 | 1,589 | 3,565 |
| 9 | Maryland | 3,313 | 2,816 | 1,802 | 4,014 |
| 10 | a) Kentucky e suoi ibridi<br>b) Moro di Cori<br>c) Salento | 2,741 | 2,330 | 1,730 | 3,294 |
| 11 | a) Forchheimer Havana II c<br>b) Nostrano del Brenta<br>c) Resistente 142<br>d) Gojano | 3,130 | 2,661 | 2,161 | 4,053 |
| 12 | a) Beneventano<br>b) Brasile selvaggio e varietà simili | 1,690 | 1,437 | 1,220 | 2,232 |
| 13 | Xanti-Yakà | 3,465 | 2,945 | 2,552 | 4,725 |
| 14 | a) Perustitza<br>b) Samsun | 3,280 | 2,788 | 2,429<br>2,364 | 4,116<br>4,140 |
| 15 | Erzegovina e varietà simili | 2,947 | 2,505 | 2,188 | 3,712 |
| 16 | a) Round Tip<br>b) Scafati<br>c) Sumatra I | 15,596 | 13,257 | 9,420 | 20,478 |
| 17 | Basmas | 5,913 | 5,026 | 2,869 | 6,747 |
| 18 | Katerini e varietà simili | 4,925 | 4,186 | 2,552 | 6,050 |
| 19 | a) Kaba Koulak classico<br>b) Elassona | 4,279 | 3,637 | 2,211 | 5,170 |
| 20 | a) Kaba Koulak non classico<br>b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi 1 | 3,223 | 2,740 | 1,514 | 4,163 |
| 21 | Myrodata Agrinion | 4,253 | 3,615 | 2,233 | 5,080 |
| 22 | Zichnomyrodata | 4,419 | 3,756 | 2,355 | 5,303 |
| 23 | Tsebelia | 3,695 | 3,141 | 2,936 | 4,613 |

| Numero d'ordine | Varietà | Prezzi d'obiettivo | Prezzi d'intervento | Importo del premio | Prezzi di intervento derivati |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Mavra | 3,607 | 3,066 | 2,400 | 4,529 |
| 25 | Burley GR | 2,251 | 1,913 | 0,953 | 3,034 |
| 26 | Virginia GR | 3,695 | 3,141 | 2,936 | 4,359 |
| 27 | Santa Fé | 1,356 | 1,153 | 0,295 | 2,007 |
| 28 | Burley Ferm. | 2,196 | 1,867 | 0,904 | 2,878 |
| 29 | Havana ESP | 2,822 | 2,399 | 1,914 | 3,575 |
| 30 | Round Scafati | 8,499 | 7,224 | 5,795 | 12,436 |
| 31 | Virginia ESP | 4,399 | 3,739 | 2,198 | 5,176 |
| 32 | Burley ESP | 2,965 | 2,520 | 1,344 | 3,789 |
| 33 | Virginia PORT | 4,139 | 3,518 | 2,198 | 4,834 |
| 34 | Burley PORT | 3,072 | 2,611 | 1,344 | 3,896 |