31989R3470

1989.11.21. *AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA* L 337/6

A BIZOTTSÁG 3470/89/EGK RENDELETE
(1989. november 16.)
a Kombinált Nómenklatúra 7. árucsoportjára vonatkozó 2. kiegészítő megjegyzés alkalmazásához használandó elemzési módszerről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 3469/89/EGK rendelettel [1] módosított, a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 9. cikkére,

mivel a fent említett rendelethez mellékelt Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Kombinált Nómenklatúra 7. árucsoportjára vonatkozó 2. kiegészítő megjegyzés alkalmazása tekintetében rendelkezéseket kell elfogadni;

mivel, az elvégzett tanulmányoknak megfelelően az e rendelet mellékletében leírt elemzési módszer megfelelőnek tűnik;

mivel a Nómenklatúra Bizottság az elnöke által meghatározott határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúra 7. árucsoportjára vonatkozó 2. kiegészítő megjegyzés alkalmazásához használandó elemzési módszert e rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet 1990. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1989. november 16-án.

a Bizottság részéről

Christiane SCRIVENER

a Bizottság tagja

---

[1] HL L 337., 1989.11.21., 5. o.
[2] HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

MELLÉKLET

A KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRA 7. ÁRUCSOPORTJÁRA VONATKOZÓ 2. KIEGÉSZÍTŐ MEGJEGYZÉS ALKALMAZÁSÁHOZ HASZNÁLANDÓ ELEMZÉSI MÓDSZER

1. **Alapelv**

Oldjunk fel meghatározott mennyiségű labdacsot hideg vízben, anélkül, hogy bármilyen további fizikai kezelésen menne keresztül, amely méretcsökkenést vagy bármilyen szerkezeti módosulást eredményezne. A keletkező anyagot nagy mennyiségű hideg víz felhasználásával szűrjük át, és a szitán fennmaradó maradékot szárítsuk meg és mérjük le.

A szitán (Z) keresztüljutó termék mennyiségét a minta tömegének a nedvességtartalom figyelembevételével helyesbített százalékaként kell kifejezni.

2. **Eszközök**

2.1. analitikai mérleg;

2.2. üveg főzőpohár, 1 l;

2.3. 2 mm-es lyukméretű fémszita;

2.4. előszárított szűrőpapír;

2.5. szárítókemence, 40 °C;

2.6. szárítókemence, 103 °C.

3. **Eljárás**

A labdacs reprezentatív mintájából mérjünk ki legalább 100 ± 0,1 g-ot a főzőpohárba (2.2.). Adjunk hozzá 800 ml hideg vizet és hagyjuk állni legalább 16 óráig és időnként óvatosan kevergessük meg.

Nagy mennyiségű hideg víz felhasználásával öntsük a főzőpohár tartalmát a szitára (2.3.). A szitán fennmaradó maradékot tegyük át a szűrőpapírra (2.4.), helyezzük a kemencébe (2.5.) és 40 °C-on szárítsuk egy éjszakán át. Az egy éjszakán át tartó szárítást követően a maradékot a kemencében (2.6.) 103 °C-on szárítsuk állandó tömegre.

4. **Számítás és az eredmények kifejezése**

$$Z = 100 - \frac{r \times 100}{i \times \frac{(100 - v)}{100}}$$

ahol:

r a szárított és szűrt maradék tömege, grammban

i a minta tömege, grammban

v a minta nedvességtartalma a 71/393/EGK bizottsági irányelv [1] mellékletének 1. szakaszában megállapított módszernek megfelelően meghatározott.

---

[1] HL L 279., 1971.12.20., 7. o.