Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.

►**B**

REGULAMENTUL (CE) NR. 721/2008 AL COMISIEI

din 25 iulie 2008

privind autorizarea unui preparat de bacterie *Paracoccus carotinifaciens* bogată în carotenoid roșu ca aditiv pentru hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 198, 26.7.2008, p. 23)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►**M1**	Regulamentul (UE) nr. 334/2010 al Comisiei din 22 aprilie 2010	L 102	21	23.4.2010

▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 721/2008 AL COMISIEI

din 25 iulie 2008

privind autorizarea unui preparat de bacterie *Paracoccus carotinifaciens* bogată în carotenoid roşu ca aditiv pentru hrana animalelor

(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor ([1]), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor, precum şi criteriile şi procedurile de acordare a unei astfel de autorizări.

(2) A fost depusă o cerere de autorizare pentru preparatul menţionat în anexa la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Respectiva cerere a fost însoţită de informaţiile şi documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3) Cererea priveşte autorizarea preparatului de celule deshidratate inactivate de bacterie *Paracoccus carotinifaciens* bogată în carotenoid roşu (NITE SD 00017) ca aditiv alimentar pentru somon şi păstrăv, urmând a fi clasificat în categoria „aditivi senzoriali”.

(4) Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat în avizul său din 18 septembrie 2007 că preparatul de celule deshidratate inactivate de bacterie *Paracoccus carotinifaciens* bogată în carotenoid roşu (NITE SD 00017) nu are efecte adverse asupra sănătăţii animale, asupra sănătăţii umane sau asupra mediului şi că are un efect favorabil asupra proprietăţilor produselor animale ([2]). De asemenea, aceasta a concluzionat că preparatul nu prezintă niciun alt risc care ar putea exclude autorizarea, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Autoritatea a făcut o recomandare privind limitele maxime ale reziduurilor. Autoritatea nu a considerat necesară prevederea unor cerinţe specifice de supraveghere ulterioară introducerii pe piaţă. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului în hrana animalelor, prezentat de către laboratorul comunitar de referinţă înfiinţat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5) Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condiţiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecinţă, utilizarea preparatului respectiv ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

([1]) JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

([2]) Aviz ştiinţific al Grupului ştiinţific pentru aditivii şi produsele sau substanţele utilizate în hrana animalelor (FEEDAP), la cererea Comisiei Europene, cu privire la siguranţa şi eficacitatea produsului Panaferd-AX (bacterie *Paracoccus carotinifaciens* bogată în carotenoid roşu) ca aditiv alimentar pentru somon şi păstrăv. *The EFSA Journal* (2007) 546, p. 1-30.

▼B

(6) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează preparatul menționat în anexă, clasificat în categoria de aditivi „aditivi senzoriali” și în grupul funcțional „a (ii). Coloranți; substanțe care, utilizate în furaje, colorează alimentele de origine animală”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului	Aditiv	Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Limitele maxime ale reziduurilor (LMR) în produsele alimentare de origine animală relevante	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %				
Categorie de aditivi senzoriali. Grup funcțional: coloranți; substanțe care, utilizate în furaje, colorează alimentele de origine animală									
2a(ii)167	*Paracoccus carotinifaciens* bogată în carotenoid roșu	*Substanțele active*: Astaxantină ($C_{40}H_{52}O_4$, CAS: 472-61-7) Adonirubină ($C_{40}H_{52}O_3$, 3-Hidroxi-beta,beta-caroten-4,4′-dionă, CAS: 511-23801) Cantaxantină ($C_{40}H_{52}O_2$, CAS: 514-78-3) *Compoziția aditivului*: Preparat de celule deshidratate inactivate de *Paracoccus carotinifaciens* (NITE SD 00017) conținând: — 20-23 g/kg astaxantină ►**M1** — 7-15 g/kg adonirubină — 1-5 g/kg cantaxantină ◄ *Metode de analiză* Cromatografie lichidă de înaltă performanță (HPLC) în fază normală asociată cu detecție UV-VIS pentru determinarea astaxantinei, adonirubinei și cantaxantinei în furaje și țesut de pește ([1]).	Somon, păstrăv	—	—	100	1. Conținutul maxim este exprimat ca sumă de astaxantină, adonirubină și cantaxantină. 2. Utilizare permisă începând cu vârsta de 6 luni sau de la o greutate de 50 de grame. 3. Amestecul aditivului cu astaxantină sau cantaxantină este permisă numai în cazul în care concentrația totală a sumei de astaxantină, adonirubină și cantaxantină din alte surse nu depășește 100 mg/kg în furaj complet.	Pentru somon: 10 mg/kg pentru suma de adonirubină și cantaxantină/kg mușchi (țesut proaspăt). Pentru păstrăv: 8 mg/kg pentru suma de adonirubină și cantaxantină/kg mușchi (țesut umed).	15.8.2018

([1]) Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință comunitar: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives