Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►**B**

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 943/2005 НА КОМИСИЯТА

от 21 юни 2005 година

относно безсрочното разрешаване на употреба на добавки в храните за животни

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 159, 22.6.2005 г., стр. 6)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 361/2011 на Комисията от 13 април 2011 година	L 100	22	14.4.2011 г.
►**M2**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 290/2014 на Комисията от 21 март 2014 година	L 87	84	22.3.2014 г.
►**M3**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1145 на Комисията от 8 юни 2017 година	L 166	1	29.6.2017 г.
►**M4**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/11 на Комисията от 3 януари 2019 година	L 2	17	4.1.2019 г.

▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 943/2005 НА КОМИСИЯТА

от 21 юни 2005 година

относно безсрочното разрешаване на употреба на добавки в храните за животни

(текст от значение за ЕИП)

▼M4

_____

▼B

Член 2

Разрешава се употребата като добавки за храненето на животни на препаратите от групата „Ензими“, специфицирани в приложение II, без ограничение във времето и при условията, определени в това приложение.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз.*

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M4

———————

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ II

№ на ЕО	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други условия	Край на срока на разрешителното
					Единици действие/kg от цялата храна за животни			
Ензими								
E 1604	►M2 ——— ◄	Препарат от ендо-1,3(4)-бета-глуканаза и ендо-1, 4-бета- ксиланаза, получаван от *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101), с минимално действие от: Прахообразна форма: Ендо-1,3(4)-бета-глуканаза: 2 000 U ([1])/g Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 1 400 U ([2])/g Течна форма: Ендо-1,3(4)-бета-глуканаза: 500 U/ml Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 350 U/ml	Кокошки носачки	—	Ендо-1,3(4)-бета-глуканаза: 100 U Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 70 U	— —	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на kg готова храна за животни: ендо-1,3(4)-бета-глуканаза: 100 U ендо-1,4-бета-ксиланаза: 70 U 3. За употреба в хранителни смески, богати на несъдържащи скорбяла полизахариди (предимно бета глукани и арабиноксилани), напр. съдържащи над 60 % ечемик или 30 % пшеница.	Без ограничение във времето
			Пуйки за угояване	—	Ендо-1,3(4)-бета-глуканаза: 100 U Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 70 U	— —	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на kg готова храна за животни: ендо-1,3(4)-бета-глуканаза: 100 U ендо-1,4-бета-ксиланаза: 70 U 3. За употреба в хранителни смески, богати на несъдържащи скорбяла полизахариди (предимно бета глукани и арабиноксилани), напр. съдържащи над 30 % ечемик или 20 % пшеница.	Без ограничение във времето

▼B

№ на ЕО	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други условия	Край на срока на разрешителното
					Единици действие/kg от цялата храна за животни			
E 1613	Ендо-1, 4-бета-ксиланаза ЕО 3.2.1.8	Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получаван от *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W) с минимално действие от: Прахообразно състояние: 70 000 IFP ([3])/g Прахообразно състояние: 7 000 IFP/ml	Пуйки за угояване	—	1 400 IFP	—	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на kg готова храна за животни: 1 400 IFP 3. За употреба в хранителни смески, богати на несъдържащи скорбяла полизахариди (предимно арабиноксилани), напр. съдържащи над 38 % пшеница.	Без ограничение във времето
▼M3								
———————								
———————								
———————								

▼B

([1]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 5,55 микромола редуцирани захари (малтозни еквиваленти) от ечемичен бета-глукан на минута при pH 5,0 и при 50 °C.
([2]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 4,00 микромол редуцирани захари (малтозни еквиваленти) от ксилан от брезово дърво на минута при pH 5,5 и при 50 °C.
([3]) 1 IFP е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редуцирани захари (ксилозни еквиваленти) от овесен ксилан на минута при pH 4,8 и при 50 °C.
([4]) ►M3 ——————— ◄
([5]) ►M3 ——————— ◄
([6]) ►M3 ——————— ◄
([7]) ►M3 ——————— ◄
([8]) ►M3 ——————— ◄