Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 943/2005

(2005. gada 21. jūnijs)

par dažu piedevu pastāvīgu atļaušanu barībā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 159, 22.6.2005., 6. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►M1	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 361/2011 (2011. gada 13. aprīlis)	L 100	22	14.4.2011.
►M2	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 290/2014 (2014. gada 21. marts)	L 87	84	22.3.2014.
►M3	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1145 (2017. gada 8. jūnijs)	L 166	1	29.6.2017.
►M4	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/11 (2019. gada 3. janvāris)	L 2	17	4.1.2019.

▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 943/2005

(2005. gada 21. jūnijs)

par dažu piedevu pastāvīgu atļaušanu barībā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

▼M4

_____

▼B

2. pants

"Fermentu" grupas preparātus, kas aprakstīti šīs regulas II pielikumā, ir atļauts bez laika ierobežojuma izmantot kā piedevu dzīvnieku barībā saskaņā ar minētajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M4

———————

▼B

II PIELIKUMS

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					Aktīvās vienības/kg kompleksās barības			
Fermenti								
E 1604	►M2 ——————— ◄	Endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts, kas iegūts no *Penicillium funiculosum* (*IMI SD* 101) un kura minimālā aktivitāte ir: pulverim: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 2 000 U ([1])/g endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 400 U ([2])/g šķidrā veidā: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 500 U/ml endo-1,4-beta-ksilanāze: 350 U/ml	Dējējvistas	—	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 70 U	— —	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos nosaka glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un granulēšanas noturīgumu 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 70 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz cieti nesaturošu polisaharīdu (galvenokārt beta-glikānu un arabinoksilānu), piemēram, tādā, kas satur vairāk nekā 60 % miežu vai 30 % kviešu	Bez laika ierobežojuma
			Tītari nobarošanai	—	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 70 U	— —	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos nosaka glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un granulēšanas noturīgumu 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 70 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz cieti nesaturošu polisaharīdu (galvenokārt beta-glikānu un arabinoksilānu), piemēram, tādā, kas satur vairāk nekā 30 % miežu un 20 % kviešu	Bez laika ierobežojuma

▼B

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					Aktīvās vienības/kg kompleksās barības			
E 1613	Endo-1,4-beta-ksilanāze *EC* 3.2.1.8	Endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts, kas iegūts no *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6–10 W) un kura minimālā aktivitāte ir: pulverim: 70 000 IFP ([3])/g šķidrā veidā: 7 000 IFP/ml	Tītari nobarošanai	—	1 400 IFP	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos nosaka glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un granulēšanas noturīgumu 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 1 400 IFP 3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz cieti nesaturošu polisaharīdu (galvenokārt arabinoksilānu), piemēram, tādā, kas satur vairāk nekā 38 % kviešu	Bez laika ierobežojuma
▼M3 _____								
_____								
_____								

▼B

([1]) 1 U ir fermenta daudzums, kas minūtē pie pH 5,0 un 50 °C no miežu beta-glikāna izdala 5,55 mikromolus reducējošo cukuru (maltozes ekvivalenti).
([2]) 1 U fermenta daudzums, kas minūtē pie pH 5,5 un 50 °C no bērza koksnes ksilāna izdala 4,00 mikromolus reducējošo cukuru (maltozes ekvivalenti).
([3]) 1 IFP ir fermenta daudzums, kas minūtē pie pH 4,8 un 50 °C no auzu ksilāna izdala vienu mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalenti).
([4]) ►M3 _____ ◄
([5]) ►M3 _____ ◄
([6]) ►M3 _____ ◄
([7]) ►M3 _____ ◄
([8]) ►M3 _____ ◄