Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 943/2005

av den 21 juni 2005

om permanent godkännande av vissa fodertillsatser

(Text av betydelse för EES)

(EUT L 159, 22.6.2005, s. 6)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►M1	Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 361/2011 av den 13 april 2011	L 100	22	14.4.2011
►M2	Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 290/2014 av den 21 mars 2014	L 87	84	22.3.2014
►M3	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1145 av den 8 juni 2017	L 166	1	29.6.2017
►M4	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/11 av den 3 januari 2019	L 2	17	4.1.2019

▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 943/2005

av den 21 juni 2005

om permanent godkännande av vissa fodertillsatser

(Text av betydelse för EES)

▼M4

_____

▼B

Artikel 2

De preparat av typen enzymer som avses i bilaga II skall utan tidsbegränsning godkännas som fodertillsats enligt de villkor som anges i den bilagan.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M4

▼B

BILAGA II

EG-nr	Tillsats	Kemisk formel och beskrivning	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg helfoder			
Enzymer								
E 1604	►M2 ——— ◄	Preparat av endo-1,3(4)-betaglukanas och endo-1,4-betaxylanas från *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101). Minsta aktivitet: Pulver: endo-1,3(4)-betaglukanas: 2 000 U ([1])/g endo-1,4-betaxylanas: 1 400 U ([2])/g Flytande form: endo-1,3(4)-betaglukanas: 500 U/ml endo-1,4-betaxylanas: 350 U/ml	Värphöns	—	endo-1,3(4)-betaglukanas: 100 U endo-1,4-betaxylanas: 70 U	— —	1. I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges 2. Rekommenderad dos per kg helfoder: endo-1,3(4)-betaglukanas: 100 U endo-1,4-betaxylanas: 70 U 3. För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelsepolysackarider, (huvudsakligen betaglukaner och arabinoxylaner), t.ex. sådana som innehåller mer än 60 % korn eller 30 % vete	Utan tidsbegränsning
			Slaktkalkoner	—	endo-1,3(4)-betaglukanas: 100 U endo-1,4-betaxylanas: 70 U	— —	1. I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges 2. Rekommenderad dos per kg helfoder: endo-1,3(4)-betaglukanas: 100 U endo-1,4-betaxylanas: 70 U 3. För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelsepolysackarider, (huvudsakligen betaglukaner och arabinoxylaner), t.ex. sådana som innehåller mer än 30 % korn eller 20 % vete	Utan tidsbegränsning

▼B

EG-nr	Tillsats	Kemisk formel och beskrivning	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg helfoder			
E 1613	Endo-1,4-betaxylanas EC 3.2.1.8	Preparat av endo-1,4-betaxylanas från *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W). Minsta aktivitet: Pulver: 70 000 IFP ([3])/g Flytande form: 7 000 IFP/ml	Slaktkalkoner	—	1 400 IFP	—	1. I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges 2. Rekommenderad dos/kg helfoder: 1 400 IFP 3. För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelsepolysackarider (huvudsakligen arabinoxylaner), t.ex. sådana som innehåller mer än 38 % vete.	Utan tidsbegränsning
▼M3								
———————								
———————								
———————								

▼B

([1]) 1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 5,55 mikromol reducerande sockerarter (maltosekvivalenter) från betaglukan från korn per minut vid pH 5,0 och 50 °C.
([2]) 1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 4,00 mikromol reducerande sockerarter (maltosekvivalenter) från xylan från björk per minut vid pH 5,5 och 50 °C.
([3]) 1 IFP motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (xylosekvivalenter) från xylan från havre per minut vid pH 4,8 och 50 °C.
([4]) ►M3 ——————— ◄
([5]) ►M3 ——————— ◄
([6]) ►M3 ——————— ◄
([7]) ►M3 ——————— ◄
([8]) ►M3 ——————— ◄