2025/1885

19.9.2025

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2025/1885 DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2025

octroyant une autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides dénommée «BPF-Propan-2-ol Dr Deppe» conformément au règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ([1]), et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le 29 juin 2016, la société Laboratorium Dr. Deppe GmbH a présenté à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (ci-après l'«Agence»), conformément à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 528/2012, une demande d'autorisation de l'Union pour une famille de produits biocides dénommée «BPF Propan-2-ol Dr Deppe», relevant du type de produits 1, décrit à l'annexe V dudit règlement, en fournissant une confirmation écrite que l'autorité compétente des Pays-Bas avait accepté d'évaluer la demande. La demande a été enregistrée sous le numéro BC-GH025503-55 dans le registre des produits biocides.

(2) La substance active contenue dans le «BPF Propan-2-ol Dr Deppe» est le propan-2-ol, qui figure sur la liste de l'Union des substances actives approuvées visée à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 528/2012 pour le type de produits 1.

(3) Le 27 mai 2024, conformément à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 528/2012, l'autorité compétente d'évaluation a transmis à l'Agence un rapport d'évaluation et les conclusions de son évaluation.

(4) Le 13 décembre 2024, conformément à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 528/2012, l'Agence a soumis à la Commission son avis ([2]), le projet de résumé des caractéristiques des produits biocides (ci-après le «RCP») appartenant à la famille de produits «BPF Propan-2-ol Dr Deppe» et le rapport final d'évaluation de cette famille de produits biocides.

(5) Dans cet avis, l'Agence conclut que la famille de produits «BPF Propan-2-ol Dr Deppe» répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l'article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) nº 528/2012, qu'elle peut faire l'objet d'une autorisation de l'Union conformément à l'article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, elle remplit les conditions fixées à l'article 19, paragraphe 6, dudit règlement.

(6) Le 8 janvier 2025, l'Agence a transmis à la Commission le projet de RCP dans toutes les langues officielles de l'Union, conformément à l'article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 528/2012.

(7) La Commission souscrit à l'avis de l'Agence et considère qu'il est dès lors approprié d'accorder une autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides dénommée «BPF Propan-2-ol Dr Deppe».

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

([1]) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Avis de l'Agence du 28 novembre 2024 concernant l'autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides «BPF Propan-2-ol Dr Deppe» (ECHA/BPC/454/2024), https://echa.europa.eu/fr/opinions-on-union-authorisation (en anglais uniquement).

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une autorisation de l'Union est accordée, sous le numéro EU-0033834-0000, à la société Laboratorium Dr. Deppe GmbH pour la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de la famille de produits biocides «BPF Propan-2-ol Dr Deppe» conformément au résumé des caractéristiques des produits biocides figurant en annexe.

L'autorisation de l'Union est valable du 9 octobre 2025 au 30 septembre 2035.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2025.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

ANNEXE

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT POUR UNE FAMILLE DE PRODUITS BIOCIDES

BPF Propan-2-ol Dr Deppe

Type(s) de produit

TP01: Hygiène humaine

Numéro d'autorisation: EU-0033834-0000

Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides: EU-0033834-0000

PARTIE I

PREMIER NIVEAU D'INFORMATION

Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1. **Nom de famille**

Nom	BPF Propan-2-ol Dr Deppe

1.2. **Type(s) de produit**

Type(s) de produit	TP01: Hygiène humaine

1.3. **Titulaire de l'autorisation**

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Laboratorium Dr. Deppe GmbH
	Adresse	Hooghe Weg 35 47906 Kempen DE
Numéro de l'autorisation	EU-0033834-0000	
Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides	EU-0033834-0000	
Date de l'autorisation	9 octobre 2025	
Date d'expiration de l'autorisation	30 septembre 2035	

1.4. **Fabricant(s) du produit**

Nom du fabricant	Laboratorium Dr. Deppe GmbH
Adresse du fabricant	Hooghe Weg 35 47906 Kempen Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Laboratorium Dr. Deppe GmbH site 1 Laboratorium Dr. Deppe GmbH, Hooghe Weg 35 47906 Kempen Allemagne Laboratorium Dr. Deppe GmbH site 2 Laboratorium Dr. Deppe GmbH, Am Selder 35 47906 Kempen Allemagne

1.5. **Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)**

Substance active	Propan-2-ol
Nom du fabricant	Brenntag GmbH
Adresse du fabricant	Stinnes-Platz 1 45472 Muelheim an der Ruhr Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Brenntag GmbH site 1 Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat 3196KK Rotterdam Pays-Bas Brenntag GmbH site 2 Exxon Mobil Chemical Plant, 4999 Scenic Highway LA 70805 Baton Rouge États-Unis d'Amérique

Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille**

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Propan-2-ol		Substance active	67-63-0	200-661-7	63,14-64 % (p/p)

2.2. **Type(s) de formulation**

Type(s) de formulation	AL Autre liquide XX: lingettes imprégnées de liquide, prêtes à l'emploi

PARTIE II

DEUXIÈME NIVEAU D'INFORMATION - MÉTA-RCP

Chapitre 1. MÉTA-RCP 1 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1. **Méta-RCP 1 identificateur**

Identificateur	Meta RCP: Meta RCP 1

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

Numéro	1-1

1.3. **Type(s) de produit**

Type(s) de produit	TP01: Hygiène humaine

Chapitre 2. COMPOSITION DU MÉTA-RCP 1

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 1**

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Propan-2-ol		Substance active	67-63-0	200-661-7	63,14-64 % (p/p)

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 1**

Type(s) de formulation	AL Autre liquide

Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1

Mentions de danger	H225: Liquide et vapeurs très inflammables. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence	P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P103: Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P233: Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P240: Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. P241: Utiliser du matériel électrique, de ventilation, d'éclairage antidéflagrant. P243: Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. P261: Éviter de respirer les vapeurs. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P304 + P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. P337 + P313: Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P370 + P378: En cas d'incendie: Utiliser du CO_2, du produit chimique sec ou de la mousse pour l'extinction.

	P403 + P235: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P405: Garder sous clef. P501: Éliminer le contenu dans conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.

Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP

4.1. Description de l'utilisation

Tableau 1

Utilisation n° 1.1 – Désinfectant hygiénique pour les mains, généralités – BP01

Type de produit	TP01: Hygiène humaine
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	s/o
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom commun: Bactéries Nom commun: Bactéries de la tuberculose Nom commun: Levures Nom commun: Virus enveloppés
Domaine(s) d'utilisation	Utilisation en intérieur Dans les hôpitaux et d'autres secteurs, si un niveau élevé d'hygiène des mains est nécessaire, par ex.: — Usage domestique — Zones de loisirs
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Désinfectant (hygiénique) pour les mains, distribution de liquide sur les mains Description détaillée: Le produit est prêt à l'emploi (RTU).
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Adultes et enfants à partir de 12 ans: 3 ml. La quantité de liquide doit correspondre à la taille d'une grande pièce de monnaie (Le nombre de pompes avec le système doseur équivalent à 3 ml du produit doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit). Enfants de moins de 12 ans: 1,5 ml (Le nombre de pompes avec le système doseur équivalent à 1,5 ml du produit doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit). RTU (PRÊT À L'EMPLOI) Nombre et fréquence des applications: Fréquence: Adultes et enfants à partir de 12 ans: jusqu'à 10 fois par jour Enfants de moins de 12 ans: jusqu'à 3 fois par jour
Catégorie(s) d'utilisateurs	Grand public (non professionnels)

Dimensions et matériaux d'emballage	— flacon de 1 000 ml — polyéthylène haute densité (PEHD) + bouchon à vis en polypropylène (PP) (avec et sans buse en polyéthylène basse densité (PEBD)) — flacon de 500 ml — PEHD + bouchon à vis en PP (avec et sans buse PEBD) — flacon de 250 ml — PEHD + capsule à vis en PP — flacon de 150 ml — PEHD + capsule à vis en PP — flacon de 100 ml — PEHD + capsule à vis en PP Abréviations: PEHD: polyéthylène haute densité PEBD: polyéthylène basse densité PP: polypropylène

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Le produit doit être utilisé sur des mains visiblement propres. Si les mains sont sales, les laver à l'eau et au savon, les rincer et les sécher avant d'appliquer le produit.

Le produit est prêt à l'emploi. Le produit sera soit appliqué directement ou utilisé dans un distributeur ou avec une pompe.

Étape 1: Appliquez la quantité suivante de désinfectant:

— Adultes et enfants à partir de 12 ans: 3 ml

— Enfants de moins de 12 ans: 1,5 ml

Frottez dans la paume de la main. Frottez les paumes l'une contre l'autre pour répandre le désinfectant sur l'ensemble des mains et des doigts.

Étape 2: Frottez le dos de votre main gauche avec la paume de votre main droite. Inversez et répétez l'action.

Étape 3: Ouvrez les doigts et frottez la pulpe des doigts. Inversez et répétez l'action.

Étape 4: Frottez paume contre paume avec les doigts entrecroisés (5 fois).

Étape 5: Frottez le pouce de chaque main en effectuant un mouvement de rotation.

Étape 6: Frottez l'extrémité des doigts contre la paume opposée en effectuant des mouvements circulaires. Frottez les poignets. Laissez les mains sécher complètement.

Maintenez humide pendant 30 secondes contre les bactéries, les levures, les bactéries de la tuberculose et les virus enveloppés.

Ne rincez pas.

Répétez l'opération si une nouvelle désinfection des mains est nécessaire.

Adultes et enfants à partir de 12 ans: jusqu'à 10 fois par jour

Enfants de moins de 12 ans: jusqu'à 3 fois par jour

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Utilisation pour les enfants (âgés d'au moins 1 an) uniquement sous la surveillance d'un adulte.

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 1.

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 1.

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 1.

4.2. **Description de l'utilisation**

Tableau 2

Utilisation nº 1.2 – Désinfectant hygiénique pour les mains, professionnel – BP01

Type de produit	TP01: Hygiène humaine
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	s/o
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom commun: Bactéries Nom commun: Bactéries de la tuberculose Nom commun: Levures Nom commun: Virus enveloppés
Domaine(s) d'utilisation	Utilisation en intérieur Dans les hôpitaux et d'autres secteurs, si un niveau élevé d'hygiène des mains est nécessaire, par ex.: — Usage domestique (soins à domicile, etc.); — Utilisation institutionnelle (recherche, etc.); — Applications industrielles, par ex. dans l'industrie alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, etc.; — Restaurants et cuisines industrielles de grande taille; — Zones de loisirs.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Désinfectant (hygiénique) pour les mains, distribution de liquide sur les mains Description détaillée: Le produit est prêt à l'emploi (RTU).
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Adulte: 3 ml. La quantité de liquide doit correspondre à la taille d'une grande pièce de monnaie (Le nombre de pompes avec le système doseur équivalent à 3 ml du produit doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit). RTU (PRÊT À L'EMPLOI) Nombre et fréquence des applications: Fréquence: Adulte: jusqu'à 25 fois par jour
Catégorie(s) d'utilisateurs	Professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	— bidon de 5 000 ml — PEHD + bouchon à vis en PEHD — flacon de 1 000 ml — PEHD + bouchon à vis en PP (avec et sans buse PEBD) — flacon de 500 ml — PEHD + bouchon à vis en PP (avec et sans buse PEBD) — flacon de 250 ml — PEHD + capsule à vis en PP — flacon de 150 ml — PEHD + capsule à vis en PP — flacon de 100 ml — PEHD + capsule à vis en PP

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Le produit doit être utilisé sur des mains visiblement propres. Si les mains sont sales, les laver à l'eau et au savon, les rincer et les sécher avant d'appliquer le produit.

Le produit est prêt à l'emploi. Le produit sera soit appliqué directement ou utilisé dans un distributeur ou avec une pompe.

Étape 1: Appliquez la quantité suivante de désinfectant:

— Adulte: 3 ml

Frottez dans la paume de la main. Frottez les paumes l'une contre l'autre pour répandre le désinfectant sur l'ensemble des mains et des doigts.

Étape 2: Frottez le dos de votre main gauche avec la paume de votre main droite. Inversez et répétez l'action.

Étape 3: Ouvrez les doigts et frottez la pulpe des doigts. Inversez et répétez l'action.

Étape 4: Frottez paume contre paume avec les doigts entrecroisés (5 fois).

Étape 5: Frottez le pouce de chaque main en effectuant un mouvement de rotation.

Étape 6: Frottez l'extrémité des doigts contre la paume opposée en effectuant des mouvements circulaires. Frottez les poignets. Laissez les mains sécher complètement.

Maintenez humide pendant 30 secondes contre les bactéries, les levures, les bactéries de la tuberculose et les virus enveloppés.

Ne rincez pas.

Répétez l'opération si une nouvelle désinfection des mains est nécessaire (Adulte: jusqu'à 25 fois par jour).

Veillez à ce que le produit appliqué soit complètement sec avant d'entrer dans une pièce ou une zone où des personnes resteront plus longtemps.

Le transfert du contenu d'emballages plus grands dans des récipients distributeurs, par ex., est possible dans la mesure où les exigences en matière d'hygiène pour les conditions ambiantes et les matériaux utilisés sont respectées et la contamination du produit peut être exclue en toute sécurité.

Le bidon doit être équipé d'un distributeur à pompe pour bidon ou d'une valve à bidon. Le plus petit récipient est équipé d'un entonnoir.

Tous les matériaux doivent être parfaitement compatibles avec le produit. Le distributeur ou le récipient qui est rechargé doit porter les informations minimales suivantes sur l'étiquette:

— Le numéro d'autorisation

— Le nom commercial du produit biocide

— L'identité et la concentration de chaque composant actif

— Le mode d'emploi, y compris le temps d'incorporation requis pour l'action biocide

— L'information selon le CLP

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 1.

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 1.

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 1.

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 1.

4.3. **Description de l'utilisation**

Tableau 3

Utilisation n° 1.3 – Désinfectant pour les mains de qualité chirurgicale – BP01

Type de produit	TP01: Hygiène humaine
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	s/o
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom commun: Bactéries Nom commun: Bactéries de la tuberculose Nom commun: Levures Nom commun: Virus enveloppés
Domaine(s) d'utilisation	Utilisation en intérieur Désinfectant pour les mains de qualité chirurgicale
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Désinfectant pour les mains (chirurgical), distribution de liquide sur les mains et les bras Description détaillée: Le produit est prêt à l'emploi (RTU).
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 6-12 ml pour un temps de contact de 90 secondes. RTU (PRÊT À L'EMPLOI) Nombre et fréquence des applications: Fréquence: jusqu'à 4 fois par jour.
Catégorie(s) d'utilisateurs	Professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	— bidon de 5 000 ml — PEHD + bouchon à vis en PEHD — flacon de 1 000 ml — PEHD + bouchon à vis en PP (avec et sans buse PEBD) — flacon de 500 ml — PEHD + bouchon à vis en PP (avec et sans buse PEBD) — flacon de 250 ml — PEHD + capsule à vis en PP — flacon de 150 ml — PEHD + capsule à vis en PP — flacon de 100 ml — PEHD + capsule à vis en PP

4.3.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Le produit doit être utilisé sur des mains et avant-bras visiblement propres. Si les mains sont sales, les laver à l'eau et au savon, les rincer et les sécher avant d'appliquer le produit.

Passer la solution non diluée sur la peau en frottant pendant 90 secondes pour maintenir humides les mains et avant-bras.

Utiliser une quantité suffisante de produit pour assurer une couverture complète pendant le temps de contact. Celle-ci peut varier en fonction de la taille de la main et de l'état de la peau.

Environ 6 à 12 ml sont nécessaires pour un temps de contact de 90 secondes.

Le remplissage/la décantation du produit ne doit se faire que dans des conditions aseptiques.

Le bidon doit être équipé d'un distributeur à pompe pour bidon ou d'une valve à bidon.

Le plus petit récipient est équipé d'un entonnoir.

Tous les matériaux doivent être parfaitement compatibles avec le produit.

Le distributeur ou le récipient qui est rechargé doit porter les informations minimales suivantes sur l'étiquette:

— Le numéro d'autorisation

— Le nom commercial du produit biocide

— L'identité et la concentration de chaque composant actif

— Le mode d'emploi, y compris le temps d'incorporation requis pour l'action biocide

— L'information selon le CLP

4.3.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 1.

4.3.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 1.

4.3.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 1.

4.3.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 1.

Chapitre 5. MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 1

5.1. **Consignes d'utilisation**

Voir les instructions spécifiques à chaque utilisation.

Respectez le mode d'emploi.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

Toutes les manipulations doivent avoir lieu dans des zones bien ventilées.

En cas de sécheresse cutanée, utilisez une lotion de soin appropriée.

Évitez le contact avec les yeux.

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

En cas d'incendie: Utiliser du CO_2, du produit chimique sec ou de la mousse pour éteindre le feu.

Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

Premiers soins:

EN CAS D'INHALATION: En cas de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Donnez à boire, si la personne exposée est en mesure d'avaler. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: En cas d'irritation, laver à l'eau et consulter un médecin. En cas d'exposition cutanée involontaire: lavez à l'eau.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincez à l'eau. Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et si c'est facile à faire. Poursuivez le rinçage pendant 5 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

À la fin du traitement, éliminez le produit non utilisé et l'emballage conformément aux exigences locales.

Code d'élimination des déchets: 070604

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Conserver hors de portée des enfants et des animaux/animaux de compagnie non ciblés.

Conservez à l'obscurité. Tenir au frais. Ne stockez pas à des températures supérieures à 35 °C.

Durée de conservation: 3 ans

Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS

Veuillez noter la valeur de référence européenne de 129,2 mg/m³; pour la substance active propan-2-ol (n° CAS: 67-63-0) qui a été utilisée pour l'évaluation des risques de la famille de produits biocides.

Les professionnels (y compris les professionnels de l'industrie) sont des professionnels formés si la législation nationale l'exige.

Chapitre 7. TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 1

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	OP Sept Color	Marché: UE
	Op Sept Blau	Marché: UE
	Teva Sept Skin poly-alkoholos bőrfertőtlenítő (színezett)	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0033834-0001 1-1	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Propan-2-ol		Substance active	67-63-0	200-661-7	63,14 % (p/p)

7.2. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	OP Sept residue-free	Marché: UE
	Curacid HD-sept	Marché: UE
	Manorapid pure	Marché: UE
	Op Sept pur	Marché: UE
	Op Sept pure	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0033834-0002 1-1	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Propan-2-ol		Substance active	67-63-0	200-661-7	63,14 % (p/p)

7.3. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	OP Sept Classic	Marché: UE
	Camed HD-Plus	Marché: UE
	Curacid Poly	Marché: UE
	Dezodent HW	Marché: UE
	Dr. Desi Händedesin-fektion	Marché: UE
	Kühn Händedesin-fektion	Marché: UE
	Kühn Händedesin-fektion	Marché: UE
	Maimed Clean	Marché: UE
	Manorapid Basic	Marché: UE
	Manorapid r.f.u.	Marché: UE
	Op Derm	Marché: UE
	Op Derm Medical	Marché: UE
	Op Sept	Marché: UE
	OPSept	Marché: UE
	OP-Sept	Marché: UE
	Septomed	Marché: UE
	Teva Sept Hand	Marché: UE
	Teva Sept Hand	Marché: UE
	Teva Sept Skin poly-alkoholos bőrfertőtlenítő és sebészi bemosakodó (színezetlen)	Marché: UE
	Alcoman	Marché: UE
	Alcoman +	Marché: UE
	Alcoman Optima	Marché: UE

	Alcoman Plus	Marché: UE
	Hand Antiseptic	Marché: UE
	Hand Disinfection	Marché: UE
	Hände Antiseptikum	Marché: UE
	Händedesin-fektion	Marché: UE
	MyClean IP-Sept	Marché: UE
	MyClean OP-Sept	Marché: UE
	Sicu Sept	Marché: UE
	Actoderm	Marché: UE
	OP Sept perfume-free	Marché: UE
	OpSeptClassic - parfumfrei	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0033834-0003 1-1	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Propan-2-ol		Substance active	67-63-0	200-661-7	63,14% (p/p)

Chapitre 1. MÉTA-RCP 2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1. **Méta-RCP 2 identificateur**

Identificateur	Meta RCP: Meta RCP 2

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

Numéro	1-2

1.3. **Type(s) de produit**

Type(s) de produit	TP01: Hygiène humaine

Chapitre 2. COMPOSITION DU MÉTA-RCP 2

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 2**

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Propan-2-ol		Substance active	67-63-0	200-661-7	63,14-64 % (p/p)

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 2**

Type(s) de formulation	XX: lingettes imprégnées de liquide, prêtes à l'emploi

Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 2

Mentions de danger	H225: Liquide et vapeurs très inflammables. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence	P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P103: Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P233: Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P240: Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. P241: Utiliser du matériel électrique, de ventilation, d'éclairage antidéflagrant. P243: Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. P261: Éviter de respirer les vapeurs. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P304 + P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. P337 + P313: Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

	P370 + P378: En cas d'incendie: Utiliser du CO_2, du produit chimique sec ou de la mousse pour l'extinction. P403 + P235: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P405: Garder sous clef. P501: Éliminer le contenu dans conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.

Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP

4.1. **Description de l'utilisation**

Tableau 1

Utilisation nº 2.1 – Désinfectant hygiénique pour les mains, généralités – BP02

Type de produit	TP01: Hygiène humaine
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	s/o
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom commun: Bactéries Nom commun: Bactéries de la tuberculose Nom commun: Levures Nom commun: Virus enveloppés
Domaine(s) d'utilisation	Utilisation en intérieur Dans les hôpitaux et d'autres secteurs, si un niveau élevé d'hygiène des mains est nécessaire, par ex.: — Usage domestique (soins à domicile, etc.); — Zones de loisirs.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Désinfectant (hygiénique) pour les mains, Essuyage Description détaillée: Lingettes prêtes à l'emploi (RTU).
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Une seule lingette suffit pour désinfecter les mains. Lingettes prêtes à l'emploi (RTU) Nombre et fréquence des applications: Fréquence: jusqu'à 9 lingettes par jour.
Catégorie(s) d'utilisateurs	Grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	Petites lingettes: Taille des paquets: 6 / 12 / 15 / 30 / 48 / 60 / 72 / ou 84 lingettes par paquet Volume total de biocide dans l'emballage: 51,38 / 102,75 / 128,44 / 256,88 /411,01 / 513,76 / 616,51 ou 719,26 ml Matériau de l'emballage: Feuille stratifiée en polyéthylène téréphtalate/aluminium/polyéthylène basse densité; (PET/Alu/PEBD) Matériau des lingettes: 100 % Lyocell (tissu blanc, fibre régénérée à partir de 100 % de cellulose de bois) Taille des lingettes: 20 × 15 cm Poids des lingettes: 1,5 g (par lingette) Poids du liquide d'imprégnation: 7,5 g (par lingette)

	Grandes lingettes: Taille des paquets: 30 / 42 / 60 / 80 ou 84 lingettes par paquet Volume total de biocide dans l'emballage: 513,76 / 719,26 / 1 027,51 / 1 370,02 ou 1 438,52 ml Matériau de l'emballage: Feuille laminée PET/Alu/PEBD Matériau des lingettes: 100 % Lyocell (tissu blanc, fibre régénérée à partir de 100 % de cellulose de bois) Taille des lingettes: 20 × 30 cm Poids des lingettes: 3 g (par lingette) Poids du liquide d'imprégnation: 15 g (par lingette)

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 2.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Utilisation pour les enfants (âgés d'au moins 1 an) uniquement sous la surveillance d'un adulte.

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 2.

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 2.

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 2.

4.2. **Description de l'utilisation**

Tableau 2

Utilisation nº 2.2 – Désinfectant hygiénique pour les mains, professionnel – BP02

Type de produit	TP01: Hygiène humaine
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	s/o
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom commun: Bactéries Nom commun: Bactéries de la tuberculose Nom commun: Levures Nom commun: Virus enveloppés
Domaine(s) d'utilisation	Utilisation en intérieur Dans les hôpitaux et d'autres secteurs, si un niveau élevé d'hygiène des mains est nécessaire, par ex.: — Usage domestique (soins à domicile, etc.); — Utilisation institutionnelle (recherche, etc.); — Applications industrielles, par ex. dans l'industrie alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, etc.; — Restaurants et cuisines industrielles de grande taille; — Zones de loisirs.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Désinfectant (hygiénique) pour les mains, Essuyage Description détaillée: Lingettes prêtes à l'emploi (RTU).

Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Une seule lingette suffit pour désinfecter les mains. Lingettes prêtes à l'emploi (RTU) Nombre et fréquence des applications: Fréquence: Normalement 25 applications par jour
Catégorie(s) d'utilisateurs	Professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Petites lingettes: Taille des paquets: 6 / 12 / 15 / 30 / 48 / 60 / 72 / ou 84 lingettes par paquet Volume total de biocide dans l'emballage: 51,38 / 102,75 / 128,44 / 256,88 /411,01 / 513,76 / 616,51 ou 719,26 ml Matériau de l'emballage: Feuille laminée PET/Alu/PEBD Matériau des lingettes: 100 % Lyocell (tissu blanc, fibre régénérée à partir de 100 % de cellulose de bois) Taille des lingettes: 20 × 15 cm Poids des lingettes: 1,5 g (par lingette) Poids du liquide d'imprégnation: 7,5 g (par lingette) Grandes lingettes: Taille des paquets: 30 / 42 / 60 / 80 ou 84 lingettes par paquet Volume total de biocide dans l'emballage: 513,76 / 719,26 / 1 027,51 / 1 370,02 ou 1 438,52 ml Matériau de l'emballage: Feuille laminée PET/Alu/PEBD Matériau des lingettes: 100 % Lyocell (tissu blanc, fibre régénérée à partir de 100 % de cellulose de bois) Taille des lingettes: 20 × 30 cm Poids des lingettes: 3 g (par lingette) Poids du liquide d'imprégnation: 15 g (par lingette)

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Veillez à ce que le produit appliqué soit complètement sec avant d'entrer dans une pièce ou une zone où des personnes resteront plus longtemps.

Voir les instructions générales d'utilisation de Méta RCP 2.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 2.

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 2.

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 2.

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 2.

Chapitre 5. MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 2

5.1. **Consignes d'utilisation**

Respectez le mode d'emploi.

Le produit doit être utilisé sur des mains visiblement propres. Si les mains sont sales, les laver à l'eau et au savon, les rincer et les sécher avant d'appliquer le produit.

Les lingettes sont prêtes à l'emploi. Seules les lingettes humides sont efficaces, les lingettes sèches doivent être jetées. Frottez les mains uniformément avec une lingette pendant 30 secondes pour maintenir les mains humides.

Veillez également à ce que tous les espaces entre les doigts, les angles des ongles et les plis de la peau soient complètement humidifiés pendant toute la durée de l'exposition.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

Toutes les manipulations doivent avoir lieu dans des zones bien ventilées.

Les lingettes usagées doivent être jetées dans un conteneur fermé.

En cas de sécheresse cutanée, utilisez une lotion de soin appropriée.

Évitez le contact avec les yeux.

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

En cas d'incendie: Utiliser du CO_2, du produit chimique sec ou de la mousse pour éteindre le feu.

Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

Conserver hors de portée des enfants et des animaux/animaux de compagnie non ciblés.

Premiers soins:

EN CAS D'INHALATION: Transportez la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. En cas de symptômes: Appelez le 112/une ambulance pour une assistance médicale. En l'absence de symptômes: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Informations destinées au personnel de santé/médecin: Prendre des mesures de réanimation si nécessaire, puis appeler un CENTRE ANTIPOISON.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: En cas d'irritation, laver à l'eau et consulter un médecin. En cas d'exposition cutanée involontaire: lavez à l'eau.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincez à l'eau. Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et si c'est facile à faire. Poursuivez le rinçage pendant 5 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

À la fin du traitement, éliminez le produit non utilisé et l'emballage conformément aux exigences locales

Code d'élimination des déchets: 070604

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Conserver hors de portée des enfants et des animaux/animaux de compagnie non ciblés.

Conservez à l'obscurité. Tenir au frais. Ne stockez pas à des températures supérieures à 40 °C.

Durée de conservation: 1 an

Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS

Veuillez noter la valeur de référence européenne de 129,2 mg/m³;pour la substance active propan-2-ol (n° CAS: 67-63-0) qui a été utilisée pour l'évaluation des risques de la famille de produits biocides.

Les professionnels (y compris les professionnels de l'industrie) sont des professionnels formés si la législation nationale l'exige.

Chapitre 7. TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 2

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	OPSept Medical	Marché: UE
	Alcohol Wipes	Marché: UE
	Alcoman Tücher	Marché: UE
	Alcoman Wipes	Marché: UE
	Chucky Wipes	Marché: UE
	Deppe Wipes	Marché: UE
	Desi Wipes	Marché: UE
	IP-Wipes	Marché: UE
	Op Sept Medical	Marché: UE
	Op Sept Wipes	Marché: UE
	OPSept medical perfume-free	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0033834-0004 1-2	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Propan-2-ol		Substance active	67-63-0	200-661-7	63,14 % (p/p)

Chapitre 1. MÉTA-RCP 3 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1. **Méta-RCP 3 identificateur**

Identificateur	Meta RCP: Meta RCP 3

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

Numéro	1-3

1.3. **Type(s) de produit**

Type(s) de produit	TP01: Hygiène humaine

Chapitre 2. COMPOSITION DU MÉTA-RCP 3

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 3**

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Propan-2-ol		Substance active	67-63-0	200-661-7	64-64 % (p/p)

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 3**

Type(s) de formulation	AL Autre liquide

Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 3

Mentions de danger	H225: Liquide et vapeurs très inflammables. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence	P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P103: Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P233: Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P240: Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. P241: Utiliser du matériel électrique, de ventilation, d'éclairage antidéflagrant. P243: Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. P261: Éviter de respirer les vapeurs. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P304 + P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

	P312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. P337 + P313: Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P370 + P378: En cas d'incendie: Utiliser du CO_2, du produit chimique sec ou de la mousse pour l'extinction. P403 + P235: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P405: Garder sous clef. P501: Éliminer le contenu dans conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.

Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP

4.1. **Description de l'utilisation**

Tableau 1

Utilisation nº 3.1 – Désinfectant hygiénique pour les mains, généralités – BP03

Type de produit	TP01: Hygiène humaine
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	s/o
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom commun: Bactéries Nom commun: Levures Nom commun: Virus enveloppés
Domaine(s) d'utilisation	Utilisation en intérieur Dans les hôpitaux et d'autres secteurs, si un niveau élevé d'hygiène des mains est nécessaire, par ex.: — Usage domestique (soins à domicile, etc.); — Zones de loisirs.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Désinfectant (hygiénique) pour les mains, répartition de gel sur les mains Description détaillée: Le produit est prêt à l'emploi (RTU).
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Adultes et enfants à partir de 12 ans: 3 ml. La quantité de gel doit correspondre à la taille d'une grande pièce de monnaie (Le nombre de pompes avec le système doseur équivalent à 3 ml du produit doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit). Enfants de moins de 12 ans: 1,5 ml (Le nombre de pompes avec le système doseur équivalent à 1.5 ml du produit doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit). RTU (PRÊT À L'EMPLOI) Nombre et fréquence des applications: Fréquence: Adultes et enfants à partir de 12 ans: jusqu'à 10 fois par jour Enfants de moins de 12 ans: jusqu'à 3 fois par jour
Catégorie(s) d'utilisateurs	Grand public (non professionnels)

Dimensions et matériaux d'emballage	— flacon de 1 000 ml — PEHD + bouchon à vis en PP (avec et sans buse PEBD) — flacon de 1 000 ml — PEHD + bouchon doseur en PP/PE — flacon de 500 ml — PEHD + bouchon à vis en PP (avec et sans buse PEBD) — flacon de 150 ml — PEHD + capsule à vis en PP — flacon de 100 ml — PEHD + capsule à vis en PP

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Le produit doit être utilisé sur des mains visiblement propres. Si les mains sont sales, les laver à l'eau et au savon, les rincer et les sécher avant d'appliquer le produit.

Le produit est prêt à l'emploi.

Étape 1: Appliquez la quantité suivante de désinfectant:

— Adultes et enfants à partir de 12 ans: 3 ml

— Enfant de moins de 12 ans: 1,5 ml

Frottez dans la paume de la main. Frottez les paumes l'une contre l'autre pour répandre le désinfectant sur l'ensemble des mains et des doigts.

Étape 2: Frottez le dos de votre main gauche avec la paume de votre main droite. Inversez et répétez l'action.

Étape 3: Ouvrez les doigts et frottez la pulpe des doigts. Inversez et répétez l'action.

Étape 4: Frottez paume contre paume avec les doigts entrecroisés (5 fois).

Étape 5: Frottez le pouce de chaque main en effectuant un mouvement de rotation.

Étape 6: Frottez l'extrémité des doigts contre la paume opposée en effectuant des mouvements circulaires. Frottez les poignets. Laissez les mains sécher complètement.

Maintenez humide pendant 30 secondes contre les bactéries, les levures et les virus enveloppés.

Ne rincez pas.

Répétez l'opération si une nouvelle désinfection des mains est nécessaire.

Adultes et enfants à partir de 12 ans: jusqu'à 10 fois par jour

Enfants de moins de 12 ans: jusqu'à 3 fois par jour

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Utilisation pour les enfants (âgés d'au moins 1 an) uniquement sous la surveillance d'un adulte.

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 3.

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 3.

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 3.

4.2. **Description de l'utilisation**

Tableau 2

Utilisation n° 3.2 – Désinfectant hygiénique pour les mains, professionnel – BP03

Type de produit	TP01: Hygiène humaine
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	s/o
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom commun: Bactéries Nom commun: Levures Nom commun: Virus enveloppés
Domaine(s) d'utilisation	Utilisation en intérieur Dans les hôpitaux et d'autres secteurs, si un niveau élevé d'hygiène des mains est nécessaire, par ex.: — Usage domestique (soins à domicile, etc.); — Utilisation institutionnelle (recherche, etc.); — Applications industrielles, par ex. dans l'industrie alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, etc.; — Restaurants et cuisines industrielles de grande taille; — Zones de loisirs.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Désinfectant (hygiénique) pour les mains, répartition de gel sur les mains Description détaillée: Le produit est prêt à l'emploi (RTU).
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Adulte: 3 ml. La quantité de gel doit correspondre à la taille d'une grande pièce de monnaie (Le nombre de pompes avec le système doseur équivalent à 3 ml du produit doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit). RTU (PRÊT À L'EMPLOI) Nombre et fréquence des applications: Fréquence: Adulte: Normalement 25 applications par jour.
Catégorie(s) d'utilisateurs	Professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	— flacon de 1 000 ml — PEHD + bouchon à vis en PP (avec et sans buse PEBD) — flacon de 1 000 ml — PEHD + bouchon doseur en PP/PE — flacon de 500 ml — PEHD + bouchon à vis en PP (avec et sans buse PEBD) — flacon de 150 ml — PEHD + capsule à vis en PP — flacon de 100 ml — PEHD+ capsule à vis en PP

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Le produit doit être utilisé sur des mains visiblement propres. Si les mains sont sales, les laver à l'eau et au savon, les rincer et les sécher avant d'appliquer le produit.

Le produit est prêt à l'emploi. Le produit sera soit appliqué directement ou utilisé dans un distributeur ou avec une pompe.

Étape 1: Appliquez la quantité suivante de désinfectant:

— Adulte: 3 ml

Frottez dans la paume de la main. Frottez les paumes l'une contre l'autre pour répandre le désinfectant sur l'ensemble des mains et des doigts.

Étape 2: Frottez le dos de votre main gauche avec la paume de votre main droite. Inversez et répétez l'action.

Étape 3: Ouvrez les doigts et frottez la pulpe des doigts. Inversez et répétez l'action.

Étape 4: Frottez paume contre paume avec les doigts entrecroisés (5 fois).

Étape 5: Frottez le pouce de chaque main en effectuant un mouvement de rotation.

Étape 6: Frottez l'extrémité des doigts contre la paume opposée en effectuant des mouvements circulaires. Frottez les poignets. Laissez les mains sécher complètement.

Maintenez humide pendant 30 secondes contre les bactéries, les levures et les virus enveloppés.

Ne rincez pas.

Répétez l'opération si une nouvelle désinfection des mains est nécessaire.

Veillez à ce que le produit appliqué soit complètement sec avant d'entrer dans une pièce ou une zone où des personnes resteront plus longtemps.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 3.

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 3.

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 3.

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général de Méta RCP 3.

Chapitre 5. MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 3

5.1. **Consignes d'utilisation**

Voir les instructions spécifiques à chaque utilisation.

Respectez le mode d'emploi.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

Toutes les manipulations doivent avoir lieu dans des zones bien ventilées.

En cas de sécheresse cutanée, utilisez une lotion de soin appropriée.

Évitez le contact avec les yeux.

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

En cas d'incendie: Utiliser du CO_2, du produit chimique sec ou de la mousse pour éteindre le feu.

Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

Premiers soins:

EN CAS D'INHALATION: Transportez la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. En cas de symptômes: Appelez le 112/une ambulance pour une assistance médicale. En l'absence de symptômes: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Informations destinées au personnel de santé/médecin: Prendre des mesures de réanimation si nécessaire, puis appeler un CENTRE ANTIPOISON.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: En cas d'irritation, laver à l'eau et consulter un médecin. En cas d'exposition cutanée involontaire: lavez à l'eau.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincez à l'eau. Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et si c'est facile à faire. Poursuivez le rinçage pendant 5 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

À la fin du traitement, éliminez le produit non utilisé et l'emballage conformément aux exigences locales

Code d'élimination des déchets: 070604

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Conserver hors de portée des enfants et des animaux/animaux de compagnie non ciblés.

Conservez à l'obscurité. Tenir au frais. Ne stockez pas à des températures supérieures à 35 °C.

Durée de conservation: 3 ans

Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS

Veuillez noter la valeur de référence européenne de 129,2 mg/m³; pour la substance active propan-2-ol (n° CAS: 67-63-0) qui a été utilisée pour l'évaluation des risques de la famille de produits biocides.

Les professionnels (y compris les professionnels de l'industrie) sont des professionnels formés si la législation nationale l'exige.

Chapitre 7. TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 3

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	Lotio Sept Gel	Marché: UE
	Alco Gel	Marché: UE
	Care Sept Gel	Marché: UE
	Lotio-Sept-Gel	Marché: UE
	Manorapid gel	Marché: UE
	Op Sept Gel	Marché: UE
	SeptoMed Gel	Marché: UE
	Sicu Gel	Marché: UE
	Sicu Sept Gel	Marché: UE
	Teva Lotio Sept Gel	Marché: UE

	Tork Alcohol Gel	Marché: UE
	Alcohol Gel	Marché: UE
	Alcoman-Gel	Marché: UE
	Alkohol Gel	Marché: UE
	antiseptic gel	Marché: UE
	Deppe Gel	Marché: UE
	Desinfektions-gel	Marché: UE
	desinfizieren-des Handgel	Marché: UE
	Händedesin-fektionsgel	Marché: UE
	Handgel	Marché: UE
	Hygienegel	Marché: UE
	Hygienic Hand Gel	Marché: UE
	Actoderm Gel	Marché: UE
	Lotio Sept Gel perfume-free	Marché: UE
	Lotio Sept Gel pur	Marché: UE
	Lotio Sept Gel pure	Marché: UE
	Manorapid gel pure	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0033834-0005 1-3	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Propan-2-ol		Substance active	67-63-0	200-661-7	64 % (p/p)

7.2. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	Lotio Sept Gel Color	Marché: UE
	Lotio Sept Gel blau	Marché: UE
	Lotio Sept Gel blue	Marché: UE
	OP Sept Gel Color	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0033834-0006 1-3	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Propan-2-ol		Substance active	67-63-0	200-661-7	64 % (p/p)