II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

EERSTE RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE

van 18 april 1978

tot wijziging van de bijlagen van Richtlijn 66/401/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen

(78/386/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 78/55/EEG (2) en met name op artikel 21 bis,

Overwegende dat in verband met de ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische kennis de bijlagen I, II en III van genoemde richtlijn om de hieronder vermelde redenen dienen te worden gewijzigd;

Overwegende dat het voor bepaalde soorten dienstig is raszuiverheidsnormen ten aanzien van het gewas vast te stellen ten einde de genetische waarde van het zaaizaad te verbeteren;

Overwegende dat het in dit opzicht dienstig is voor autogame soorten en voor van één kloon afkomstige apomictische rassen van Poa-soorten ten aanzien van de raszuiverheid voorwaarden vast te stellen waaraan het zaaizaad moet voldoen;

Overwegende dat het dienstig is eisen aan het gewas te stellen met betrekking tot schadelijke organismen die de gebruikswaarde van het zaaizaad verminderen;

Overwegende dat het dienstig is bijzondere normen vast te stellen voor het maximumgehalte, niet alleen aan Rumex crispus en Rumex obtusifolius, maar ook aan andere ongewenste of schadelijke zaden zoals Agropyron repens, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Melilotus-soorten, Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum of andere Rumex-soorten dan Rumex acetosella;

Overwegende dat de normen ten aanzien van de minimumkiemkracht en de minimum mechanische zuiverheid moeten worden aangepast in het licht van de ontwikkeling van normaal verkregen zaaizaadkwaliteiten;

Overwegende dat sommige bepalingen moeten worden aangepast aan de geldende internationale methoden met betrekking tot het officiële onderzoek van zaaizaad;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

(1) PB nr. 125 van 11. 7. 1966, blz. 2298/66.
(2) PB nr. L 16 van 20. 1. 1978, blz. 23.

Artikel 1

Richtlijn 66/401/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. Bijlage I wordt gelezen:

„BIJLAGE I

VOORWAARDEN WAARAAN HET GEWAS MOET VOLDOEN

1. Op het perceel mag geen voorvrucht zijn verbouwd die zich niet verdraagt met de produktie van zaaizaad van de soort en het ras van het betrokken gewas. Het perceel moet ook voldoende vrij zijn van opslag van de voorvrucht.

2. Het gewas moet voldoen aan de onderstaande normen betreffende de afstand tot dicht in de buurt gelegen bestuivingsbronnen die tot ongewenste kruisbestuiving kunnen leiden:

Gewas	Minimum-afstand
1	2
Brassica-soorten	
— voor de produktie van basiszaad	400 m
— voor de produktie van gecertificeerd zaad	200 m
Andere soorten of rassen dan: Brassica-soorten, Pisum arvense, van één kloon afkomstige apomictische rassen van Poa-soorten	
— voor de produktie van zaad voor de vermeerdering, percelen tot 2 ha	200 m
— voor de produktie van zaad voor de vermeerdering, percelen groter dan 2 ha	100 m
— voor de produktie van zaad bestemd voor de voortbrenging van groenvoedergewassen, percelen tot 2 ha	100 m
— voor de produktie van zaad bestemd voor de voortbrenging van groenvoedergewassen, percelen groter dan 2 ha	50 m

Deze afstanden behoeven niet in acht te worden genomen wanneer er voldoende bescherming tegen ongewenste kruisbestuiving aanwezig is.

3. Planten van andere soorten, waarvan de zaden in het laboratorium moeilijk te onderscheiden zijn van het gewas, mogen slechts in geringe mate aanwezig zijn.

In het bijzonder moeten gewassen van de Loeium-soorten aan de volgende voorwaarden voldoen: het aantal planten van een andere Loeium-soort dan het gewas mag niet meer bedragen dan:

— 1 per 50 m² voor de produktie van basiszaad,

— 1 per 10 m² voor de produktie van gecertificeerd zaad.

4. Het gewas moet voldoende rasecht en raszuiver zijn. In het bijzonder gewassen van andere soorten of rassen dan Pisum arvense of van één kloon afkomstige apomictische rassen van Poa-soorten moeten aan de volgende eisen voldoen: het aantal planten van deze soorten die duidelijk niet tot het betrokken ras behoren, mag niet meer bedragen dan:

   — 1 per 30 m^2 voor de produktie van basiszaad,

   — 1 per 10 m^2 voor de produktie van gecertificeerd zaad.

5. De aanwezigheid van schadelijke organismen die de gebruikswaarden van het zaaizaad verminderen, moet zoveel mogelijk beperkt zijn.

6. Of aan de bovengenoemde normen of eisen is voldaan, wordt vastgesteld door middel van officiële veldkeuringen.

   Bij deze veldkeuringen moeten de volgende punten in acht worden genomen:

   A. De stand en het ontwikkelingsstadium van het gewas moeten een afdoend onderzoek mogelijk maken.

   B. Er moet ten minste één veldkeuring plaatsvinden.

   C. De grootte, het aantal en de verdeling van de perceelstukken, waarvoor moet worden nagegaan of aan de bepalingen van deze bijlage wordt voldaan, moeten volgens daarvoor passende methoden worden vastgesteld.".

2. Bijlage II wordt gelezen:

„BIJLAGE II

VOORWAARDEN WAARAAN ZAAIZAAD MOET VOLDOEN

I. GECERTIFICEERD ZAAD

1. Het zaad moet voldoende rasecht en raszuiver zijn.

   In het bijzonder moet zaad van Pisum arvense en van één kloon afkomstige apomictische rassen van Poa-soorten, overeenkomstig de onderstaande normen of eisen voor ten minste 98 % raszuiver zijn. Of aan de minimumeisen inzake raszuiverheid is voldaan, wordt hoofdzakelijk nagegaan door middel van de in bijlage I omschreven veldkeuringen.

2. Het zaaizaad moet ten aanzien van kiemkracht, mechanische zuiverheid en gehalte aan zaden en andere plantesoorten (inclusief Lupinezaden van een andere kleur en zaden van bitterstofhoudende lupinen) aan de volgende normen of eisen voldoen:

   A. Tabel:

Soort	Kiemkracht		Mechanische zuiverheid			
	Minimum-kiemkracht (% zuiver zaad)	Maximum-bestanddeel hardschalige zaden (% zuiver zaad)	Minimum mechanische zuiverheid (% van het gewicht)	Maximumgehalte aan zaden van andere plantesoorten (% v/h gewicht)		
				totaal	van een enkele soort	Agropyron repens
1	2	3	4	5	6	7
GRAMINEAE						
Agrostis canina ssp. canina	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis gigantea	80 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis stolonifera	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis tenuis	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Alopecurus pratensis	70 (a)		75	2,5	1,0	0,3
Arrhenatherum elatius	75 (a)		90	3,0	1,0 (f)	0,5
Dactylis glomerata	80 (a)		90	1,5	1,0	0,3
Festuca arundinacea	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5
Festuca ovina	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5
Festuca pratensis	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5
Festuca rubra	75 (a)		90	1,5	1,0	0,5
Lolium multiflorum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Lolium perenne	80 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Lolium x hybridum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Phleum bertolonii	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3
Phleum pratense	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3
Poa annua	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa nemoralis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa palustris	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa pratensis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa trivialis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Trisetum flavescens	70 (a)		75	3,0	1,0 (f)	0,3
LEGUMINOSAE						
Hedysarum coronarium	75 (a) (b)	30	95	2,5	1,0	
Lotus corniculatus	75 (a) (b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)	
Lupinus albus	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
Lupinus angustifolius	75 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
Lupinus luteus	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
Medicago lupulina	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Medicago sativa	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
Medicago varia	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
Onobrychis sativa	75 (a) (b)	20	95	2,5	1,0	
Pisum arvense	80 (a)		98	0,5	0,3	
Trifolium alexandrinum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium hybridum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium incarnatum	75 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium pratense	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium repens	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
Trifolium resupinatum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trigonella foenumgraecum	80 (a)		95	1,0	0,5	
Vicia faba ssp. var. equina	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3	
Vicia faba var. minor	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3	
Vicia pannonica	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
Vicia sativa	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
Vicia villosa	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
ANDERE SOORTEN						
Brassica napus var. napobrassica	80 (a)		98	1,0	0,5	
Brassica oleracea convar. acephala	75 (a)		98	1,0	0,5	
Raphanus sativus ssp. oleifera	80 (a)		97	1,0	0,5	

Mechanische zuiverheid				Maximumgehalte aan zaden van andere plantesoorten in monster, waarvan het gewicht is aangegeven in bijlage II, kolom 4 (totaal per kolom)			Eisen aangaande het gehalte aan lupinezaden met een andere kleur en van bittere lupinezaden
Maximumgehalte aan zaden van andere plantesoorten (% v/h gewicht)							
Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. ander dan Rumex acetosella	
8	9	10	11	12	13	14	15
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0 (g)	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (k)	5	
0,3				0	0 (k)	5	
0,3				0	0 (j) (k)	5	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0 (h)	0 (j) (k)	2	
	0,3			0	0 (k)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (j)	20	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (j)	20	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
		0,3	0,3	0	0 (j) (k)	20	
		0,3	0,3	0	0 (j) (k)	20	
		0,3	0,3	0	0 (j)	20	

B. Normen of andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan, wanneer daarnaar wordt verwezen in de onder punt I 2 A van deze bijlage opgenomen tabel:

a) Alle na voorbehandeling niet gekiemde verse en gezonde zaden worden beschouwd als gekiemde zaden.

b) Hardschalige zaden worden voor zover zij het aangegeven maximumpercentage niet overschrijden, meegeteld als kiemkrachtige zaden.

c) Een maximum gewichtspercentage van 0,8 aan zaden van andere Poa-soorten geldt niet als onzuiverheid.

d) Een maximum gewichtspercentage van 1 aan zaden van Trifolium pratense geldt niet als onzuiverheid.

e) Een maximum gewichtspercentage van 0,5 aan zaden van Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum arvense, Vicia faba-soorten, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa in een van de andere genoemde soorten geldt niet als onzuiverheid.

f) Het voorgeschreven maximum gewichtspercentage aan zaden van één enkele soort geldt niet voor zaden van Poa-soorten.

g) De aanwezigheid van maximaal twee zaden van Avena fatua, Avena ludoviciana of Avena sterilis in een monster van de voorgeschreven grootte geldt niet als onzuiverheid, wanneer een tweede monster van dezelfde grootte volledig vrij is van zaden van deze soorten.

h) De aanwezigheid van één zaad van Avena fatua, Avena ludoviciana of Avena sterilis in een monster van de voorgeschreven grootte geldt niet als onzuiverheid, wanneer een tweede monster van tweemaal de voorgeschreven grootte volledig vrij is van zaden van deze soorten.

i) Het aantal zaden van Avena fatua, Avena ludoviciana of Avena sterilis wordt slechts bepaald indien er twijfel bestaat of aan de in kolom 12 vastgestelde eisen is voldaan.

j) Het aantal zaden van Cuscuta-soorten wordt slechts bepaald indien er twijfel over bestaat of aan de in kolom 13 vastgestelde eisen is voldaan.

k) De aanwezigheid van één zaad van Cuscuta-soorten in een monster van de voorgeschreven grootte geldt niet als onzuiverheid, indien een tweede monster van dezelfde grootte volledig vrij is van zaden van Cuscuta-soorten.

l) Om het aantal zaden van Cuscuta-soorten te bepalen moet het monster tweemaal zo groot zijn als de in kolom 4 van bijlage III voor deze soort aangegeven grootte.

m) De aanwezigheid van één zaad van Cuscuta-soorten in een monster van de voorgeschreven grootte geldt niet als onzuiverheid, indien een tweede monster van tweemaal de voorgeschreven grootte volledig vrij is van zaden van Cuscuta-soorten.

n) Het aantal zaden van andere Rumex-soorten dan Rumex acetosella wordt slechts bepaald indien er twijfel over bestaat of aan de in kolom 14 vastgestelde eisen is voldaan.

o) Het percentage van het aantal lupinezaden van een andere kleur mag niet meer bedragen dan:

— 2 in bitterstofhoudende lupinen,

— 1 in andere dan bitterstofhoudende lupinen.

p) Het percentage van het aantal zaden van bitterstofhoudende lupinen in andere rassen dan bitterstofhoudende lupinen mag niet meer bedragen dan:

— 3 voor gecertificeerd zaad van de eerste vermeerdering,

— 5 voor gecertificeerd zaad van de daaropvolgende vermeerderingen.

3. De aanwezigheid van schadelijke organismen die de gebruikswaarde van het zaaizaad verminderen, moet zoveel mogelijk beperkt zijn.

II. BASISZAAD

Voor basiszaad gelden de voorwaarden van deel I van deze bijlage, tenzij hieronder anders is bepaald:

1. Zaad van Pisum arvense en van één kloon afkomstige apomictische rassen van Poasoorten moet, overeenkomstig de onderstaande normen of eisen, voor ten minste 99,7 % raszuiver zijn. Of aan de minimumeisen inzake raszuiverheid is voldaan, wordt hoofdzakelijk nagegaan door middel van de in bijlage I omschreven veldkeuringen.

2. Het zaad moet aan de volgende normen of andere eisen voldoen.

A. Tabel:

Soorten	Maximumgehalte aan zaden van andere plantesoorten							Overige normen of eisen
	Totaal (% van het gewicht)	Aantallen in een monster waarvan het gewicht is aangegeven in bijlage III, kolom 4 (totaal per kolom)						
		van één enkele soort	Rumex spp. ander dan Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.		
1	2	3	4	5	6	7		8
GRAMINEAE								
Agrostis canina ssp. canina	0,3	20	1	1	1			(j)
Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1			(j)
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1			(j)
Agrostis tenuis	0,3	20	1	1	1			(j)
Alopecurus pratensis	0,3	20 (a)	5	5	5			(j)
Arrhenatherum elatius	0,3	20 (a)	5	5	5			(i) (j)
Dactylis glomerata	0,3	20 (a)	5	5	5			(j)
Festuca arundinacea	0,3	20 (a)	5	5	5			(j)
Festuca ovina	0,3	20 (a)	5	5	5			(j)
Festuca pratensis	0,3	20 (a)	5	5	5			(j)
Festuca rubra	0,3	20 (a)	5	5	5			(j)
Lolium multiflorum	0,3	20 (a)	5	5	5			(j)
Lolium perenne	0,3	20 (a)	5	5	5			(j)
Lolium x hybridum	0,3	20 (a)	5	5	5			(j)
Phleum bertolonii	0,3	20	2	1	1			(j)
Phleum pratense	0,3	20	2	1	1			(j)
Poa annua	0,3	20 (b)	1	1	1		(f)	(j)
Poa nemoralis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f)	(j)
Poa palustris	0,3	20 (b)	1	1	1		(f)	(j)
Poa pratensis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f)	(j)
Poa trivialis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f)	(j)
Trisetum flavescens	0,3	20 (c)	1	1	1			(i) (j)

Soorten	Totaal (% van het gewicht)	Maximumgehalte aan zaden van andere plantesoorten: Aantallen in een monster, waarvan het gewicht is aangegeven in bijlage III, kolom 4 (totaal per kolom)					Overige normen of eisen
		van één enkele soort	Rumex spp. ander dan Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
LEGUMINOSAE							
Hedysarum coronarium	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Lotus corniculatus	0,3	20	5			0 (e)	(g) (j)
Lupinus albus	0,3	20	5			0 (d)	(h) (k)
Lupinus angustifolius	0,3	20	5			0 (d)	(h) (k)
Lupinus luteus	0,3	20	5			0 (d)	(h) (k)
Medicago lupulina	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Medicago sativa	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Medicago varia	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Onobrychis sativa	0,3	20	5			0 (d)	
Pisum arvense	0,3	20	5			0 (d)	
Trifolium alexandrinum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium hybridum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium incarnatum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium pratense	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium repens	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium resupinatum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trigonella foenumgraecum	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia faba ssp. var. equina	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia faba var. minor	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia pannonica	0,3	20	5			0 (d)	(h)
Vicia sativa	0,3	20	5			0 (d)	(h)
Vicia villosa	0,3	20	5			0 (d)	(h)
ANDERE SOORTEN							
Brassica napus var. napobrassica	0,3	20	5				(j)
Brassica oleracea convar. acephala	0,3	20	5				(i)
Raphanus sativus ssp. oleifera	0,3	20	5				

B. Normen of andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan, wanneer daarnaar wordt verwezen in de onder punt II 2 A van deze bijlage opgenomen tabel:

a) De aanwezigheid van maximaal 80 zaden van Poa-soorten geldt niet als onzuiverheid.

b) De in kolom 3 vastgestelde eis is niet van toepassing op zaaizaad van Poa-soorten. Het totale maximale aantal zaden van de andere Poa-soorten dan de soort die onderzocht wordt mag niet meer dan 1 bedragen in een monster van 500 zaden.

c) De aanwezigheid van maximaal 20 zaden van Poa-soorten geldt niet als onzuiverheid.

d) Het aantal zaden van Melilotus-soorten wordt slechts bepaald indien er twijfel over bestaat of aan de in kolom 7 vastgestelde eisen is voldaan.

e) De aanwezigheid van één zaad van Melilotus-soorten in een monster van de voorgeschreven grootte geldt niet als onzuiverheid, indien een tweede monster van tweemaal de voorgeschreven grootte volledig vrij is van zaden van Melilotus-soorten.

f) Voorwaarde c) in punt 2 van deel I van deze bijlage is niet van toepassing.

g) Voorwaarde d) in punt 2 van deel I van deze bijlage is niet van toepassing.

h) Voorwaarde e) in punt 2 van deel I van deze bijlage is niet van toepassing.

i) Voorwaarde f) in punt 2 van deel I van deze bijlage is niet van toepassing.

j) Voorwaarde k) en voorwaarde m) in punt 2 van deel I van deze bijlage zijn niet van toepassing.

k) Het percentage van het aantal zaden van bitterstofhoudende lupinen in andere dan bitterstofhoudende lupinen mag niet meer bedragen dan 1.

III. HANDELSZAAD

Voor handelszaad gelden de voorwaarden van deel I, punt 2 en punt 3 van deze bijlage, tenzij hieronder anders is bepaald:

1. De gewichtspercentages van kolom 5 en kolom 6 van de in deel I, sub 2 A, van deze bijlage opgenomen tabel worden met 1 verhoogd.

2. Voor Poa annua geldt een gewichtspercentage van maximaal 10 aan zaden van andere Poa-soorten niet als onzuiverheid.

3. Voor andere Poa-soorten dan Poa annua geldt een gewichtspercentage van maximaal 3 aan zaden van andere Poa-soorten niet als onzuiverheid.

4. Voor Hedysarum coronarium geldt een gewichtspercentage van maximaal 1 aan zaden van Melilotussoorten niet als onzuiverheid.

5. Voorwaarde d) ten aanzien van Lotus corniculatus in punt 2 van deel I van deze bijlage, is niet van toepassing.

6. Voor Lupinus-soorten:

   a) bedraagt de minimum mechanische zuiverheid 97 gewichtspercenten;

   b) mag het percentage van het aantal lupinezaden van een andere kleur niet meer bedragen dan:
      — 4 in bitterstofhoudende lupinen,
      — 2 in andere dan bitterstofhoudende lupinen;

   c) mag het percentage van het aantal zaden van bitterstofhoudende lupinen in andere dan bitterstofhoudende lupinen niet meer bedragen dan 5."

7. Voor Vicia spp. geldt een gewichtspercentage van maximaal 6 aan zaden van Vicia pannonica, Vicia villosa of aanverwante cultuursoorten in één van de andere genoemde soorten niet als onzuiverheid.

8. Voor Vicia pannonica, Vicia sativa en Vicia villosa bedraagt de minimum mechanische zuiverheid 97 gewichtspercenten.".

3. Bijlage III wordt gelezen:

„BIJLAGE III

GEWICHT VAN EEN PARTIJ ZAAIZAAD EN VAN EEN MONSTER

Soorten	Maximumgewicht van een partij (in tonnen)	Minimumgewicht van een monster van een partij (in grammen)	Gewicht van het monster voor de bepaling van aantallen, als voorzien in bijlage II, I, 2 A kolommen 12-14 en in bijlage II, II, 2A kolommen 3-7 (in grammen)
1	2	3	4
GRAMINEAE			
Agrostis canina ssp. canina	10	50	5
Agrostis gigantea	10	50	5
Agrostis stolonifera	10	50	5
Agrostis tenuis	10	50	5
Alopecurus pratensis	10	100	30
Arrhenatherum elatius	10	200	80
Dactylis glomerata	10	100	30
Festuca arundinacea	10	100	50
Festuca ovina	10	100	30
Festuca pratensis	10	100	50
Festuca rubra	10	100	30
Lolium multiflorum	10	200	60
Lolium perenne	10	200	60
Lolium x hybridum	10	200	60
Phleum bertolonii	10	50	10
Phleum pratense	10	50	10
Poa annua	10	50	10
Poa nemoralis	10	50	5
Poa palustris	10	50	5
Poa pratensis	10	50	5
Poa trivialis	10	50	5
Trisetum flavescens	10	50	5

Soorten	Maximum-gewicht van een partij (in tonnen)	Minimum-gewicht van een monster van een partij (in grammen)	Gewicht van het monster voor de bepaling van aantallen, als voorzien in bijlage II, I, 2 A kolommen 12-14 en in bijlage II, II, 2A kolommen 3-7 (in grammen)
1	2	3	4
LEGUMINOSAE			
Hedysarum coronarium			
— fruit	10	1 000	300
— seed	10	400	120
Lotus corniculatus	10	200	30
Lupinus albus	20	1 000	1 000
Lupinus angustifolius	20	1 000	1 000
Lupinus luteus	20	1 000	1 000
Medicago lupulina	10	300	50
Medicago sativa	10	300	50
Medicago varia	10	300	50
Onobrychis sativa			
— fruit	10	600	600
— seed	10	400	400
Pisum arvense	20	1 000	1 000
Trifolium alexandrinum	10	400	60
Trifolium hybridum	10	200	20
Trifolium incarnatum	10	500	80
Trifolium pratense	10	300	50
Trifolium repens	10	200	20
Trifolium resupinatum	10	200	20
Trigonella foenumgraecum	10	500	450
Vicia faba ssp. var. equina	20	1 000	1 000
Vicia faba var. minor	20	1 000	1 000
Vicia pannonica	20	1 000	1 000
Vicia sativa	20	1 000	1 000
Vicia villosa	20	1 000	1 000
ANDERE SOORTEN			
Brassica napus var. napobrassica	10	200	100
Brassica oleracea convar. acephala	10	200	100
Raphanus sativus ssp. oleifera	10	300	300

Artikel 2

1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om:

— op 1 januari 1981 te voldoen aan de bepalingen van artikel 1, lid 1, met betrekking tot bijlage I, punt 3 en 4, en artikel 1, lid 2, met betrekking tot bijlage II, deel I, punt 1, en van bijlage II, deel II, punt 1,

— uiterlijk 1 juli 1980 te voldoen aan de overige bepalingen van deze richtlijn.

2. De Lid-Staten zien erop toe dat de toepassing van deze richtlijn op verschillende tijdstippen ingevolge het bepaalde in lid 1, tweede streepje, geen aanleiding geeft tot handelsbeperkingen ten aanzien van zaaizaad van groenvoedergewassen.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 18 april 1978.

Voor de Commissie
De Vice-Voorzitter
Finn GUNDELACH