31978L0386

25.4.1978 *ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ* L 113/1

PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE
ze dne 18. dubna 1978,
kterou se mění přílohy směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh

(78/386/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh ([1]), naposledy pozměněnou směrnicí 78/55/EHS ([2]), a zejména na článek 21a uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že v důsledku vývoje vědeckých a technických poznatků by měly být z níže uvedených důvodů změněny přílohy I, II a III uvedené směrnice;

vzhledem k tomu, že za účelem zlepšení genetické hodnoty osiva by měly být stanoveny normy odrůdové čistoty, které musí splňovat množitelský porost u některých druhů;

vzhledem k tomu, že v tomto ohledu by v případě osiva samosprašných druhů a apomikčních jednoklonných odrůd rodu *Poa* měly být stanoveny normy minimální odrůdové čistoty, které musí osivo splňovat;

vzhledem k tomu, že by měly být stanoveny požadavky na množitelský porost, pokud jde o přítomnost škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu osiva;

vzhledem k tomu, že by měly být stanoveny zvláštní normy pro nejvyšší povolený výskyt dalších nežádoucích nebo škodlivých semen, jako jsou *Agropyron repens*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis*, rod *Melilotus*, *Sinapis arvensis*, *Raphanus raphanistrum* nebo rod *Rumex*, s výjimkou *Rumex acetosella*, *Rumex crispus* a *Rumex obtusifolius*;

vzhledem k tomu, že se jeví nezbytným změnit normy týkající se minimální klíčivosti a minimální technické čistoty vzhledem k vývoji běžně dosahované kvality osiva;

vzhledem k tomu, že by měla být změněna některá opatření, aby bylo vyhověno požadavkům úředních zkoušek osiva prováděných podle obvyklých mezinárodních metod;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

([1]) Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66.
([2]) Úř. věst. L 16, 20.1.1978, s. 23.

Článek 1

Směrnice 66/401/EHS se mění takto:

1. Příloha I se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

POŽADAVKY NA MNOŽITELSKÝ POROST

1. Předchozí porosty na množitelské ploše byly slučitelné s produkcí osiva druhu a odrůdy daného porostu a plocha je dostatečně prosta rostlin, jež vzešly z předchozích porostů.

2. Porost splňuje následující normy, pokud jde o vzdálenost od sousedních zdrojů pylu, které mohou vést k nežádoucímu cizosprášení:

Množitelský porost	Vzdálenost nejméně
1	2
Rod *Brassica*:	
— k produkci základního osiva	400 m
— k produkci certifikovaného osiva	200 m
Druhy a odrůdy jiné než rod *Brassica*, *Pisum arvense* a apomikční jednoklonné odrůdy druhů rodu *Poa*:	
— k produkci základního osiva určeného k množení, množitelský porost do 2 ha	200 m
— k produkci základního osiva určeného k množení, množitelský porost přes 2 ha	100 m
— k produkci základního osiva určeného k produkci pícnin, množitelský porost do 2 ha	100 m
— k produkci základního osiva určeného k produkci pícnin, množitelský porost přes 2 ha	50 m

Tyto vzdálenosti nemusí být dodrženy, pokud existuje dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

3. Výskyt rostlin ostatních druhů, jejichž semena se při laboratorní analýze obtížně rozlišují od osiva plodin, je přípustný pouze v omezené míře.

Porosty druhů rodu *Lolium* vyhovují zejména těmto požadavkům: počet rostlin určitého druhu rodu *Lolium*, které nejsou shodné s odrůdou porostu, nepřekračuje:

— jednu na 50 m^2 pro produkci základního osiva,

— jednu na 10 m^2pro produkci certifikovaného osiva.

4. Množitelský porost vykazuje dostatečnou odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu. Množitelské porosty jiných druhů nebo odrůd než *Pisum arvense* nebo apomikční jednoklonné odrůdy druhů rodu *Poa* vyhovují zejména těmto požadavkům: počet rostlin množitelského porostu, které lze rozpoznat jako zjevně neshodné s danou odrůdou, nepřekračuje:

— jednu na 30 m^2 pro produkci základního osiva,

— jednu na 10 m^2 pro produkci certifikovaného osiva.

5. Výskyt škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu osiva, je omezen na nejnižší míru.

6. Dodržování uvedených norem a jiných požadavků se ověřuje při úředních inspekcích v terénu.

Inspekce jsou prováděny za těchto podmínek:

A. Pěstební stav a vývojový stupeň porostu umožňují dostatečné přezkoušení.

B. Je provedena alespoň jedna inspekce.

C. Velikost, počet a rozmístění základních vzorků, které mají být prohlíženy, aby bylo zhodnoceno splnění požadavků stanovených v této příloze, se určí pomocí vhodných metod.“

2. Příloha II se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

POŽADAVKY NA OSIVO

I. CERTIFIKOVANÉ OSIVO

1. Osivo vykazuje dostatečnou odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu. Osivo *Pisum arvensea* apomiktních jednoklonných odrůd druhů rodu *Poa* splňuje zejména následující normy nebo jiné požadavky: odrůdová čistota je nejméně 98 %.

Odrůdová čistota se kontroluje zpravidla při inspekcích, které se provádějí za podmínek stanovených v příloze I.

2. Osivo splňuje následující normy nebo jiné požadavky, pokud jde o klíčivost, technickou čistotu a výskyt semen jiných druhů rostlin, včetně semen lupiny jiné barvy a semen hořké lupiny:

A. Tabulka

Druh	Klíčivost		Technická čistota			
	Klíčivost nejméně (v % čistého osiva)	Výskyt tvrdých semen nejvýše (v % čistého osiva)	Technická čistota nejméně (v % čistého osiva)	Nejvyšší povolený výskyt semen jiných druhů rostlin		
				celkem	jednotlivý druh	Agropyron repens
1	2	3	4	5	6	7
GRAMINEAE						
Agrostis canina ssp. canina	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis gigantea	80 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis stolonifera	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis tenuis	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Alopecurus pratensis	70 (a)		75	2,5	1,0	0,3
Arrhenatherum elatius	75 (a)		90	3,0	1,0 (f)	0,5
Dactylis glomerata	80 (a)		90	1,5	1,0	0,3
Festuca arundinacea	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5
Festuca ovina	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5
Festuca pratensis	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5
Festuca rubra	75 (a)		90	1,5	1,0	0,5
Lolium multiflorum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Lolium perenne	80 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Lolium x hybridum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Phleum bertolonii	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3
Phleum pratense	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3
Poa annua	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa nemoralis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa palustris	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa pratensis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa trivialis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Trisetum flavescens	70 (a)		75	3,0	1,0 (f)	0,3
LEGUMINOSAE						
Hedysarum coronarium	75 (a) (b)	30	95	2,5	1,0	
Lotus corniculatus	75 (a) (b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)	
Lupinus albus	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
Lupinus angustifolius	75 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
Lupinus luteus	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
Medicago lupulina	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Medicago sativa	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
Medicago varia	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
Onobrychis sativa	75 (a) (b)	20	95	2,5	1,0	
Pisum arvense	80 (a)		98	0,5	0,3	
Trifolium alexandrinum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium hybridum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium incarnatum	75 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium pratense	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium repens	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
Trifolium resupinatum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trigonella foenumgraecum	80 (a)		95	1,0	0,5	
Vicia faba ssp. var. equina	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3	
Vicia faba var. minor	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3	
Vicia pannonica	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
Vicia sativa	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
Vicia villosa	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
OSTATNÍ DRUHY						
Brassica napus var. napobrassica	80 (a)		98	1,0	0,5	
Brassica oleracea convar. acephala	75 (a)		98	1,0	0,5	
Raphanus sativus ssp. oleifera	80 (a)		97	1,0	0,5	

Technická čistota				Nejvyšší povolený výskyt semen jiných druhů rostlin ve vzorku o hmotnosti uvedené v příloze III sloupci 4 (celkem ve sloupci)			Požadavky na výskyt semen lupiny jiných barev a hořké lupiny
Nejvyšší povolený výskyt semen jiných druhů rostlin (v % hmotnostních)							
Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatua-Avena ludoviciana-Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. krome Rumex acetosella	
8	9	10	11	12	13	14	15
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0 (g)	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (k)	5	
0,3				0	0 (k)	5	
0,3				0	0 (j) (k)	5	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0 (h)	0 (j) (k)	2	
	0,3			0	0 (k)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0 (i)	0 (i)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0 (i)	0 (i)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0 (i)	0 (i)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (i)	20	
	0,3			0	0 (i)	20 (n)	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (i)	20	
	0,3			0	0 (i)	20 (n)	
	0,3			0	0 (i)	20 (n)	
	0,3			0 (i)	0 (i)	20 (n)	
	0,3			0 (i)	0 (i)	20 (n)	
	0,3			0 (i)	0 (i)	20 (n)	
		0,3	0,3	0	0 (i) (k)	20	
		0,3	0,3	0	0 (i) (k)	20	
		0,3	0,3	0	0 (i)	20	

B. Normy nebo jiné požadavky platí, pokud je na ně odkázáno v tabulce v části I bodě 2 oddíle A této přílohy:

a) Všechna čerstvá a zdravá semena, která neklíčí po předchozím ošetření, se považují za semena, která vyklíčila.

b) Tvrdá semena se až do nejvyššího povoleného výskytu považují za semena schopná vyklíčit.

c) Semena jiných druhů rodu *Poa* se nepovažují za nečistotu až do nejvyššího povoleného výskytu 0,8 % hmotnostních.

d) Semena *Trifolium pratense* se nepovažují za nečistotu až do nejvyššího povoleného výskytu 1 % hmotnostních.

e) Semena *Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum arvense, Vicia faba* spp., *Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa* v jiných obdobných druzích se nepovažují za nečistotu až do nejvyššího povoleného výskytu 0,5 % hmotnostních.

f) Stanovený nejvyšší povolený výskyt semen jediného druhu v procentech hmotnostních se nevztahuje na osivo rodu *Poa*.

g) Nejvyšší povolený výskyt dvou semen *Avena fatua, Avena ludoviciana* a *Avena sterilis* ve vzorku o stanovené hmotnosti se nepovažuje za nečistotu, pokud druhý vzorek o stejné hmotnosti neobsahuje žádná semena těchto druhů.

h) Přítomnost jednoho semene *Avena fatua, Avena ludoviciana* a *Avena sterilis* ve vzorku o stanovené hmotnosti se nepovažuje za nečistotu, pokud druhý vzorek o dvojnásobné hmotnosti neobsahuje žádná semena těchto druhů.

i) Stanovení počtu semen *Avena fatua, Avena ludoviciana* a *Avena sterilis* není třeba provádět, pokud neexistují pochybnosti o splnění norem uvedených ve sloupci 12.

j) Stanovení počtu semen rodu *Cuscuta* není třeba provádět, pokud neexistují pochybnosti o splnění norem uvedených ve sloupci 13.

k) Přítomnost jednoho semene rodu *Cuscuta* ve vzorku o stanovené hmotnosti se nepovažuje za nečistotu, pokud druhý vzorek o stejné hmotnosti neobsahuje žádná semena rodu *Cuscuta*.

l) Hmotnost vzorku pro stanovení počtu semen rodu *Cuscuta* je dvojnásobkem hmotnosti uvedené v příloze III sloupci 4 pro příslušné druhy.

m) Přítomnost jednoho semene rodu *Cuscuta* ve vzorku o stanovené hmotnosti se nepovažuje za nečistotu, pokud druhý vzorek o dvojnásobné hmotnosti neobsahuje žádná semena rodu *Cuscuta*.

n) Stanovení počtu semen rodu *Rumex*, s výjimkou *Rumex acetosella*, není třeba provádět, pokud neexistují pochybnosti o splnění norem uvedených ve sloupci 14.

o) Procentní podíl počtu semen lupiny jiné barvy nepřekračuje:

— 2 % u hořké lupiny,

— 1 % u jiné lupiny než hořké.

p) Procentní podíl počtu semen hořké lupiny u jiných odrůd než hořká lupina nepřekračuje:
— 3 % pro certifikované osivo první generace po základním osivu,
— 5 % pro certifikované osiva následných generací.

3. Výskyt škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu osiva, je omezen na nejnižší míru.

II. ZÁKLADNÍ OSIVO

Pokud níže uvedená ustanovení nestanoví jinak, vztahují se požadavky uvedené v části I této přílohy na základní osivo:

1. Osivo *Pisum arvense* a apomikční jednoklonné odrůdy druhů rodu *Poa* splňuje následující normy nebo jiné požadavky: odrůdová čistota je nejméně 99,7 %.

   Minimální odrůdová čistota se kontroluje zejména při inspekcích, které se provádějí za podmínek stanovených v příloze I.

2. Osivo splňuje následující normy a jiné požadavky:

   A. Tabulka

Druh	Nevyšší povolený výskyt semen jiných druhů rostlin						Jiné normy nebo požadavky
	Celkem (v % hmotnostních)	Nejvyšší povolený výskyt v jednom vzorku o hmotnosti uvedené v příloze III sloupci 4					
		Jednotlivý druh	Rumex spp.- kromě Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecuru myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
GRAMINEAE							
Agrostis canina ssp. canina	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis gigantea Roth.	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis tenuis	0,3	20	1	1	1		(j)
Alopecurus pratensis	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Arrhenatherum elatius	0,3	20 (a)	5	5	5		(i) (j)
Dactylis glomerata	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca arundinacea	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca ovina	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca pratensis	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca rubra	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium multiflorum	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium perenne	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium x hybridum	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Phleum bertolonii	0,3	20	2	1	1		(j)
Phleum pratense	0,3	20	2	1	1		(j)
Poa annua	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa nemoralis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa palustris	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa pratensis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa trivialis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Trisetum flavescens	0,3	20 (c)	1	1	1		(i) (j)

Druh	Nevyšší povolený výskyt semen jiných druhů rostlin						Jiné normy nebo požadavky
	Celkem (v % hmotnostních)	Nejvyšší povolený výskyt v jednom vzorku o hmotnosti uvedené v příloze III sloupci 4					
		Jednotlivý druh	Rumex spp.- kromě Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecuru myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
LEGUMINOSAE							
Hedysarum coronarium	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Lotus corniculatus	0,3	20	5			0 (e)	(g) (j)
Lupinus albus	0,3	20	5			0 (d)	(h) (k)
Lupinus angustifolius	0,3	20	5			0 (d)	(h) (k)
Lupinus luteus	0,3	20	5			0 (d)	(h) (k)
Medicago lupulina	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Medicago sativa	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Medicago varia	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Onobrychis sativa	0,3	20	5			0 (d)	
Pisum arvense	0,3	20	5			0 (d)	
Trifolium alexandrinum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium hybridum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium incarnatum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium pratense	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium repens	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium resupinatum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trigonella foenumgraecum	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia faba ssp. var. equina	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia faba var. minor	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia pannonica	0,3	20	5			0 (d)	(h)
Vicia sativa	0,3	20	5			0 (d)	(h)
Vicia villosa	0,3	20	5			0 (d)	(h)
OSTATNÍ DRUHY							
Brassica napus var. napobrassica	0,3	20	5				
Brassica oleracea convar. acephala	0,3	20	5				(j)
Raphanus sativus ssp. oleifera	0,3	20	5				(j)

B. Normy nebo jiné požadavky platné, pokud je na ně odkázáno v tabulce v části II bodě 2 oddíle A této přílohy:

a) Nejvyšší povolený výskyt 80 semen rodu *Poa* se nepovažuje za nečistotu.

b) Požadavky uvedené ve sloupci 3 se nevztahují na semena rodu *Poa*. Nejvyšší povolený výskyt semen rodu *Poa*, kromě přezkušovaných druhů, nepřesahuje jedno ve vzorku o 500 semenech.

c) Nejvyšší povolený výskyt 20 semen rodu *Poa* se nepovažuje za nečistotu.

d) Stanovení počtu semen rodu Melilotus není třeba provádět, pokud neexistují pochybnosti o splnění norem uvedených ve sloupci 7.

e) Přítomnost jednoho semene rodu *Melilotus* ve vzorku o stanovené hmotnosti se nepovažuje za nečistotu, pokud druhý vzorek o dvojnásobné hmotnosti neobsahuje žádná semena rodu *Melilotus*.

f) Nepoužije se požadavek c) uvedený v části I bodě 2 této přílohy.

g) Nepoužije se požadavek d) uvedený v části I bodě 2 této přílohy.

h) Nepoužije se požadavek e) uvedený v části I bodě 2 této přílohy.

i) Nepoužije se požadavek f) uvedený v části I bodě 2 této přílohy.

j) Nepoužijí se požadavky k) a m) uvedené v části I bodě 2 této přílohy.

k) Podíl počtu semen hořké lupiny v jiných odrůdách než hořká lupina nepřekračuje 1 %.

III. OBCHODNÍ OSIVO

Pokud níže uvedená ustanovení nestanoví jinak, vztahují se požadavky uvedené v části I bodech 2 a 3 této přílohy na obchodní osivo:

1. Hmotnostní procenta uvedená ve sloupcích 5 a 6 tabulky v části I bodě 2 oddíle A této přílohy se zvyšují o 1 %.

2. Nejvyšší povolený výskyt 10 % hmotnostních semen jiných druhů rodu *Poa* se u *Poa annua* nepovažuje za nečistotu.

3. Nejvyšší povolený výskyt 3 % hmotnostních semen jiných druhů rodu *Poa* se u druhů rodu *Poa*, s výjimkou *Poa annua*, nepovažuje za nečistotu.

4. Nejvyšší povolený výskyt 1 % hmotnostní semen rodu *Melilotus* se u *Hedysarum coronarium* nepovažuje za nečistotu.

5. Nepoužije se požadavek d) uvedený v části I bodě 2 této přílohy pro *Lotus corniculatus*.

6. U druhů lupiny
   a) je technická čistota nejméně 97 % hmotnostních,
   b) podíl počtu semen lupiny jiné barvy nepřekračuje
      — 4 % u hořké lupiny,
      — 2 % u jiné lupiny,
   c) podíl počtu hořkých semen v odrůdách jiné ne hořké lupiny nepřekračuje 5 %.
7. Nejvyšší povolený výskyt 6 % hmotnostních semen *Vicia pannonica*, *Vicia villiosa* nebo příbuzných pěstovaných druhů v jiných odpovídajících druzích se u rodu Vicia nepovažuje za nečistotu
8. U *Vicia pannonica*, *Vicia sativa* a *Vicia villosa* je technická čistota nejméně 97 % hmotnostních."

3. Příloha III se nahrazuje tímto:

PŘÍLOHA III

HMOTNOST PARTIE A VZORKU

Druh	Maximální hmotnost partie (v tunách)	Minimální hmotnost vzorku odebraného z jedné partie (v gramech)	Hmotnost jednoho dílčího vzorku pro vyčíslení podle přílohy II části I bodu 2 oddílu A sloupců 12 – 14 a podle přílohy II části II bodu 2 oddílu A sloupců 3 – 7 (v gramech)
1	2	3	4
GRAMINEAE			
Agrostis canina ssp. canina	10	50	5
Agrostis gigantea Roth.	10	50	5
Agrostis stolonifera	10	50	5
Agrostis tenuis	10	50	5
Alopecurus pratensis	10	100	30
Arrhenatherum elatius	10	200	80
Dactylis glomerata	10	100	30
Festuca arundinacea	10	100	50
Festuca ovina	10	100	30
Festuca pratensis	10	100	50
Festuca rubra	10	100	30
Lolium multiflorum	10	200	60
Lolium perenne	10	200	60
Lolium x hybridum	10	200	60
Phleum bertolonii	10	50	10
Phleum pratense	10	50	10
Poa annua	10	50	10
Poa nemoralis	10	50	5
Poa palustris	10	50	5
Poa pratensis	10	50	5
Poa trivialis	10	50	5
Trisetum flavescens	10	50	5

Druh	Maximální hmotnost partie (v tunách)	Minimální hmotnost vzorku odebraného z jedné partie (v gramech)	Hmotnost jednoho dílčího vzorku pro vyčíslení podle přílohy II části I bodu 2 oddílu A sloupců 12 – 14 a podle přílohy II části II bodu 2 oddílu A sloupců 3 – 7 (v gramech)
1	2	3	4
LEGUMINOSAE			
Hedysarum coronarium			
— plody	10	1 000	300
— semeno	10	400	120
Lotus corniculatus	10	20	30
Lupinus albus	20	1 000	1 000
Lupinus angustifolius	20	1 000	1 000
Lupinus luteus	20	1 000	1 000
Medicago lupulina	10	300	50
Medicago sativa	10	300	50
Medicago varia	10	300	50
Onobrychis sativa			
— plody	10	600	600
— semeno	10	400	400
Pisum arvense	20	1 000	1 000
Trifolium alexandrinum	10	400	60
Trifolium hybridum	10	200	20
Trifolium incarnatum	10	500	80
Trifolium pratense	10	300	50
Trifolium repens	10	200	20
Trifolium resupinatum	10	200	20
Trigonella foenumgraecum	10	500	450
Vicia faba ssp. var. equina	20	1 000	1 000
Vicia faba var. minor	20	1 000	1 000
Vicia pannonica	20	1 000	1 000
Vicia sativa	20	1 000	1 000
Vicia villosa	200	1 000	1 000
OSTATNÍ DRUHY			
Brassica napus var. napobrassica	10	200	100
Brassica oleracea convar. acephala	10	200	100
Raphanus sativus ssp. oleifera	10	200	300“

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu:

— s čl. 1 bodem 1, pokud jde o přílohu I body 3 a 4, a s čl. 1 bodem 2, pokud jde o přílohu II část I bod 1 a přílohu II část II bod 1, do 1. ledna 1981,

— s ostatními ustanoveními této směrnice nejpozději do 1. července 1980.

2. Členské státy zajistí, aby uvádění osiva na trh nepodléhalo žádným omezením na základě rozdílných dat pro provedení této směrnice podle odst. 1 druhé odrážky.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. dubna 1978.

Za Komisi

Finn GUNDELACH

místopředseda