31978L0386

25.4.1978 *DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH* L 113/1

PIERWSZA DYREKTYWA KOMISJI

z dnia 18 kwietnia 1978 r.

zmieniająca załączniki do dyrektywy 66/401/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych

(78/386/EW(G)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych [1], ostatnio zmienioną dyrektywą 78/55/EWG [2],w szczególności jej art. 21a,

a także mając na uwadze, co następuje:

w świetle rozwoju wiedzy naukowo-technicznej, załączniki I, II i III do dyrektywy powinny zostać zmienione z powodów wymienionych poniżej;

w celu poprawy genetycznej wartości materiału siewnego należy ustanowić przepisy dotyczące norm czystości odmianowej, które muszą zostać spełnione w przypadku upraw niektórych gatunków;

w związku z tym, w przypadku gatunków samopylnych i apomiktycznych jednoklonalnych odmian Poa spp. należy ustanowić przepisy dotyczące norm czystości odmianowej, które muszą zostać spełnione przez materiał siewny;

należy ustanowić przepisy dotyczące warunków, które muszą spełniać uprawy w odniesieniu do obecności organizmów szkodliwych, które zmniejszają przydatność nasion;

należy ustanowić specjalne normy w odniesieniu do maksymalnej zawartości innego niepożądanego lub szkodliwego materiału siewnego takiego jak: Agropyron repens, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Melilotus spp., Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum lub gatunku Rumex innego niż Rumex acetosella, Rumex crispus i Rumex obtusifolius;

należy przyjąć normy w odniesieniu do minimalnej zdolności kiełkowania oraz minimalnej czystości laboratoryjnej w świetle zmiany jakości materiału siewnego otrzymywanego w sposób normalny;

w celu spełnienia warunków badań urzędowych materiału siewnego zgodnie z aktualnymi metodami międzynarodowymi niezbędne jest dokonanie rewizji niektórych przepisów;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa;

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

[1] Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2298/66.
[2] Dz.U. L 16 z 20.1.1978, str. 23.

Artykuł 1

W dyrektywie 66/401/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik I otrzymuje brzmienie:

äZAŁĄCZNIK I

WARUNKI, JAKIE MAJĄ SPEŁNIAĆ UPRAWY

1. Wcześniejsze zbiory z pól nie są niezgodne z produkcją materiału siewnego gatunków i odmian upraw, pole jest pozbawione w dostatecznym stopniu takich roślin z poprzednich zbiorów.

2. Uprawy odpowiadają następującym normom dotyczącym odległości od sąsiadujących źródeł pyłków, które mogą powodować niepożądane obce zapylenie:

Uprawy	Minimalna odległość
1	2
Brassica spp.:	
— do produkcji elitarnego materiału siewnego	400 m
— do produkcji kwalifikowanego materiału siewnego	200 m
Gatunki i odmiany inne niż *Brassica* spp., *Pisum arvense*,	
— do produkcji materiału siewnego przeznaczonego do rozmnożenia, pola do dwóch hektarów,	200 m
— do produkcji materiału siewnego przeznaczonego do rozmnożenia, pola powyżej dwóch hektarów,	100 m
— do produkcji materiału siewnego przeznaczonego do produkcji roślin pastewnych, pola do dwóch hektarów,	100 m
— do produkcji materiału siewnego przeznaczonego do produkcji roślin pastewnych, pola powyżej dwóch hektarów	50 m

Te odległości mogą nie być uwzględniane, jeżeli istnieje wystarczające zabezpieczenie przed wszelkim niepożądanym obcym zapyleniem.

3. Rośliny innych gatunków, których materiał siewny trudno odróżnić od uprawianego materiału siewnego podczas badań laboratoryjnych, występują na niskim poziomie.

W szczególności uprawy gatunków lolium odpowiadają następującym warunkom: liczba roślin gatunków loliuminnych niż gatunków uprawianych nie przewyższa:

— jedna na 50 m^2 dla produkcji elitarnego materiału siewnego,

— jedna na 10 m^2 dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego.

4. Uprawy posiadają wystarczającą tożsamość odmianową oraz czystość odmianową. W szczególności uprawy gatunków i odmian innych niż Pisum arvense lub apomitycznych jednoklonalnych odmian Poa spp. spełniają następujące normy: liczba uprawianych gatunków wyraźnie rozpoznawalnych jako nienależących do odmiany nie powinna przewyższać:

— jeden na 30 m^2 dla produkcji elitarnego materiału siewnego,

— jeden na 10 m^2 dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego.

5. Organizmy szkodliwe, które obniżają przydatność materiału siewnego powinny występować na najniższym możliwym poziomie.

6. Spełnienie wymienionych wyżej norm lub innych warunków jest przedmiotem oceny podczas urzędowych badań polowych.

   Badania polowe przeprowadza się zgodnie z następującymi warunkami:

   A. Stan i stopień rozwoju upraw umożliwiają przeprowadzenie właściwych badań.

   B. Przeprowadza się przynajmniej jedno badanie polowe.

   C. Rozmiar, liczba oraz rozmieszczenie części pól w których przeprowadza się badania w celu oceny wypełnienia przepisów niniejszego Załącznika, ustala się zgodnie z właściwymi metodami."

2) Załącznik II otrzymuje brzmienie:

äZAŁĄCZNIK II

WARUNKI, JAKIE MA SPEŁNIAĆ MATERIAŁ SIEWNY

I. KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY

1. Materiał siewny posiada wystarczającą tożsamość i czystość odmianową. W szczególności materiał siewny Pisum arvense oraz apomiktycznych jednoklonalnych odmian *Poa* spp. spełnia następujące normy lub inne warunki: minimalna czystość odmianowa wynosi 98 %.

   Minimalną czystość odmianową ocenia się głównie podczas badań polowych przeprowadzanych zgodnie z warunkami przewidzianymi w załączniku I.

2. Materiał siewny spełnia następujące normy lub inne warunki w odniesieniu do kiełkowania, czystości laboratoryjnej i zawartości materiału siewnego innych gatunków, włącznie z materiałem siewnym łubinu innego koloru oraz nasionami łubinu gorzkiego:

   A. Tabela:

Gatunek	Kiełkowanie		Czystość laboratoryjna			
	Minimum kiełkowania (% czystych nasion)	Maksymalna zawartość twardych nasion (% czystych nasion)	Minimalna czystość laboratoryjna	Maksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin		
				Ogółem	Pojedynczy gatunek	*Agropyron repens*
1	2	3	4	5	6	7
GRAMINEAE						
Agrostis canina druh canina	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis gigantea	80 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis stolonifera	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis tenuis	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Alopecurus pratensis	70 (a)		75	2,5	1,0	0,3
Arrhenatherum elatius	75 (a)		90	3,0	1,0 (f)	0,5
Dactylis glomerata	80 (a)		90	1,5	1,0	0,3
Festuca arundinacea	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5
Festuca ovina	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5
Festuca pratensis	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5
Festuca rubra	75 (a)		90	1,5	1,0	0,5
Lolium multiflorum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Lolium perenne	80 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Lolium X hybridum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Phleum bertolonii	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3
Phleum pratense	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3
Poa annua	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa nemoralis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa palustris	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa pratensis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa trivialis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Trisetum flavescens	70 (a)		75	3,0	1,0 (f)	0,3
LEGUMINOSAE						
Hedysarum coronarium	75 (a) (b)	30	95	2,5	1,0	
Lotus corniculatus	75 (a) (b)	40	95	1,8 (d)	2,0 (d)	
Lupinus albus	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
Lupinus angustifolius	75 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
Lupinus luteu	80 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,3 (e)	
Medicago lupulina	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Medicago sativa	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
Medicago varia	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
Onobrychis sativa	75 (a) (b)	20	95	2,5	1,0	
Pisum arvense	80 (a)		98	0,5	0,3	
Trifolium alexandrinum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium hybridum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium incarnatum	75 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium pratense	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium repens	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
Trifolium resupinatum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trigonella foenumgraecum	80 (a)		95	1,0	0,5	
Vicia faba druh, odroda equina	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3	
Vicia faba odroda minor	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3	
Vicia pannonica	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
Vicia sativa	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
Vicia villosa	85 (a) (b)	20	98	2,0 (e)	0,5 (e)	
INNE GATUNKI						
Brassica napus odroda napobrassica	80 (a)		98	1,0	0,5	
Brassica oleracea spoluodroda acephala	75 (a)		98	1,0	0,5	
Raphanus sativus druh oleifera	80 (a)		97	1,0	0,5	

Czystość laboratoryjna				Maksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin w próbce wagowej określonej w kolumnie 4 załącznika III (ogółem na kolumnę)			Warunki dotyczące zawartości nasion łubinu innego koloru oraz gorzkich nasion łubinu
Maksymalna zawartość nasion innych gatunków							
Alopecures	Mechlotus	Raphanus	Sinapis arvensis	Avena fatua'	Cuscuta	Rumex spp.	
8	9	10	11	12	13	14	15
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0 (g)	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (k)	5	
0,3				0	0 (k)	5	
0,3				0	0 (j) (k)	5	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0 (h)	0 (j) (k)	2	
	0,3			0	0 (k)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (j)	20	
	0,3			0	0 (j)	20(n)	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (j)	20	
	0,3			0	0 (j)	20(n)	
	0,3			0	0 (j)	20(n)	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20(n)	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20(n)	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20(n)	
		0,3	0,3	0	0 (j) (k)	20	
		0,3	0,3	0	0 (j) (k)	20	
		0,3	0,3	0	0 (j)	20	

B. Normy lub inne warunki mające zastosowanie tam, gdzie występuje do nich odniesienie w tabeli w sekcji I ust. 2 lit. A niniejszego Załącznika:

a) Wszelkie świeże i zdrowe nasiona, które nie kiełkują po wstępnej obróbce są uznawane za nasiona po kiełkowaniu.

b) Do maksymalnej wskazanej ilości, występujące nasiona twarde są uznawane za nasiona zdolne do kiełkowania.

c) Maksymalna łączna masa nasion innych niż gatunków *Poa* równa 0,8 % nie jest uznawana za zanieczyszczenie.

d) Maksymalna masa nasion *Trifolium pratense* równa 1 % nie jest uznawana za zanieczyszczenie.

e) Maksymalna łączna masa nasion *Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum arvense, Vici faba* spp., *Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa* równa 0,5 % w innym odpowiednim gatunku nie jest uznawana za zanieczyszczenie.

f) Określona maksymalna masa nasion pojedynczego gatunku wyrażona procentowo nie ma zastosowania do nasion *Poa* spp.

g) Maksymalna łączna liczba dwóch nasion *Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis* w próbce wskazanej wagi nie jest uznawana za zanieczyszczenie, jeżeli druga próbka o tej samej wadze nie wykaże zawartości nasion tych gatunków.

h) Obecność jednego nasienia *Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis* w próbce określonej wagi nie jest uznawana za zanieczyszczenie, jeżeli druga próbka o podwójnej wskazanej wadze nie wykaże zawartości żadnych nasion tych gatunków.

i) Liczbowe określenie nasion *Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis* nie musi być przeprowadzane, chyba że występują wątpliwości dotyczące spełnienia warunków ustanowionych w kolumnie 12.

j) Liczbowe określenie nasion *Cuscuta* spp. nie musi być przeprowadzane, chyba że wystąpią wątpliwości dotyczące spełnienia warunków ustanowionych w kolumnie 13.

k) Obecność jednego nasienia *Cuscuta* spp. w próbce wskazanej wagi nie jest uznawana za zanieczyszczenie, jeżeli druga próbka o tej samej wadze nie wykaże obecności żadnych nasion *Cuscuta* spp.

l) Waga próbki dla liczbowego określenia nasion *Cuscuta* spp. powinna być dwa razy większa niż podana w kolumnie 4 załącznika III dla odpowiednich gatunków.

m) Obecność nasion *Cuscuta* spp. w próbce wskazanej wagi nie jest uznawana za zanieczyszczenie, jeżeli druga próbka o podwójnej wskazanej wadze nie wykaże obecności nasion *Cuscuta* spp.

n) Liczbowe określenie nasion *Rumex* spp. innych niż *Rumex acetosella* nie musi być przeprowadzone, chyba że wystąpią wątpliwości dotyczące spełnienia warunków ustanowionych w kolumnie 14.

o) Ilość nasion łubinu innego koloru wyrażona procentowo nie przekracza:

— w łubinie gorzkim 2 %,

— w łubinach innych niż gorzki 1 %.

p) Ilość nasion łubinu gorzkiego w odmianach innych niż łubin gorzki wyrażona procentowo nie przekracza:
   — dla kwalifikowanego materiału siewnego z pierwszej hodowli elitarnego materiału siewnego, 3 %,
   — dla kwalifikowanego materiału siewnego z kolejnych hodowli elitarnego materiału siewnego, 5 %.

3. Organizmy szkodliwe, które obniżają przydatność nasion występują na możliwie najniższym poziomie.

II. ELITARNY MATERIAŁ SIEWNY

Z zastrzeżeniem poniższych przepisów, warunki ustanowione w sekcji I niniejszego Załącznika odnoszą się do elitarnego materiału siewnego:

1) Nasiona *Pisum* arvense oraz apomiktycznych jednoklonalnych odmian *Poa* spp. spełniają następujące normy lub inne warunki: minimalna czystość odmianowa wynosi 99,7 %.

   Minimalna czystość odmianowa jest sprawdzana głównie przez badania polowe przeprowadzane zgodnie z warunkami ustanowionymi w załączniku I.

2) Materiał siewny spełnia następujące normy lub inne warunki:

   A. Tabela:

Gatunek	Maksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin						Inne normy lub warunki
	Ogółem (% masy)	Zawartość mierzona liczbowo w próbce wagi podanej w kolumnie 4					
		Pojedyncze gatunki	Rumex spp.	Agropyron	Alopecurus	Meilotus	
1	2	3	4	5	6	7	8
GRAMINEAE							
Agrostis canina druh canina	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis tenuis	0,3	20	1	1	1		(j)
Alopecurus pratensis	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Arrhenatherum elatius	0,3	20 (a)	5	5	5		(i)
Dactylis glomerata	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca arundinacea	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca ovina	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca pratensis	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca rubra	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium multiflorum	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium perenne	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium X hybridum	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Phleum bertolonii	0,3	20	2	1	1		(j)
Phleum pratense	0,3	20	2	1	1		(j)
Poa annua	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa nemoralis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa palustris	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa pratensis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa trivialis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Trisetum flavescens	0,3	20 (c)	1	1	1		(i) (j)

Gatunek	Maksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin						Inne normy lub warunki
	Ogółem (% masy)	Zawartość mierzona liczbowo w próbce wagi podanej w kolumnie 4					
		Pojedyncze gatunki	Rumex spp.	Agropyron	Alopecurus	Meilotus	
1	2	3	4	5	6	7	8
LEGUMINOSAE							
Hedysarum coronarium	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Lotus corniculatus	0,3	20	5			0 (e)	(g) (j)
Lupinus albus	0,3	20	5			0 (d)	(h) (k)
Lupinus angustifolius	0,3	20	5			0 (d)	(h) (k)
Lupinus luteus	0,3	20	5			0 (d)	(h) (k)
Medicago lupulina	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Medicago sativa	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Medicago varia	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Onobrychis sativa	0,3	20	5			0 (d)	
Pisum arvense	0,3	20	5			0 (d)	
Trifolium alexandrinum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium hybridum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium incarnatum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium pratense	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium repens	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium resupinatum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trigonella foenumgraecum	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia faba druh, odroda equina	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia faba odroda minor	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia pannonica	0,3	20	5			0 (d)	(h)
Vicia sativa	0,3	20	5			0 (d)	(h)
Vicia villosa	0,3	20	5			0 (d)	(h)
INNE ODMIANY							
Brassica napus odroda napobrassica	0,3	20	5				
Brassica oleracea spoluodroda acephala	0,3	20	5				(j)
Raphanus sativus druh oleifera	0,3	20	5				(i)

B. Normy lub inne warunki mające zastosowanie tam, gdzie występuje do nich odniesienie w tabeli w sekcji II ust. 2 lit. A niniejszego Załącznika:

a) Maksymalna liczba 80 nasion *Poa* spp. nie jest uznawana za zanieczyszczenie.

b) Warunku ustanowionego w kolumnie 3 nie stosuje się do nasion *Poa* spp. Maksymalna zawartość nasion *Poa* spp. innych niż gatunku będącego przedmiotem badania nie przewyższa jednego nasiona w próbce 500 nasion.

c) Maksymalna liczba 20 nasion *Poa* spp. nie jest uznawana za zanieczyszczenie.

d) Liczbowe określenie nasion *Melilotus* spp. nie musi być przeprowadzane, chyba że wystąpią wątpliwości dotyczące spełnienia warunków ustanowionych w kolumnie 7.

e) Obecność jednego nasienia *Melilotus* spp. w próbce wskazanej wagi nie jest uznawana za zanieczyszczenie, jeżeli druga próbka o podwójnej wskazanej wadze nie zawiera żadnych nasion *Melilotus* spp.

f) Warunku c) ustanowionego w sekcji I ust. 2 niniejszego Załącznika nie stosuje się.

g) Warunku d) ustanowionego w sekcji I ust. 2 niniejszego Załącznika nie stosuje się.

h) Warunku e) ustanowionego w sekcji I ust. 2 niniejszego Załącznika stosuje się.

i) Warunku f) ustanowionego w sekcji I ust. 2 niniejszego Załącznika nie stosuje się.

j) Warunków k) i m) ustanowionych w sekcji I ust. 2 niniejszego Załącznika nie stosuje się.

k) Liczba nasion łubinu gorzkiego w odmianach innych niż łubin gorzki wyrażona procentowo nie przewyższa 1 %.

III. HANDLOWY MATERIAŁ SIEWNY

Z zastrzeżeniem poniższych przepisów, warunki ustanowione w sekcji I ust. 2 i 3 niniejszego Załącznika stosuje się do handlowego materiału siewnego:

1) Masa nasion wyrażona procentowo ustalona w kolumnie 5 i 6 w tabeli sekcji I ust. 2 lit. A niniejszego Załącznika zostaje zwiększona o 1 %.

2) W *Poa annua* maksymalna łączna zawartość 10 % masy nasion innych niż gatunku *Poa* nie jest uznawana za zanieczyszczenie.

3) W *Poa* spp. innych niż *Poa annua* maksymalna łączna zawartość 3 % masy nasion innych niż gatunku *Poa* nie jest uznawana za zanieczyszczenie.

4) W *Hedisarum coronarium* maksymalna łączna zawartość 1 % masy nasion *Melilotus* spp. nie jest uznawana za zanieczyszczenie.

5) Warunku d) ustanowionego w sekcji I ust. 2 niniejszego Załącznika dla *Lotus corniculatus* nie stosuje się.

6) W gatunkach łubinu:
   a) minimalna laboratoryjna czystość wynosi 97 % wagi,
   b) liczba nasion łubinu innego koloru wyrażona procentowo nie przekracza:
      — w łubinie gorzkim, 4 %,
      — w łubinach innych niż łubin gorzki, 2 %;
   c) liczba nasion gorzkiego łubinu wyrażona procentowo w łubinie innym niż gorzki nie przewyższa 5 %.

7) W *Vicia* spp, maksymalna łączna zawartość 6 % masy nasion *Vicia pannonica*, *Vicia villosa* albo podobnych uprawianych gatunków w innych odpowiednich gatunkach nie jest uznawana za zanieczyszczenie.

8) W *Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa* minimalna laboratoryjna czystość wynosi 97 % masy."

3) Załącznik III otrzymuje brzmienie:

„*ZAŁĄCZNIK III*

MASA PARTII I PRÀBEK

Gatunek	Maksymalna masa partii (w tonach)	Maksymalna masa próbki pobierana z partii (w gramach)	Waga próbki dla określenia liczbowego, określonego w kolumnach 12-14 załącznika II ust. 1 i ust. 2 lit. A i w kolumnach 3-7 załącznika II, część II ust. 2 lit. A (w gramach)
1	2	3	4
GRAMINEAE			
Agrostis canina ssp. canina	10	50	5
Agrostis gigantea	10	50	5
Agrostis stolonifera	10	50	5
Agrostis tenuis	10	50	5
Alopecurus pratensis	10	100	30
Arrhenatherumclatius	10	200	80
Dactylis glomerata	10	100	30
Festuca arundmacea	10	100	50
Festuca ovina	10	100	30
Festuca pratensis	10	100	50
Festuca rubra	10	100	30
Lolium multiflorum	10	200	60
Lolium perenne	10	200	60
lolium X hybridum	10	200	60
Phleum bertolonii	10	50	10
Phleum pratense	10	50	10
Poa annua	10	50	10
Poa nemoralis	10	50	5
Poa palustris	10	50	5
Poa pratensis	10	50	5
Poa trivialis	10	50	5
Trisctum flavescens	10	50	5

Gatunek	Maksymalna masa partii (w tonach)	Maksymalna masa próbki pobierana z partii (w gramach)	Waga próbki dla określenia liczbowego, określonego w kolumnach 12-14 załącznika II ust. 1 i ust. 2 lit. A i w kolumnach 3-7 załącznika II, część II ust. 2 lit. A (w gramach)
1	2	3	4
LEGUMINOSAE			
Hedysarum coronarium			
— owoc	10	1 000	300
— nasienie	10	400	120
Lotus corniculatus	10	200	30
Lupinus albus	20	1 000	1 000
Lupinus angustifolius	20	1 000	1 000
Lupinus luteus	20	1 000	1 000
Medicago lupulina	10	300	50
Medicago sativa	10	300	50
Medicago varia	10	300	50
Onobrvchis sativa			
— owoc	10	600	600
— nasienie	10	400	400
Pisum arvense	20	1 000	1 000
Trifolium alexandrinum	10	400	60
Trifolium hybridum	10	200	20
Trifolium incarnatum	10	500	80
Trifolium pratense	10	300	50
Trifolium repens	10	200	20
Tsifolium resupinatum	10	200	20
Trigonella foenumgraecum	10	500	450
Vicia faba ssp. var. equina	20	1 000	1 000
Vicia faba var. minor	20	1 000	1 000
Vicia pannonica	20	1 000	1 000
Vicia sativa	20	1 000	1 000
Vicia villosa	20	1 000	1 000
INNE GATUNKI			
Brassica napus var. napobrassica	10	200	100
Brassica oleracea convar. acephala	10	200	100
Raphanus sativus ssp. oleifera	10	300	300

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania:

— dnia 1 stycznia 1981 r. przepisów art. 1 ust. 1 w odniesieniu do załącznika I ust. 3 i 4, art. 1 ust. 2 w odniesieniu do załącznika II (I) ust. 1 oraz załącznika II (II) ust. 1,

— pozostałych przepisów niniejszej dyrektywy nie później niż dnia 1 lipca 1980 r.

2. Państwa Członkowskie zapewnią, że materiał siewny roślin pastewnych nie podlega żadnym ograniczeniom obrotu z powodu różnych dat wykonania niniejszej dyrektywy, zgodnie z ust. 1 tiret drugie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 1978 r.

W imieniu Komisji
Finn GUNDELACH
Wiceprzewodniczący