31978L0386

L 113/1 *ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ* 25.4.1978

ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 18 април 1978 година за изменение на приложенията към Директива 66/401/ЕИО относно търговията със семена от фуражни култури

(78/386/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от фуражни култури [1], последно изменена с Директива 78/55/ЕИО [2], и по-специално член 21а от нея,

като има предвид, че в светлината на развитието на научните и технически познания, приложения I, II и III към директивата следва да бъдат изменени поради изброените по-долу съображения;

като има предвид, че, за да бъде подобрена генетичната стойност на семената, трябва да се предвидят стандарти за сортова чистота, на които трябва да отговаря културата за определени видове;

като има предвид, че в тази връзка, по отношение на самооплождащи се видове и апомиктични моноклонни сортове на Poa spp., следва да се предвидят условия за стандартите за сортова чистота, на която трябва да отговарят семената;

като има предвид, че трябва да бъдат предвидени условията, на които трябва да отговаря културата по отношение на наличието на вредни организми, които намаляват полезността на семето;

като има предвид, че следва да бъдат определени специални стандарти по отношение на максималното съдържание на други нежелателни или вредни семена като *Agropyron repens, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Melilotus* spp., *Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum* или видовете *Rumex* освен *Rumex acetosella, Rumex crispus* и *Rumex obtusifolius*;

като има предвид, че стандартите по отношение на минималната кълняемост и минималната аналитична чистота трябва да бъдат приведени в съответствие с развитието на качеството, обичайно достигнато от семената;

като има предвид, че за да бъдат удовлетворени условията за официалната инспекция на семената, извършвана в съответствие с настоящите международни методи, е необходимо да бъдат преразгледани някои разпоредби;

като има предвид, че предвидените в настоящата директива мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

(1) ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2298/66.
(2) ОВ L 16, 20.1.1978 г., стр. 23.

Член 1

Директива 66/401/ЕИО се изменя, както следва:

1. Текстът на приложение I се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ КУЛТУРАТА

1. Предходните отгледани култури на полето не трябва да са били несъвместими с производството на семена от видовете и сорта на културата и полето трябва да бъде достатъчно чисто от саморасли насаждения от предходните култури.

2. Културата трябва да отговаря на следните стандарти по отношение на разстоянията от съседни източници на полен, което може да доведе до нежелателно кръстосано опрашване:

Култура	Минимално разстояние
1	2
Brassica spp	
— За производството на базови семена	400 m
— За производството на сертифицирани семена	200 m
Видове или сортове, различни от *Brassica, Pisum arvense* апомиктични моноклонни сортове на *Poa* spp.:	
— За прозводството на семена, предназначени за размножаване, площи до 2 ha	200 m
— За прозводството на семена, предназначени за размножаване, площи над 2 ha	100 m
— За производството на семена, предназначени за производството на фуражни растения, площи до 2 ha	100 m
— За производството на семена, предназначени за производството на фуражни растения, площи над 2 ha	50 m

Тези разстояния могат да бъдат пренебрегнати, в случай че има достатъчна защита срещу всякакво нежелателно кръстосано опрашване.

3. Растенията от други видове, чиито семена трудно могат да бъдат различени от семената на културата при лабораторно изпитване се допускат само в малко количество.

В частност, култури от вида *lolium* трябва да отговарят на следните условия: броят на растенията от вида *lolium*, различни от видовете на дадената култура, не трябва да надхвърля:

— едно на 50 m^2 за производство на базови семена,

— едно на 10 m^2 за производството на сертифицирани семена;

4. Културата трябва да има достатъчна сортова автентичност и чистота. В частност, културите от други видове освен *Pisum arvense* или апомиктичните моноклонни сортове на *Poa* spp., трябва да отговарят на

следните стандарти: броят на растенията от вида култура, които могат да бъдат разпознати като явно непринадлежащи на дадения сорт, не трябва да надхвърля:

— едно на 30 m^2 за производството на базови семена,

— едно на 10 m^2 за производство на сертифицирани семена.

5. Вредните организми които намаляват полезността на семената, трябва да бъдат на възможно най-ниско ниво.

6. Изпълнението на посочените по-горе стандарти или други условия се установява при официални полеви инспекции.

Тези полеви инспекции се извършват в съответствие със следните изисквания:

А. Състоянието и фазата на развитие на растението позволяват съответната проверка.

Б. Провежда се поне една полева инспекция.

В. Размерът, броят и разпределението на участъците от полето, които ще бъдат инспектирани, за да се провери изпълнението на условията на настоящото приложение се определят съгласно съответните методи.“

2. Текстът на приложение II се заменя със следния текст:

„*ПРИЛОЖЕНИЕ II*

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ СЕМЕНАТА

I. СЕРТИФИЦИРАНИ СЕМЕНА

1 Семената трябва да притежават задоволителна сортова идентичност и чистота. По-специално, семената на *Pisum arvense* и апомиктичните моноклонни сортове на вида *Poa* spp., съответстват на следните стандарти или други изисквания: минималната сортова чистота на сорта е 98 %.

Минималната сортова чистота се контролира главно по време на полевите инспекции, провеждани в съответствие с условията, изложени в приложение I.

2. Семената отговарят на следните стандарти или други изисквания по отношение на кълняемостта, аналитичната чистота и съдържанието на семена от други растителни видове, включително и семена от лупина с друг цвят и горчиви семена от лупина.

А. Таблица:

Видове	Кълняемост		Аналитична честота			
	Минимална кълняемост (% от чисти семена)	Максимално съдържание от твърдо семе (% от чисти семена)	Минимална аналична чистота (% тегловни)	Максимално съдържание на семена от други растения (% тегловни)		
				Общо	Само един вид	Agropyron repens
1	2	3	4	5	6	7
GRAMINEAE						
Agrostis canina ssp. canina	75 (а)		90	2·0	1·0	0·3
Agrostis gigantea	80 (а)		90	2·0	1·0	0·3
Agrostis stolonifera	75 (а)		90	2·0	1·0	0·3
Agrostis tenuis	75 (а)		90	2·0	1·0	0·3
Alopecurus pratensis	70 (а)		75	2·5	1·0	0·3
Arrhenatherum elatius	75 (а)		90	3·0	1·0 (е)	0·5
Dactylis glomerata	80 (а)		90	1·5	1·0	0·3
Festuca arundinacea	80 (а)		95	1·5	1·0	0·5
Festuca ovina	75 (а)		85	2·0	1·0	0·5
Festuca pratensis	80 (а)		95	1·5	1·0	0·5
Festuca rubra	75 (а)		90	1·5	1·0	0·5
Lolium multiflorum	75 (а)		96	1·5	1·0	0·5
Lolium perenne	80 (а)		96	1·5	1·0	0·5
Lolium X hybridum	75 (а)		96	1·5	1·0	0·5
Phleum bertolonii	80 (а)		96	1·5	1·0	0·3
Phleum pratense	80 (а)		96	1·5	1·0	0·3
Poa annua	75 (а)		85	2·0 (в)	1·0 (в)	0·3
Poa nemoralis	75 (а)		85	2·0 (в)	1·0 (в)	0·3
Poa palustris	75 (а)		85	2·0 (в)	1·0 (в)	0·3
Poa pratensis	75 (а)		85	2·0 (в)	1·0 (в)	0·3
Poa trivialis	75 (а)		85	2·0 (в)	1·0 (в)	0·3
Trisetum flavescens	70 (а)		75	3·0	1·0 (е)	0·3
LEGUMINOSAE						
Hedysarum coronarium	75 (а) (б)	30	95	2·5	1·0	
Lotus corniculatus	75 (а) (б)	40	95	1·8 (г)	1·0 (г)	
Lupinus albus	80 (а) (б)	20	98	0·5 (д)	0·3 (д)	
Lupinus angustifolius	75 (а) (б)	20	98	0·5 (д)	0·3 (д)	
Lupinus luteus	80 (а) (б)	20	98	0·5 (д)	0·3 (д)	
Medicago lupulina	80 (а) (б)	20	97	1·5	1·0	
Medicago sativa	80 (а) (б)	40	97	1·5	1·0	
Medicago varia	80 (а) (б)	40	97	1·5	1·0	
Onobrychis sativa	75 (а) (б)	20	95	2·5	1·0	
Pisum arvense	80 (а)		98	0·5	0·3	
Trifolium alexandrinum	80 (а) (б)	20	97	1·5	1·0	
Trifolium hybridum	80 (а) (б)	20	97	1·5	1·0	
Trifolium incarnatum	75 (а) (б)	20	97	1·5	1·0	
Trifolium pratense	80 (а) (б)	20	97	1·5	1·0	
Trifolium repens	80 (а) (б)	40	97	1·5	1·0	
Trifolium resupinatum	80 (а) (б)	20	97	1·5	1·0	
Trigonella foenumgraecum	80 (а)		95	1·0	0·5	
Vicia faba ssp. var. equina	85 (а) (б)	5	98	0·5	0·3	
Vicia faba var. minor	85 (а) (б)	5	98	0·5	0·3	
Vicia pannonica	85 (а) (б)	20	98	1·0 (д)	0·5 (д)	
Vicia sativa	85 (а) (б)	20	98	1·0 (д)	0·5 (д)	
Vicia villosa	85 (а) (б)	20	98	1·0 (д)	0·5 (д)	
ДРУГИ ВИДОВЕ						
Brassica napus var. napobrassica	80 (а)		98	1·0	0·5	
Brassica oleracea convar. acephala	75 (а)		98	1·0	0·5	
Raphanus sativus ssp. oleifera	80 (а)		97	1·0	0·5	

Аналитична честота				Максимална чистота на други растителни видове в проба с теглото, указано в колона 4 на приложение III (общо на колона)			Условия по отношение на семена от лупина от друг цвят и на семена от горчива лупин
Максимално съдържание на семена от други растения (% тегловни)				Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. различни от Rumex acetosella	
Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis				
8	9	10	11	12	13	14	15
0·3				0	0 (й) (к)	2	
0·3				0	0 (й) (к)	2	
0·3				0	0 (й) (к)	2	
0·3				0	0 (й) (к)	2	
0·3				0	0 (й) (к)	10	
0·3				0 (ж)	0 (й) (к)	20	
0·3				0	0 (й) (к)	10	
0·3				0	0 (й) (к)	20	
0·3				0	0 (й) (к)	10	
0·3				0	0 (й) (к)	20	
0·3				0	0 (й) (к)	10	
0·3				0	0 (й) (к)	20	
0·3				0	0 (й) (к)	20	
0·3				0	0 (й) (к)	20	
0·3				0	0 (к)	5	
0·3				0	0 (к)	5	
0·3				0	0 (й) (к)	5	
0·3				0	0 (й) (к)	2	
0·3				0	0 (й) (к)	2	
0·3				0	0 (й) (к)	2	
0·3				0	0 (й) (к)	2	
0·3				0 (з)	0 (й) (к)	2	
	0·3			0	0 (к)	20	
	0·3			0	0 (л) (м)	10	
	0·3			0 (и)	0 (й)	20 (н)	(о) (п)
	0·3			0 (и)	0 (й)	20 (н)	(о) (п)
	0·3			0 (и)	0 (й)	20 (н)	(о) (п)
	0·3			0	0 (л) (м)	20	
	0·3			0	0 (л) (м)	20	
	0·3			0	0 (л) (м)	20	
	0·3			0	0 (й)	20	
	0·3			0	0 (й)	20 (н)	
	0·3			0	0 (л) (м)	20	
	0·3			0	0 (л) (м)	10	
	0·3			0	0 (л) (м)	20	
	0·3			0	0 (л) (м)	20	
	0·3			0	0 (л) (м)	10	
	0·3			0	0 (л) (м)	10	
	0·3			0	0 (й)	20	
	0·3			0	0 (й)	20 (н)	
	0·3			0	0 (й)	20 (н)	
	0·3			0 (и)	0 (й)	20 (н)	
	0·3			0 (и)	0 (й)	20 (н)	
	0·3			0 (и)	0 (й)	20 (н)	
		0·3	0·3	0	0 (й) (к)	20	
		0·3	0·3	0	0 (й) (к)	20	
		0·3	0·3	0	0 (й)	20	

Б. Стандарти или други изисквания, които се прилагат в случай на позоваване в таблицата към раздел I, точка 2, буква А на настоящото приложение:

а) Всички свежи и здрави семена, които не са покълнали след предварително третиране се считат за семена, които са покълнали.

б) До максимално посоченото количество, наличните твърди семена, се считат за семена, които могат да покълнат.

в) Общо максимално съдържание 0,8 % тегловно на семена от други видове *Poa* не се счита за примес.

г) Максимално съдържание 1 % тегловно на семена от вида *Trifolium pratense* не се счита за примес.

д) Общо максимално съдържание 0,5 % тегловни на семена от вида *Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum arvense, Vicia faba* spp., *Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa* при други съответни видове не се счита за примес.

е) Препоръчваното максимално процентно съдържание в тегловно изражение на семена от отделен тип не се прилага за семена от *Poa* spp.

ж) Максимално две семена от *Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis* в проба с предписаното тегло не се счита за примес, когато има втора проба със същото тегло без семена от тези видове.

з) Наличието на едно семе от типа *Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis* в проба от предписаното тегло не се счита за примес, когато има втора проба с двойно на предписаното тегло без семена от тези видове.

и) Определянето на семената от *Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis* по брой не трябва да се извършва, освен ако има съмнение дали са били изпълнени изискванията от колона 12.

й) Определянето по брой на семената от *Cuscuta* spp., не трябва да се извършва, освен ако има съмнение дали са били изпълнени изискванията от колона 13.

к) Наличието на едно семе от *Cuscuta* spp., в проба с предписваното тегло не се счита за примес, когато има втора проба със същото тегло без семена от *Cuscuta* spp.

л) Теглото на пробата за определянето на семената от *Cuscuta* spp., по брой е два пъти теглото, посочено в колона 4 на приложение III за съответните видове.

м) Наличието на едно семе от типа *Cuscuta* spp. в проба с предписваното тегло не се счита за примес, когато има втора проба с тегло два пъти колкото предписаното, без семена от *Cuscuta* spp.

н) Не е необходимо да се извършва определяне по брой на семена от *Rumex* spp. с изключение на семена от *Rumex acetosella*, освен ако има съмнения, че не са били изпълнени изискванията от колона 14.

о) Процентното съдържание по брой на семена от лупина от друг цвят, не трябва да надвишава:

— в горчива лупина 2 %,

— в лупини, различни от горчива лупина 1 %.

п) Процентното съдържание по брой на семена от горчива лупина в други сортове освен горчива лупина не трябва да надвишава:

- за сертифицирани семена от първо размножение след базови семена 3 %,
- за сертифицирани семена от следващи размножения, след базови семена 5 %.

3. Вредните организми, които намаляват полезността на семето, трябва да бъдат на възможно най-ниско равнище.

II. БАЗОВИ СЕМЕНА

При спазване на посочените по-долу разпоредби, условията в раздел I на настоящото приложение се прилагат за базови семена:

1. Семената от *Pisum arvense* и апомиктичните моноклонни сортове на вида *Poa* spp., трябва да отговарят на следните стандарти или други изисквания: минималната сортова чистота е 99,7 %.

   Минималната сортова чистота се проверява главно при полеви инспекции, извършвани в съответствие с условията, изложени в приложение I.

2. Семената трябва да отговарят на следните стандарти или други изисквания:

   A. Таблица:

Видове	Максимално съдържание на семена от други растения						Други стандарти или условия
	Общо (% тегловно)	Съдържание по брой в проба с тегло, посочено в колона 4 на приложение III (общо на колона)					
		Само един вид	Rumex spp., освен Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
GRAMINEAE							
Agrostis canina ssp. canina	0·3	20	1	1	1		(й)
Agrostis gigantea	0·3	20	1	1	1		(й)
Agrostis stolonifera	0·3	20	1	1	1		(й)
Agrostis tenuis	0·3	20	1	1	1		(й)
Alopecurus pratensis	0·3	20 (а)	5	5	5		(й)
Arrhenatherum elatius	0·3	20 (а)	5	5	5		(и) (й)
Dactylis glomerata	0·3	20 (а)	5	5	5		(й)
Festuca arundinacea	0·3	20 (а)	5	5	5		(й)
Festuca ovina	0·3	20 (а)	5	5	5		(й)
Festuca pratensis	0·3	20 (а)	5	5	5		(й)
Festuca rubra	0·3	20 (а)	5	5	5		(й)
Lolium multiflorum	0·3	20 (а)	5	5	5		(й)
Lolium perenne	0·3	20 (а)	5	5	5		(й)
Lolium X hybridum	0·3	20 (а)	5	5	5		(й)
Phleum bertolonii	0·3	20	2	1	1		(й)
Phleum pratense	0·3	20	2	1	1		(й)
Poa annua	0·3	20 (б)	1	1	1		(е) (й)
Poa nemoralis	0·3	20 (б)	1	1	1		(е) (й)
Poa palustris	0·3	20 (б)	1	1	1		(е) (й)
Poa pratensis	0·3	20 (б)	1	1	1		(е) (й)
Poa trivialis	0·3	20 (б)	1	1	1		(е) (й)
Trisetum flavescens	0·3	20 (в)	1	1	1		(и) (й)

Видове	Максимално съдържание на семена от други растения						Други стандарти или условия
	Общо (% тегловно)	Съдържание по брой в проба с тегло, посочено в колона 4 на приложение III (общо на колона)					
		Само един вид	Rumex spp., освен Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
LEGUMINOSAE							
Hedysarum coronarium	0·3	20	5			0 (д)	(й)
Lotus corniculatus	0·3	20	5			0 (д)	(ж) (й)
Lupinus albus	0·3	20	5			0 (г)	(з) (к)
Lupinus angustifolius	0·3	20	5			0 (г)	(з) (к)
Lupinus luteus	0·3	20	5			0 (г)	(з) (к)
Medicago lupulina	0·3	20	5			0 (д)	(й)
Medicago sativa	0·3	20	5			0 (д)	(й)
Medicago varia	0·3	20	5			0 (д)	(й)
Onobrychis sativa	0·3	20	5			0 (г)	
Pisum arvense	0·3	20	5			0 (г)	
Trifolium alexandrinum	0·3	20	5			0 (д)	(й)
Trifolium hybridum	0·3	20	5			0 (д)	(й)
Trifolium incarnatum	0·3	20	5			0 (д)	(й)
Trifolium pratense	0·3	20	5			0 (д)	(й)
Trifolium repens	0·3	20	5			0 (д)	(й)
Trifolium resupinatum	0·3	20	5			0 (д)	(й)
Trigonella foenumgraecum	0·3	20	5			0 (г)	
Vicia faba ssp. var. equina	0·3	20	5			0 (г)	
Vicia faba var. minor	0·3	20	5			0 (г)	
Vicia pannonica	0·3	20	5			0 (г)	(з)
Vicia sativa	0·3	20	5			0 (г)	(з)
Vicia villosa	0·3	20	5			0 (г)	(з)
ДРУГИ ВИДОВЕ							
Brassica napus var. napobrassica	0·3	20	5				(й)
Brassica oleracea convar. acephala	0·3	20	5				(й)
Raphanus sativus ssp. oleifera	0·3	20	5				

Б. Стандартните или други изисквания, които се прилагат при позоваване в таблицата по раздел II, точка 2, буква А на настоящото приложение:

а) Максимално количество от общо 80 семена от *Poa* spp., не се счита за примес.

б) Посоченото в колона 3 условие не се прилага за семената от *Poa* spp. Максималното общо съдържание на семена от *Poa* spp., освен видовете, които ще бъдат преглеждани, не трябва да надвишава едно при проба от 500 семена.

в) Максимално общо количество от 20 семена от *Poa* spp. не се счита за на примес.

г) Определянето на семена от типа *Melilotus* spp., не трябва да се извършва, освен ако има съмнение, че не са били изпълнени изискванията, посочени в колона 7.

д) Наличието на едно семе от *Melilotus* spp., в проба с предписаното тегло, не се счита за примес, когато има втора проба с тегло два пъти колкото предписаното която е без семена от *Melilotus* spp.

е) Изискването по буква в), посочено в раздел I, точка 2 на настоящото приложение не се прилага.

ж) Изискването по буква г) от раздел I, точка 2 на настоящото приложение не се прилага.

з) Изискването по буква д) от раздел I точка 2 на настоящото приложение не се прилага.

и) Изискването по буква е) от раздел I точка 2 на настоящото приложение не се прилага.

й) Изискванията по букви к) и м) от раздел I, точка 2 на настоящото приложение не се прилагат.

к) Процентното съдържание по брой на семена от горчива лупина при други сортове, освен типа горчива лупина, не трябва да надхвърля 1 %.

III. ТЪРГОВСКИ СЕМЕНА

При спазване на посочените по-долу разпоредби, условията, посочени в раздел I, точки 2 и 3 от настоящото приложение се прилагат за търговски семена:

1. Процентите на теглото, изложени в колони 5 и 6 на таблицата от раздел I, точка 2, буква А на настоящото приложение се увеличават с 1 %.

2. За *Poa annua* максимално общо съдържание от 10 % тегловно семена от други видове *Poa* не се счита за примес.

3. За видове *Poa* spp. различни от *Poa annua* максимално общо съдържание от 3 % тегловно на семената от другите видове *Poa* няма да се счита за примес.

4. За *Hedisarum coronarium* максимално общо съдържание от 1 % тегловно на семената от *Melilotus* spp. не се счита за примес.

5. Условието по буква е) от раздел I, точка 2 на настоящото приложение за *Lotus corniculatus* не се прилага.

6. За видовете лупина:

(а) минималната аналитична чистота е 97 % тегловни;

б) процентното съдържание по брой семена лупина от друг цвят няма да надхвърля:

- в горчива лупина 4 %,

- в лупини, различни от горчива лупина 2 %;

в) процентът по брой семена от горчива лупина в лупина, различна от горчива лупина не трябва да надхвърля 5 %.

7. При *Vicia* spp. максимално общо тегло от 6 % на семената от типа *Vicia pannonica, Vicia villiosa* или свързани с тях култивирани видове в другите съответни видове не се счита за наличие на примес.

8. При *Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa* минималната аналитична чистота е 97 % тегловни.“

3. Приложение III се заменя от следния текст:

„*ПРИЛОЖЕНИЕ III*

ТЕГЛО НА ПАРТИДИ И ПРОБИ

Видове	Максимално тегло на проба (тонове)	Минимално тегло на проба, която се взема от партидата (в грамове)	Тегло на пробата за определяне по брой, предвидено в колони от 12 до 14 на приложение II, раздел I, точка 2, буква A и колони от 3 до 7 на приложение II, раздел II, точка 2, буква A (в грамове)
1	2	3	4
GRAMINEAE			
Agrostis canina ssp. canina	10	50	5
Agrostis gigantea	10	50	5
Agrostis stolonifera	10	50	5
Agrostis tenuis	10	50	5
Alopecurus pratensis	10	100	30
Arrhenatherum elatius	10	200	80
Dactylis glomerata	10	100	30
Festuca arundinacea	10	100	50
Festuca ovina	10	100	30
Festuca pratensis	10	100	50
Festuca rubra	10	100	30
Lolium multiflorum	10	200	60
Lolium perenne	10	200	60
Lolium X hybridum	10	200	60
Phleum bertolonii	10	50	10
Phleum pratense	10	50	10
Poa annua	10	50	10
Poa nemoralis	10	50	5
Poa palustris	10	50	5
Poa pratensis	10	50	5
Poa trivialis	10	50	5
Trisetum flavescens	10	50	5

Видове	Максимално тегло на проба (тонове)	Минимално тегло на проба, която се взема от партидата (в грамове)	Тегло на пробата за определяне по брой, предвидено в колони от 12 до 14 на приложение II, раздел I, точка 2, буква A и колони от 3 до 7 на приложение II, раздел II, точка 2, буква A (в грамове)
1	2	3	4
LEGUMINOSAE			
Hedysarum coronarium			
— плод	10	1000	300
— семена	10	400	120
Lotus corniculatus	10	200	30
Lupinus albus	20	1000	1000
Lupinus angustifolius	20	1000	1000
Lupinus luteus	20	1000	1000
Medicago lupulina	10	300	50
Medicago sativa	10	300	50
Medicago varia	10	300	50
Onobrychis sativa			
— плод	10	600	600
— семена	10	400	400
Pisum arvense	20	1000	1000
Trifolium alexandrinum	10	400	60
Trifolium hybridum	10	200	20
Trifolium incarnatum	10	500	80
Trifolium pratense	10	300	50
Trifolium repens	10	200	20
Trifolium resupinatum	10	200	20
Trigonella foenumgraecum	10	500	450
Vicia faba ssp. var. equina	20	1000	1000
Vicia faba var. minor	20	1000	1000
Vicia pannonica	20	1000	1000
Vicia sativa	20	1000	1000
Vicia villosa	20	1000	1000
ДРУГИ ВИДОВЕ			
Brassica napus var. napobrassica	10	200	100
Brassica oleracea convar. acephala	10	200	100
Raphanus sativus ssp. oleifera	10	300	300“

Член 2

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с:

— на 1 януари 1981 г., разпоредбите на член 1, параграф 1 по отношение на приложение I, точки 3 и 4, член 1, параграф 2, по отношение на приложение II, раздел I, точка 1, и приложение II, раздел II, точка 1,

— другите разпоредби на настоящата директива, не по-късно от 1 юли 1980 г.

2. Държавите-членки гарантират, че семената от фуражни култури не са обект на никакви търговски ограничения поради различните дати на прилагане на настоящата директива, в съответствие с второто тире на параграф 1.

Член 3

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 април 1978 година.

За Комисията

Finn GUNDELACH

Заместник-председател