Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 943/2005 AL COMISIEI

din 21 iunie 2005

privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi în hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 159, 22.6.2005, p. 6)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 361/2011 al Comisiei din 13 aprilie 2011	L 100	22	14.4.2011
►M2	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 290/2014 al Comisiei din 21 martie 2014	L 87	84	22.3.2014
►M3	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1145 al Comisiei of 8 iunie 2017	L 166	1	29.6.2017

▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 943/2005 AL COMISIEI

din 21 iunie 2005

privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi în hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

Articolul 1

Se autorizează fără limită de timp, ca aditiv în hrana animalelor, preparatul aparținând grupei „Microorganisme” menționat în anexa I, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Se autorizează fără limită de timp, ca aditivi în furaje, preparatele aparținând grupei „Enzime” menționate în anexa II, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M1

ANEXA I

Nr. CE		Aditiv	Formulă chimică, descriere	Specii sau categorii de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						UFC/kg de hrană completă			
Microorganisme									
E 1705		*Enterococcus faecium* NCIMB 10415	Preparat de *Enterococcus faecium* care conține cel puțin: sub formă de microcapsule: $1,0 \times 10^{10}$ UFC/g de aditiv; sub formă de granule: $3,5 \times 10^{10}$ UFC/g aditiv	Porci pentru îngrășare	—	$0,35 \times 10^{9}$	$1,0 \times 10^{9}$	În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.	Fără limită de timp

ANEXA II

Nr. CE	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					Unități de activitate/kg de furaj complet			
Enzime								
E 1604	►**M2** ——— ◄	Preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază și endo-1,4-beta-xilanază produse de *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101) având o activitate minimă de: pulbere: endo-1,3(4)-beta-glucanază: 2 000 U ([1])/g endo-1,4-beta-xilanază: 1 400 U ([2])/g formă lichidă: endo-1,3(4)-beta-glucanază: 500 U/ml endo-1,4-beta-xilanază: 350 U/ml	Găini ouătoare	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 100 U Endo-1,4-beta-xilanază: 70 U	— —	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se menționează temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: endo-1,3(4)-beta-glucanază: 100 U endo-1,4-beta-xilanază: 70 U. 3. Se utilizează în furaje combinate, bogate în polizaharide non-amilacee (în principal beta-glucani și arabinoxilani), de exemplu, ce conțin mai mult de 60 % orz sau 30 % grâu.	Fără limită de timp
			Curci pentru îngrășare	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 100 U Endo-1,4-beta-xilanază: 70 U	— —	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se menționează temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: endo-1,3(4)-beta-glucanază: 100 U endo-1,4-beta-xilanază: 70 U. 3. Se utilizează în furaje combinate, bogate în polizaharide non-amilacee (în principal beta-glucani și arabinoxilani), de exemplu, ce conțin mai mult de 30 % orz sau 20 % grâu.	Fără limită de timp

▼B

Nr. CE	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					Unități de activitate/kg de furaj complet			
E 1613	Endo-1,4-beta-xilanaza EC 3.2.1.8	Preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10W) având o activitate minimă de: pulbere: 70 000 IFP ([3])/g formă lichidă: 7 000 IFP/ml	Curci pentru îngrășare	—	1 400 IFP	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se menționează temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: 1 400 IFP. 3. Se utilizează în furaje combinate, bogate în polizaharide non-amilacee (în principal arabinoxilani), de exemplu, ce conțin mai mult de 38 % grâu.	Fără limită de timp
▼M3								
———————								
———————								
———————								

▼B

([1]) 1 U este cantitatea de enzimă ce eliberează 5,55 micromoli de zahăr reducător (măsurați în echivalenți de maltoză) pe minut din beta-glucan de orz, la pH 5,0 și 50 °C.
([2]) 1 U este cantitatea de enzimă ce eliberează 4,00 micromoli de zahăr reducător (măsurați în echivalenți de maltoză) pe minut din xilan de lemn de mesteacăn, la pH 5,0 și 50 °C.
([3]) 1 IFP este cantitatea de enzimă ce eliberează 1 micromol de de zahăr reducător (măsurat în echivalenți xiloză) pe minut din xilan de ovăz, la pH 4,8 și 50 °C.
([4]) ►M3 ——————— ◄
([5]) ►M3 ——————— ◄
([6]) ►M3 ——————— ◄
([7]) ►M3 ——————— ◄
([8]) ►M3 ——————— ◄