**Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm**

►B

# KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 943/2005

**(2005. gada 21. jūnijs)**

**par dažu piedevu pastāvīgu atļaušanu barībā**

**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

(OV L 159, 22.6.2005., 6. lpp.)

Grozīta ar:

| | | Oficiālais Vēstnesis | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nr. | Lappuse | Datums |
| ►M1 | Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 361/2011 (2011. gada 13. aprīlis) | L 100 | 22 | 14.4.2011. |
| ►M2 | Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 290/2014 (2014. gada 21. marts) | L 87 | 84 | 22.3.2014. |
| ►M3 | Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1145 (2017. gada 8. jūnijs) | L 166 | 1 | 29.6.2017. |

▼B

# KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 943/2005

**(2005. gada 21. jūnijs)**

**par dažu piedevu pastāvīgu atļaušanu barībā**

**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

*1. pants*

"Mikroorganismu" grupas preparātu, kas aprakstīts šīs regulas I pielikumā, ir atļauts bez laika ierobežojuma izmantot kā piedevu dzīvnieku barībā saskaņā ar minētajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

*2. pants*

"Fermentu" grupas preparātus, kas aprakstīti šīs regulas II pielikumā, ir atļauts bez laika ierobežojuma izmantot kā piedevu dzīvnieku barībā saskaņā ar minētajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

*3. pants*

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M1

*I PIELIKUMS*

| EK Nr. | | Piedeva | Ķīmiskā formula, apraksts | Dzīvnieka suga vai kategorija | Maksimālais vecums | Minimālais saturs | Maksimālais saturs | Citi noteikumi | Atļaujas derīguma termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KVV/kg kompleksās barības | | | |
| **Mikroorganismi** | | | | | | | | | |
| E 1705 | | *Enterococcus faecium*<br>NCIMB 10415 | *Enterococcus faecium* preparāts, kas satur vismaz:<br>mikrokapsulu veidā:<br>$1,0 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas;<br>granulētā veidā:<br>$3,5 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas | Gaļas cūkas | — | $0,35 \times 10^{9}$ | $1,0 \times 10^{9}$ | Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. | Bez termiņa ierobežojuma |

*II PIELIKUMS*

| EK Nr. | Piedeva | Ķīmiskā formula, apraksts | Dzīvnieku suga vai kategorija | Maksimālais vecums | Minimālais saturs | Maksimālais saturs | Citi noteikumi | Atļaujas termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aktīvās vienības/kg kompleksās barības | | | |
| **Fermenti** | | | | | | | | |
| E 1604 | ►**M2** ——— ◄ | Endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts, kas iegūts no *Penicillium funiculosum* (*IMI SD* 101) un kura minimālā aktivitāte ir:<br>pulverim:<br>endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 2 000 U ([1])/g<br>endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 400 U ([2])/g<br>šķidrā veidā:<br>endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 500 U/ml<br>endo-1,4-beta-ksilanāze: 350 U/ml | Dējējvistas | — | Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U<br>Endo-1,4-beta-ksilanāze: 70 U | —<br>— | 1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos nosaka glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un granulēšanas noturīgumu<br>2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības:<br>endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U<br>endo-1,4-beta-ksilanāze: 70 U<br>3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz cieti nesaturošu polisaharīdu (galvenokārt beta-glikānu un arabinoksilānu), piemēram, tādā, kas satur vairāk nekā 60 % miežu vai 30 % kviešu | Bez laika ierobežojuma |
| | | | Tītari nobarošanai | — | Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U<br>Endo-1,4-beta-ksilanāze: 70 U | —<br>— | 1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos nosaka glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un granulēšanas noturīgumu<br>2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības:<br>endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U<br>endo-1,4-beta-ksilanāze: 70 U<br>3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz cieti nesaturošu polisaharīdu (galvenokārt beta-glikānu un arabinoksilānu), piemēram, tādā, kas satur vairāk nekā 30 % miežu un 20 % kviešu | Bez laika ierobežojuma |

02005R0943 — LV — 19.07.2017 — 003.001 — 4

▼B

| EK Nr. | Piedeva | Ķīmiskā formula, apraksts | Dzīvnieku suga vai kategorija | Maksimālais vecums | Minimālais saturs | Maksimālais saturs | Citi noteikumi | Atļaujas termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aktīvās vienības/kg kompleksās barības | | | |
| E 1613 | Endo-1,4-beta-ksilanāze<br>*EC* 3.2.1.8 | Endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts, kas iegūts no *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6–10 W) un kura minimālā aktivitāte ir:<br>pulverim: 70 000 IFP ([3])/g<br>šķidrā veidā: 7 000 IFP/ml | Tītari nobarošanai | — | 1 400 IFP | — | 1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos nosaka glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un granulēšanas noturīgumu<br>2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 1 400 IFP<br>3. Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz cieti nesaturošu polisaharīdu (galvenokārt arabinoksilānu), piemēram, tādā, kas satur vairāk nekā 38 % kviešu | Bez laika ierobežojuma |
| ▼M3 _____ | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |

▼B

([1]) 1 U ir fermenta daudzums, kas minūtē pie pH 5,0 un 50 °C no miežu beta-glikāna izdala 5,55 mikromolus reducējošo cukuru (maltozes ekvivalenti).
([2]) 1 U fermenta daudzums, kas minūtē pie pH 5,5 un 50 °C no bērza koksnes ksilāna izdala 4,00 mikromolus reducējošo cukuru (maltozes ekvivalenti).
([3]) 1 IFP ir fermenta daudzums, kas minūtē pie pH 4,8 un 50 °C no auzu ksilāna izdala vienu mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalenti).
([4]) ►M3 _____ ◄
([5]) ►M3 _____ ◄
([6]) ►M3 _____ ◄
([7]) ►M3 _____ ◄
([8]) ►M3 _____ ◄