Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 943/2005

2005 m. birželio 21 d.

dėl nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 159, 2005 6 22, p. 6)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	2011 m. balandžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 361/2011	L 100	22	2011 4 14
►M2	2014 m. kovo 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 290/2014	L 87	84	2014 3 22
►M3	2017 m. birželio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1145	L 166	1	2017 6 29

▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 943/2005

2005 m. birželio 21 d.

dėl nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

I priede nurodytą mikroorganizmų grupei priklausantį preparatą leidžiama neribotą laiką naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

II priede nurodytus fermentų grupei priklausančius preparatus leidžiama neribotą laiką naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M1

I PRIEDAS

EB Nr.		Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV/kg visaverčio pašaro			
Mikroorganizmai									
E 1705		*Enterococcus faecium* NCIMB 10415	*Enterococcus faecium* preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip: Mikrokapsulių pavidalo: $1,0 \times 10^{10}$ KVS/g priedo; Granulių pavidalo: $3,5 \times 10^{10}$ KSV/g priedo	Penimos kiaulės	—	$0,35 \times 10^{9}$	$1,0 \times 10^{9}$	Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, laikymo trukmę ir stabilumą granuliuojant.	Neribotam laikui

II PRIEDAS

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimas galioja
					Aktyvumo vienetų/kg visaverčio pašaro			
Fermentai								
E 1604	►**M2** ——— ◄	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautų iš *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 101), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: Miltelių pavidalo: endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 2 000 U ([1])/g endo-1,4-beta-ksilanazė: 1 400 U ([2])/g Skysto pavidalo: endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 500 U/ml endo-1,4-beta-ksilanazė: 350 U/ml	Dedeklės vištos	—	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 100 U Endo-1,4-beta-ksilanazė: 70 U	— —	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, trukmę ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama dozė visaverčio pašaro kilograme: endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 100 U endo-1,4-beta-ksilanazė: 70 U. 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač beta- gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., tuose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 60 % miežių arba 60 % kviečių.	Neribotą laiką
			Penimi kalakutai	—	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 100 U Endo-1,4-beta-ksilanazė: 70 U	— —	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, trukmę ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama dozė visaverčio pašaro kilograme: endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 100 U endo-1,4-beta-ksilanazė: 70 U. 3. Naudoti kombinuotuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač beta- gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 30 % miežių arba 20 % kviečių.	Neribotą laiką

02005R0943 — LT — 19.07.2017 — 003.001 — 4

▼B

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimas galioja
					Aktyvumo vienetų/kg visaverčio pašaro			
E 1613	Endo-1,4-beta-ksilanazė EB 3.2.1.8	Endo-1,4-beta-gliukanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: Miltelių pavidalo: 70 000 IFP ([3])/g Skysto pavidalo: 7 000 IFP/ml	Penimi kalakutai	—	1 400 IFP	—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, trukmę ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama dozė visaverčio pašaro 1 kg: 1 400 IFP. 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač arabinoksilanų), pvz., tuose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 38 % kviečių.	Neribotą laiką
▼M3 _____								
_____								
_____								

▼B

([1]) 1 U – tai fermento kiekis, iš miežių beta-gliukano per minutę atpalaiduojantis 5,55 mikromolio redukuojančių cukrų (maltozės ekvivalentai), esant 5,0 pH ir 50 °C temperatūrai.
([2]) 1 U – tai fermento kiekis, iš beržų ksilano per minutę atpalaiduojantis 4,00 mikromolius redukuojančių cukrų (maltozės ekvivalentai), esant 5,5 pH ir 50 °C temperatūrai.
([3]) 1 IFP – tai fermento kiekis, iš avižų ksilano per minutę atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai), esant 4,8 pH ir 50 °C temperatūrai.
([4]) ►M3 _____ ◄
([5]) ►M3 _____ ◄
([6]) ►M3 _____ ◄
([7]) ►M3 _____ ◄
([8]) ►M3 _____ ◄