RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2268/88

af 19. juli 1988

om fastsættelse for 1988-høsten af målpriser, interventionspriser og præmier til købere af tobak i blade, afledte interventionspriser for tobak i baller, referencekvaliteter og produktionsområder samt de maksimale garantimængder og om ændring af forordning (EØF) nr. 1975/87

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 727/70 af 21. april 1970 om oprettelse af en fælles markedsordning for råtobak (1), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2267/88 (2), særlig artikel 2, stk. 5, artikel 4, stk. 4 og 5, og artikel 6, stk. 8,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (3),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (4),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (5),

under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved fastsættelsen af priserne for råtobak bør der tages hensyn såvel til målsætningen for den fælles landbrugspolitik som til det bidrag, som Fællesskabet tilstræber at yde til den harmoniske udvikling af verdenshandelen; den fælles landbrugspolitik tilsigter særlig at garantere landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard, at sikre forsyningerne og at garantere forbrugerne leverancer til rimelige priser;

målpriserne og interventionspriserne for tobak i blade bør fastsættes efter de kriterier, der omhandles i artikel 2, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 727/70, med henblik på at fremme en produktionsudvikling i retning af en omlægning af avlen henimod de sorter, der er mest efterspurgte og konkurrencedygtige;

for 1988-høsten bør der endvidere fastsættes afledte interventionspriser for de sorter, for hvilke der inden iværksættelsen af den fælles markedsordning fandtes en prisgaranti for tobak i baller, eller for sorter dyrket i Grækenland, Spanien og Portugal før disse landes tiltrædelse samt for de sorter, der hovedsagelig dyrkes i Tyskland, for at tage hensyn til handelssædvanerne i dette land;

i henhold til artikel 4, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 727/70 skal der inden for en samlet mængde for Fællesskabet fastsættes en maksimal garantimængde for hver af de sorter eller sortsgrupper af tobak, som produceres i Fællesskabet, og overskridelse heraf medfører, at målpriser og interventionspriser samt præmier nedsættes forholdsmæssigt; disse maksimale garantimængder bør fastsættes; disse mængder, samt fordelingen mellem sortsgrupper, vil dog kunne tages op til fornyet behandling på baggrund af de indvundne erfaringer og omstillingsprogrammerne; de således vedtagne bestemmelser gælder derfor kun for 1988-høsten;

formålet med den præmie, der ydes til køberne af den i Fællesskabet producerede tobak, er at gøre det muligt for dem at betale producenterne af tobak i blade en pris, som ligger på samme niveau som målprisen, under hensyntagen til prisudviklingen på verdensmarkedet og til det prisniveau, som er en følge af forholdet mellem udbud og efterspørgsel på Fællesskabets marked;

ovennævnte priser og præmien bør fastsættes for hver sort, der dyrkes i de anerkendte produktionszoner, og for en referencekvalitet, der er defineret således, at tobakkens kvalitet kan bedømmes så objektivt som muligt;

for 1988-høsten er det hensigtsmæssigt at anføre de anerkendte produktionsområder for hver enkelt tobakssort og gentage de definitioner af referencekvaliteter, som blev fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1975/87 af 2. juli 1987 om fastsættelse for 1987-høsten af målpriser, interventionspriser og præmier til købere af tobak i blade, afledte interventionspriser for tobak i baller samt referencekvaliteter og produktionsområder og om ændring af forordning (EØF) nr. 1577/86 (6);

i listen over anerkendte produktionsområder i bilag III til forordning (EØF) nr. 1975/87 er der udeladt et produktionsområde; for at tobaksproducenterne i disse områder kan omfattes af de i nævnte forordning fastsatte foranstaltninger, bør det pågældende bilag ændres;

i henhold til forordning (EØF) nr. 1890/87 (7) gælder der for tobakssektoren fra 1. april 1988 en ny repræsentativ kurs for

(1) EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 1.
(2) Se side 18 i denne Tidende.
(3) EFT nr. C 139 af 30. 5. 1988, s. 72.
(4) EFT nr. C 187 af 18. 7. 1988.
(5) EFT nr. C 175 af 4. 7. 1988, s. 33.
(6) EFT nr. L 184 af 3. 7. 1987, s. 31.
(7) EFT nr. L 182 af 3. 7. 1987, s. 4.

visse medlemsstaters valutaer; denne bestemmelse vil fra denne dato medføre, at de præmier, der er fastsat i ECU for en stor del af høsten, nedsættes, i national valuta i de medlemsstater, hvis repræsentative kurs opskrives; på grund af de forhold, der kendetegner sektoren, er det imidlertid mere rimeligt at sørge for, at hele et års høst behandles ens; dette kan ske ved, at det fastsættes, at den tidligere omregningskurs i de pågældende medlemsstater gælder for de præmier, som udbetales for 1987-høsten —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For 1988-høsten fastsættes de i artikel 2, stk. 3, litra b) og c), i forordning (EØF) nr. 727/70 omhandlede referencekvaliteter og anerkendte produktionsområder for hver af de i Fællesskabet producerede sorter af tobak i blade som angivet henholdsvis i bilag I og III til nærværende forordning.

Artikel 2

For 1988-høsten fastsættes de i artikel 6, stk. 3, litra b) og c), i forordning (EØF) nr. 727/70 omhandlede referencekvaliteter og anerkendte produktionsområder for hver af de i Fællesskabet producerede sorter af tobak i baller, for hvilke der er fastsat en afledt interventionspris, som angivet henholdsvis i bilag II og III til nærværende forordning.

Artikel 3

1. For 1988-høsten fastsættes de i artikel 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 727/70 omhandlede målpriser, interventionspriser og præmier, der ydes til køberne af tobak i blade, samt de i artikel 6 i samme forordning omhandlede afledte interventionspriser for tobak i baller som angivet i bilag IV til nærværende forordning.

2. Priserne og præmierne finder kun anvendelse, såfremt hver af disse sorter er blevet dyrket i de tilsvarende produktionsområder som angivet i bilag III.

3. For 1988-høsten fastsættes de i artikel 4, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 727/70 omhandlede maksimale garantimængder som angivet i bilag V til nærværende forordning.

Artikel 4

I bilag III til forordning (EØF) nr. 1975/87 ændres for sort nr. 1 »Badischer Geudertheimer og hybrider deraf« de for Italien anerkendte produktionsområder til »Veneto, Toscana, Molise, Campania, Latium og Puglia«.

Artikel 5

Den omregningskurs, der skal anvendes i Forbundsrepublikken Tyskland på præmierne for 1987-høsten, er den repræsentative kurs, der var gældende for den pågældende valuta før 1. april 1988.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende.*

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 1988.

På Rådets vegne
Y. POTTAKIS
Formand

BILAG I

Tobak i blade: sorter og deres referencekvalitet for 1988-høsten

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
1	Badischer Geudertheimer og hybrider deraf	Hauptgut (Leaves) af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde, ubeskadigede blade af mørkebrun til meleret farve, af ensartet længde Præsentation: Sorteret tobak, i bundter eller i foreløbige baller, eventuelt bundet med et andet materiale end tobak Fugtighed: 26 %
2	Badischer Burley E og hybrider deraf	Hauptgut (Leaves) af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde, ubeskadigede, skærefaste blade af rødligbrun til lysebrun farve, af ensartet længde Præsentation: Sorteret tobak, i bundter eller i foreløbige baller, bundet med et andet materiale end tobak Fugtighed: 25 %
3	Virgin D	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde, ubeskadigede blade: afvigelser i brunlige til grønliggule farver er tilladt op til en tredjedel af bladfladen Præsentation: Sorteret tobak, i bundter eller i foreløbige baller, bundet med et andet materiale end tobak Fugtighed: 19 %
4	a) Paraguay og hybrider deraf b) Dragon vert og hybrider deraf, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Midterste blade (Leaves) af klasse 2 Klasse 2: Sunde blade med lette farvnings-, bladvævs- og modenhedsfejl, men med tilstrækkelig kombustibilitet Præsentation: Sorteret og bundtet eller sammenrullet tobak Fugtighed: 27 %
5	Nijkerk	Øverste blade (Tips) af klasse 2 Klasse 2: — enten blade af anden længde (45 cm eller derunder), med meget trækfast, kødfuldt, ubeskadiget modstandsdygtigt og elastisk bladvæv, uden fremtrædende åring, af god modenhed, der viser sig ved en brun til mørkebrun farve, af varm tone — eller blade af første længde (over 45 cm), med trækfast, kødfuldt, endnu ubeskadiget, modstandsdygtigt bladvæv, med mere eller mindre fremtrædende åring, af alle farver med undtagelse af flaskegrøn Præsentation: Sorteret og bundtet eller sammenrullet tobak Fugtighed: 27 %

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
6	a) Misionero og hybrider deraf b) Rio Grande og hybrider deraf	Blade af 2. kvalitet 2. kvalitet: Fuldt udviklede blade af længde over 45 cm, uden groft bladvæv, med en lys, noget gullig farve, af en varm eller temmelig varm tone, tilstrækkeligt faste og stort set ubeskadigede, med forholdsmæssig god kombustibilitet Præsentation: Sorteret og bundtet eller sammenrullet tobak, (capsé) Fugtighed: 27 %
7	Bright	Blade af kategori A Kategori A: Blade af tilstrækkelig modenhed, omhyggeligt tørrede, af åben tekstur og ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af gul farve i forskellige schatteringer Præsentation: I foreløbige baller på 30-40 kg Fugtighed: 16 %
8	Burley I	Blade af kategori A Kategori A: Blade af tilstrækkelig modenhed, omhyggeligt tørrede, af åben tekstur, også faste, med ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af mere eller mindre varm nøddebrun farve Præsentation: I foreløbige baller på 30-40 kg eller i bundter på 25-30 blade bundet med et andet materiale end tobak (fascicoli) Fugtighed: 19 %
9	Maryland	Blade af kategori A Kategori A: Blade af tilstrækkelig modenhed, med lette tørringsfejl med meget få bronzefarvede nuancer, med et bladvæv af middel tekstur og ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af en rødligbrun, nærmest varm farve Præsentation: I foreløbige baller på 30-40 kg eller i bundter på 25-30 blade bundet med andet materiale end tobak (fascicoli) Fugtighed: 19 %
10	a) Kentucky og hybrider deraf b) Moro di Cori c) Salento	Blade af kategori B Kategori B: Fuldmodne blade med fast bladvæv, uden fejl som følge af behandling og opbevaring, af brun farve, med nogle beskadigelser, med god kombustibilitet Præsentation: I bundter på 25-30 blade bundet med andet materiale end tobak (fascicoli) Fugtighed: 23 %

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	Blade af kategori B Kategori B: Blade med fast eller magert bladvæv, sunde, uden tørringsfejl, af brun eller grønlig farve, med visse beskadigelser Præsentation: Sorteret tobak, i bundter eller i forløbige baller, bundet med et andet materiale end tobak Fugtighed: 26 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio o.l. sorter	Blade af kategori B Kategori B: Blade af tilstrækkelig modenhed, med fast eller endog groft eller magert bladvæv, med ubetydelige fejl som følge af behandling, fermentering og beskadigelse Præsentation: I bundter på 25-30 blade bundet med et andet materiale end tobak (fascicoli) Fugtighed: 24 %
13	Xanti-Yakà	Blade af kategori B Kategori B: Tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse af oval-elliptisk form, med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god kombustibilitet De midterste blades længde overstiger ikke 20 cm Præsentation: I foreløbige baller på 15-20 kg eller i kasser med »guirlander« af blade på 30-40 kg Fugtighed: 17 %
14	a) Perustitza b) Samsun	Blade af kategori B Kategori B: Tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse (Perustitza) eller med stilk (Samsun), elliptisk-lancetformede med tynde spidser (Perustitza) eller elliptisk runde (Samsun), med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest skarpvinklede årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve (Perustitza) eller henimod det rødlige (Samsun), med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god kombustibilitet De midterste blades længde overstiger ikke 25 cm Præsentation: I foreløbige baller på 15-20 kg eller i kasser med »guirlander« af blade på 30-40 kg Fugtighed: 17 %

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
15	Erzegovina o.l. sorter	Blade af kategori B Kategori B: Tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse, af oval eller elliptisk form med nogenlunde fremtrædende ribber og nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god kombustibilitet De midterste blades længde overstiger ikke 35 cm Præsentation: I foreløbige baller på 15-20 kg eller i kasser med »guirlander« af blade på 30-40 kg Fugtighed: 17 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Blade af kategori B Kategori B: Midterste nedre blade, sorteret efter længde i følgende størrelsesforhold: første længde (38 cm og derover) 60 % anden længde (på 32 cm og derover, men under 38 cm) 35 % tredje længde (på 25 cm og derover, men under 32 cm) 5 % Blade af god form, fuldmodne og af ensartet farve, sunde, ubeskadigede, af fint bladvæv, elastiske og modstandsdygtige, uden fremtrædende ribber og årer, tilpas fermenteret og godt bevaret, af god kombustibilitet, med typisk smag og aroma, egnet til cigardæksblad med ca. 25 % beskadigede blade Præsentation: I bundter bundet med et andet materiale end tobak (fascicoli) Fugtighed: 22 %
17	Basmas	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde blade uden tørringsfejl; tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«), længde op til 15 cm, farve: gylden, orange til rødgul, meget elastiske og med glans, temmelig kødfulde, tyndkornede og af god tekstur, med kraftig behagelig aroma, god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 45 % af kvalitet I/III Modne blade med nogle lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, nogle spor af sygdom, tages fra alle bladpositioner, op til 20 cm lange, farve: lysegul, gulgrøn, rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur og god tekstur, middelelastiske, med moderat glans, moderat kødfulde, med kraftig behagelig aroma, meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III Præsentation: Bondeballer på 15-25 kg, præsenteret på traditionel vis i to rækker pasteller (i lignende blade). (Det bør bemærkes, at områderne Astakos og Chrysoupolis præsenterer tobakken i »armathodom«) Fugtighed: 17 %

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
18	Katerini og lignende sorter	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde og veltørrede blade, tages fra alle bladpositioner (protomana), op til 20 cm lange, farve: lysegul eller orange til rødlig, af løs struktur, meget elastiske og med glans, temmelig kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 45 % af kvalitet I/III Modne blade med nogle beskadigelser og tørringsfejl, nogle spor af sygdom, stammer fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul, orange, gulgrøn, rødlig eller lysebrun, af løs struktur, temmelig kødfulde, god tekstur, gennemsnitlig elasticitet og skinnende og meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III Præsentation: Guirlanderne samles for det meste efter præsentationsmåden »Baski» for emballeringen. Præsentation i baller på 25-35 kg efter den traditionelle metode kaldet »Kalup« Fugtighed: 16 %
19	a) Klassisk Kaba Koulak b) Elassona	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne ubeskadigede, sunde og velplejede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, op til 20 cm lange for Elassona, Karatzeva og Kontoula, farve: middelgul til mørkegul, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur, og udmærket kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III Modne blade med lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og 25 cm for Elassona, Karatzova og Kontoula, farve: gul til rødlig, af temmelig god tekstur, middelelastiske og med glans, meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 53 % af kvalitet I/III Præsentation: Bondeballer på 15-30 kg, præsenteret på traditionel vis i to rækker „armathodema« Fugtighed: 17 %
20	a) Ikke klassisk Kaba Koulak b) Myrodata Smyrna, Trapezous og Phi 1	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde og veltørrede blade, stammer fra alle bladpositioner, med undtagelse af topbladene, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 20 cm lange for Phi 1, og op til 15 cm lange for Myrodata Smyrna, farve: lysegul til rødlig, meget elastiske og med glans, af temmelig løs struktur, god tekstur og med god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 47 % af kvalitet I/III Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, tages fra alle bladpositioner, op til 35 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 25 cm

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
20 *(fortsat)*	a) Ikke klassisk Kaba Koulak b) Myrodata Smyrna, Trapezous og Phi 1	for Phi 1, og op til 20 cm for Myrodata Smyrna, farve: gul til lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 53 % af kvalitet I/III Præsentation: Bondeballer på 23-35 kg, præsenteret på traditionel vis i »armathodema«, eller på 35-50 kg i form af »Kalup« Fugtighed: 17 %
21	Myrodata Agrinion	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde og velplejede blade, stammer fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (Protomana), op til 25 cm lange, farve: gul til mørk orange, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 47 % af kvalitet I/III Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, stammer fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange, farve: gul til lys rødlig, temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 53 % af kvalitet I/III Præsentation: I bondeballer på 15-30 kg præsenteret på traditionel vis i to rækker »armathodema« Fugtighed: 15 %
22	Zichnomyrodata	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde og velplejede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, op til 20 cm lange, farve: lysegul til lys orange, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, tages fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul til lys rødlig, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 53 % af kvalitet I/III Præsentation: I bondeballer på 15-30 kg, præsenteret på traditionel vis i to rækker »armathodema« Fugtighed: 17 %
23	Tsebelia	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde og velplejede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (protomana), op til 35 cm lange, farve: rødgul, orange til rødlig, af løs struktur, elastiske og med glans, temmelig kødfulde, god tekstur og meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 45 % af kvalitet I/III

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
23 *(fortsat)*	Tsebelia	Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner, op til 40 cm lange, farve: lysegul til rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig elastiske og med temmelig stærk glans, temmelig kødfulde, temmelig god tekstur og meget god kombustibilitet. Denne kategori omfatter endvidere lettere sygdomsangrebne blade og/eller blade med lette beskadigelser De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III Præsentation: I bondeballer på 30-40 kg, præsenteret i to rækker »armathodema« Fugtighed: 14 %
24	Mavra	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde og omhyggeligt tørrede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første («protomana») op til 30 cm lange, farve: fra rødgul eller orange til rødlig, af løs struktur, god tekstur, elastiske og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 45 % af kvalitet I/III Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner, op til 40 cm lange, farve: gullig til rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet. Denne kategori omfatter også lettere sygdomsangrebne blade og/eller blade med lette beskadigelser De ovenfor nævnte blade udgør 55 % af kvalitet I/III Præsentation: I bondeballer på 30-50 kg, præsenteret i to rækker «armathodema» Fugtighed: 14 %
25	Burley EL	Blade af kvalitet A Kvalitet A: Helmodne, fuldstændigt udviklede, ubeskadigede, sunde og veltørrede blade, tages fra midterpositionen, farve: fra en ensartet middel nøddebrun til en ensartet middel rødbrun, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet Præsentation: I bondeballer på 50—70 kg, præsenteret i to rækker «armathodema», uden snor (i løse blade) Fugtighed: 22 %
26	Virginia EL	Blade af kvalitet A Kvalitet A: Helt modne og fuldstændigt udviklede blade, tages fra midterpositionen, sunde, ubeskadigede, velplejede, farve: ensfarvet gul, der går fra citrongul til middelgul, af god tekstur og god kombustibilitet Præsentation: I bondeballer på 30-40 kg, præsenteret i to rækker »armathodema«, uden snor (i løse blade) Fugtighed: 19 %

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
27	Santa Fé	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde blade uden tørringsfejl, med fuldstændigt reduceret midterribbe, af brun farve, med nogle beskadigelser Præsentation: Sorteret tobak i homogene foreløbige baller Fugtighed: 18 %
28	Fermenteret Burley	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde blade uden tørringsfejl, med fuldstændigt reduceret midterribbe, af god kombustibilitet, af nødde- til kanelbrun farve, med nogle beskadigelser Præsentation: Sorteret tobak i homogene foreløbige baller Fugtighed: 18 %
29	Havanna E	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde blade med fint bladvæv, med ikke for fremtrædende midterribbe og årer, uden tørringsfejl, med fuldstændigt reduceret midterribbe, af brun, lysebrun eller grønlig farve, med nogle beskadigelser Præsentation: Sorteret tobak i homogene foreløbige baller Fugtighed: 18 %
30	Round Scafati	Blade af klasse 1 Klasse 1: Blade af tilstrækkelig størrelse, af god modenhed, af ensartet farve, sunde, uden større beskadigelser, med fint bladvæv, elastiske og modstandsdygtige, med fin midterribbe og fine årer, godt bevarede, af god kombustibilitet, med typisk smag og aroma, anvendelige til cigardæksblade. Ca. 25 % beskadigede blade kan tolereres Præsentation: I homogene foreløbige baller indeholdende bundter bundet med et andet materiale end tobak Fugtighed: 18 %
31	Virginia E	Blade af klasse 1 Klasse 1: Blade af tilstrækkelig modenhed, uden tørringsfejl, med åben tekstur, med ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af citrongul eller orange farve Præsentation: I homogene foreløbige baller på 35-45 kg ubundet tobak, sorteret efter bladposition Fugtighed: 16 %
32	Burley E	Blade af Klasse 1 Klasse 1: Blade af tilstrækkelig modenhed, uden tørringsfejl, med åben tekstur, med ikke for fremtrædende midterribber og årer, sunde, af kanelbrun farve i forskellige nuancer Præsentation: I homogene foreløbige baller på 35-45 kg ubundtet tobak, sorteret efter bladposition Fugtighed: 18 %

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
33	Virginia P	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne blade, med åben og elastisk tekstur, glatte, af citrongul til orange farve, med glans, længere end 40 cm, de første og sidste bladpositioner dog ikke medregnet Præsentation: I foreløbige baller på 45 kg med ordnede blade Fugtighed: 17 %
34	Burley P	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne blade, med åben og elastisk tekstur, af skinnende farve, længde på over 40 cm, de første og sidste bladpositioner dog undtaget Præsentation: I foreløbige baller på 35 kg med ordnede blade Fugtighed: 22 %

BILAG II

Tobaksballer: sorter og deres referencekvaliteter for 1988-høsten

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
1	Badischer Geudertheimer og hybrider deraf	Hauptgut (Leaves) af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde, ubeskadigede blade af meleret til mørkebrun farve, af ensartet længde, normalt fermenteret Præsentation: I baller eller kasser på ca. 75-200 kg eller i fade på ca. 225-450 kg Fugtighed: 16%
2	Badischer Burley E og hybrider deraf	Hauptgut (Leaves) af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde, ubeskadigede, skærefaste blade af lysebrun, rødligbrun til mørkebrun farve, af ensartet længde, normalt fermenteret Præsentation: I baller eller kasser på ca. 75-175 kg eller i fade på ca. 225-450 kg Fugtighed: 15%
3	Virgin D	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde, ubeskadigede blade af gul, gulrød til brunliggul farve, normalt fermenteret Præsentation: I baller eller kasser på ca. 75-175 kg eller i fade på ca. 225-450 kg Fugtighed: 13%
7	Bright	Blade af kategori A Kategori A: Blade af tilstrækkelig modenhed, omhyggeligt behandlet, af åben tekstur og ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af gul farve i forskellige schatteringer Præsentation: I fade på ca. 280-450 kg eller i kasser på ca. 150-210 kg Fugtighed: 13%
8	Burley I	Blade af kategori A Kategori A: Blade af tilstrækkelig modenhed, omhyggeligt behandlet, af åben tekstur, også faste, med ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af mere eller mindre varm nøddebrun farve Præsentation: I fade på ca. 280-450 kg eller i kasser på ca. 150-210 kg Fugtighed: 13%

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
9	Maryland	Blade af kategori A Kategori A: Blade af tilstrækkelig modenhed, med lette tørringsfejl med meget få bronzefarvede nuancer, med et bladvæv af middel tekstur og ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af en rødligbrun mere eller mindre varm farve I fade på 280-450 kg eller i kasser på ca. 150-210 kg Fugtighed: 13 %
10	a) Kentucky og hybrider deraf b) Moro di Cori c) Salento	Blade af kategori B Kategori B: Fuldmodne blade med fast bladvæv uden fejl som følge af behandling og opbevaring, af brun farve, med nogle beskadigelser, med god kombustibilitet Præsentation: I fade på ca. 280-450 kg, i baller på ca. 170-200 kg eller i kasser på ca. 150-200 kg Fugtighed: 16 %
11	a) Forchheimer Havanna II C b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	Blade af kategori B Kategori B: Blade med fast eller magert bladvæv, sunde, uden tørringsfejl, af brun til grønlig farve, med visse beskadigelser Præsentation: I baller eller kasser på ca. 75-200 kg eller i fade på ca. 225-450 kg Fugtighed: 16 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio o. lign. sorter	Blade af kategori B Kategori B: Blade af tilstrækkelig modenhed, med fast eller endog groft eller magert bladvæv, med ubetydelige fejl som følge af tørring, fermentering og beskadigelse Præsentation: I baller på ca. 120 kg eller i fade på ca. 330 kg Fugtighed: 16 %
13	Xanti-Yakà	Blade af kategori B Kategori B: Tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse, af oval-elliptisk form, med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god kombustibilitet De midterste blades længde overstiger ikke 20 cm Præsentation: I små baller på ca. 18-50 kg Fugtighed: 13 %

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
14	a) Perustitza b) Samsun	Blade af kategori B Kategori B: Tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse (Perustitza) eller med stilk (Samsun), ellipstisk-lancetformede med tynde spidser (Perustitza) eller elliptisk-runde (Samsun), med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest skarpvinklede årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve (Perustitza) eller henimod det rødlige (Samsun), med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god kombustibilitet De midterste blades længde overstiger ikke 25 cm Præsentation: I små baller på ca. 18-50 kg Fugtighed: 13%
15	Erzegovina og lign. sorter	Blade af kategori B Kategori B: Tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse af oval eller elliptisk form med nogenlunde fremtrædende ribber og nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god kombustibilitet De midterste blades længde overstiger ikke 35 cm Præsentation: I små baller på ca. 18-50 kg Fugtighed: 13%
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Blade af kategori B Kategori B: Midterste nedre blade sorteret efter længde i følgende størrelsesforhold: første længde (38 cm og derover) 60% anden længde (på 32 cm og derover, men under 38 cm) 35% tredje længde (på 25 cm og derover, men under 32 cm) 5% Blade af god form; fuldmodne og af ensartet farve, sunde, ubeskadigede, af fint bladvæv, elastiske og modstandsdygtige, uden fremtrædende ribber og årer, tilpas fermenteret og godt bevaret, af god kombustibilitet, med typisk smag og aroma egnet til cigardæksblad, med ca. 25% beskadigede blade Præsentation: I baller på ca. 70-90 kg eller i kasser på ca. 180-210 kg Fugtighed: 16%
17	Basmas	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«), længde op til 15 cm, farve: gylden, orange til rødgul, meget elastiske og med glans, temmelig kødfulde, tyndkornede og af god tekstur, med kraftig behagelig aroma, god kombustibilitet

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
17 *(fortsat)*	Basmas	De ovenfor beskrevne blade (I/III) udgør 45% af kvalitet I/III Modne blade med nogle lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, nogle spor af sygdom, tages fra alle bladpositioner, op til 20 cm lange, farve: lysegul, gulgrøn, rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur og god tekstur, middel elastiske, med moderat glans, moderat kødfulde, med kraftig behagelig aroma, meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 55% af kvalitet I/III Præsentation: I såkaldte »tongas« baller på ca. 30 kg Fugtighed: 13%
18	Katerini og lignende sorter	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, beskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«), op til 20 cm lange, farve: lysegul eller orange til rødlig, af løs struktur, meget elastiske, med glans, temmelig kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet De ovennævnte blade udgør 45% af kvalitet I/III Modne blade med nogle lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, nogle spor af sygdom, tages fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul, orange, gulgrøn, rødlig eller lysebrun, af løs struktur, gennemsnitlig elasticitet og skinnende moderat kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 55% af kvalitet I/III Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg Fugtighed: 13%
19	a) Klassisk Kaba Kulak b) Elassona	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topblade, op til 25 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og op til 20 cm lange for Elassona, Karatzova og Kontoula, farve: middelgul til mørkegul, elastiske og med glans: af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 47% af kvalitet I/III Modne blade med nogle lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, med små sygdomsspor tages fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og 25 cm lange for Elassona, Karatzeva og Kontoula, farve: gul gulgrøn, rødlig, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, middel elastiske og med moderat glans, meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 53% af kvalitet I/III Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg Fugtighed: 13%

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
20	a) Ikke klassisk Kaba Koulak b) Myrodata Smyrna, Trapezous og Phi 1	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, og til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 20 cm for Phi I og op til 15 cm for Myrodata Smyrna, farve: lysegul til rødlig, meget elastiske og med glans, af temmelig løs struktur, god tekstur og udmærket kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 47 % af kvalitet I/III Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, tages fra alle bladpositioner, op til 35 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 25 cm lange for Phi 1 og op til 20 cm for Myrodata Smyrna, farve: gul, gulgrøn eller lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med temmelig stærk glans, meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 53 % af kvalitet I/III Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg Fugtighed: 13 %
21	Myrodata Agrinion	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede og sunde uden tørringsfejl, stammer fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«), op til 25 cm lange, farve: gul til mørkorange, meget elastiske og med glans; af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 47 % af kvalitet I/III Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor stammer fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange, farve: gul, gulgrøn eller lys rødlig, temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske med glans, meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 53 % af kvalitet I/III Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg Fugtighed: 14 %
22	Zichnomyrodata	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, op til 20 cm lange, farve: lysegul til lys orange, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III Modne, og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med få lette tørringsfejl, med små sygdomsspor tages fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul, gulgrøn eller lys rødlig, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med temmelig stærk glans, meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 53 % af kvalitet I/III Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg Fugtighed: 13 %

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
23	Tsebelia	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringfejl, stammer fra alle bladpositioner med undtagelse af den første, op til 35 cm lange, farve: rødgul, orange til rødlig, af løs struktur, god elasticitet og med glans, temmelig kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 45 % af kvalitet I/III Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med nogle lette tørringsfejl, stammer fra alle bladpositioner, op til 40 cm lange, farve: lysegul gulgrøn rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig elastiske og med middel glans, temmelig kødfulde, af temmelig god tekstur og meget god kombustibilitet. Denne kategori omfatter endvidere lettere angrebne blade og/eller blade med lette beskadigelser De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg Fugtighed: 13 %
24	Mavra	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«) op til 30 cm lange, farve: fra rødlig gul til orange og det rødlige, af løs struktur, god tekstur, god elasticitet og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet De ovenfor beskrevne udgør 45 % af kvalitet I/III Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, der stammer fra alle bladpositioner, op til 40 cm lange, farve: gullig, grøngul (citron), rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet Denne kategori omfatter endvidere lettere angrebne blade og/eller blade med lette beskadigelser De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg Fugtighed: 13 %
25	Burley EL	Blade af kvalitet A Kvalitet A: Helmodne blade, fuldstændigt udviklede, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra midterpositionen, farve: ensartet middelbrun til rødbrun, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet Præsentation: I baller på ca. 100 kg eller i kasser på ca. 200 kg eller i fade på ca. 240-280 kg Fugtighed: 13 %
26	Virginia EL	Blade af kvalitet A Kvalitet A: Helmodne fuldstændigt udviklede, sunde og ubeskadigede blade uden tørringsfejl, farve, ensartet citrongul til middel orange, kødfulde, af god tekstur og god kombustibilitet, tages hovedsagelig fra midterpositionen Præsentation: I baller på ca. 100 kg Fugtighed: 13 %

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
27	Santa Fé	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde, godt fermenterede blade, af brun eller mørkebrun farve, med nogle beskadigelser Præsentation: I baller på 80-100 kg eller i kasser på 150-210 kg Fugtighed: 14 %
28	Fermenteret Burley	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde, godt fermenterede blade, af brun farve, med nogle beskadigelser Præsentation: I baller på 80-100 kg eller i kasser på 150-210 kg Fugtighed: 14 %
29	Havanna E	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde blade, med fint bladvæv, med ikke for fremtrædende midterribber og årer, godt fermenterede, af brun, lysebrun eller grønlig farve, med nogle beskadigelser Præsentation: I baller på 80-100 kg eller i kasser på 150-210 kg Fugtighed: 14 %
30	Round Scafati	Blade af klasse 1 Klasse 1: Blade af tilstrækkelig størrelse, af god modenhed, af ensartet farve, sunde, uden større beskadigelser, med fint bladvæv, elastiske og modstandsdygtige, med fin midterribbe og fine årer, godt bevarede, af god kombustibilitet, med typisk smag og aroma, godt fermenterede, anvendelige til cigardæksblade Ca. 25% beskadigede blade kan tolereres Præsentation: I baller på 70-100 kg eller i kasser på 180-210 kg Fugtighed: 14 %
31	Virginia E	Blade af klasse 1 Klasse 1: Blade af tilstrækkelig modenhed, med åben tekstur, med ikke for fremtrædende midterribber og årer, sunde af gul farve i forskellige nuancer fra citrongul til orange Præsentation: I kasser på 170-210 kg Fugtighed: 14 %
32	Burley E	Blade af klasse 1 Klasse 1: Blade af tilstrækkelig modenhed, med åben tekstur, med ikke for fremtrædende midterribber og årer, sunde, af kanelbrun farve i forskellige nuancer Præsentation: I kasser på 150-210 kg Fugtighed: 14 %

Løbe-nummer	Sorter	Referencekvalitet
33	Virginia P	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne blade, uden tørringsfejl, med åben og elastisk tekstur, glatte, af citrongul til orange farve, med glans, længde på over 40 cm, den første og sidste bladposition dog undtaget Præsentation: I kasser med ubundtet tobak på 200 kg Fugtighed: 12,5 %
34	Burley P	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne blade, uden tørringsfejl, med åben og elastisk tekstur, af skinnende farve, længde på over 40 cm, den første og sidste bladposition dog undtaget Præsentation: I kasser med ubundtet tobak på 180 kg Fugtighed: 13 %

BILAG III

Anerkendte produktionsområder for de i Fællesskabet producerede sorter af tobak

Sorter	Land	Produktionsområder
1. Badischer Geudertheimer og hybrider deraf	Tyskland	Rhinsletten og de tilstødende dale, Midtfranken
	Frankrig	Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardennes, Alsace-Lorraine, Val-de-Loire og Poitou-Bretagne
	Italien	Veneto, Toscana, Molise, Campania, Latium og Puglia
2. Badischer Burley E og hybrider deraf	Tyskland	Rhinsletten og de tilstødende dale, Midtfranken
	Frankrig	Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne-Limousin, Alsace-Lorraine, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Val-de-Loire, Centre, Poitou-Bretagne, Bourgogne og Charente
	Italien	Piémonte, Lombardia, Veneto og Emilia-Romagna
3. Virgin D	Tyskland	Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Franken og Rhinsletten med tilstødende dale
	Frankrig	Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergnes-Limousin, Champagne-Ardennes, Alsace-Lorraine, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Provence, Val-de-Loire, Centre, Poitou-Bretagne, Languedoc-Roussillon, Normandie og Bourgogne, Charente, Nord-Pas de Calais og Picardie
4. a) Paraguay og hybrider deraf	Frankrig	Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne-Limousin, Poitou-Bretagne, Charente, Val-de-Loire, Centre, Rhône-Alpes, Provence, Franche-Comté, Alsace-Lorraine, Champagne-Ardennes, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Normandie og Bourgogne
	Belgien	Vlaandern
	Italien	Molise og Campania
b) Dragon vert og hybrider deraf, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Frankrig	Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne, Ardennes, Val-de-Loire
	Belgien	Vlaandern, Hainaut, Namur, Luxembourg
5. Nijkerk	Frankrig	Departementerne Lot og Aveyron
6. Misionero	Frankrig	Île de la Réunion
7. Bright	Italien	Friuli, Veneto, Lombardia, Piémonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Basilicata, Puglia og Calabria
8. Burley I	Italien	Veneto, Lombardia, Piémonte, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Basilicata, Puglia og Sicilia
9. Maryland	Italien	Friuli, Lombardia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise og Campania
10. Kentucky	Italien	Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania
	Spanien	Extremadura, Andalucia
11. F. Havanna	Italien	Friuli, Trentino, Veneto, Toscana, Lazio, Molise og Campania
12. Beneventano Brasile Selvaggio	Italien	Campania Sicilia
13. Xanti-Yaka	Italien	Abruzzi, Campania, Basilicata og Puglia
14. a) Perustitza b) Samsun	Italien	Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia og Sicilia
15. Erzegovine	Italien	Lazio, Abruzzi og Puglia

Sorter	Land	Produktionsområder
16. Round Tip	Grækenland Italien	Midtmakedonia Campania
17. Basmas	Grækenland	Thraki, Makedonia og Midtgrækenland og Thassalia
18. a) Katerini b) Lignende sorter	Grækenland	Makedonia Makedonia, Midtgrækenland, Ipiros og Thessalia
19. a) Klassisk Kaba Koulak b) Elassona	Grækenland Grækenland	Makedonia Thessalia
20. Ikke klassisk Kaba Koulak	Grækenland	Makedonia, Thessalia, Midtgrækenland, Thraki, Ipiros, Péloponnès og Øerne
21. Myrodata Agrinion	Grækenland	Midtgrækenland
22. Zichnomyrodata	Grækenland	Thessalia
23. Tsebelia	Grækenland	Ipiros og Midtgrækenland
24. Mavra	Grækenland	Thessalia, Péloponnès og Midtgrækenland
25. Burley EL	Grækenland	Makedonia, Thessalia
26. Virginia EL	Grækenland	Midtgrækenland, Thessalia, Makedonia, Thraki og Peloponnes
27. Santa Fé	Spanien	Andalucía
28. Burley Fermenteret	Spanien	Extremadura, Andaloucía, Castilla — Léon, Castilla-la Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, Rioja, Cataluña, Madrid
29. Havanna E	Spanien	Castilla-Léon, Navarra, Galicia, Asturias, Cantabria
30. Round Scafati	Spanien	Galicia, Asturias, Navarra, Castilla — Léon, Cantabria-Léon
31. Virginia E	Spanien	Extremadura, Andalucía, Castilla-Léon, Castilla-La Mancha
32. Burley E	Spanien	Extremadura, Andalucía, Castilla-Léon, Castilla-La Mancha
33. Virginia P	Portugal	Beira Interior, Ribatejo Oeste, Alentejo, Regiao Autonoma dos Açores
34. Burley P	Portugal	Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Duoro e Minho, Trás-os-Montes, Regiao Autonoma dos Açores

BILAG IV

Målpriser, interventionspriser og præmier for tobak i blade for 1988-høsten

Afledte interventionspriser for tobak i baller for 1988-høsten

(ECU/kg)

Løbe-nummer	Sorter	Målpris	Interventions-pris	Præmie	Afledt interventions-pris
1	Badischer Geudertheimer og hybrider deraf	3,643	3,097	2,961	4,644
2	Badischer Burley E og hybrider deraf	4,512	3,835	2,927	5,426
3	Virgin D	4,626	3,932	2,870	5,179
4	a) Paraguay og hybrider deraf b) Dragon vert og hybrider deraf, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	3,400	2,890	2,352	–
5	Nijkerk	3,357	2,853	2,132	–
6	a) Misionero og hybrider deraf b) Rio Grande og hybrider deraf	3,128	2,659	2,159	–
7	Bright	4,070	3,459	2,461	4,764
8	Burley I	2,848	2,421	1,653	3,565
9	Maryland	3,313	2,816	1,875	4,014
10	a) Kentucky og hybrider deraf b) Mori di Cori c) Salento	2,796	2,376	1,765	3,347
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	2,707	2,301	1,909	3,614
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio og lignende sorter	1,462	1,243	1,077	2,012
13	Xanti-Yakà	3,257	2,768	2,399	4,521
14	a) Perustitza b) Samsun	3,083	2,621	2,283 2,222	3,925 3,949
15	Erzegovina og lignende sorter	2,770	2,355	2,057	3,540
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	15,908	13,522	9,608	20,782
17	Basmas	6,090	5,177	3,072	6,914
18	Katerini og lignende sorter	5,073	4,312	2,734	6,196
19	a) Klassisk Kaba Koulak b) Elassona	4,022	3,419	2,078	4,925
20	a) Ikke klassisk Kaba Koulak b) Myrodata Smyrne, Trapezous og Phi 1	3,030	2,576	1,423	3,979
21	Myrodata Agrinion	3,998	3,398	2,099	4,840
22	Zichnomyrodata	4,154	3,531	2,214	5,051
23	Tsebelia	3,195	2,716	2,593	4,136

Løbe-nummer	Sorter	Målpris	Interventions-pris	Præmie	Afledt interventions-pris
24	Mavra	3,120	2,652	2,120	4,065
25	Burley EL	2,251	1,688 (1)	1,219 (1)	2,748 (1)
26	Virginia EL	3,806	3,235	3,145	4,465
27	Santa Fé	1,383	1,176	0,301	2,034
28	Burley Fermteret	2,240	1,904	0,931	2,923
29	Havanna E	2,878	2,447	1,952	3,634
30	Round Scafati	8,669	7,369	5,911	12,615
31	Virginia E	4,531	3,851	2,354	5,305
32	Burley E	2,965	2,520	1,398	3,789
33	Virginia P	4,263	3,624	2,354	4,953
34	Burley P	3,072	2,611	1,398	3,896

(1) Under hensyntagen til anvendelsen af artikel 13 i forordning (EØF) nr. 727/70.

BILAG V

Maksimale garantimængder for hver sort og sortsgruppe af tobak fra 1988-høsten

(tobak i blade)

Grupper og sorter (løbenummer)	Maksimale garantimængder (tons)
GRUPPE I	
3 Virginia D	8 300
7 Bright	38 000
31 Virginia E	11 000
33 Virginia P	3 200
17 Basmas	30 000
18 Katerini	23 000
26 Virginia EL	3 500
I alt	117 000
GRUPPE II	
2 Badischer Burley	10 000
8 Burley I	42 000
9 Maryland	3 000
25 Burley EL	11 000
28 Fermenteret Burley 32 Burley E	28 000
34 Burley P	1 750
I alt	95 750
GRUPPE III	
1 Badischer Geudertheimer	12 000
4 Paraguay	28 000
5 Wijkerk 6 Misionero 27 Santa Fé 29 Havanna E	2 000
10 Kentucky	10 000
16 Round tip 30 Round Scafati	250
I alt	52 250
GRUPPE IV	
13 Xanti-Yaka 14 Perustitza 15 Erzegovina	27 000
19 Klassisk Kaba Koulak 20 Kaba Kou ikke klassisk 21 Myrodata 22 Zychnomyrodata	40 000
I alt	67 000
GRUPPE V	
11 Forchheimer Havanna 12 Beneventano	20 000
23 Tsebelia 24 Mavra	33 000
I alt	53 000