REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/1800 AL COMISIEI

din 10 septembrie 2025

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/753 în ceea ce privește modificări administrative aduse autorizației Uniunii pentru familia de produse biocide „C(M)IT/MIT formulations”

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide ([1]), în special articolul 50 alineatul (2),

întrucât:

(1) La 12 aprilie 2023, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/753 al Comisiei ([2]) s-a acordat societății Solenis Switzerland GmbH o autorizație a Uniunii cu numărul de autorizație EU-0025678-0000 pentru punerea la dispoziție pe piață și utilizarea familiei de produse biocide „C(M)IT/MIT formulations”. Anexa la respectivul regulament de punere în aplicare conține rezumatul caracteristicilor produsului pentru familia de produse biocide respectivă.

(2) La 1 octombrie 2024, Solenis Switzerland GmbH a transmis Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”), în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013 al Comisiei ([3]), o notificare a modificărilor administrative aduse autorizației Uniunii pentru familia de produse biocide „C(M)IT/MIT formulations”, înregistrată în registrul produselor biocide cu numărul de caz BC-TG100256-47. Modificarea propusă notificată se referă la adăugarea de formulatori ai produsului biocid.

(3) La 6 noiembrie 2024 ([4]), agenția a transmis Comisiei, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013, un aviz privind modificarea administrativă notificată a autorizației acordate la nivelul Uniunii pentru familia de produse biocide „C(M)IT/MIT formulations”. În avizul respectiv, agenția concluzionează că modificarea propusă este o modificare administrativă astfel cum este menționată la articolul 50 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 și astfel cum se specifică în titlul 1 secțiunea 2 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013 și că, după punerea în aplicare a modificării, condițiile prevăzute la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 vor fi în continuare îndeplinite.

(4) La 6 noiembrie 2024, agenția a transmis Comisiei rezumatul revizuit al caracteristicilor produsului biocid din autorizația Uniunii pentru familia de produse biocide „C(M)IT/MIT formulations”, în toate limbile oficiale ale Uniunii, incluzând modificarea administrativă solicitată, în conformitate cu articolul 11 alineatul (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013.

(5) Comisia este de acord cu avizul agenției și, prin urmare, consideră că este oportun să se modifice autorizația Uniunii pentru familia de produse biocide „C(M)IT/MIT formulations” în vederea introducerii modificării administrative solicitate de societatea Solenis Switzerland GmbH.

([1]) JO L 167, 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/753 al Comisiei din 12 aprilie 2023 de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide „C(M)IT/MIT formulations” (JO L 100, 13.4.2023, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/753/oj).

([3]) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013 al Comisiei din 18 aprilie 2013 privind modificări ale produselor biocide autorizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 109, 19.4.2013, p. 4; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

([4]) Avizul ECHA nr. UAD-C-1777770-16-00/F din 6 noiembrie 2024 privind modificările administrative ale autorizației Uniunii pentru familia de produse biocide „C(M)IT/MIT formulations”, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(6) Cu excepția modificărilor administrative, toate celelalte informații incluse în rezumatul caracteristicilor produsului biocid „C(M)IT/MIT formulations”, astfel cum figurează în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/753, rămân neschimbate.

(7) Pentru a spori claritatea și pentru a facilita accesul utilizatorilor și al părților interesate la versiunea consolidată a rezumatului caracteristicilor produsului biocid, care urmează să fie publicată de agenție, este necesar ca anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/753 să fie înlocuită în întregime. Ca urmare a unei modificări a formatului utilizat pentru generarea rezumatului caracteristicilor produsului biocid în registrul produselor biocide în februarie 2024, rezumatul caracteristicilor produsului biocid din anexa respectivă trebuie să includă, de asemenea, unele modificări minore de redactare și de prezentare.

(8) Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/753 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/753 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 septembrie 2025.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI PENTRU O FAMILIE DE PRODUSE BIOCIDE

C(M)IT/MIT formulations

Tip(uri) de produs

TP 6: Conservanți pentru produse în timpul depozitării

TP 11: Conservanți pentru sisteme de răcire și de procesare a lichidelor

TP 12: Slimicide

Numărul autorizației: EU-0025678-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP: EU-0025678-0000

PARTEA I

PRIMUL NIVEL DE INFORMARE

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1. **Denumirea familiei de produse**

Denumire	C(M)IT/MIT formulations

1.2. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 6: Conservanți pentru produse în timpul depozitării TP 11: Conservanți pentru sisteme de răcire și de procesare a lichidelor TP 12: Slimicide

1.3. **Deținătorul autorizației**

Denumirea și adresa deținătorului autorizației	Denumire	Solenis Switzerland GmbH
	Adresă	Mühlentalstrasse 38 8200 Schaffhausen CH
Numărul autorizației	EU-0025678-0000	
Numărul deciziei de reglementare R4BP	EU-0025678-0000	
Data autorizației	3 mai 2023	
Data de expirare a autorizației	31 august 2032	

1.4. **Producătorul (producătorii) produsului**

Denumirea producătorului	Solenis Switzerland GmbH
Adresa producătorului	Mühlentalstrasse 38 8200 Schaffhausen Elveția
Adresa locurilor de producție	Solenis Switzerland GmbH site 1 Fütingsweg 20 D-47805 Krefeld, Germania Solenis Switzerland GmbH site 2 Wimsey Way, Somercotes DE55 4LR Alfreton, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Denumirea producătorului	Solenis Switzerland GmbH
	Solenis Switzerland GmbH site 3 Högastensgatan 18 252 32 Helsingborg, Suedia Solenis Switzerland GmbH site 4 AD International B.V. Markweg Zuid 27 4793 ZJ Fijnaart, Țările de Jos

Denumirea producătorului	Diversey UK Production Ltd
Adresa producătorului	Cotes Park Industrial Estate, Somercotes DE55 4PA Alfreton, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Adresa locurilor de producție	Diversey UK Production Ltd Cotes Park Industrial Estate, Somercotes, DE55 4PA Alfreton, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Denumirea producătorului	Diversey Italy Production Srl
Adresa producătorului	Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR), Italia
Adresa locurilor de producție	Diversey Italy Production Srl Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR), Italia

Denumirea producătorului	Diversey España Production S.L.U
Adresa producătorului	Avenida Conde Duque 5, 7 y 9, Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid), Spania
Adresa locurilor de producție	Diversey España Production S.L.U Avenida Conde Duque 5, 7 y 9, Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid), Spania

Denumirea producătorului	Diversey Netherlands Production BV
Adresa producătorului	Rembrandtlaan 414 7545ZW Enschede, Țările de Jos
Adresa locurilor de producție	Diversey Netherlands Production BV Rembrandtlaan 414 7545ZW Enschede, Țările de Jos

Denumirea producătorului	Diversey Germany Production oHG
Adresa producătorului	Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden, Germania
Adresa locurilor de producție	Diversey Germany Production oHG Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden, Germania

1.5. **Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active**

Substanță activă	C(M)IT/MIT (3:1)
Denumirea producătorului	Specialty Electronic Materials Switzerland GmbH
Adresa producătorului	Bachtobelstrasse 3 8810 Horgen, Elveția
Adresa locurilor de producție	Specialty Electronic Materials Switzerland GmbH site 1 Jiangsu FOPIA Chemicals Co., Ltd, Touzeng Village 224555 Binhuai Town, Binhai County, Yancheng City, Jiangsu, China Specialty Electronic Materials Switzerland GmbH site 2 Rohm and Haas (UK) Ltd. Tyneside Works, Ellison Street, NE32 3DJ Jarrow, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Substanță activă	C(M)IT/MIT (3:1)
Denumirea producătorului	Thor GmbH
Adresa producătorului	Landwehrstraße 1 67346 Speyer, Germania
Adresa locurilor de producție	Thor GmbH site 1 Landwehrstraße 1 67346 Speyer, Germania

Substanță activă	C(M)IT/MIT (3:1)
Denumirea producătorului	Thor Quimicos de México, SA de CV
Adresa producătorului	Km 182 Autopista México – Querétaro, Pedro Escobedo 76700 Querétaro, Mexic
Adresa locurilor de producție	Thor Quimicos de México, SA de CV site 1 Km 182 Autopista México – Querétaro, Pedro Escobedo 76700 Querétaro, Mexic

Substanță activă	C(M)IT/MIT (3:1)
Denumirea producătorului	Troy Chemical Company BV
Adresa producătorului	Poortweg 4C 2612 Delft, Țările de Jos
Adresa locurilor de producție	Troy Chemical Company BV site 1 Weifang Heaven-sent New Materials Technology Co. Ltd, Binhai Road, Changyi Coastal Economic Development Zone 261312 Weifang, China Troy Chemical Company BV site 2 Dalian Xingyuan Chemistry Co., Ltd, Room 1205/1206, Pearl River International Building, No.99, Xinkai Road, Xigang District, Songmudao Chemical Industry Zone, Puwan New District 116308 Dalian China Troy Chemical Company BV site 3 Dalian Bio-Chem Company Limited, Songmudao Plant: Songmudao Chemical Industry, Zone, Puwan New District 116308 Dalian, China

Substanță activă	C(M)IT/MIT (3:1)
Denumirea producătorului	Jiangsu FOPIA Chemicals Co., Ltd
Adresa producătorului	Touzeng Village, Binhuai Town, Binhai County 224555 Yancheng City, China
Adresa locurilor de producție	Jiangsu FOPIA Chemicals Co., Ltd site 1Touzeng Village, Binhuai Town, Binhai County 224555 Yancheng City, China

2. COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA FAMILIEI DE PRODUSE

2.1. **Informații calitative și cantitative despre compoziția familiei de produse**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1)	Substanță activă	55965-84-9		2,2-20,9 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare**

Tip(uri) de formulare	AL Orice alt lichid

PARTEA II

AL DOILEA NIVEL DE INFORMARE – META-RCP(-URI)

1. META-RCP 1 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1. **Meta-RCP 1 identificator**

Identificator	Meta SPC: Meta SPC 3

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-1

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 6: Conservanți pentru produse în timpul depozitării TP 11: Conservanți pentru sisteme de răcire și de procesare a lichidelor TP 12: Slimicide

2. COMPOZIȚIA META RCP 1

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 1**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Masă de reacție com pusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1)	Substanță activă	55965-84-9		2,2-6,5 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 1**

Tip(uri) de formulare	AL Orice alt lichid

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 1

Fraze de pericol	H332: Nociv în caz de inhalare. H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H290: Poate fi coroziv pentru metale. H302: Nociv în caz de înghițire. EUH071: Coroziv pentru căile respiratorii.
Fraze de precauție	P260: Nu inspirați fumul. P264: Spălați-vă bine pe piele după utilizare.

	P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P272: Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. P273: Evitați dispersarea în mediu. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție facială/ protecție auditivă. P362+P364: Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. P333+P313: În caz de iritație sau erupție cutanată: solicitați sfatul medicului. P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați voma. P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați victima la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. P310: Sunați imediat la un Centru de informare toxicologică sau medicul. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P391: Colectați scurgerile de produs. P405: A se depozita sub cheie. P234: Păstrați numai în recipientul original. P301+P312: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați la un Centru de informare toxicologică sau medicul, dacă nu vă simțiți bine. P406: Depozitați într-un rezistent la coroziune cu dublură interioară rezistentă la coroziune. P390: Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabelul 1

Conservarea rețelelor polimerice

Tip de produs	TP 6: Conservanți pentru produse în timpul depozitării
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: nu există date

	Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: nu există date Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Ciuperci Etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Conservarea rețelelor polimerice Produsul biocid este recomandat pentru controlul bacteriilor, drojdiilor și ciupercilor în fabricarea, depozitarea și transportul latexurilor, polimerilor sintetici, inclusiv poliacrilamida hidrolizată (HPAM), biopolimerilor (de exemplu, xanthan, dextran etc.) și latexurilor naturale.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: sistem închis Descriere detaliată: Aplicație manuală și automatizată. Produsul biocid trebuie distribuit în lichidul final într-un punct care să asigure o amestecare adecvată folosind, de preferință, o pompă automată de dozare sau prin adăugare manuală.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Utilizări industriale: 1,5-14,5 % C(M)IT/MIT în produsele biocide; Utilizări profesionale: 14,9-50 mg/kg de C(M)IT/MIT (3:1) în produsul final. - Numărul și calendarul de aplicare: Produsul biocid este adăugat în doză unică la momentul fabricației, depozitării sau expedierii. Pentru a asigura o distribuție uniformă, dispersați încet lichidul în produs, folosind contorizarea automată sau adăugarea manuală, împreună cu agitarea. Se amestecă bine până când lichidul este uniform dispersat în produs. Utilizări industriale: 1,5-14,5 % C(M)IT/MIT în produsele biocide. Utilizări profesionale 14,9-50 mg/kg de C(M)IT/MIT (3:1) în produsul final. Pentru produsul biocid așa cum este furnizat: numai pentru uz industrial.
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pentru utilizatorii industriali și profesioniști: — flacon HDPE: 5 l (nominal) — găleată/canistră HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominal) — cutie cu căptușeală HDPE: 20 l — tambur HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Toate produsele trebuie transportate și depozitate într-o cameră ventilată.

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

— Conservantul poate fi adăugat în orice etapă a fabricației produsului.

— Se recomandă adăugarea cât mai timpurie posibilă pentru o protecție optimă.

— Consultați producătorul pentru a determina doza optimă pentru diferitele produse care trebuie conservate.

— Se recomandă ca valoarea concentrației optime de biocid și compatibilitatea cu formulele individuale să fie determinate prin teste de laborator.

— Durata și condițiile de depozitare a matricelor conservate pot avea impact asupra eficacității produsului; se recomandă testele microbiologice pentru a determina rata de aplicare adecvată fără a depăși rata maximă de aplicare autorizată.

— Produsul biocid trebuie utilizat pentru tratarea produselor (articole/amestecuri) distribuite numai utilizatorilor profesioniști.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

— În timpul fazelor de manipulare ale produsului din Meta SPC 1, 2, 3 și 4 (amestecare și încărcare), expunerea la produs (produse corozive și iritante pentru piele) trebuie limitată prin utilizarea PPE și aplicarea RMM tehnice și organizaționale:

  — Minimizarea fazelor manuale (automatizarea proceselor);

  — Utilizarea unui dispozitiv de dozare;

  — Curățarea regulată a echipamentelor și a zonei de lucru;

  — Evitarea contactului cu unelte și obiecte contaminate;

  — Un standard corespunzător de ventilație generală;

  — Instruirea și îndrumarea personalului cu privire la bunele practici.

— EIP este următorul:

  — mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (materialul pentru mănuși trebuie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

  — salopetă de protecție (cel puțin tip 3 sau 4, EN 14605) care este impermeabilă la produse biocide (materialul de salopetă trebuie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs);

  — Protecție pentru ochi;

  — Respirator adecvat pentru substanță/sarcină, dacă ventilația este inadecvată.

— Pentru utilizatorii profesioniști, concentrația maximă de produs utilizată pentru conservarea rețelelor de polimeri depășește valoarea pragului de 15 ppm; prin urmare, expunerea trebuie limitată prin utilizarea PPE, protejarea pielii și a membranelor mucoase potențial expuse și aplicarea RMM tehnice și organizaționale:

  — Minimizarea fazelor manuale;

  — Utilizarea unui dispozitiv de dozare;

  — Curățarea regulată a echipamentelor și a zonei de lucru;

  — Un standard corespunzător de ventilație generală;

  — Instruirea și îndrumarea personalului cu privire la bunele practici.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2. **Descrierea utilizării**

Tabelul 2

Conservarea șlamurilor

Tip de produs	TP 6: Conservanți pentru produse în timpul depozitării
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Conservarea șlamurilor Produsul biocid este recomandat pentru a controla creșterea bacteriilor în șlamuri anorganice/minerale pe bază de apă și pigmenți anorganici utilizați pentru vopsele, straturi de acoperire și hârtie.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: sistem închis Descriere detaliată: Aplicație manuală și automatizată. Biocidul trebuie distribuit ca aditiv de rezervor în diluarea circulantă a lichidului, folosind o pompă dozatoare sau prin turnare manuală, într-un punct care să asigure o amestecare adecvată în întregul sistem.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Utilizări industriale: 1,5-14,5 % C(M)IT/MIT în produsele biocide; Utilizări profesionale: 10-30 mg/kg de C(M) IT/MIT (3:1) în produsul final. - Numărul și calendarul de aplicare: Produsul biocid este adăugat în doză unică la momentul fabricației, depozitării sau expedierii. Utilizări industriale: 1,5-14,5 % C(M)IT/MIT în produsele biocide. Utilizări profesionale: 10-30 mg/kg de C(M)IT/MIT (3:1) în produsul final. Pentru produsul biocid așa cum este furnizat: numai pentru uz industrial.
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pentru utilizatorii industriali și profesioniști: — flacon HDPE: 5 l (nominal) — găleată/canistră HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominal) — cutie cu căptușeală HDPE: 20 l — tambur HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Toate produsele trebuie transportate și depozitate într-o cameră ventilată.

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

— Conservantul poate fi adăugat în orice etapă a fabricației produsului.

— Se recomandă adăugarea cât mai timpurie posibilă pentru o protecție optimă.

— Consultați producătorul pentru a determina doza optimă pentru diferitele produse care trebuie conservate.

— Se recomandă ca valoarea concentrației optime de biocid și compatibilitatea cu formulele individuale să fie determinate prin teste de laborator.

— Durata și condițiile de depozitare a matricelor conservate pot avea impact asupra eficacității produsului; se recomandă testele microbiologice pentru a determina rata de aplicare adecvată fără a depăși rata maximă de aplicare autorizată.

— Produsul biocid trebuie utilizat pentru tratarea produselor (articole/amestecuri) distribuite numai utilizatorilor profesioniști.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

— În timpul fazelor de manipulare ale produsului din Meta SPC 1, 2, 3 și 4 (amestecare și încărcare), expunerea la produs (produse corozive și iritante pentru piele) trebuie limitată prin utilizarea PPE și aplicarea RMM tehnice și organizaționale:

  — Minimizarea fazelor manuale (automatizarea proceselor);

  — Utilizarea unui dispozitiv de dozare;

  — Curățarea regulată a echipamentelor și a zonei de lucru;

  — Evitarea contactului cu unelte și obiecte contaminate;

  — Un standard corespunzător de ventilație generală;

  — Instruirea și îndrumarea personalului cu privire la bunele practici.

— EIP este următorul:

  — mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (materialul pentru mănuși trebuie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

  — salopetă de protecție (cel puțin tip 3 sau 4, EN 14605) care este impermeabilă la produse biocide (materialul de salopetă trebuie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs);

  — Protecție pentru ochi;

  — Respirator adecvat pentru substanță/sarcină, dacă ventilația este inadecvată.

— Pentru utilizatorii profesioniști, concentrația maximă de produs utilizată pentru conservarea șlamurilor depășește valoarea pragului de 15 ppm; prin urmare, expunerea trebuie limitată prin utilizarea PPE, protejarea pielii și a membranelor mucoase potențial expuse și aplicarea RMM tehnice și organizaționale:

  — Minimizarea fazelor manuale;

  — Utilizarea unui dispozitiv de dozare;

  — Curățarea regulată a echipamentelor și a zonei de lucru;

  — Un standard corespunzător de ventilație generală;

  — Instruirea și îndrumarea personalului cu privire la bunele practici.

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3. **Descrierea utilizării**

Tabelul 3

Conservarea lichidelor funcționale (lichide hidraulice, antigel, inhibitori de coroziune etc. – cu excepția aditivilor pentru combustibil)

Tip de produs	TP 6: Conservanți pentru produse în timpul depozitării
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Conservarea lichidelor funcționale (lichide hidraulice, antigel, inhibitori de coroziune etc. – cu excepția aditivilor pentru combustibil) Produsul biocid este recomandat pentru a controla creșterea bacteriilor în lichidele funcționale, cum ar fi lichidele de frână și hidraulice, aditivii antigel, inhibitorii de coroziune, lichidele de filare. Produsul biocid inhibă creșterea microorganismelor, care altfel ar duce la formarea mirosurilor, modificarea vâscozității, decolorarea produselor și defectarea prematură a produselor.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: sistem închis Descriere detaliată: Dozare manuală și automată. Produsul biocid trebuie distribuit în lichidul final într-un punct care să asigure o amestecare adecvată folosind, de preferință, o pompă automată de dozare sau prin adăugare manuală.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Utilizări industriale: 1,5-14,5 % C(M)IT/MIT în produsele biocide. Utilizări profesionale: Se adaugă la o rată de utilizare tipică între 6 și 30 mg C(M)IT/MIT (3:1) per kg de produs final care urmează a fi tratat. - Numărul și calendarul de aplicare: Produsul biocid este adăugat în doză unică la momentul fabricației, depozitării sau expedierii. Utilizări industriale: 1,5-14,5 % C(M)IT/MIT în produsele biocide. Utilizări profesionale: Se adaugă la o rată de utilizare tipică între 6 și 30 mg C(M)IT/MIT (3:1) per kg de produs final care urmează a fi tratat Pentru produsul biocid așa cum este furnizat: numai pentru uz industrial.

Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pentru utilizatorii industriali și profesioniști: — flacon HDPE: 5 l (nominal) — Găleată/canistră HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominal) — Cutie cu căptușeală HDPE: 20 l — Tambur HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Toate produsele trebuie transportate și depozitate într-o cameră ventilată.

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

— Conservantul poate fi adăugat în orice etapă a fabricației produsului.

— Se recomandă adăugarea cât mai timpurie posibilă pentru o protecție optimă.

— Consultați producătorul pentru a determina doza optimă pentru diferitele produse care trebuie conservate.

— Se recomandă ca valoarea concentrației optime de biocid și compatibilitatea cu formulele individuale să fie determinate prin teste de laborator.

— Durata și condițiile de depozitare a matricelor conservate pot avea impact asupra eficacității produsului; se recomandă testele microbiologice pentru a determina rata de aplicare adecvată fără a depăși rata maximă de aplicare autorizată.

— Produsul biocid trebuie utilizat pentru tratarea produselor (articole/amestecuri) distribuite numai utilizatorilor profesioniști.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

— În timpul fazelor de manipulare ale produsului din Meta SPC 1, 2, 3 și 4 (amestecare și încărcare), expunerea la produs (produse corozive și iritante pentru piele) trebuie limitată prin utilizarea PPE și aplicarea RMM tehnice și organizaționale:

  — Minimizarea fazelor manuale (automatizarea proceselor);

  — Utilizarea unui dispozitiv de dozare;

  — Curățarea regulată a echipamentelor și a zonei de lucru;

  — Evitarea contactului cu unelte și obiecte contaminate;

  — Un standard corespunzător de ventilație generală;

  — Instruirea și îndrumarea personalului cu privire la bunele practici.

— EIP este următorul:

  — mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (materialul pentru mănuși trebuie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

  — salopetă de protecție (cel puțin tip 3 sau 4, EN 14605) care este impermeabilă la produse biocide (materialul de salopetă trebuie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs);

  — Protecție pentru ochi;

  — Respirator adecvat pentru substanță/sarcină, dacă ventilația este inadecvată.

— Concentrația maximă de produse utilizată pentru conservarea lichidelor funcționale (lichide hidraulice, antigel, inhibitori de coroziune etc.) depășește valoarea pragului de 15 ppm; prin urmare, expunerea trebuie limitată prin utilizarea PPE, protejarea pielii și a mucoaselor potențial expuse și aplicarea RMM tehnice și organizaționale:

  — Minimizarea fazelor manuale;

  — Utilizarea unui dispozitiv de dozare;

  — Curățarea regulată a echipamentelor și a zonei de lucru;

  — Un standard corespunzător de ventilație generală;

  — Instruirea și îndrumarea personalului cu privire la bunele practici.

4.3.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4. **Descrierea utilizării**

Tabelul 4

Conservarea lichidelor utilizate în sistemele de răcire închise cu recirculare

Tip de produs	TP 11: Conservanți pentru sisteme de răcire și de procesare a lichidelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Bacterii (inclusiv Legionella pneumophila) Etapă de dezvoltare: nu există date Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: nu există date Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Ciuperci Etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior utilizare în exterior Conservarea lichidelor utilizate în sistemele de răcire închise cu recirculare (sistemele închise de apă de răcire cu recirculare includ răcirea compresoarelor, apa răcită pentru sisteme de aer condiționat, boilerele, sistemele de răcire a carterelor de motor, răcirea sistemelor de alimentare cu energie și alte procese industriale). Produsul biocid este utilizat pentru a controla creșterea bacteriilor aerobe și anaerobe, a drojdiilor, ciupercilor și biopeliculei în apa circulată în sisteme închise.

Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: sistem închis Descriere detaliată: Dozare manuală și automată.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Eficacitate curativă: – împotriva bacteriilor (inclusiv L. pneumophila) la 50-14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă. Timp de contact: 24 de ore – împotriva biopeliculei: 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă. Timp de contact: 24 de ore: – împotriva ciupercilor și drojdiilor la 1-3 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă. Timp de contact: 48 de ore. Eficacitate preventivă: – împotriva bacteriilor (inclusiv L. pneumophila) la 3-14,9 g C(M) IT/MIT (3:1)/m^3 de apă. – împotriva biopeliculei (inclusiv L. pneumophila): 3 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă. - Numărul și calendarul de aplicare: Eficacitate curativă: — împotriva bacteriilor (inclusiv L. pneumophila) la 5-14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă. Timp de contact: 24 de ore. — împotriva biopeliculei: 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă. Timp de contact: 24 de ore. — împotriva ciupercilor și drojdiilor la 1-3 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă. Timp de contact: 48 de ore. Eficacitate preventivă: împotriva bacteriilor (inclusiv L. pneumophila) la 3-14,9 g C(M) IT/MIT (3:1)/m^3 de apă. împotriva biopeliculei (inclusiv L. pneumophila): 3 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă.
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pentru utilizatorii industriali și profesioniști: — flacon HDPE: 5 l (nominal) — găleată/canistră HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominal) — cutie cu căptușeală HDPE: 20 l — tambur HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Toate produsele trebuie transportate și depozitate într-o cameră ventilată.

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Testele microbiologice pentru demonstrarea caracterului adecvat al conservării trebuie efectuate de către utilizatorul produselor C(M)IT/MIT pentru a determina doza efectivă de conservant pentru matricea/locația/sistemul respectiv. Dacă este necesar, consultați producătorul produsului conservant.

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

— Clătiți sistemul (în special pompele de distribuție) cu apă înainte de a efectua etapa de curățare.

— În timpul fazelor de manipulare (amestecare și încărcare) și al curățării pompelor de dozare, expunerea la produs (produs coroziv și iritant pentru piele) trebuie limitată prin utilizarea PPE și aplicarea RMM tehnice și organizaționale:

  — Minimizarea fazelor manuale (automatizarea proceselor);

  — Utilizarea unui dispozitiv de dozare;

— Curățarea regulată a echipamentelor și a zonei de lucru;

— Evitarea contactului cu unelte și obiecte contaminate;

— Un standard corespunzător de ventilație generală;

— Instruirea și îndrumarea personalului cu privire la bunele practici.

— EIP este următorul:

— mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (materialul pentru mănuși trebuie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

— salopetă de protecție (cel puțin tip 3 sau 4, EN 14605) care este impermeabilă la produse biocide (materialul de salopetă trebuie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs);

— Protecție pentru ochi;

— Respirator adecvat pentru substanță/sarcină, dacă ventilația este inadecvată.

4.4.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5. **Descrierea utilizării**

Tabelul 5

Conservarea lichidelor utilizate în sistemele de răcire deschise cu recirculare, de mici dimensiuni

Tip de produs	TP 11: Conservanți pentru sisteme de răcire și de procesare a lichidelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Bacterii (inclusiv Legionella pneumophila) Etapă de dezvoltare: nu există date Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: nu există date Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Ciuperci Etapă de dezvoltare: nu există date Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Alge (alge verzi și cianobacterii) Etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior utilizare în exterior Conservarea lichidelor utilizate în sistemele deschise de răcire cu recirculare de mici dimensiuni (debitul de circulare și recirculare, precum și volumul total de apă limitat la 2 m^3/h, 100 m^3/h, respectiv 300 m^3) Apa de proces și de răcire: Se utilizează pentru controlul creșterii bacteriilor, algelor, ciupercilor și biopeliculei
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: sistem deschis Descriere detaliată: Dozare manuală și automată.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Tratament curativ Împotriva bacteriilor (inclusiv L. pneumophila) la 5-14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă – împotriva biopeliculei (inclusiv L. pneumophila) la 1,5-14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă – împotriva ciupercilor (inclusiv drojdiile) la 1-14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă. Tratament preventiv:-Împotriva bacteriilor, algelor verzi și cianobacteriilor la 3 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă – împotriva biopeliculei (inclusiv L. pneumophila) la 3 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă. - Numărul și calendarul de aplicare: Tratament curativ — Împotriva bacteriilor (inclusiv L. pneumophila) la 5-14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă Timp de contact: 24 de ore — împotriva biopeliculei (inclusiv L. pneumophila) la 1,5-14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă Timp de contact: 48 de ore. — împotriva ciupercilor și drojdiilor la 1-14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă Timp de contact: 48 de ore. Tratament preventiv: — împotriva bacteriilor, algelor verzi și cianobacteriilor la 3 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă. — împotriva biopeliculei (inclusiv L. pneumophila) la 3 g C(M) IT/MIT (3:1)/m^3 de apă.
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pentru utilizatorii industriali și profesioniști: — flacon HDPE: 5 l (nominal) — Găleată/canistră HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominal) — Cutie cu căptușeală HDPE: 20 l — Tambur HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Toate produsele trebuie transportate și depozitate într-o cameră ventilată.

4.5.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Testele microbiologice pentru demonstrarea caracterului adecvat al conservării trebuie efectuate de către utilizatorul produselor C(M)IT/MIT pentru a determina doza efectivă de conservant pentru matricea/locația/sistemul respectiv. Dacă este necesar, consultați producătorul produsului conservant.

4.5.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

— Clătiți sistemul (în special pompele de distribuție) cu apă înainte de a efectua etapa de curățare.

— În timpul fazelor de manipulare (amestecare și încărcare) și al curățării pompelor de dozare, expunerea la produs (produs coroziv și iritant pentru piele) trebuie limitată prin utilizarea PPE și aplicarea RMM tehnice și organizaționale:

  — Minimizarea fazelor manuale (automatizarea proceselor);

  — Utilizarea unui dispozitiv de dozare;

  — Curățarea regulată a echipamentelor și a zonei de lucru;

  — Evitarea contactului cu unelte și obiecte contaminate;

  — Un standard corespunzător de ventilație generală;

  — Instruirea și îndrumarea personalului cu privire la bunele practici.

— EIP este următorul:

  — mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (materialul pentru mănuși trebuie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

  — salopetă de protecție (cel puțin tip 3 sau 4, EN 14605) care este impermeabilă la produse biocide (materialul de salopetă trebuie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs);

  — Protecție pentru ochi;

  — Respirator adecvat pentru substanță/sarcină, dacă ventilația este inadecvată.

— Lichidul de răcire nu trebuie să intre direct în apa de suprafață. Utilizați produsul numai în spații conectate la un STP.

— Produsul poate fi utilizat numai atunci când turnurile de răcire sunt echipate cu dispozitive de eliminare a derivei care reduc deriva cu cel puțin 99%.

4.5.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.6. **Descrierea utilizării**

Tabelul 6

Conservarea lichidelor utilizate în pasteurizatoare, benzi rulante și mașini de spălat aer

Tip de produs	TP 11: Conservanți pentru sisteme de răcire și de procesare a lichidelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Bacterii (inclusiv Legionella pneumophila) Etapă de dezvoltare: nu există date Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: nu există date Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Ciuperci Etapă de dezvoltare: nu există date Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Alge (alge verzi și cianobacterii) Etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior utilizare în exterior Conservarea lichidelor utilizate în pasteurizatoare nealimentare, benzi rulante și mașini de spălat aer
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: - Descriere detaliată: Produsul biocid este dozat automat în lichidul de transfer termic, într-un loc cu amestecare bună (de ex, un bazin de colectare aflat sub banda rulantă). Conducta de alimentare este utilizată pentru dozarea produsului biocid sub nivelul apei pentru a limita evaporarea acestuia.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Tratament curativ:-împotriva bacteriilor (inclusiv L. pneumophila): 5-14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă – împotriva biopeliculei (inclusiv L. pneumophila) la 1,5-14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă – împotriva ciupercilor și drojdiilor la 1-14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă. Tratament preventiv: Împotriva bacteriilor, algelor verzi și cianobacteriilor la 3 g C(M) IT/MIT (3:1)/m^3 de apă, împotriva biopeliculei (inclusiv L. pneumophila) la 3 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă. - Numărul și calendarul de aplicare: Tratament curativ împotriva bacteriilor (inclusiv L. pneumophila): 5-14,9 g C(M) IT/MIT (3:1)/m^3 de apă. Timp de contact: 24 de ore — împotriva biopeliculei (inclusiv L. pneumophila) la 1,5-14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă Timp de contact: 48 de ore. — împotriva ciupercilor și drojdiilor la 1-14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/ m^3 de apă Timp de contact: 48 de ore.

	Tratament preventiv: — împotriva bacteriilor, algelor verzi și cianobacteriilor la 3 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă. — împotriva biopeliculei (inclusiv L. pneumophila) la 3 g C(M) IT/MIT (3:1)/m^3 de apă.
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pentru utilizatorii industriali și profesioniști: — flacon HDPE: 5 l (nominal) — Găleată/canistră HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominal) — Cutie cu căptușeală HDPE: 20 l — Tambur HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Toate produsele trebuie transportate și depozitate într-o cameră ventilată.

4.6.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Testele microbiologice pentru demonstrarea caracterului adecvat al conservării trebuie efectuate de către utilizatorul produselor C(M)IT/MIT pentru a determina doza efectivă de conservant pentru matricea/locația/sistemul respectiv. Dacă este necesar, consultați producătorul produsului conservant.

Sisteme de spălare a aerului: Pentru utilizare numai în sisteme industriale de spălare a aerului, care mențin componentele de eliminare eficientă a ceții.

4.6.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

— Clătiți sistemul (în special pompele de distribuție) cu apă înainte de a efectua etapa de curățare.

— În timpul fazelor de manipulare (amestecare și încărcare) și al curățării pompelor de dozare, expunerea la produs (produs coroziv și iritant pentru piele) trebuie limitată prin utilizarea PPE și aplicarea RMM tehnice și organizaționale:

  — Minimizarea fazelor manuale (automatizarea proceselor);

  — Utilizarea unui dispozitiv de dozare;

  — Curățarea regulată a echipamentelor și a zonei de lucru;

  — Evitarea contactului cu unelte și obiecte contaminate;

  — Un standard corespunzător de ventilație generală;

  — Instruirea și îndrumarea personalului cu privire la bunele practici.

— EIP este următorul:

  — mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (materialul pentru mănuși trebuie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

  — salopetă de protecție (cel puțin tip 3 sau 4, EN 14605) care este impermeabilă la produse biocide (materialul de salopetă trebuie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs);

  — Protecție pentru ochi;

  — Respirator adecvat pentru substanță/sarcină, dacă ventilația este inadecvată.

4.6.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.6.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.6.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.7. **Descrierea utilizării**

Tabelul 7

Conservarea lichidelor de recirculare utilizate în prelucrarea textilelor și a fibrelor, prelucrarea marochinăriei, prelucrarea fotografiilor și sistemele de soluții de protecție la imprimare

Tip de produs	TP 11: Conservanți pentru sisteme de răcire și de procesare a lichidelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Conservarea lichidelor de recirculare utilizate în prelucrarea textilelor și a fibrelor, prelucrarea marochinăriei, prelucrarea fotografiilor și sistemele de soluții de protecție la imprimare Produsele biocide C(M)IT/MIT (3:1) sunt utilizate pentru conservarea lichidelor textile și de filare, soluțiilor de prelucrare foto, a soluțiilor de procesare a pielii naturale (de exemplu, în etape de tratament prin spălare și înmuiere) și soluțiilor de protecție la imprimare pentru a controla integritatea lichidului recirculat prin reducerea contaminării microbiene în soluția vrac.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: - Descriere detaliată: Dozare manuală și automată.Conservarea tuturor produselor finale este realizată, în majoritatea cazurilor, în moduri puternic automatizate de către utilizatorii industriali. Produsul biocid este adăugat la bazinul central, în rezervor sau în liniile de recirculare într-o zonă cu amestecare adecvată.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Tratament curativ: Împotriva bacteriilor la 16-30 mg C(M)IT/MIT (3:1) per l de lichid - Numărul și calendarul de aplicare: Tratament curativ: Împotriva bacteriilor la 16-30 mg C(M)IT/MIT (3:1) per l de lichid Timp de contact: 5 zile
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pentru utilizatorii industriali și profesioniști: — flacon HDPE: 5 l (nominal) — Găleată/canistră HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominal) — Cutie cu căptușeală HDPE: 20 l — Tambur HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Toate produsele trebuie transportate și depozitate într-o cameră ventilată.

4.7.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Testele microbiologice pentru demonstrarea caracterului adecvat al conservării trebuie efectuate de către utilizatorul produselor C(M)IT/MIT pentru a determina doza efectivă de conservant pentru matricea/locația/sistemul respectiv. Dacă este necesar, consultați producătorul produsului conservant.

4.7.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

— Clătiți sistemul (în special pompele de distribuție) cu apă înainte de a efectua etapa de curățare.

— În timpul fazelor de manipulare (amestecare și încărcare) și al curățării pompelor de dozare, expunerea la produs (produs coroziv și iritant pentru piele) trebuie limitată prin utilizarea PPE și aplicarea RMM tehnice și organizaționale:

  — Minimizarea fazelor manuale (automatizarea proceselor);

  — Utilizarea unui dispozitiv de dozare;

  — Curățarea regulată a echipamentelor și a zonei de lucru;

  — Evitarea contactului cu unelte și obiecte contaminate;

  — Un standard corespunzător de ventilație generală;

  — Instruirea și îndrumarea personalului cu privire la bunele practici.

— EIP este următorul:

  — mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (materialul pentru mănuși trebuie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

  — salopetă de protecție (cel puțin tip 3 sau 4, EN 14605) care este impermeabilă la produse biocide (materialul de salopetă trebuie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs);

  — Protecție pentru ochi;

  — Respirator adecvat pentru substanță/sarcină, dacă ventilația este inadecvată.

— Substanțele utilizate în lichidele de prelucrare a textilelor și fibrelor nu trebuie să intre direct în apa de suprafață. Utilizați produsul numai în spații conectate la un STP.

— Lichidele de recirculare din sistemele de fotoprocesare și sistemele cu soluții de protecție la imprimare nu trebuie să intre direct în apa de suprafață. Utilizați produsul numai în spații conectate la un STP.

4.7.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.7.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.7.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.8. **Descrierea utilizării**

Tabelul 8

Conservarea lichidelor recirculate utilizate în cabine de vopsire și sisteme de acoperire cu electrodepunere

Tip de produs	TP 11: Conservanți pentru sisteme de răcire și de procesare a lichidelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: nu există date Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Conservarea lichidelor recirculate utilizate în cabine de vopsire și sisteme de acoperire cu electrodepunere. Biocidul este utilizat pentru conservarea lichidelor în procesele de pretratare (tratament de curățare pentru îndepărtarea grăsimilor și murdăriei, procesul de fosfatare pentru degresare, clătirea rezervoarelor), în cabine de vopsire și sisteme de acoperire cu electrodepunere (de exemplu, băi cataforetice) aplicate în procesele de refinisare auto și producție auto de către producătorii de echipamente originale pentru controlul integrității lichidului recirculat prin reducerea contaminării microbiene de bacterii și ciuperci în soluția vrac.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: - Descriere detaliată: -
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Tratament preventiv: 7,5-30 mg C(M)IT/MIT (3:1) per kg produs final. - Numărul și calendarul de aplicare: Tratament preventiv: 7,5-30 mg C(M)IT/MIT (3:1) per kg produs final. Produsul biocid este adăugat în momentul fabricației, depozitării sau expedierii.
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pentru utilizatorii industriali și profesioniști: — flacon HDPE: 5 l (nominal) — găleată/canistră HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominal) — cutie cu căptușeală HDPE: 20 l — tambur HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Toate produsele trebuie transportate și depozitate într-o cameră ventilată.

4.8.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Testele microbiologice pentru demonstrarea caracterului adecvat al conservării trebuie efectuate de către utilizatorul produselor C(M)IT/MIT pentru a determina doza efectivă de conservant pentru matricea/locația/sistemul respectiv. Dacă este necesar, consultați producătorul produsului conservant.

4.8.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

— Clătiți sistemul (în special pompele de distribuție) cu apă înainte de a efectua etapa de curățare.

— În timpul fazelor de manipulare (amestecare și încărcare) și al curățării pompelor de dozare, expunerea la produs (produs coroziv și iritant pentru piele) trebuie limitată prin utilizarea PPE și aplicarea RMM tehnice și organizaționale:

  — Minimizarea fazelor manuale (automatizarea proceselor);

  — Utilizarea unui dispozitiv de dozare;

  — Curățarea regulată a echipamentelor și a zonei de lucru;

  — Evitarea contactului cu unelte și obiecte contaminate;

  — Un standard corespunzător de ventilație generală;

  — Instruirea și îndrumarea personalului cu privire la bunele practici.

— EIP este următorul:

  — mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (materialul pentru mănuși trebuie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

  — salopetă de protecție (cel puțin tip 3 sau 4, EN 14605) care este impermeabilă la produse biocide (materialul de salopetă trebuie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs);

  — Protecție pentru ochi;

  — Respirator adecvat pentru substanță/sarcină, dacă ventilația este inadecvată.

4.8.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.8.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.8.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.9. **Descrierea utilizării**

Tabelul 9

Conservarea lichidelor utilizate în sistemele închise de încălzire cu recirculare și conductele asociate

Tip de produs	TP 11: Conservanți pentru sisteme de răcire și de procesare a lichidelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-

Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Bacterii (anaerobe și aerobe, inclusiv Legionella pneumophila) Etapă de dezvoltare: nu există date Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: nu există date Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Ciuperci Etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior utilizare în exterior Conservarea lichidelor utilizate în sistemele închise de încălzire cu recirculare și conductele asociate. Spălarea biocidului înainte de punerea în funcțiune a sistemelor de conducte noi sau existente (conducte de încălzire și răcire) include conductele structurale existente sau noi construite pe proiecte de clădiri industriale. Sisteme de încălzire închise cu recirculare: spălarea biocidului înainte de punerea în funcțiune a sistemelor de conducte noi sau existente (conducte de încălzire și răcire) include conductele structurale existente sau noi construite pe proiecte de clădiri industriale. Produsul biocid este utilizat pentru a controla creșterea bacteriilor aerobe și anaerobe, a ciupercilor și a biopeliculei în apa circulată în sisteme închise. Sistemele închise sunt mai puțin susceptibile la coroziune, tartru și murdărire biologică decât sistemele deschise. Cu toate acestea, pot apărea probleme microbiene, dacă sistemul este lăsat umplut și netratat. Acest lucru este cauzat de prezența nitriților și glicolurilor care hrănesc microbii.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: sistem închis Descriere detaliată: Dozare manuală și automată. Produsul biocid este dozat automat în lichidul de transfer termic, într-un loc cu amestecare bună. Conducta de alimentare trebuie să dozeze produsul biocid sub nivelul apei pentru a limita evaporarea produsului biocid.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Tratament curativ – împotriva bacteriilor la 5 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă (inclusiv L. pneumophila) – împotriva biopeliculei la 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă – împotriva ciupercilor și drojdiilor la 1 g C(M)IT/MIT/m^3 de apă Tratament preventiv – împotriva bacteriilor (inclusiv L. Pneumophila) la 3 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă – împotriva biopeliculei la 3 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă. - Numărul și calendarul de aplicare: Tratament curativ — împotriva bacteriilor la 5 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă (inclusiv L. pneumophila) Timp de contact: 24 de ore — împotriva biopeliculei la 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă Timp de contact: 24 de ore — împotriva ciupercilor și drojdiei la 1 g C(M)IT/MIT/m^3 de apă Timp de contact: 48 de ore Tratament preventiv — împotriva bacteriilor (inclusiv L. pneumophila) la 3 g C(M) IT/MIT (3:1)/m^3 de apă și împotriva biopeliculei la 3 g C(M) IT/MIT (3: 1)/m^3 de apă.

Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pentru utilizatorii industriali și profesioniști: — flacon HDPE: 5 l (nominal) — găleată/canistră HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominal) — cutie cu căptușeală HDPE: 20 l — tambur HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Toate produsele trebuie transportate și depozitate într-o cameră ventilată.

4.9.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Testele microbiologice pentru demonstrarea caracterului adecvat al conservării trebuie efectuate de către utilizatorul produselor C(M)IT/MIT pentru a determina doza efectivă de conservant pentru matricea/locația/sistemul respectiv. Dacă este necesar, consultați producătorul produsului conservant.

4.9.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

— Clătiți sistemul (în special pompele de distribuție) cu apă înainte de a efectua etapa de curățare.

— În timpul fazelor de manipulare (amestecare și încărcare) și al curățării pompelor de dozare, expunerea la produs (produs coroziv și iritant pentru piele) trebuie limitată prin utilizarea PPE și aplicarea RMM tehnice și organizaționale:

  — Minimizarea fazelor manuale (automatizarea proceselor);

  — Utilizarea unui dispozitiv de dozare;

  — Curățarea regulată a echipamentelor și a zonei de lucru;

  — Evitarea contactului cu unelte și obiecte contaminate;

  — Un standard corespunzător de ventilație generală;

  — Instruirea și îndrumarea personalului cu privire la bunele practici.

— EIP este următorul:

  — mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (materialul pentru mănuși trebuie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

  — salopetă de protecție (cel puțin tip 3 sau 4, EN 14605) care este impermeabilă la produse biocide (materialul de salopetă trebuie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs);

  — Protecție pentru ochi;

  — Respirator adecvat pentru substanță/sarcină, dacă ventilația este inadecvată.

4.9.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.9.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.9.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.10. **Descrierea utilizării**

Tabelul 10

Conservarea polimerilor utilizați în procesele din industria petrolieră (de exemplu, recuperarea optimizată a petrolului, nămolurile de forare etc.)

Tip de produs	TP 11: Conservanți pentru sisteme de răcire și de procesare a lichidelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în exterior Conservarea polimerilor utilizați în procesele din industria petrolieră (de exemplu, recuperarea optimizată a petrolului, nămolurile de forare etc.)
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: - Descriere detaliată: -
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Tratamentul preventiv al polimerilor utilizați în apa de injectare: Polimerul xanthan: 30-50 g soluție C(M)IT/MIT/m^3. Polimer HPAM: 30-50 g soluție C(M)IT/MIT/m^3. Tratamentul preventiv al polimerilor utilizați pentru nămolul de forare: Polimerul xanthan: 30 g soluție C(M)IT/MIT/m^3. Polimer HPAM: 30 g soluție C(M)IT/MIT/m^3. - Numărul și calendarul de aplicare: Tratamentul preventiv al polimerilor utilizați în apa de injectare: Polimerul xanthan: 30-50 g soluție C(M)IT/MIT/m^3. Polimer HPAM: 30-50 g soluție C(M)IT/MIT/m^3. Tratamentul preventiv al polimerilor utilizați pentru nămolul de forare: Polimerul xanthan: 30 g soluție C(M)IT/MIT/m^3. Polimer HPAM: 30 g soluție C(M)IT/MIT/m^3.
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pentru utilizatorii industriali și profesioniști: — flacon HDPE: 5 l (nominal) — Găleată/canistră HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominal) — Cutie cu căptușeală HDPE: 20 l — Tambur HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Toate produsele trebuie transportate și depozitate într-o cameră ventilată.

4.10.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Testele microbiologice pentru demonstrarea caracterului adecvat al conservării trebuie efectuate de către utilizatorul produselor C(M)IT/MIT pentru a determina doza efectivă de conservant pentru matricea/locația/sistemul respectiv. Dacă este necesar, consultați producătorul produsului conservant.

4.10.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

— Clătiți sistemul (în special pompele de distribuție) cu apă înainte de a efectua etapa de curățare.

— În timpul fazelor de manipulare (amestecare și încărcare) și al curățării pompelor de dozare, expunerea la produs (produs coroziv și iritant pentru piele) trebuie limitată prin utilizarea PPE și aplicarea RMM tehnice și organizaționale:

  — Minimizarea fazelor manuale (automatizarea proceselor);

  — Utilizarea unui dispozitiv de dozare;

  — Curățarea regulată a echipamentelor și a zonei de lucru;

  — Evitarea contactului cu unelte și obiecte contaminate;

  — Un standard corespunzător de ventilație generală;

  — Instruirea și îndrumarea personalului cu privire la bunele practici.

— EIP este următorul:

  — mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (materialul pentru mănuși trebuie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

  — salopetă de protecție (cel puțin tip 3 sau 4, EN 14605) care este impermeabilă la produse biocide (materialul de salopetă trebuie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs);

  — Protecție pentru ochi;

  — Respirator adecvat pentru substanță/sarcină, dacă ventilația este inadecvată.

4.10.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.10.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.10.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.11. **Descrierea utilizării**

Tabelul 11

Tratament cu slimicid în procesul de decolorare a celulozei și hârtiei

Tip de produs	TP 12: Slimicide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: nu există date Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: nu există date Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Ciuperci Etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Tratament cu slimicid în procesul de decolorare a celulozei și hârtiei. Reciclarea/decolorarea hârtiei în fabricile de hârtie. Procesul de decolorare este un proces utilizat în producția de hârtie pentru îndepărtarea cernelurilor de tipărire din deșeurile de fibre de hârtie pentru a obține celuloză decolorată.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: sistem închis Descriere detaliată: Dozare manuală și automată. Biocidul este dozat automat de pompă și conductele fixe în circuit, de obicei în defibrator, sub nivelul apei.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Tratament curativ: 10 la 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă de tratat. Tratament preventiv: 5 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă de tratat. - Numărul și calendarul de aplicare: Tratament curativ: 10 la 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă de tratat Timp de contact: 24 de ore Tratament preventiv: 5 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă de tratat.
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pentru utilizatorii industriali și profesioniști: — flacon HDPE: 5 l (nominal) — Găleată/canistră HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominal) — Cutie cu căptușeală HDPE: 20 l — Tambur HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Toate produsele trebuie transportate și depozitate într-o cameră ventilată.

4.11.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Testele microbiologice pentru demonstrarea caracterului adecvat al conservării trebuie efectuate de către utilizatorul produselor C(M)IT/MIT pentru a determina doza efectivă de conservant pentru matricea/locația/sistemul respectiv. Dacă este necesar, consultați producătorul produsului conservant.

4.11.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

— Clătiți sistemul (în special pompele de distribuție) cu apă înainte de a efectua etapa de curățare.

— În timpul fazelor de manipulare (amestecare și încărcare) și al curățării pompelor de dozare, expunerea la produs (produs coroziv și iritant pentru piele) trebuie limitată prin utilizarea PPE și aplicarea RMM tehnice și organizaționale:

  — Minimizarea fazelor manuale (automatizarea proceselor);

  — Utilizarea unui dispozitiv de dozare;

  — Curățarea regulată a echipamentelor și a zonei de lucru;

  — Evitarea contactului cu unelte și obiecte contaminate;

  — Un standard corespunzător de ventilație generală;

  — Instruirea și îndrumarea personalului cu privire la bunele practici.

— EIP este următorul:

  — mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (materialul pentru mănuși trebuie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

  — salopetă de protecție (cel puțin tip 3 sau 4, EN 14605) care este impermeabilă la produse biocide (materialul de salopetă trebuie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs);

  — Protecție pentru ochi;

  — Respirator adecvat pentru substanță/sarcină, dacă ventilația este inadecvată.

4.11.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.11.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.11.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.12. **Descrierea utilizării**

Tabelul 12

Tratament slimicid în stadiul umed al procesului de fabricație a hârtiei

Tip de produs	TP 12: Slimicide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-

Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: nu există date Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: nu există date Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Ciuperci Etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Tratament slimicid în stadiul umed al procesului de fabricație a hârtiei (fabrici de hârtie, etapă umedă [circuite de apă] și sisteme de procesare din fabricile de hârtie).
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: sistem închis Descriere detaliată: Dozare manuală și automată.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Tratament curativ: 10 la 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă de tratat Tratament preventiv: 5 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă de tratat. - Numărul și calendarul de aplicare: Tratament curativ: 10 la 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă de tratat Timp de contact: 24 de ore Tratament preventiv: 5 g C(M)IT/MIT (3:1)/m^3 de apă de tratat.
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pentru utilizatorii industriali și profesioniști: — flacon HDPE: 5 l (nominal) — găleată/canistră HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominal) — cutie cu căptușeală HDPE: 20 l — tambur HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Toate produsele trebuie transportate și depozitate într-o cameră ventilată.

4.12.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Testele microbiologice pentru demonstrarea caracterului adecvat al conservării trebuie efectuate de către utilizatorul produselor C(M)IT/MIT pentru a determina doza efectivă de conservant pentru matricea/locația/sistemul respectiv. Dacă este necesar, consultați producătorul produsului conservant.

4.12.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

— Clătiți sistemul (în special pompele de distribuție) cu apă înainte de a efectua etapa de curățare.

— În timpul fazelor de manipulare (amestecare și încărcare) și al curățării pompelor de dozare, expunerea la produs (produs coroziv și iritant pentru piele) trebuie limitată prin utilizarea PPE și aplicarea RMM tehnice și organizaționale:

  — Minimizarea fazelor manuale (automatizarea proceselor);

  — Utilizarea unui dispozitiv de dozare;

— Curățarea regulată a echipamentelor și a zonei de lucru;

— Evitarea contactului cu unelte și obiecte contaminate;

— Un standard corespunzător de ventilație generală;

— Instruirea și îndrumarea personalului cu privire la bunele practici.

— EIP este următorul:

— mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (materialul pentru mănuși trebuie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

— salopetă de protecție (cel puțin tip 3 sau 4, EN 14605) care este impermeabilă la produse biocide (materialul de salopetă trebuie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs);

— Protecție pentru ochi;

— Respirator adecvat pentru substanță/sarcină, dacă ventilația este inadecvată.

— Utilizarea produselor care conțin C(M)IT/MIT (3:1) pentru tratamentul slimicid în stadiul umed al procesului de fabricație a hârtiei este limitată la

(a) tratamente curative în instalații conectate la o sursă de apă fără slimicide dintr-o fabrică de celuloză și numai pentru tratamentul circulației scurte din fabricile de hârtie; și

(b) tratamente preventive,

și, în ambele cazuri, numai dacă apele reziduale ale fabricii sunt purificate într-o instalație de epurare industrială (completă) la fața locului, având o capacitate minimă de 5 000 m^3 pe zi, așa cum este descris în Directiva privind emisiile industriale din 2010/75/UE (Cele mai bune tehnici disponibile pentru producția de celuloză, hârtie și carton) și dacă se realizează o diluare de cel puțin 200 de ori în apa de suprafață după stația de epurare industrială.

4.12.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.12.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.12.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.13. **Descrierea utilizării**

Tabelul 13

Tratament preventiv (controlul murdăririi biologice) online și după curățarea în locul de instalare pentru membranele industriale RO/NF

Tip de produs	TP 12: Slimicide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: fără date Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Tratament preventiv (controlul murdăririi biologice) online și după curățarea în locul de instalare pentru membranele industriale RO/NF
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: sistem închis Descriere detaliată: Dozare manuală și automată.Aplicarea regulată a biocidului va preveni formarea biopeliculei pe suprafața membranei de osmoză inversă sau nanofiltrare, distanțierul de alimentare, mediul de filtrare și conducte. Biocidul trebuie distribuit în apa de alimentare într-un punct care să asigure o amestecare adecvată în întregul sistem.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Tratament preventiv: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) per m^3 de lichid - Numărul și calendarul de aplicare: Tratament preventiv: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) per m^3 de lichid
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pentru utilizatorii industriali și profesioniști: — flacon HDPE: 5 l (nominal) — Găleată/canistră HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominal) — Cutie cu căptușeală HDPE: 20 l — Tambur HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l — HDPE IBC: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Toate produsele trebuie transportate și depozitate într-o cameră ventilată.

4.13.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Testele microbiologice pentru demonstrarea caracterului adecvat al conservării trebuie efectuate de către utilizatorul produselor C(M)IT/MIT pentru a determina doza efectivă de conservant pentru matricea/locația/sistemul respectiv. Dacă este necesar, consultați producătorul produsului conservant.

4.13.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

— Clătiți sistemul (în special pompele de distribuție) cu apă înainte de a efectua etapa de curățare.

— În timpul fazelor de manipulare (amestecare și încărcare) și al curățării pompelor de dozare, expunerea la produs (produs coroziv și iritant pentru piele) trebuie limitată prin utilizarea PPE și aplicarea RMM tehnice și organizaționale:

  — Minimizarea fazelor manuale (automatizarea proceselor);

  — Utilizarea unui dispozitiv de dozare;

  — Curățarea regulată a echipamentelor și a zonei de lucru;

  — Evitarea contactului cu unelte și obiecte contaminate;

  — Un standard corespunzător de ventilație generală;

  — Instruirea și îndrumarea personalului cu privire la bunele practici.

— EIP este următorul:

— mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (materialul pentru mănuși trebuie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

— salopetă de protecție (cel puțin tip 3 sau 4, EN 14605) care este impermeabilă la produse biocide (materialul de salopetă trebuie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs);

— Protecție pentru ochi;

— Respirator adecvat pentru substanță/sarcină, dacă ventilația este inadecvată.

— Utilizați produsul numai în spații conectate la un STP.

4.13.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.13.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.13.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 1

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

— Durata efectului depinde de cerințele de performanță ale clientului pentru materialul conservat și de compoziția ingredientelor specifice și pH-ul produsului conservat.

— Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și urmați toate instrucțiunile furnizate.

— Respectați condițiile de utilizare a produsului (concentrație, timp de contact, temperatură, pH etc.).

MĂSURI DE PRECAUȚIE ÎN TIMPUL DEPOZITĂRII ȘI TRANSPORTULUI:

A se păstra într-un loc bine ventilat. Produsul furnizat poate genera lent gaze (în mare măsură, dioxid de carbon). Pentru a preveni acumularea presiunii, produsul este ambalat în recipiente special ventilate, acolo unde este necesar. Păstrați acest produs în recipientul original atunci când nu îl folosiți. Containerul trebuie depozitat și transportat în poziție verticală pentru a preveni vărsarea conținutului prin aerisire, acolo unde este montat.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

-

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

— Contact cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea și încălțămintea contaminată. Spălați pielea contaminată cu apă. Contactați un specialist în tratamentul otrăvurilor dacă apar simptome.

— Contact cu ochii: Spălați imediat cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare. Verificați și scoateți lentilele de contact puteți face acest lucru cu ușurință. Continuați să clătiți cu apă călduță timp de cel puțin 30 de minute. Pentru asistență medicală, apelați 112/serviciul de ambulanță.

— Ingerare: Spălați gura cu apă. Contactați un specialist în tratamentul otrăvurilor. Solicitați imediat sfatul medicului dacă apar simptome și/sau au fost ingerate cantități mari. Nu administrați lichide și nu provocați vărsături.

— Inhalare (ceață pulverizată): transportați victima în aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. Solicitați imediat sfatul medicului dacă apar simptome și/sau au fost inhalate cantități mari.

— În caz de tulburări de conștiență, așezați pacientul în poziția de recuperare și solicitați imediat sfatul medicului.

— Păstrați recipientul sau eticheta la dispoziție.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

— Nu eliminați produsul neutilizat pe sol, în apele curgătoare, în conducte (de exemplu chiuvete, toalete) și nici în canalele de scurgere.

— Eliminați produsul neutilizat, ambalajul acestuia și toate celelalte deșeuri, în conformitate cu reglementările locale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități: A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat, în recipientul original.

Durată de valabilitate: 12 luni

A se proteja de lumina soarelui.

Recomandare: Dacă se folosește un ambalaj metalic, trebuie aplicat un strat de lac.

6. ALTE INFORMAȚII

-

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 1

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale		Spectrum™ RX6804 MICROBIO-CIDE	zona Piața: UE		
Numărul autorizației		EU-0025678-0001 1-1			
Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Masă de reacție com pusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1)	Substanță activă	55965-84-9		5,9 % (de greutate)

7.2. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	Spectrum™ PR3126 PRESERVATIVE	zona Piața: UE
	Spectrum™ RX8560 MICROBIOCIDE	zona Piața: UE
	Spectrum™ RX7827 MICROBIOCIDE	zona Piața: UE
Numărul autorizației	EU-0025678-0002 1-1	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Masă de reacție com pusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1)	Substanță activă	55965-84-9		3,2 % (de greutate)

7.3. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	Biosperse™ 250 MICROBIOCIDE	zona Piața: UE
	Biosperse™ 251 MICROBIOCIDE	zona Piața: UE
	Biosperse™ 850 MICROBIOCIDE	zona Piața: UE
	Biosperse™ 851 MICROBIOCIDE	zona Piața: UE
	Spectrum™ RX6810 MICROBIOCIDE	zona Piața: UE
	Spectrum™ RX6820 MICROBIOCIDE	zona Piața: UE
Numărul autorizației	EU-0025678-0003 1-1	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Masă de reacție com pusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1)	Substanță activă	55965-84-9		2,3 % (de greutate)