Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►**B**

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. decembra 2004,

ktorým sa schvaľujú metódy klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných v Českej republike

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5266)

(Iba český text je autentický)

(2005/1/ES)

(UL L 1, 4.1.2005, str. 8)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►**M1**	Rozhodnutie Komisie 2006/383/ES, z 22. mája 2006	L 148	50	2.6.2006

▼B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. decembra 2004,

ktorým sa schvaľujú metódy klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných v Českej republike

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5266)

(Iba český text je autentický)

(2005/1/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3220/84 z 13. novembra 1984, ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu trupov z ošípaných ([1]), a najmä na jeho článok 5 ods. 2,

keďže:

(1) Článok 2 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3220/84 stanovuje, že klasifikácia jatočne opracovaných tiel ošípaných sa musí stanoviť na základe odhadu obsahu chudého mäsa v súlade so štatisticky osvedčenými metódami posudzovania, ktoré sú založené na fyzickom meraní jednej alebo viacerých anatomických častí trupu ošípanej. Schválenie klasifikačných metód podlieha dodržaniu maximálnej tolerancie štatistickej chyby v posudzovaní. Táto tolerancia bola stanovená v článku 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 2967/85 z 24. októbra 1985, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupnice Spoločenstva na klasifikáciu jatočne opracovaných tiel ošípaných ([2]).

(2) Vláda Českej republiky požiadala Komisiu, aby schválila štyri metódy klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných a predložila výsledky disekčných skúšok, ktoré sa uskutočnili pred dňom pristúpenia formou predloženia časti dva protokolu ustanoveného v článku 3 nariadenia (EHS) č. 2967/85.

(3) Prehodnotenie tejto žiadosti ukázalo, že podmienky na schválenie týchto klasifikačných metód sú splnené.

(4) Neschvaľujú sa žiadne úpravy prístrojov ani metód okrem tých, ktoré budú stanovené v novom rozhodnutí Komisie, prijatom na základe nadobudnutých skúseností, ktorým sa zároveň môže zrušiť súčasné schválenie.

(5) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre bravčové mäso,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v Českej republike podľa nariadenia (EHS) č. 3220/84 schvaľujú nasledujúce metódy klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných:

— klasifikačná metóda známa pod názvom „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)" a s ňou súvisiace metódy posudzovania, podrobne opísané v časti 1 prílohy,

— klasifikačná metóda známa pod názvom „Fat-O-Meater (FOM)" a s ňou súvisiace metódy posudzovania, podrobne opísané v časti 2 prílohy,

— klasifikačná metóda známa pod názvom „Hennessy Grading Probe (HGP 4)" a s ňou súvisiace metódy posudzovania, podrobne opísané v časti 3 prílohy,

([1]) Ú. v. ES L 301, 20.11.1984, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3513/93 (Ú. v. ES L 320, 22.12.1993, s. 5).

([2]) Ú. v. ES L 285, 25.10.1985, s. 39. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3127/94 (Ú. v. ES L 330, 21.12.1994, s. 43).

▼B

— klasifikačná metóda známa pod názvom „Ultra FOM 300” a s ňou súvisiace metódy posudzovania, podrobne opísané v časti 4 prílohy,

▼M1

— prístroj známy pod názvom „Ultra-sound IS-D-05” a s ním súvisiace metódy posudzovania, podrobne opísané v časti 5 prílohy,

— prístroj známy pod názvom „Needle IS-D-15” a s ním súvisiace metódy posudzovania, podrobne opísané v časti 6 prílohy.

Klasifikačná metóda „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)” sa môže uplatňovať len na bitúnkoch, v ktorých ročný priemer počtu porazených kusov za týždeň neprekročí 200 kusov.

▼B

Pokiaľ ide o prístroj „Ultra FOM 300”, je stanovené, že po ukončení merania musí byť možné na trupe ošípanej skontrolovať, že prístroj meral hodnoty P_2 na strane určenej v prílohe 4 bode 3. Zodpovedajúce označenie merania na príslušnej strane sa musí vykonať súčasne s meraním.

Článok 2

Neschvaľujú sa žiadne úpravy prístrojov ani metód posudzovania.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Českej republike.

▼B

PRÍLOHA

Metódy klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných v Českej republike

ČASŤ 1

Metóda „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)"

1. Klasifikácia jatočne opracovaných tiel ošípaných sa vykoná pomocou metódy „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)".
2. Obsah chudého mäsa jatočne opracovaných tiel ošípaných sa vypočíta na základe tohto vzorca:

$$ý = 49{,}62542 - 0{,}63371\ S\ (ZP) + 0{,}23525\ M\ (ZP)$$

pričom:

ý = odhadnuté percento chudého mäsa v jatočne opracovaných telách ošípaných,

S (ZP) = hrúbka slaniny (aj s kožou), meraná logaritmickým pravítkom v bode, kde *musculus gluteus medius* (m.g.m.) je najvypuklejší (mm),

M (ZP) = hrúbka svalu meraná logaritmickým pravítkom v najkratšom spojení medzi kraniálnym koncom m.g.m. a dorzálnym okrajom vertebrálneho kanála.

Vzorec platí pre jatočne opracované telá s hmotnosťou od 60 do 120 kg.

ČASŤ 2

Metóda „Fat-O-Meater (FOM)"

1. Klasifikácia jatočne opracovaných tiel ošípaných sa vykoná pomocou prístroja „Fat-O-Meater (FOM)".
2. Súčasťou prístroja je sonda s priemerom 6 mm, ktorá obsahuje fotodiódu typu Siemens SFH 950/960 a jej operačná vzdialenosť je od 3 do 103 mm. Výsledky meraní sa prostredníctvom počítača prevedú do odhadnutého obsahu chudého mäsa.
3. Obsah chudého mäsa jatočne opracovaných tiel ošípaných sa vypočíta na základe tohto vzorca:

$$ý = 59{,}86131 - 0{,}72930\ S\ (FOM) + 0{,}12853\ M\ (FOM)$$

pričom:

ý = odhadnuté percento chudého mäsa v jatočne opracovaných telách ošípaných

S (FOM) = hrúbka chrbtovej slaniny (aj s kožou) v milimetroch, meraná 6,5 centimetra od stredovej čiary jatočne opracovaných tiel ošípaných medzi druhým a tretím posledným rebrom,

M (FOM) = hrúbka svalu v milimetroch, meraná v rovnakom čase a na rovnakom mieste ako S (FOM).

Vzorec platí pre jatočne opracované telá s hmotnosťou od 60 do 120 kg.

ČASŤ 3

Metóda „Hennessy Grading Probe (HGP 4)"

1. Klasifikácia jatočne opracovaných tiel ošípaných sa vykoná pomocou prístroja „Hennessy Grading Probe (HGP 4)".
2. Súčasťou prístroja je sonda s priemerom 5,95 mm (a 6,3 mm na ostrí nachádzajúcom sa navrchu sondy), ktorá obsahuje fotodiódu (Siemens LED typu LYU 260-EO) a fotodetektor typu 58 MR a jej operačná vzdialenosť je od 0 do 120 mm. Výsledky meraní sa prevedú do odhadnutého obsahu chudého mäsa prostredníctvom samotného HGP 4 alebo pomocou počítača, ktorý je k nemu pripojený.
3. Obsah chudého mäsa jatočne opracovaných tiel ošípaných sa vypočíta na základe tohto vzorca:

$$ý = 61{,}34154 - 0{,}81609\ S\ (HGP) + 0{,}12901\ M\ (HGP)$$

▼B

pričom

ý = odhadnuté percento chudého mäsa v jatočne opracovaných telách ošípaných,

S (HGP) = hrúbka chrbtovej slaniny (aj s kožou) v milimetroch, meraná 7,5 centimetra od stredovej čiary jatočne opracovaných tiel ošípaných medzi druhým a tretím posledným rebrom,

M (HGP) = hrúbka svalu v milimetroch, meraná v rovnakom čase a na rovnakom mieste ako S (HGP).

Vzorec platí pre jatočne opracované telá s hmotnosťou od 60 do 120 kg.

ČASŤ 4

Metóda „ULTRA-FOM 300"

1. Klasifikácia jatočne opracovaných tiel ošípaných sa vykoná pomocou prístroja „Ultra-FOM 300".
2. Súčasťou prístroja je nadzvuková sonda s 3,5 MHz. Nadzvukový signál sa digitalizuje, uloží a spracuje mikroprocesorom.

   Výsledky meraní sa pomocou samotného prístroja Ultra-FOM prevedú do odhadovaného obsahu chudého mäsa.
3. Obsah chudého mäsa jatočne opracovaných tiel ošípaných sa vypočíta na základe tohto vzorca:

$$ý = 64{,}64865 - 0{,}76656\ S\ (UFOM) + 0{,}06425\ M\ (UFOM)$$

pričom:

ý = odhadnuté percento chudého mäsa v jatočne opracovaných telách ošípaných,

S (UFOM) = hrúbka chrbtovej slaniny (aj s kožou) v milimetroch, meraná 7 centimetrov od stredovej čiary jatočne opracovaných tiel ošípaných medzi druhým a tretím posledným rebrom (meranie známe pod názvom „P_2"),

M (UFOM) = hrúbka svalu v milimetroch, meraná v rovnakom čase a na rovnakom mieste ako S (UFOM).

Vzorec platí pre jatočne opracované telá s hmotnosťou od 60 do 120 kg.

▼M1

ČASŤ 5

Ultra-sound IS-D-05

1. Klasifikácia jatočne opracovaných tiel ošípaných sa vykonáva pomocou metódy „Ultra-sound IS-D-05".
2. Klasifikačný prístroj IS-D-05 je zariadením na meranie chudého mäsa a hrúbky slaniny na základe analýzy rozpätia vyslaných a prijatých ultrazvukových impulzov, ktoré sú postupne vysielané do trupu ošípanej na špecifickom mieste. Ultrazvuková sonda sníma v čase skenovania vyšetrovaný trup sériou 3 x 100 ultrazvukových impulzov frekvencie 4 MHz.
3. Obsah chudého mäsa trupu ošípanej sa vypočíta na základe tohto vzorca:

$$\hat{y} = 60{,}69798 - 0{,}89211\ S\ (IS\text{-}D\text{-}05) + 0{,}10560\ M\ (IS\text{-}D\text{-}05)$$

kde:

$\hat{y}$ = odhadovaný podiel chudého mäsa jatočne opracovaného tela vyjadrený v percentách,

S (IS-D-05) = hrúbka chrbtovej slaniny vrátane kože (v mm) nameraná v bode nachádzajúcom sa 70 mm od stredovej čiary trupu medzi druhým a tretím posledným rebrom,

M (IS-D-05) = hrúbka svaloviny nameraná v rovnakom bode merania (v mm).

Vzorec platí pre jatočne opracované telá s hmotnosťou od 60 do 120 kilogramov.

▼**M1**

ČASŤ 6

Needle IS-D-15

1. Klasifikácia jatočne opracovaných tiel ošípaných sa vykonáva pomocou metódy „Needle IS-D-15”.
2. Klasifikačný prístroj IS-D-15 je zariadením používajúcim ostrú ihlovú sondu, ktorá sa zapichne na danom mieste do trupu ošípanej, pričom hĺbka vpichu je cca. 140 mm. Za ihlou je umiestnená špeciálne skonštruovaná optická súprava, ktorá prostredníctvom optického kanálu osvetľuje okolité tkanivo alebo oblasť a sníma množstvo odrazenej svetelnej energie s určenou vlnovou dĺžkou. Uvedený terminál je vybavený precíznym zariadením na bezdotykové meranie, ktoré určuje aktuálnu hĺbku vpichu s presnosťou na 46 mikrometrov.
3. Obsah chudého mäsa jatočne opracovaného tela ošípanej sa vypočíta na základe tohto vzorca:

$$\hat{y} = 60{,}92452 - 0{,}77248\ S\ (IS\text{-}D\text{-}15) + 0{,}11329\ M\ (IS\text{-}D\text{-}15)$$

kde:

$\hat{y}$ = odhadovaný podiel chudého mäsa jatočne opracovaného tela vyjadrený v percentách,

S (IS-D-15) = hrúbka chrbtovej slaniny vrátane kože (v mm) nameraná v bode nachádzajúcom sa 70 m od stredovej čiary trupu medzi druhým a tretím posledným rebrom,

M (IS-D-15) = hrúbka svaloviny nameraná v rovnakom bode merania (v mm).

Vzorec platí pre jatočné telá s hmotnosťou od 60 do 120 kilogramov.