Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►**B**

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. decembra 2004

o odobritvi metod razvrščanja prašičjih trupov v Češki republiki

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 5266)

(Besedilo v češkem jeziku je edino verodostojno)

(2005/1/ES)

(EGT L 1, 4.1.2005, s. 8)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►**M1**	Odločba Komisije 2006/383/ES, z dne 22. maja 2006	L 148	50	2.6.2006

▼B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. decembra 2004

o odobritvi metod razvrščanja prašičjih trupov v Češki republiki

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 5266)

(Besedilo v češkem jeziku je edino verodostojno)

(2005/1/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3220/84 z dne 13. novembra 1984, ki določa lestvico Skupnosti za razvrščanje prašičjih trupov ([1]) in zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 2(3) Uredbe (EGS) št. 3220/84 določa, da se razvrščanje prašičjih trupov določi z oceno deleža pustega mesa s statistično preizkušenimi metodami ocenjevanja na podlagi fizičnih meritev enega ali več anatomskih delov prašičjega trupa; odobritev metod za razvrščanje je odvisna od skladnosti metod z največjim odstopanjem statistične napake ocenjevanja; to odstopanje je bilo določeno v členu 3 Uredbe Komisije (EGS) št. 2967/85 z dne 24. oktobra 1985 o podrobnih pravilih za uporabo lestvice Skupnosti za razvrščanje prašičjih trupov ([2]).

(2) Vlada Češke republike je zaprosila Komisijo za odobritev štirih metod razvrščanja prašičjih trupov in je predložila rezultate svojih preizkusov z raztelešenjem, ki so bili izvršeni pred dnem pristopa, s predstavitvijo drugega dela protokola, določenega v členu 3 Uredbe (EGS) št. 2967/85.

(3) Vrednotenje te prošnje je pokazalo, da so pogoji za odobritev teh metod razvrščanja izpolnjeni.

(4) Nobene nove naprave ali metode razvrščanja ni mogoče odobriti drugače kot z novo Odločbo Komisije, sprejeto na podlagi pridobljenih izkušenj; iz tega razloga je lahko ta odobritev preklicana.

(5) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za prašičje meso –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Na podlagi Uredbe (EGS) št. 3220/84 se v Češki republiki odobri uporaba naslednjih metod razvrščanja prašičjih trupov:

— metoda razvrščanja, imenovana „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)", in z njo povezane metode ocenjevanja, podrobneje opredeljene v delu 1 Priloge,

— naprava, imenovana „Fat-O-Meater (FOM)", in z njo povezane metode ocenjevanja, podrobneje opredeljene v delu 2 Priloge,

— naprava, imenovana „Hennessy Grading Probe (HGP 4)", in z njo povezane metode ocenjevanja, podrobneje opredeljene v delu 3 Priloge,

— naprava, imenovana „Ultra FOM 300", in z njo povezane metode ocenjevanja, podrobneje opredeljene v delu 4 Priloge,

([1]) UL L 301, 20.11.1984, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3513/93 (UL L 320, 22.12.1993, str. 5).

([2]) UL L 285, 25.10.1985, str. 39. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3127/94 (UL L 330, 21.12.1994, str. 43).

▼M1

— naprava, imenovana „Ultra-sound IS-D-05”, in z njo povezane metode ocenjevanja, ki so podrobno opredeljene v delu 5 Priloge,

— naprava, imenovana „Needle IS-D-15”, in z njo povezane metode ocenjevanja, ki so podrobno opredeljene v delu 6 Priloge.

Metoda razvrščanja „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)” se sme uporabljati le v klavnicah, ki v letnem povprečju ne presegajo zakola 200 prašičev tedensko.

▼B

Glede naprave „Ultra FOM 300” se določi, da mora biti po opravljenem postopku merjenja na trupu možno preveriti, ali je naprava izmerila vrednosti meritve P_2 na mestu, določenem v Prilogi, delu 4, točki 3. Ustrezno označitev mesta merjenja je treba opraviti sočasno s postopkom merjenja.

Člen 2

Spremembe naprav ali metod ocenjevanja niso dovoljene.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Češko republiko.

▼B

PRILOGA

Metode razvrščanja prašičjih trupov v Češki republiki

DEL 1

Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)

1. Razvrščanje prašičjih trupov se opravi z uporabo metode, imenovane „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)".
2. Mesnatost se izračuna po naslednjem obrazcu:

$$\acute{y} = 49{,}62542 - 0{,}63371\ S\ (ZP) + 0{,}23525\ M\ (ZP)$$

pri čemer je:

ý = ocenjeni odstotek mesnatosti trupa,

S (ZP) = debelina maščobnega tkiva (vključno s kožo), merjena z logaritmičnim računalom na točki, kjer je musculus gluteus medius (m. g.m.) najbolj izbočen (mm),

M (ZP) = debelina mišice, merjena z logaritmičnim računalom na najkrajši povezavi med lobanjskim zaključkom m.g.m. in hrbtnim robom vretenčnega kanala.

Obrazec velja za trupe, katerih teža se giblje med 60 in 120 kilogrami.

DEL 2

Fat-O-Meater (FOM)

1. Razvrščanje prašičjih trupov se opravi z napravo, imenovano „Fat-O-Meater (FOM)".
2. Naprava mora biti opremljena s sondo premera šestih milimetrov, ki vsebuje fotodiodo tipa Siemens SFH 950/960, ki deluje na razdalji med 3 in 103 milimetri. Rezultati meritev se z računalnikom pretvorijo v ocenjeno mesnatost.
3. Mesnatost trupa se izračuna po naslednjem obrazcu:

$$\acute{y} = 59{,}86131 - 0{,}72930\ S\ (FOM) + 0{,}12853\ M\ (FOM)$$

pri čemer je:

ý = ocenjeni odstotek mesnatosti trupa,

S (FOM) = debelina maščobnega tkiva na zadnjem delu (vključno s kožo) v milimetrih, merjena 6,5 centimetra od sredine trupa, med drugim in tretjim rebrom od zadaj,

M (FOM) = debelina mišice v milimetrih, merjena hkrati in na istem mestu kot S (FOM).

Obrazec velja za trupe, katerih teža se giblje med 60 in 120 kilogrami.

DEL 3

Hennessy Grading Probe (HGP 4)

1. Razvrščanje prašičjih trupov se opravi z napravo, imenovano „Hennessy Grading Probe (HGP 4)".
2. Naprava mora biti opremljena s sondo premera 5,95 milimetra (in s 6,3 milimetra na rezilu na vrhu sonde), ki vsebuje fotodiodo (Siemens LED tipa LYU 260-EO) in fotodetektor tipa 58 MR, ki deluje na razdalji med 0 in 120 milimetri. Rezultati meritev se pretvorijo v ocenjeno mesnatost s samim HGP 4 ali z njim povezanim računalnikom.
3. Mesnatost trupa se izračuna po naslednjem obrazcu:

$$\acute{y} = 61{,}34154 - 0{,}81609\ S\ (HGP) + 0{,}12901\ M\ (HGP)$$

pri čemer je:

ý = ocenjeni odstotek mesnatosti trupa,

S (HGP) = debelina maščobnega tkiva na zadnjem delu (vključno s kožo) v milimetrih, merjena 7,5 centimetra od sredine trupa, med drugim in tretjim rebrom od zadaj,

▼B

M (HGP) = debelina mišice v milimetrih, merjena hkrati in na istem mestu kot S (HGP).

Obrazec velja za trupe, katerih teža se giblje med 60 in 120 kilogrami.

DEL 4

Ultra-FOM 300

1. Razvrščanje prašičjih trupov se opravi z napravo, imenovano „Ultra-FOM 300".
2. Naprava mora biti opremljena s 3,5 MHz nadzvočno sondo. Nadzvočni signal se digitalizira, shrani in obdela z mikroprocesorjem.

   Rezultati meritev se pretvorijo v ocenjeno mesnatost s samo napravo Ultra-FOM.
3. Mesnatost trupa se izračuna po naslednjem obrazcu:

$$\acute{y} = 64{,}64865 - 0{,}76656\ S\ (UFOM) + 0{,}06425\ M\ (UFOM)$$

pri čemer je:

ý = ocenjeni odstotek mesnatosti trupa,

S (UFOM) = debelina maščobnega tkiva na zadnjem delu (vključno s kožo) v milimetrih, merjena 7 centimetrov od sredine trupa, med drugim in tretjim rebrom od zadaj (meritve, imenovane „P_2"),

M (UFOM) = debelina mišice v milimetrih, merjena hkrati in na istem mestu kot S (UFOM).

Obrazec velja za trupe, katerih teža se giblje med 60 in 120 kilogrami.

▼M1

DEL 5

Ultra-sound IS-D-05

1. Razvrščanje prašičjih trupov se opravi z metodo, imenovano „Ultra-sound IS-D-05".
2. Naprava za razvrščanje IS-D-05 je pripomoček za merjenje mesnatosti in debeline slanine z analizo razpona odmeva ultrazvočnih impulzov, ki se v zaporedju oddajajo v trup na posebnem mestu. Ultrazvočna sonda preišče obdelane trupe z nizem 3 x 100 ultrazvočnih impulzov s frekvenco 4 MHz med preiskavo.
3. Delež mesnatosti trupa se izračuna po naslednji enačbi:

$$\hat{y} = 60{,}69798 - 0{,}89211\ S\ (IS\text{-}D\text{-}05) + 0{,}10560\ M\ (IS\text{-}D\text{-}05)$$

pri čemer:

$\hat{y}$ = predvideni odstotek mesnatosti trupa,

S (IS-D-05) = debelina hrbtne slanine, vključno s kožo, v milimetrih na točki merjenja 70 mm od vzdolžne osi trupa med zadnjim drugim in tretjim rebrom,

M (IS-D-05) = debelina mišice na točki merjenja v milimetrih.

Enačba velja za trupe, ki tehtajo med 60 in 120 kilogrami.

DEL 6

Needle IS-D-15

1. Razvrščanje prašičjih trupov se opravi z metodo, imenovano „Needle IS-D-15".
2. Naprava za razvrščanje IS-D-15 je pripomoček z ostro iglasto sondo, ki se vstavi v posebno točko trupa; globina vboda je približno 140 mm. Za iglo je nameščena posebna optična priprava, ki z optičnim kanalom osvetli okolno tkivo ali področje in odčita količino odbite svetlobe z določeno valovno dolžino. Terminal je opremljen tudi z natančnim nestičnim merilnim pripomočkom, ki določa trenutno globino vboda z natančnostjo 46 mikrometrov.
3. Delež mesnatosti trupa se izračuna po naslednji enačbi:

$$\hat{y} = 60{,}92452 - 0{,}77248\ S\ (IS\text{-}D\text{-}15) + 0{,}11329\ M\ (IS\text{-}D\text{-}15)$$

pri čemer:

▼**M1**

$\hat{y}$ = predvideni odstotek mesnatosti trupa,

S (IS-D-15) = debelina hrbtne slanine, vključno s kožo, v milimetrih na točki merjenja 70 mm od vzdolžne osi trupa med zadnjim drugim in tretjim rebrom,

M (IS-D-15) = debelina mišice na točki merjenja v milimetrih.

Enačba velja za trupe, ki tehtajo med 60 in 120 kilogrami.