Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2026/2201

5.10.2026

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2026/2201 VAN DE COMMISSIE

van 2 oktober 2026

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1763 wat betreft een administratieve wijziging in de toelating van de Unie voor de biocidefamilie "Lactic acid Family — Quatchem"

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden ([1]), en met name artikel 50, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1763 van de Commissie ([2]) is op 12 september 2023 een toelating van de Unie met toelatingsnummer EU-0030143-0000 verleend aan Arrow Regulatory (Ireland) Limited voor het op de markt aanbieden en het gebruik van de biocidefamilie "Lactic acid Family — Quatchem".

(2) Op 22 juli 2024 is Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1763 bij Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1990 van de Commissie ([3]) gewijzigd om de naam van de oorspronkelijke houder van de toelating "Arrow Regulatory (Ireland) Limited" te vervangen door de naam van een nieuwe houder van de toelating, namelijk "Neogen Italia S.r.l.".

(3) Op 21 oktober 2025 heeft Neogen Italia S.r.l. overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie ([4]) een kennisgeving ingediend bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen ("het Agentschap") met betrekking tot een administratieve wijziging in de toelating van de Unie voor de biocidefamilie "Lactic acid Family — Quatchem", zoals bedoeld in titel 1, afdeling 1, van de bijlage bij die verordening.

(4) Neogen Italia S.r.l. heeft voorgesteld de toelating over te dragen aan een nieuwe houder die in de Europese Economische Ruimte is gevestigd, zoals bepaald in titel 1, afdeling 1, punt 3, van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013. De kennisgeving is onder zaaknummer BC-NG111282-55 opgenomen in het biocidenregister.

(5) Op 11 november 2025 heeft het Agentschap, in overeenstemming met artikel 11, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013, bij de Commissie een advies ([5]) over de voorgestelde wijziging ingediend. In dat advies wordt geconcludeerd dat de door de houder van de toelating gevraagde wijziging van de bestaande toelating onder artikel 3, lid 1, punt aa), van Verordening (EU) nr. 528/2012 valt, dat de partijen hebben ingestemd met de overdracht van de toelating, dat de potentiële toekomstige houder van de toelating in de Unie is gevestigd en dat na de doorvoering van de wijzigingen nog steeds aan de voorwaarden van artikel 19 van Verordening (EU) nr. 528/2012 wordt voldaan.

([1]) PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1763 van de Commissie van 12 september 2023 tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie "Lactic acid Family — Quatchem" overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 225 van 13.9.2023, blz. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1763/oj).

([3]) Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1990 van de Commissie van 22 juli 2024 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1763 wat betreft een administratieve wijziging in de toelating van de Unie voor de biocidefamilie Lactic acid Family — Quatchem (PB L, 2024/1990, 23.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1990/oj).

([4]) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie van 18 april 2013 betreffende wijzigingen in overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad toegelaten biociden (PB L 109 van 19.4.2013, blz. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

([5]) Advies van het ECHA over een administratieve wijziging van de toelating van de Unie voor "Lactic acid Family — QuatChem" van 11 november 2025, Advies nr. UTR-C-1870223-88-00/F, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(6) Op 11 november 2025 heeft het Agentschap overeenkomstig artikel 11, lid 6, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 de herziene samenvatting van de productkenmerken van de biocidefamilie "Lactic acid Family — Quatchem" in alle officiële talen van de Unie aan de Commissie doen toekomen.

(7) De Commissie is het eens met het advies van het Agentschap en acht het daarom passend de toelating van de Unie voor de biocidefamilie "Lactic acid Family — Quatchem" te wijzigen.

(8) Om de duidelijkheid te vergroten en de toegang van gebruikers en belanghebbenden tot de definitieve geconsolideerde versie van de door het Agentschap te publiceren samenvatting van de productkenmerken van het biocide te vergemakkelijken, moet de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1763 in haar geheel worden vervangen.

(9) Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1763 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1763 wordt als volgt gewijzigd:

1) in artikel 1, eerste alinea, wordt de naam "Neogen Italia S.r.l." vervangen door de naam "Hypred SAS";

2) de bijlage wordt vervangen door de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 oktober 2026.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEFAMILIE

Lactic acid Family — Quatchem

Productsoort(en)

PT03: Dierhygiëne

Toelatingsnummer EU-0030143-0000

Toelatingsnummer in R4BP EU-0030143-0000

DEEL I

EERSTE INFORMATIENIVEAU

1. **ADMINISTRATIEVE INFORMATIE**

1.1. **Familienaam**

Naam	Lactic acid Family - Quatchem

1.2. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT03: Dierhygiëne

1.3. **Toelatingshouder**

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	HYPRED SAS
	Adres	55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD Frankrijk
Toelatingsnummer		EU-0030143-0000
Toelatingsnummer in R4BP		EU-0030143-0000
Toelatingsdatum		3.10.2023
Vervaldatum		30.9.2033

1.4. **Fabrikant(en) van het product**

Naam van de fabrikant	Quat-Chem Ltd. A Neogen Company
Adres van de fabrikant	1-4 Sandfield Industrial Park, Dodgson Street, Rochdale OL16 5SJ Lancashire Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Productielocaties	Quat-Chem Ltd. A Neogen Company site 1 1-4 Sandfield Industrial Park, Dodgson Street, Rochdale OL16 5SJ Lancashire Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

1.5. **Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)**

Werkzame stof	L-(+)-melkzuur
Naam van de fabrikant	Purac Biochem bv
Adres van de fabrikant	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Nederland
Productielocaties	Purac Biochem bv site 1 Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Nederland

Werkzame stof	L-(+)-melkzuur
Naam van de fabrikant	Jungbunzlauer S. A
Adres van de fabrikant	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 FR-67390 Marckolsheim Frankrijk
Productielocaties	Jungbunzlauer S. A site 1 Z.I. et Portuaire, B.P. 32 FR-67390 Marckolsheim Frankrijk

2. **SAMENSTELLING EN FORMULERING VAN DE BIOCIDEFAMILIE**

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	4 - 4 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering**

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen

DEEL II

TWEEDE INFORMATIENIVEAU — META-SPC('S)

1. **META-SPC 1 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE**

1.1. **Meta-SPC 1 identificatiecode**

Identificatiecode	Meta SPC: meta SPC 1

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-1

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT03: Dierhygiëne

2. **SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 1**

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 1**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	4 - 4 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 1**

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen

3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 1**

Gevarenaanduidingen	H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsaanbevelingen	P280: Draag Beschermende handschoenen. P280: Draag Oogbescherming. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een een arts. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501: Inhoud afvoeren een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval afvoeren, overeenkomstig met nationale regelgeving.. P501: verpakking afvoeren afvoeren een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig met nationale regelgeving..

4. **TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC**

4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1

Gebruik # 1.1 – Speendesinfectie na het melken – handmatig dippen

Productsoort	PT03: Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Speendesinfectie na het melken door handmatig dippen met behulp van een dipbeker
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatig dippen met behulp van een dipbeker Gedetailleerde beschrijving: Contacttijd voor dippen bij 30 °C onder vuile omstandigheden: - 5 minuten voor bacteriën en gisten.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 5 tot 10 ml per speen Gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Tot 2 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Container van 1 000 liter van hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) met HDPE-sluiting; Plastic vat van 200 liter met HDPE-sluiting; HDPE-vaatje van 25 liter met HDPE-schroefdop DIN 61 of gelijkwaardig; HDPE-vaatje van 5 liter met HDPE-schroefdop DIN 51 of gelijkwaardig.

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

Product dient na het melken toegepast te worden met behulp van een dipbeker.

Reinig de speen vooraf met een droog doekje, schenk het product in het reservoir van de dipbeker. Bij gebruik van een dipbeker wordt de beker om de beurt op elke speen toegepast en drukt de gebruiker het product uit het reservoir de beker in. De beker heeft een terugslagklep, zodat eventueel resterend product niet terug het reservoir in kan.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2

Gebruik # 1.2 – Speendesinfectie na het melken - handmatig spuiten

Productsoort	PT03: Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Speendesinfectie na het melken met gebruik van handspuit
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatig spuiten met gebruik van handspuit Gedetailleerde beschrijving: Contacttijd voor spuiten bij 30 °C onder vuile omstandigheden: - 5 minuten voor bacteriën en gisten.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 5 tot 10 ml per speen Gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Tot 2 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Container van 1 000 liter van hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) met HDPE-sluiting; Plastic vat van 200 liter met HDPE-sluiting; HDPE-vaatje van 25 liter met HDPE-schroefdop DIN 61 of gelijkwaardig; HDPE-vaatje van 5 liter met HDPE-schroefdop DIN 51 of gelijkwaardig.

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

Product dient na het melken toegepast te worden met behulp van een handspuit.

Reinig de speen vooraf met een droog doekje, schenk het product in het reservoir van de spuit. De gebruiker spuit elk dier één keer na het melken.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

Professionele gebruikers moeten zorgen dat er geen professionele omstanders in het behandelingsgebied aanwezig zijn tijdens het desinfectieproces door spuiten. Als het nodig is dat er professionele omstanders aanwezig zijn, moeten professionele gebruikers zorgen dat die omstanders hetzelfde type persoonlijke beschermingsmiddelen dragen als de gebruiker.

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 1**

5.1. **Gebruiksinstructies**

Lees de gebruik-specifieke instructies voor de gebruiken van meta-SPC 1.

Altijd het etiket of de folder lezen voor gebruik.

Het product voor gebruik op kamertemperatuur brengen. De hoeveelheid product die per speen wordt toegepast, hangt af van het te behandelen dier. Voor grote zoogdieren (koeien, kamelen) tot 10 ml per speen en voor kleine zoogdieren (schapen, geiten) tot 5 ml per speen. Zorg dat de spenen volledig met desinfecteermiddel bedekt zijn. Om voor voldoende contacttijd te zorgen dient erop te worden gelet dat het product niet na het aanbrengen ervan kan worden verwijderd (bv. door er voor te zorgen dat de dieren gedurende ten minste 5 minuten in een staande positie blijven).

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Het is verplicht om tijdens het hanteren van het product oogbescherming conform Europese norm EN ISO 16321 of gelijkwaardig te gebruiken.

Vermijd overbrengen van hand naar oog.

Draag tijdens het hanteren van het product beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen (nitril-handschoenen – ingedeeld volgens Europese normen EN ISO 374 of EN 455 of gelijkwaardig).

De volledige titels van de hier aangegeven Europese normen zijn beschikbaar in rubriek 6.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

BIJ CONTACT MET DE HUID: Onmiddellijk wassen met veel water. Alle verontreinigde kleding daarna uittrekken en wassen alvorens ze opnieuw te gebruiken. De huid gedurende 15 minuten blijven wassen met water. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk spoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Gedurende minstens 15 minuten blijven spoelen. 112/ambulance bellen voor medische hulp.

NA INADEMING: In de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Indien er symptomen zijn: 112/ambulance bellen voor medische hulp. Indien er geen symptomen zijn: Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NL) of Antigifcentrum (BE).

NA INSLIKKEN: Onmiddellijk de mond spoelen. Iets te drinken geven indien blootgestelde persoon kan slikken. GEEN braken opwekken. 112/ambulance bellen voor medische hulp.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Residuen in bijvoorbeeld dipbekers en spuitflacons mogen, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling (IBA).

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Buiten het bereik van kinderen houden.

In de goed afgesloten oorspronkelijke verpakking bewaren.

Bewaren tussen 0 °C en + 30 °C.

Houdbaarheid: 24 maanden

6. **OVERIGE INFORMATIE**

De volledige titels van de in rubriek 5.2 'Risicobeperkende maatregelen' genoemde Europese normen zijn:

EN ISO 16321 – Oog- en gezichtsbescherming voor beroepsmatig gebruik

EN ISO 374 – Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemische stoffen en micro-organismen

EN 455 - Medische handschoenen voor eenmalig gebruik

7. **DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 1**

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)	Synodex	Marktgebied EU
	Lactopost	Marktgebied EU
	Lactopost Y	Marktgebied EU
	Lactopost Plus	Marktgebied EU
	Lactopost Extra	Marktgebied EU
	Synodex Y	Marktgebied EU
	Synodex Extra	Marktgebied EU
	Synodex Plus	Marktgebied EU
	Udder X	Marktgebied EU
	Teat Care	Marktgebied EU
	Lacto Gold	Marktgebied EU
	Lacto Extra	Marktgebied EU
	Lactogold	Marktgebied EU
	Lacto Spray	Marktgebied EU
Toelatingsnummer	EU-0030143-0001 1-1	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	4 % (m/m)

7.2. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)	Laxsan	Marktgebied EU
	Hexsan	Marktgebied EU
	Lactopost R	Marktgebied EU
	Laxsan R	Marktgebied EU
	Hexfoam	Marktgebied EU
	Deosan LA1	Marktgebied EU
	Hexsan Extra	Marktgebied EU
	Hexsan Plus	Marktgebied EU
	Laxsan Plus	Marktgebied EU
	Laxsan Extra	Marktgebied EU
	Hexsan R	Marktgebied EU
	LA1	Marktgebied EU
	Condition Pink	Marktgebied EU
Toelatingsnummer	EU-0030143-0002 1-1	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	4 % (m/m)

1. **META-SPC 2 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE**

1.1. **Meta-SPC 2 identificatiecode**

Identificatiecode	Meta SPC: meta SPC 2

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-2

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT03: Dierhygiëne

2. **SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 2**

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 2**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	4 - 4 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 2**

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen

3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 2**

Gevarenaanduidingen	H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. EUH208: Bevat pepermuntolie. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	P280: Draag Beschermende handschoenen. P280: Draag Oogbescherming. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een een arts. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501: Inhoud afvoeren een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval afvoeren, overeenkomstig met nationale regelgeving.. P501: verpakking afvoeren afvoeren een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig met nationale regelgeving..

4. **TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC**

4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1

Gebruik # 3.1 – Speendesinfectie na het melken – handmatig dippen

Productsoort	PT03: Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Speendesinfectie na het melken door handmatig dippen met behulp van een dipbeker
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatig dippen met behulp van een dipbeker Gedetailleerde beschrijving: Contacttijd voor onderdompelen bij 30 °C onder vuile omstandigheden: - 5 minuten voor bacteriën en gisten.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 5 tot 10 ml per speen Gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Tot 2 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Container van 1 000 liter van hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) met HDPE-sluiting; Plastic vat van 200 liter met HDPE-sluiting; HDPE-vaatje van 25 liter met HDPE-schroefdop DIN 61 of gelijkwaardig; HDPE-vaatje van 5 liter met HDPE-schroefdop DIN 51 of gelijkwaardig.

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

Product dient na het melken toegepast te worden met behulp van een dipbeker.

Reinig de speen vooraf met een droog doekje, schenk het product in het reservoir van de dipbeker. Bij gebruik van een dipbeker wordt de beker om de beurt op elke speen toegepast en drukt de gebruiker het product uit het reservoir de beker in. De beker heeft een terugslagklep, zodat eventueel resterend product niet terug het reservoir in kan.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2

Gebruik # 3.2 – Speendesinfectie na het melken - handmatig spuiten

Productsoort	PT03: Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Speendesinfectie na het melken met gebruik van handspuit
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatig spuiten met gebruik van handspuit Gedetailleerde beschrijving: Contacttijd voor spuiten bij 30 °C onder vuile omstandigheden: - 5 minuten voor bacteriën en gisten.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 5 tot 10 ml per speen Gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Tot 2 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Container van 1 000 liter van hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) met HDPE-sluiting; plastic vat van 200 liter met HDPE-sluiting; HDPE-vaatje van 25 liter met HDPE-schroefdop DIN 61 of gelijkwaardig; HDPE-vaatje van 5 liter met HDPE-schroefdop DIN 51 of gelijkwaardig.

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

Product dient na het melken toegepast te worden met behulp van een handspuit.

Reinig de speen vooraf met een droog doekje, schenk het product in het reservoir van de spuit. De gebruiker spuit elk dier één keer na het melken.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

Professionele gebruikers moeten zorgen dat er geen professionele omstanders in het behandelingsgebied aanwezig zijn tijdens het desinfectieproces door spuiten. Als het nodig is dat er professionele omstanders aanwezig zijn, moeten professionele gebruikers zorgen dat die omstanders hetzelfde type persoonlijke beschermingsmiddelen dragen als de gebruikers.

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 2**

5.1. **Gebruiksinstructies**

Zie gebruiksspecifieke instructie voor het gebruik van meta-SPC 2.

Altijd het etiket of de folder lezen voor gebruik.

Het product voor gebruik op kamertemperatuur brengen. De hoeveelheid product die per speen wordt toegepast, hangt af van het te behandelen dier. Voor grote zoogdieren (koeien, kamelen) tot 10 ml per speen en voor kleine zoogdieren (schapen, geiten) tot 5 ml per speen. Zorg dat de spenen volledig met desinfecteermiddel bedekt zijn. Om voor voldoende contacttijd te zorgen dient erop te worden gelet dat het product niet na het aanbrengen ervan kan worden verwijderd (bv. door er voor te zorgen dat de dieren gedurende ten minste 5 minuten in een staande positie blijven).

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Het is verplicht om tijdens het hanteren van het product oogbescherming conform Europese norm EN ISO 16321 of gelijkwaardig te gebruiken.

Vermijd overbrengen van hand naar oog.

Draag tijdens het hanteren van het product beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen (nitril-handschoenen – ingedeeld volgens Europese normen EN ISO 374 of EN 455 of gelijkwaardig).

De volledige titels van de hier aangegeven Europese normen zijn beschikbaar in rubriek 6.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

BIJ CONTACT MET DE HUID: Onmiddellijk wassen met veel water. Alle verontreinigde kleding daarna uittrekken en wassen alvorens ze opnieuw te gebruiken. De huid gedurende 15 minuten blijven wassen met water. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk spoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Gedurende minstens 15 minuten blijven spoelen. 112/ambulance bellen voor medische hulp.

NA INADEMING: In de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Indien er symptomen zijn: 112/ambulance bellen voor medische hulp. Indien er geen symptomen zijn: Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NL) of Antigifcentrum (BE).

NA INSLIKKEN: Onmiddellijk de mond spoelen. Iets te drinken geven indien blootgestelde persoon kan slikken. GEEN braken opwekken. 112/ambulance bellen voor medische hulp.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Residuen in bijvoorbeeld dipbekers en spuitflacons mogen, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling (IBA).

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Buiten het bereik van kinderen houden.

In de goed afgesloten oorspronkelijke verpakking bewaren.

Bewaren tussen 0 °C en + 30 °C.

Houdbaarheid: 24 maanden

6. **OVERIGE INFORMATIE**

De volledige titels van de in rubriek 5.2 genoemde EN-normen zijn als volgt:

EN ISO 16321 - Oog- en gezichtsbescherming voor beroepsmatig gebruik

EN ISO 374 – Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemische stoffen en micro-organismen

EN 455 - Medische handschoenen voor eenmalig gebruik

7. **DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 2**

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)	Synoshield	Marktgebied EU
	Lactopost G	Marktgebied EU
	Synoshield P	Marktgebied EU
	Lactopost P	Marktgebied EU
	Synoshield G	Marktgebied EU
	Lactoshield	Marktgebied EU
	Lactoshield Plus	Marktgebied EU
	Lactoshield Extra	Marktgebied EU
	Synoshield Extra	Marktgebied EU
	Synoshield Plus	Marktgebied EU
	Lactopost Protect	Marktgebied EU
	Udder Shield	Marktgebied EU
	Teat Care	Marktgebied EU
	Mint Lacto Plus	Marktgebied EU
	Lacto Care G	Marktgebied EU
	Lactosal	Marktgebied EU
	Lacto Care P	Marktgebied EU
	Previoshield	Marktgebied EU
Toelatingsnummer	EU-0030143-0003 1-2	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		Werkzame stof	79-33-4	201-196-2	4 % (m/m)