Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►**B**

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. decembra 2004,

ktorým sa schvaľujú metódy klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných v Českej republike

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5266)

(Iba český text je autentický)

(2005/1/ES)

(Ú. v. EÚ L 1, 4.1.2005, s. 8)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►**M1**	Rozhodnutie Komisie 2006/383/ES z 22. mája 2006	L 148	50	2.6.2006
►**M2**	Rozhodnutie Komisie 2010/793/EÚ z 20. decembra 2010	L 336	62	21.12.2010
►**M3**	Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/187/EÚ z 18. apríla 2013	L 111	103	23.4.2013

▼B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. decembra 2004,

ktorým sa schvaľujú metódy klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných v Českej republike

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5266)

(Iba český text je autentický)

(2005/1/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3220/84 z 13. novembra 1984, ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu trupov z ošípaných ([1]), a najmä na jeho článok 5 ods. 2,

keďže:

(1) Článok 2 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3220/84 stanovuje, že klasifikácia jatočne opracovaných tiel ošípaných sa musí stanoviť na základe odhadu obsahu chudého mäsa v súlade so štatisticky osvedčenými metódami posudzovania, ktoré sú založené na fyzickom meraní jednej alebo viacerých anatomických častí trupu ošípanej. Schválenie klasifikačných metód podlieha dodržaniu maximálnej tolerancie štatistickej chyby v posudzovaní. Táto tolerancia bola stanovená v článku 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 2967/85 z 24. októbra 1985, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupnice Spoločenstva na klasifikáciu jatočne opracovaných tiel ošípaných ([2]).

(2) Vláda Českej republiky požiadala Komisiu, aby schválila štyri metódy klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných a predložila výsledky disekčných skúšok, ktoré sa uskutočnili pred dňom pristúpenia formou predloženia časti dva protokolu ustanoveného v článku 3 nariadenia (EHS) č. 2967/85.

(3) Prehodnotenie tejto žiadosti ukázalo, že podmienky na schválenie týchto klasifikačných metód sú splnené.

(4) Neschvaľujú sa žiadne úpravy prístrojov ani metód okrem tých, ktoré budú stanovené v novom rozhodnutí Komisie, prijatom na základe nadobudnutých skúseností, ktorým sa zároveň môže zrušiť súčasné schválenie.

(5) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre bravčové mäso,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v Českej republike podľa nariadenia (EHS) č. 3220/84 schvaľujú nasledujúce metódy klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných:

— klasifikačná metóda známa pod názvom „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)“ a s ňou súvisiace metódy posudzovania, podrobne opísané v časti 1 prílohy,

([1]) Ú. v. ES L 301, 20.11.1984, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3513/93 (Ú. v. ES L 320, 22.12.1993, s. 5).

([2]) Ú. v. ES L 285, 25.10.1985, s. 39. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3127/94 (Ú. v. ES L 330, 21.12.1994, s. 43).

▼B

— klasifikačná metóda známa pod názvom „Fat-O-Meater (FOM)“ a s ňou súvisiace metódy posudzovania, podrobne opísané v časti 2 prílohy,

— klasifikačná metóda známa pod názvom „Hennessy Grading Probe (HGP 4)“ a s ňou súvisiace metódy posudzovania, podrobne opísané v časti 3 prílohy,

— klasifikačná metóda známa pod názvom „Ultra FOM 300“ a s ňou súvisiace metódy posudzovania, podrobne opísané v časti 4 prílohy,

▼M1

— prístroj známy pod názvom „Ultra-sound IS-D-05“ a s ním súvisiace metódy posudzovania, podrobne opísané v časti 5 prílohy,

— prístroj známy pod názvom „Needle IS-D-15“ a s ním súvisiace metódy posudzovania, podrobne opísané v časti 6 prílohy.

Klasifikačná metóda „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)“ sa môže uplatňovať len na bitúnkoch, v ktorých ročný priemer počtu porazených kusov za týždeň neprekročí 200 kusov.

▼M3

Pokiaľ ide o prístroj „Ultra FOM 300“ a „Ultra-sound IS-D-05“, je stanovené, že po ukončení merania musí byť možné na trupe ošípanej skontrolovať, že prístroj meral hodnoty P_2 na strane určenej v časti 4 bode 3 a v časti 5 bode 3 prílohy. Zodpovedajúce označenie merania na príslušnej strane sa musí vykonať súčasne s meraním.

Článok 1a

Bez ohľadu na štandardnú úpravu stanovenú v prvom odseku bodu B.III prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 jatočne opracované telá ošípaných v Českej republike sa môžu upravovať:

a) bez uší, pričom sa uši odstránia skôr, ako sa jatočne opracované telo odváži a klasifikuje. V prípade takejto úpravy sa zaznamenaná hmotnosť jatočne opracovaného tela za tepla upraví podľa tohto vzorca:

hmotnosť jatočne opracovaného tela za tepla = hmotnosť jatočne opracovaného tela za tepla bez uší + 0,274 kg, a

b) bez odstránenia obličkového tuku pred vážením a klasifikáciou. V prípade takejto úpravy sa zaznamenaná hmotnosť jatočne opracovaného tela za tepla upraví podľa tohto vzorca:

hmotnosť jatočne opracovaného tela zatepla = 1,65651 + 0,96139 × hmotnosť jatočne opracovaného tela za tepla s obličkovým tukom, a

c) bez odstránenia obličkového tuku a bez uší, pričom uši sa odstránia pred vážením a klasifikáciou jatočne opracovaného tela. V prípade takejto úpravy sa zaznamenaná hmotnosť jatočne spracovaného tela za tepla upraví podľa tohto vzorca:

hmotnosť jatočne opracovaného tela za tepla = 1,65651 + 0,96139 × (hmotnosť jatočne opracovaného tela za tepla s obličkovým tukom a bez uší + 0,274 kg).

▼**M3**

Článok 2

Úpravy povoleného prístroja ani metód klasifikácie sa neumožnia, kým ich Komisia vykonávacím rozhodnutím výslovne nepovolí.

▼**B**

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Českej republike.

▼B

PRÍLOHA

Metódy klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných v Českej republike

ČASŤ 1

Metóda „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)“

1. Klasifikácia jatočne opracovaných tiel ošípaných sa vykoná pomocou metódy „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)“.

▼M3

2. Obsah chudého mäsa v jatočne opracovanom tele sa vypočíta podľa tohto vzorca:

$$\hat{Y} = 59,08991 - 0,43868 \times S + 0,09792 \times M$$

kde:

Ŷ — odhadovaný percentuálny podiel chudého mäsa v jatočne opracovanom tele,

S — údaj o tuku, meraný posuvným meradlom – minimálna hrúbka viditeľného tuku (vrátane kože) pokrývajúceho sval gluteus medius, ktorá bola nameraná na reze po stredovej čiare jatočne opracovaného tela (mm),

M — hrúbka mäsa, meraná posuvným meradlom na najkratšej spojnici medzi predným (kraniálnym) okrajom svalu gluteus medius a hornou (dorzálnou) hranou miechového kanálika (mm).

Vzorec platí pre jatočne opracované telá s hmotnosťou od 60 do 120 kg.

▼B

ČASŤ 2

Metóda „Fat-O-Meater (FOM)“

1. Klasifikácia jatočne opracovaných tiel ošípaných sa vykoná pomocou prístroja „Fat-O-Meater (FOM)“.

2. Súčasťou prístroja je sonda s priemerom 6 mm, ktorá obsahuje fotodiódu typu Siemens SFH 950/960 a jej operačná vzdialenosť je od 3 do 103 mm. Výsledky meraní sa prostredníctvom počítača prevedú do odhadnutého obsahu chudého mäsa.

▼M3

3. Obsah chudého mäsa v jatočne opracovanom tele sa vypočíta podľa tohto vzorca:

$$\hat{Y} = 70,28164 - 0,75376 \times S + 0,00270 \times M$$

kde:

Ŷ — odhadovaný percentuálny podiel chudého mäsa v jatočne opracovanom tele,

S — hrúbka chrbtovej slaniny (vrátane kože) v milimetroch, meraná 6,5 centimetra od stredovej čiary jatočne opracovaného tela medzi druhým a tretím posledným rebrom,

M — hrúbka svalu v milimetroch, pričom meranie sa vykoná v rovnakom čase a bode ako meranie S.

Vzorec platí pre jatočne opracované telá s hmotnosťou od 60 do 120 kg.

▼B

ČASŤ 3

Metóda „Hennessy Grading Probe (HGP 4)“

1. Klasifikácia jatočne opracovaných tiel ošípaných sa vykoná pomocou prístroja „Hennessy Grading Probe (HGP 4)“.

2. Súčasťou prístroja je sonda s priemerom 5,95 mm (a 6,3 mm na ostrí nachádzajúcom sa navrchu sondy), ktorá obsahuje fotodiódu (Siemens LED typu LYU 260-EO) a fotodetektor typu 58 MR a jej operačná vzdialenosť je od 0 do 120 mm. Výsledky meraní sa prevedú do odhadnutého obsahu chudého mäsa prostredníctvom samotného HGP 4 alebo pomocou počítača, ktorý je k nemu pripojený.

▼M3

3. Obsah chudého mäsa v jatočne opracovanom tele sa vypočíta podľa tohto vzorca:

$$\hat{Y} = 69,11354 - 0,67804 \times S + 0,00432 \times M$$

kde:

$\hat{Y}$ — odhadovaný percentuálny podiel chudého mäsa v jatočne opracovanom tele,

S — hrúbka chrbtovej slaniny (vrátane kože) v milimetroch, meraná 7 centimetrov od stredovej čiary jatočne opracovaného tela medzi tretím a štvrtým posledným rebrom,

M — hrúbka svalu v milimetroch, pričom meranie sa vykoná v rovnakom čase a bode ako meranie S.

Vzorec platí pre jatočne opracované telá s hmotnosťou od 60 do 120 kg.

▼B

ČASŤ 4

Metóda „ULTRA-FOM 300“

1. Klasifikácia jatočne opracovaných tiel ošípaných sa vykoná pomocou prístroja „Ultra-FOM 300“.

2. Súčasťou prístroja je nadzvuková sonda s 3,5 MHz. Nadzvukový signál sa digitalizuje, uloží a spracuje mikroprocesorom.

Výsledky meraní sa pomocou samotného prístroja Ultra-FOM prevedú do odhadovaného obsahu chudého mäsa.

▼M3

3. Obsah chudého mäsa v jatočne opracovanom tele sa vypočíta podľa tohto vzorca:

$$\hat{Y} = 66,78382 - 0,80922 \times S + 0,04746 \times M$$

kde:

$\hat{Y}$ — odhadovaný percentuálny podiel chudého mäsa v jatočne opracovanom tele,

S — hrúbka chrbtovej slaniny (vrátane kože) v milimetroch, meraná 7 centimetrov od stredovej čiary jatočne opracovaného tela medzi druhým a tretím posledným rebrom (hodnota známa ako „P_2“),

M — hrúbka svalu v milimetroch, pričom meranie sa vykoná v rovnakom čase a bode ako meranie S.

Vzorec platí pre jatočne opracované telá s hmotnosťou od 60 do 120 kg.

▼M1

ČASŤ 5

Ultra-sound IS-D-05

1. Klasifikácia jatočne opracovaných tiel ošípaných sa vykonáva pomocou metódy „Ultra-sound IS-D-05“.

2. Klasifikačný prístroj IS-D-05 je zariadením na meranie chudého mäsa a hrúbky slaniny na základe analýzy rozpätia vyslaných a prijatých ultrazvukových impulzov, ktoré sú postupne vysielané do trupu ošípanej na špecifickom mieste. Ultrazvuková sonda sníma v čase skenovania vyšetrovaný trup sériou 3 x 100 ultrazvukových impulzov frekvencie 4 MHz.

▼M3

3. Obsah chudého mäsa v jatočne opracovanom tele sa vypočíta podľa tohto vzorca:

$$\hat{Y} = 66,01987 - 0,69560 \times S + 0,01947 \times M$$

kde:

$\hat{Y}$ — odhadovaný percentuálny podiel chudého mäsa v jatočne opracovanom tele,

S — hrúbka chrbtovej slaniny (vrátane kože) v milimetroch, meraná 7 centimetrov od stredovej čiary jatočne opracovaného tela medzi druhým a tretím posledným rebrom(hodnota známa ako „P_2“),

M — hrúbka svalu v milimetroch, pričom meranie sa vykoná v rovnakom čase a na rovnakom mieste ako meranie S.

Vzorec platí pre jatočne opracované telá s hmotnosťou od 60 do 120 kg.

▼M1

ČASŤ 6

Needle IS-D-15

1. Klasifikácia jatočne opracovaných tiel ošípaných sa vykonáva pomocou metódy „Needle IS-D-15“.

2. Klasifikačný prístroj IS-D-15 je zariadením používajúcim ostrú ihlovú sondu, ktorá sa zapichne na danom mieste do trupu ošípanej, pričom hĺbka vpichu je cca. 140 mm. Za ihlou je umiestnená špeciálne skonštruovaná optická súprava, ktorá prostredníctvom optického kanálu osvetľuje okolité tkanivo alebo oblasť a sníma množstvo odrazenej svetelnej energie s určenou vlnovou dĺžkou. Uvedený terminál je vybavený precíznym zariadením na bezdotykové meranie, ktoré určuje aktuálnu hĺbku vpichu s presnosťou na 46 mikrometrov.

▼M3

3. Obsah chudého mäsa v jatočne opracovanom tele sa vypočíta podľa tohto vzorca:

$$\hat{Y} = 66,37105 - 0,80124 \times S + 0,05507 \times M$$

kde:

$\hat{Y}$ — odhadovaný percentuálny podiel chudého mäsa v jatočne opracovanom tele,

S — hrúbka chrbtovej slaniny (vrátane kože) v milimetroch, meraná 7,5 centimetra od stredovej čiary jatočne opracovaného tela medzi druhým a tretím posledným rebrom,

M — hrúbka svalu v milimetroch, pričom meranie sa vykoná v rovnakom čase a na rovnakom mieste ako meranie S.

Vzorec platí pre jatočne opracované telá s hmotnosťou od 60 do 120 kg.