Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►**B**

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. decembra 2004

o odobritvi metod razvrščanja prašičjih trupov v Češki republiki

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 5266)

(Besedilo v češkem jeziku je edino verodostojno)

(2005/1/ES)

(UL L 1, 4.1.2005, str. 8)

spremenjen z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►**M1**	Odločba Komisije 2006/383/ES z dne 22. maja 2006	L 148	50	2.6.2006
►**M2**	Sklep Komisije 2010/793/EU z dne 20. decembra 2010	L 336	62	21.12.2010
►**M3**	Izvedbeni sklep Komisije 2013/187/EU z dne 18. aprila 2013	L 111	103	23.4.2013

▼B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. decembra 2004

o odobritvi metod razvrščanja prašičjih trupov v Češki republiki

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 5266)

(Besedilo v češkem jeziku je edino verodostojno)

(2005/1/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3220/84 z dne 13. novembra 1984, ki določa lestvico Skupnosti za razvrščanje prašičjih trupov ([1]) in zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 2(3) Uredbe (EGS) št. 3220/84 določa, da se razvrščanje prašičjih trupov določi z oceno deleža pustega mesa s statistično preizkušenimi metodami ocenjevanja na podlagi fizičnih meritev enega ali več anatomskih delov prašičjega trupa; odobritev metod za razvrščanje je odvisna od skladnosti metod z največjim odstopanjem statistične napake ocenjevanja; to odstopanje je bilo določeno v členu 3 Uredbe Komisije (EGS) št. 2967/85 z dne 24. oktobra 1985 o podrobnih pravilih za uporabo lestvice Skupnosti za razvrščanje prašičjih trupov ([2]).

(2) Vlada Češke republike je zaprosila Komisijo za odobritev štirih metod razvrščanja prašičjih trupov in je predložila rezultate svojih preizkusov z raztelešenjem, ki so bili izvršeni pred dnem pristopa, s predstavitvijo drugega dela protokola, določenega v členu 3 Uredbe (EGS) št. 2967/85.

(3) Vrednotenje te prošnje je pokazalo, da so pogoji za odobritev teh metod razvrščanja izpolnjeni.

(4) Nobene nove naprave ali metode razvrščanja ni mogoče odobriti drugače kot z novo Odločbo Komisije, sprejeto na podlagi pridobljenih izkušenj; iz tega razloga je lahko ta odobritev preklicana.

(5) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za prašičje meso –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Na podlagi Uredbe (EGS) št. 3220/84 se v Češki republiki odobri uporaba naslednjih metod razvrščanja prašičjih trupov:

— metoda razvrščanja, imenovana „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)“, in z njo povezane metode ocenjevanja, podrobneje opredeljene v delu 1 Priloge,

([1]) UL L 301, 20.11.1984, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3513/93 (UL L 320, 22.12.1993, str. 5).

([2]) UL L 285, 25.10.1985, str. 39. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3127/94 (UL L 330, 21.12.1994, str. 43).

▼B

— naprava, imenovana „Fat-O-Meater (FOM)“, in z njo povezane metode ocenjevanja, podrobneje opredeljene v delu 2 Priloge,

— naprava, imenovana „Hennessy Grading Probe (HGP 4)“, in z njo povezane metode ocenjevanja, podrobneje opredeljene v delu 3 Priloge,

— naprava, imenovana „Ultra FOM 300“, in z njo povezane metode ocenjevanja, podrobneje opredeljene v delu 4 Priloge,

▼M1

— naprava, imenovana „Ultra-sound IS-D-05“, in z njo povezane metode ocenjevanja, ki so podrobno opredeljene v delu 5 Priloge,

— naprava, imenovana „Needle IS-D-15“, in z njo povezane metode ocenjevanja, ki so podrobno opredeljene v delu 6 Priloge.

Metoda razvrščanja „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)“ se sme uporabljati le v klavnicah, ki v letnem povprečju ne presegajo zakola 200 prašičev tedensko.

▼M3

Glede naprav „Ultra FOM 300“ in „Ultra-sound IS-D-05“ se določi, da mora biti po opravljenem postopku merjenja na trupu možno preveriti, ali je naprava izmerila vrednosti meritve P_2 na mestu, določenem v Prilogi, delu 4, točki 3 in delu 5, točki 3. Ustrezno označitev mesta merjenja je treba opraviti sočasno s postopkom merjenja.

Člen 1a

Ne glede na standardno predstavitev iz prvega odstavka točke B.III Priloge V k Uredbi (ES) št. 1234/2007 se prašičji trupi na Češkem lahko predstavijo:

(a) brez ušes, pri čemer so bila ušesa odstranjena pred tehtanjem in razvrščanjem. V primeru takšne predstavitve se zabeležena masa toplega trupa prilagodi v skladu z naslednjim obrazcem:

$$\text{masa toplega trupa} = \text{masa toplega trupa brez ušes} + 0,274 \text{ kg}, \text{ in}$$

(b) ne da bi bilo pred tehtanjem in razvrščanjem odstranjeno trebušno salo. V primeru takšne predstavitve se zabeležena masa toplega trupa prilagodi v skladu z naslednjim obrazcem:

$$\text{masatoplega trupa} = 1,65651 + 0,96139 \times \text{masa toplega trupa s trebušnim salom}, \text{ in}$$

(c) s trebušnim salom in brez ušes, pri čemer so bila ušesa odstranjena pred tehtanjem in razvrščanjem. V primeru takšne predstavitve se zabeležena masa toplega trupa prilagodi v skladu z naslednjim obrazcem:

$$\text{masa toplega trupa} = 1,65651 + 0,96139 \times (\text{masa toplega trupa s trebušnim salom in brez ušes} + 0,274 \text{ kg}).$$

▼**M3**

Člen 2

Spremembe odobrenih naprav ali metod razvrščanja niso dovoljene, če takšne spremembe niso izrecno odobrene z izvedbenim sklepom Komisije.

▼**B**

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Češko republiko.

▼B

PRILOGA

Metode razvrščanja prašičjih trupov v Češki republiki

DEL 1

Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)

1. Razvrščanje prašičjih trupov se opravi z uporabo metode, imenovane „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)“.

▼M3

2. Delež mesnatosti trupa se izračuna v skladu z naslednjim obrazcem:

$$\hat{Y} = 59,08991 - 0,43868 \times S + 0,09792 \times M$$

pri čemer je:

$\hat{Y}$ – ocenjeni odstotek mesnatosti trupa,

S – stopnja maščobe, merjena z logaritmičnim računalom – najmanjša debelina vidne maščobe (vključno s kožo), ki pokriva M. gluteus medius na sredini razpolovljenega trupa (mm),

M – stopnja mesnatosti, merjena z logaritmičnim računalom na najkrajši povezavi med sprednjim (kranialnim) koncem mišice M. gluteus medius in zgornjim (dorzalnim) robom hrbteničnega kanala (mm).

Ta obrazec velja za trupe, ki tehtajo med 60 in 120 kilogrami.

▼B

DEL 2

Fat-O-Meater (FOM)

1. Razvrščanje prašičjih trupov se opravi z napravo, imenovano „Fat-O-Meater (FOM)“.

2. Naprava mora biti opremljena s sondo premera šestih milimetrov, ki vsebuje fotodiodo tipa Siemens SFH 950/960, ki deluje na razdalji med 3 in 103 milimetri. Rezultati meritev se z računalnikom pretvorijo v ocenjeno mesnatost.

▼M3

3. Delež mesnatosti trupa se izračuna v skladu z naslednjim obrazcem:

$$\hat{Y} = 70,28164 - 0,75376 \times S + 0,00270 \times M$$

pri čemer je:

$\hat{Y}$ – ocenjeni odstotek mesnatosti trupa,

S – debelina hrbtne slanine (vključno s kožo) v milimetrih, merjena 6,5 centimetra od vzdolžne osi trupa med drugim in tretjim zadnjim rebrom,

M – debelina mišice v milimetrih, merjena istočasno in na istem mestu kot S.

Ta obrazec velja za trupe, ki tehtajo med 60 in 120 kilogrami.

▼B

DEL 3

Hennessy Grading Probe (HGP 4)

1. Razvrščanje prašičjih trupov se opravi z napravo, imenovano „Hennessy Grading Probe (HGP 4)“.

2. Naprava mora biti opremljena s sondo premera 5,95 milimetra (in s 6,3 milimetra na rezilu na vrhu sonde), ki vsebuje fotodiodo (Siemens LED tipa LYU 260-EO) in fotodetektor tipa 58 MR, ki deluje na razdalji med 0 in 120 milimetri. Rezultati meritev se pretvorijo v ocenjeno mesnatost s samim HGP 4 ali z njim povezanim računalnikom.

▼M3

3. Delež mesnatosti trupa se izračuna v skladu z naslednjim obrazcem:

$$\hat{Y} = 69,11354 - 0,67804 \times S + 0,00432 \times M$$

pri čemer je:

$\hat{Y}$ – ocenjeni odstotek mesnatosti trupa,

S – debelina hrbtne slanine (vključno s kožo) v milimetrih, merjena 7 cm od vzdolžne osi trupa med tretjim in četrtim zadnjim rebrom,

M – debelina mišice v milimetrih, merjena istočasno in na istem mestu kot S.

Ta obrazec velja za trupe, ki tehtajo med 60 in 120 kilogrami.

▼B

DEL 4

Ultra-FOM 300

1. Razvrščanje prašičjih trupov se opravi z napravo, imenovano „Ultra-FOM 300“.

2. Naprava mora biti opremljena s 3,5 MHz nadzvočno sondo. Nadzvočni signal se digitalizira, shrani in obdela z mikroprocesorjem.

Rezultati meritev se pretvorijo v ocenjeno mesnatost s samo napravo Ultra-FOM.

▼M3

3. Delež mesnatosti trupa se izračuna v skladu z naslednjim obrazcem:

$$\hat{Y} = 66,78382 - 0,80922 \times S + 0,04746 \times M$$

pri čemer je:

$\hat{Y}$ – ocenjeni odstotek mesnatosti trupa,

S – debelina hrbtne slanine (vključno s kožo) v milimetrih, merjena 7 cm od vzdolžne osi trupa med drugim in tretjim zadnjim rebrom (merjenje, imenovano „P_2“),

M – debelina mišice v milimetrih, merjena istočasno in na istem mestu kot S.

Ta obrazec velja za trupe, ki tehtajo med 60 in 120 kilogrami.

▼M1

DEL 5

Ultra-sound IS-D-05

1. Razvrščanje prašičjih trupov se opravi z metodo, imenovano „Ultra-sound IS-D-05“.

2. Naprava za razvrščanje IS-D-05 je pripomoček za merjenje mesnatosti in debeline slanine z analizo razpona odmeva ultrazvočnih impulzov, ki se v zaporedju oddajajo v trup na posebnem mestu. Ultrazvočna sonda preišče obdelane trupe z nizem 3 x 100 ultrazvočnih impulzov s frekvenco 4 MHz med preiskavo.

▼M3

3. Delež mesnatosti trupa se izračuna v skladu z naslednjim obrazcem:

$$\hat{Y} = 66,01987 - 0,69560 \times S + 0,01947 \times M$$

pri čemer je:

$\hat{Y}$ – ocenjeni odstotek mesnatosti trupa,

S – debelina hrbtne slanine (vključno s kožo) v milimetrih, merjena 7 cm od vzdolžne osi trupa med drugim in tretjim zadnjim rebrom (merjenje, imenovano „P_2“),

M – debelina mišice v milimetrih, merjena istočasno in na istem mestu kot S.

Ta obrazec velja za trupe, ki tehtajo med 60 in 120 kilogrami.

▼M1

DEL 6

Needle IS-D-15

1. Razvrščanje prašičjih trupov se opravi z metodo, imenovano „Needle IS-D-15“.

2. Naprava za razvrščanje IS-D-15 je pripomoček z ostro iglasto sondo, ki se vstavi v posebno točko trupa; globina vboda je približno 140 mm. Za iglo je nameščena posebna optična priprava, ki z optičnim kanalom osvetli okolno tkivo ali področje in odčita količino odbite svetlobe z določeno valovno dolžino. Terminal je opremljen tudi z natančnim nestičnim merilnim pripomočkom, ki določa trenutno globino vboda z natančnostjo 46 mikrometrov.

▼M3

3. Delež mesnatosti trupa se izračuna v skladu z naslednjim obrazcem:

$$\hat{Y} = 66,37105 - 0,80124 \times S + 0,05507 \times M$$

pri čemer je:

$\hat{Y}$ – ocenjeni odstotek mesnatosti trupa,

S – debelina hrbtne slanine (vključno s kožo) v milimetrih, merjena 7,5 cm od vzdolžne osi trupa med drugim in tretjim zadnjim rebrom,

M – debelina mišice v milimetrih, merjena istočasno in na istem mestu kot S.

Ta obrazec velja za trupe, ki tehtajo med 60 in 120 kilogrami.