31999R2690

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2690/1999 НА КОМИСИЯТА
от 17 декември 1999 година
относно разрешението на нови добавки в храните за животни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни ([1]), последно изменена с Регламент (ЕО) № 2562/1999 на Комисията ([2]), и по-специално член 3 от нея,

като има предвид, че:

(1) Директива 70/524/ЕИО предвижда възможност за разрешаване на нови добавки, като се държи сметка за развитието на научните и техническите познания.

(2) Директива 93/113/ЕО на Съвета от 14 декември 1993 г. относно използването и търговията с ензими, микроорганизми и техните препарати при храненето на животни ([3]), последно изменена с Директива 97/40/ЕО ([4]), чрез дерогация от Директива 70/524/ЕИО, упълномощава държавите-членки да разрешат временно използването и пускането в търговската мрежа на ензими, микроорганизми и техните препарати.

(3) Временно разрешение за нови добавки или за нови начини на използване на добавките може да се даде, ако на разрешеното ниво при храните за животни, те нямат вредно въздействие върху здравето на човека и животните, нито върху околната среда, ако не вредят на потребителя, променяйки характеристиките на животинския продукт, ако наличието им в храните за животни може да се контролира и ако е уместно да се предположи, предвид наличните резултати, че влияят благоприятно върху характеристиките на животинските продукти, в които са добавени, или върху животинската продукция.

(4) Директива 89/391/ЕИО на Съвета ([5]) относно прилагането на мерки за повишаване на сигурността и запазване на здравето на трудещите се по време на работа, както и нейните специални директиви, по-специално Директива 90/679/ЕИО на Съвета ([6]), последно изменена с Директива 97/65/ЕО на Комисията ([7]) относно защита на работещите срещу рисковете, свързани с излагането на биологични агенти по време на работа, изцяло се прилагат за използването и манипулирането на работещите с добавките в храните за животни.

(5) Проучването на документациите, представени от държавите-членки по смисъла на член 3 на Директива 93/113/ЕО, показва че някои препарати, попадащи в групите на ензимите и на микроорганизмите, могат временно да бъдат разрешени.

(6) Научният комитет по храненето на животните предостави благоприятно становище по отношение на безвредността на тези препарати.

(7) Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по храните за животни,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратите, попадащи в групата на ензимите, които са изброени в приложение I към настоящия регламент, се разрешават по смисъла на Директива 70/524/ЕИО като добавки към храните за животни при условията, определени от посоченото приложение.

Член 2

Препаратите, попадащи в групата на микроорганизмите, които са изброени в приложение II към настоящия регламент, се разрешават по смисъла на Директива 70/524/ЕИО като добавки към храните за животни при условията, определени от посоченото приложение.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейските общности*.

([1]) ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1.
([2]) ОВ L 310, 4.12.1999 г., стр. 11.
([3]) ОВ L 334, 31.12.1993 г., стр. 17.
([4]) ОВ L 180, 9.7.1997 г., стр. 21.
([5]) ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.
([6]) ОВ L 374, 31.12.1990 г., стр. 1.
([7]) ОВ L 335, 6.12.1997 г., стр. 17.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 1999 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ I

№	Добавка	Химически състав и описание	Жив. вид или категория животни	Макс. възраст	Мин. съдържание	Макс. съдържание	Други разпоредби	Срок на разрешението
					Единица активност на кг пълноценна храна			
43	Ендо-1,4-бета-ксиланаза ЕС 3.2.1.8 Ендо-1,3(4)-бета-глюконаза ЕС 3.2.1.6 Алфа-амилаза ЕС 3.2.1.1	Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135), от ендо-1,3(4)-бета-глюконаза, получена от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) и от алфа-амилаза, получена от *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), с минимална активност: ендо-1,4-бета-ксиланаза: 3975 U/g (1) ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 125 U/g (2) алфа-амилаза: 1000 U/g (3)	Прасета	4 месеца	ендо-1,4-бета-ксиланаза 3975 U ендо-1,3(4)-бета-глюконаза 125 U алфа-амилаза - 1000 U	— — —	1. При начина на използване на добавката и на предварителната смеска посочете температурата на съхранение, срок на годност и стабилност при гранулиране. 2. Препоръчителна доза на кг пълноценна храна: ендо-1,4-бета-ксиланаза 3975 U ендо-1,3(4)-бета-глюко-наза 125U алфа-амилаза 1000 U 3. Да се използват в смесените храни за животни,съдържащи зър- нени култури, богати на скорбелни полизахариди (главно арабиноксилани и бета-глюкани), например съдържащи над 30 % пшеница, 20 % ечемик и 20 % царевица.	30.9.2000 г.
44	Ендо-1,3(4)-бета-глюконаза ЕС 3.2.1.6 Ендо-1,4-бета-ксиланаза ЕС 3.2.1.8 Алфа-амилаза ЕС 3.2.1.1	Препарат от ендо-1,3(4)-бета-, глюконаза, получена от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) от ендо-1,4-бета-, ксиланаза, получена от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) и от алфа-амилаза, получена от *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), с минимална активност: ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 250 U/g (2) ендо-1,4-бета-ксиланаза: 400 U/g (1) алфа-амилаза: 1000 U/g (3)	Прасета	4 месеца	ендо-1,3(4)-бета-глюконаза 250 U ендо-1,4-бета-ксиланаза 400 U алфа -1,4-бета-ксиланаза 1000 U	— — —	1. При начина на използване на добавката и на предварителната смеска посочете температурата на съхранение, срок на годност и стабилност при гранулиране 2. Препоръчителна доза на кг пълноценна храна: ендо-1,3(4)-бета-глюко-наза 250 U ендо-1,4-бета-ксиланаза 400 U алфа-амилаза 1000 U 3. Да се използват в смесените храни за животни,съдържащи зър-нени култури, богати на скорбелни полизахариди (главно арабиноксилани и бета-глюкани), например съдържащи над 50 % ечемик.	30.9.2000 г.

(1) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол захари-редуктори (измерени в еквиваленти ксилоза № в минута от ксилан от ечемичени люспи, с pH 5,3 и при температура 50 °C.

(2) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол захари-редуктори (измерени в еквиваленти глюкоза№ в минута от ечемичен бета.глюкан, с pH 5,0 и при температура 30 °C.

(3) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол глюкозидни връзки в минута от скорбелен полимерен субстрат, свързан напречно и неразтворим във вода, с pH 6,5 е при температура 37 °C.

№	Добавка	Химически състав и описание	Жив. вид или категория животни	Макс. възраст	Мин. съдържание	Макс. съдържание	Други разпоредби	Срок на разрешението
					Единица активност на кг пълноценна храна			
45	Ендо-1,3(4)-бета-глюконаза ЕС 3.2.1.6 Ендо-1,4-бета-ксиланаза ЕС 3.2.1.8 Алфа-амилаза ЕС 3.2.1.1	Препарат от ендо-1,3(4)-бета-, глюконаза, получена от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) от ендо-1,4-бета-, ксиланаза, получена от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) и от алфа-амилаза, получена от *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), с минимална активност: ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 250 U/g (1) ендо-1,4-бета-ксиланаза: 400 U/g (2) алфа-амилаза: 1000 U/g (3)	Прасета	4 месеца	ендо-1,3(4)-бета-глюконаза 250 U ендо-1,4-бета-ксиланаза 400 U алфа-амилаза: 1000 U	— — —	1. При начина на използване на добавката и на предварителната смеска посочете температурата на съхранение, срок на годност и стабилност при гранулиране. 2. Препоръчителна доза на кг пълноценна храна: ендо-1,3(4)-бета-глюко-наза 250 U ендо-1,4-бета-ксиланаза 400 U алфа-амилаза 1000 U 3. Да се използват в смесените храни за животни,съдържащи зър-нени култури, богати на скорбелни полизахариди (главно арабиноксилани и бета-глюкани), например съдържащи над 35 % ечемик.	30.9.2000 г.
46	Ендо-1,3(4)-бета-глюконаза ЕС 3.2.1.6 Ендо-1,4-бета-ксиланаза ЕС 3.2.1.8 Алфа-амилаза ЕС 3.2.1.1	Препарат от ендо-1,3(4)-бета-, глюконаза, получена от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) от ендо-1,4-бета-, ксиланаза, получена от *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) и от полигалак-, туроназа, получена от *Aspergillus* aculeatus (CBS 589.94), с минимална активност: ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 400 U/g (1) ендо-1,4-бета-ксиланаза: 400 U/g (2) полигалактуроназа: 50 U/g (4)	Свине за угояване	-	ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 400 U ендо-1,4-бета-ксиланаза 400 U полигала-ктуроназа: 50 U	— — —	1. При начина на използване на добавката и на предварителната смеска посочете температурата на съхранение, срок на годност и стабилност при гранулиране 2. Препоръчителна доза на кг пълноценна храна: ендо-1,3(4)-бета-глюко-наза 400 U ендо-1,4-бета-ксиланаза 400 U полигалактуроназа: 50 U 3. Да се използват в смесените храни за животни,съдържащи зър-нени култури, богати на скорбелни и нескорбелни полизахариди (главно ара-биноксилани и бета-глю-кани),например съдър жащи над 40 % ечемик.	30.9.2000 г.

(1) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол захари-редуктори (измерени в еквиваленти глюкоза№ в минута от ечемичен бета.глюкан, с pH 5,0 и при температура 30 °C.

(2) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол захари-редуктори (измерени в еквиваленти ксилоза № в минута от ксилан от ечемичени люспи, с pH 5,3 и при температура 50 °C.

(3) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол глюкозидни връзки в минута от скорбелен полимерен субстрат, свързан напречно и неразтворим във вода, с pH 6,5 е при температура 37 °C.

(4) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редукторни вещества (измерени в еквиваленти гаракту-ронова киселина) в минута от поли D-галактуронов субстрат, с pH 5,0 и при температура 40 °C.

№	Добавка	Химически състав и описание	Жив. вид или категория животни	Макс. възраст	Мин. съдържание	Макс. съдържание	Други разпоредби	Срок на разрешението
					Единица активност на кг пълноценна храна			
47	Ендо-1,3(4)-бета-глюконаза ЕС 3.2.1.6 Ендо-1,4-бета-ксиланаза ЕС 3.2.1.8 Алфа-амилаза ЕС 3.2.1.1 Полигалактуро-наза ЕС 3.2.1.15	Препарат от ендо-1,3(4)-бета-, глюконаза, получена от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) от ендо-1,4-бета- ксиланаза, получена от *Trichoderma longibrachiatum* (imi sd 135), от алфа-амилаза, получена от *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), от поригалактуроза, получена от *Aspergillus* aculeatus (CBS 589.94), от с минимална активност: ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 4000 U/g (1) ендо-1,4-бета-ксиланаза: 400 U/g (2) алфа-амилаза: 1000 U/g (3) полигалактуроза: 25 U/g (4)	Прасета	4 месеца	ендо-1,3(4)-бета-глюконаза 150 U ендо-1,4-бета-ксиланаза 4000 U алфа-амилаза: 1000 U полигалакту-роназа: 25 U	— — — —	1. При начина на използване на добавката и на предварителната смеска посочете температурата на съхранение, срок на годност и стабилност при гранулиране 2. Препоръчителна доза на кг пълноценна храна: ендо-1,3(4)-бета-глюко-наза 150 U ендо-1,4-бета-ксиланаза 4000 U алфа-амилаза: 1000 U полигалактуроназа: 25 U 3. Да се използват в смесените храни за животни,съдържащи зър-нени култури, богати на скорбелни и не скорбелни полизахариди (главно арабиноксилани и бета-глюкани), например съдържащи над 20 % ечемик и 35 % пшеница.	30.9.2000 г.

(1) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол захари-редуктори (измерени в еквиваленти глюкоза№ в минута от ечемичен бета.глюкан, с pH 5,0 и при температура 30 °C.

(2) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол захари-редуктори (измерени в еквиваленти ксилоза № в минута от ксилан от ечемичени люспи, с pH 5,3 и при температура 50 °C.

(3) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол глюкозидни връзки в минута от скорбелен полимерен субстрат, свързан напречно и неразтворим във вода, с pH 6,5 е при температура 37 °C.

(4) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редукторни вещества (измерени в еквиваленти гаректуронова киселина) в минута от поли D-галактуронов субстрат, с pH 5,0 и при температура 40 °C.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

№	Добавка	Химически състав и описание	Жив. вид или категория животни	Макс. възраст	UFC на кг пълноценна храна.		Други разпоредби	Срок на разрешението
					Мин. съдържание	Макс. съдържание		
15	*Enterococcus faecium* NCIMB 11181	Препарат от *Enterococcus faeciump*, съдържащ мини-мум: прахообразно вещество 4 × 10 на 11 UFC/г добавка	Телета	6 месеца	5×10^8	2×10^9	При начина на използване на добавката и на предварителната смеска посочете температурата на съхранение, срок на годност и стабилност при гранулиране.	30.9.2000 г.
		със защитно покритие 5 × 10 на 10 UFC/г добавка	Прасета	4 месеца	5×10^8	2×10^9	При начина на използване на добавката и на предварителната смеска посочете температурата на съхранение, срок на годност и стабилност при гранулиране.	30.9.2000 г.
16	*Enterococcus faecium* DSM 7134	Смес от: *Enterococcus faecium*, съдържащ минимум: $7 \times 10_9$ UFC/г	Телета	6 месеца	1×10^9	6×10^9	При начина на използване на добавката и на предварителната смеска посочете температурата на съхранение, срок на годност и стабилност при гранулиране.	30.9.2000 г.
	Lactobacillus rhamnosus DSM 7133	и *Lactobacillus rhamnosus*, съдържащ минимум: $3 \times 10_9$ UFC/г	Прасета	4 месеца	1×10^9	5×10^9	При начина на използване на добавката и на предварителната смеска посочете температурата на съхранение, срок на годност и стабилност при гранулиране.	30.9.2000 г.