KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1259/2004

(2004. gada 8. jūlijs)

par pastāvīgu atļauju izmantot dažas jau atļautas barības piedevas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1756/2002 [2], un jo īpaši ar tās 3. un 9.d panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Direktīva 70/524/EEK paredz, ka piedevas nedrīkst laist apgrozībā, ja vien tam nav dota Komisijas atļauja.

(2) Direktīvas 70/524/EEK C pielikuma II daļā minētajām piedevām, kuru starpā ir mikroorganismi un fermenti, var piešķirt izmantošanas atļauju bez laika ierobežojumiem, kādi noteikti jau atļautām piedevām, ja ir ievēroti 3. panta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi.

(3) *Enterococcus faecium* (DSM 10663/NCIMB 10415) mikroorganismu preparātu pirmo reizi uz laiku atļāva izmantot ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1636/1999 [3] gaļas cāļiem.

(4) Tika iesniegti jauni dati, lai papildinātu pieteikumu šā mikroorganisma izmantošanas atļaujai uz neierobežotu laiku.

(5) Atļaujas pieteikuma novērtējums, kas tika iesniegts attiecībā uz minēto mikroorganismu, liecina, ka Direktīvā 70/524/EEK paredzētie nosacījumi atļaujai uz neierobežotu laiku ir ievēroti.

(6) Tādēļ jāatļauj uz neierobežotu laiku izmantot I pielikumā minēto mikroorganismu gaļas cāļiem.

(7) Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74 252) palīdzību iegūtu endo-1,4-beta-glikanāzes, endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-l,4-beta-ksilanāzes fermentu preparāta izmantošanu šķidrā veidā pirmo reizi uz laiku atļāva ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1436/1998 [4] gaļas cāļiem un granulās – ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 937/2001 [5].

(8) Ar *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) palīdzību iegūtu endo-1,3(4)-beta-glikanāzes fermentu preparātu pirmo reizi atļāva izmantot uz laiku ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 654/2000 [6] gaļas cāļiem.

(9) Ar *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101) palīdzību iegūtu endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes fermentu preparātu pirmo reizi atļāva izmantot uz laiku ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 866/1999 [7] gaļas cāļiem.

(10) Ar *Aspergillus niger* (CBS 520.94) palīdzību iegūtu endo-1,4-beta-ksilanāzes fermentu preparātu pirmo reizi atļāva izmantot uz laiku ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1436/1998 [8] gaļas cāļiem.

(11) Ar *Bacillus subtilis* (LMG-S 15136) palīdzību iegūtu endo-1,4-beta-ksilanāzes fermentu preparātu pirmo reizi atļāva izmantot cietā veidā uz laiku ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1353/2000 [9] un šķidrā veidā – ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2188/2002 [10].

(12) Tika iesniegti jauni dati, lai papildinātu šo fermentu preparātu izmantošanas atļaujas pieteikumu uz neierobežotu laiku.

(13) Atļaujas pieteikuma novērtējums attiecībā uz ikvienu no šiem fermentu preparātiem liecina, ka Direktīvā +70/524/EEK paredzētie nosacījumi atļaujai uz neierobežotu laiku ir ievēroti.

(14) Tādēļ ir jāatļauj šo fermentu preparātu uz neierobežotu laiku izmantot gaļas cāļiem saskaņā ar II, III, IV, V un VI pielikumā minētajiem nosacījumiem.

---

[1] OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.
[2] OV L 265, 3.10.2002., 1. lpp.
[3] OV L 194, 27.7.1999., 17. lpp.
[4] OV L 191, 7.7.1998., 15. lpp
[5] OV L 130, 12.5.2001., 25. lpp.
[6] OV L 79, 30.3.2000., 26. lpp.
[7] OV L 108, 27.4.1999., 21. lpp.
[8] OV L 191, 7.7.1998., 15. lpp.
[9] OV L 155, 28.6.2000., 15. lpp.
[10] OV L 333, 10.12.2002., 5. lpp.

(15) Šo pieteikumu novērtējums liecina, ka vajadzīgas dažas procedūras, kas jāīsteno, lai darba ņēmējus aizsargātu no pielikumos minēto piedevu iedarbības. Šāda aizsardzība jānodrošina, piemērojot Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvu 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā [1], kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 [2].

(16) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

"Mikroorganismu" grupas preparātus, kas uzskaitīti I pielikumā, ir atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar minētajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

2. pants

"Fermentu" grupas preparātus, kas uzskaitīti II, III, IV, V un VI pielikumā, ir atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar minētajos pielikumos paredzētajiem nosacījumiem.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 8. jūlijā

Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
David BYRNE

[1] OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.
[2] OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.

I PIELIKUMS

EC Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku sugas vai kategorijas	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņa beigas
					KVV uz 1 kg kompleksās barības			
Mikroorganismi								
E 1707	*Enterococcus faecium* DSM 10663/NCIMB 10415	*Enterococcus faecium* preparāts, kura sastāvā ir ne vairāk kā: pulverveidā un granulās: $3,5 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas pārklātā veidā: $2,0 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas šķidrā veidā: 1×10^{10} KVV/g piedevas	Gaļas cāļi	—	1×10^{9}	1×10^{9}	Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. Var izmantot barības maisījumā, kas satur atļautos kokcidiostatus: diklazurilu, halofuginonu, lazalocīdnātriju, maduramicīnamoniju, monenzīnnātriju, robenidīnu.	Uz neierobežotu laiku

II PIELIKUMS

EC Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku sugas vai kategorijas	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņa beigas
					Aktīvās vienības uz 1 kg kompleksās barības			
Fermenti								
E 1602	endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.4 endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74 252) palīdzību iegūts endo-1,4-beta-glikanāzes, endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-l,4-beta-ksilanāzes preparāts, kura maksimālā iedarbība ir: šķidrā veidā un granulās: endo-1,4-beta-glikanāze: 8 000 U (1)/ml vai g endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 18 000 U (2)/ml vai g endo-1,4-beta-ksilanāze: 26 000 U (3)/ml vai g	Gaļas cāļi	—	endo-1,4-beta-glikanāze: 400 U endo-1,3 (4)-beta-glikanāze: 900 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 300 U	— — —	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva kg kompleksās barības endo-1,4-beta-glikanāze: 400-1 600 U endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 900-3 600 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 300-5 200 U. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk nekā 30 % kviešu vai miežu un vairāk nekā 10 % rudzu.	Uz neierobežotu laiku

(1) 1 U ir fermenta daudzums, kas vienā minūtē no karboksimetilcelulozes atbrīvo 0,1 mikrogramu glikozes, ja pH ir 5,0 un temperatūra ir 40 °C.
(2) 1 U ir fermenta daudzums, kas vienā minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 0,1 mikrogramu glikozes, ja pH ir 5,0 un temperatūra ir 40 °C.
(3) 1 U ir fermenta daudzums, kas vienā minūtē no auzu pelavu ksilāna atbrīvo 0,1 mikrogramu glikozes, ja pH ir 5,0 un temperatūra ir 40 °C.

III PIELIKUMS

EC Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku sugas vai kategorijas	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņa beigas
					Aktīvās vienības uz 1 kg kompleksās barības			
Fermenti								
E 1603	endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6	Ar *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) palīdzību iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts, kura maksimalā iedarbība ir: pārklātā veidā: 50 FBG [1]/g šķidrā veidā: 120 FBG/ml	Gaļas cāļi	—	10 FBG	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva uz 1 kg kompleksās barības: 15–20 FBG. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk nekā 60 % dārzeņu sastāvdaļu (kukurūzu, lupīnas, kviešus, miežus, soju, rīsus, eļļas rapšus vai zirņus).	Uz neierobežotu laiku

[1] 1 FGB ir fermentu daudzums, kas vienā minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus), ja pH ir 5,0 un temperatūra ir 30 °C.

IV PIELIKUMS

EC Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku sugas vai kategorijas	Maksimālais vecums	Minimālais saturs / Maksimālais saturs (Aktīvās vienības uz 1 kg kompleksās barības)		Citi noteikumi	Atļaujas termiņa beigas
Fermenti								
E 1604	endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101) palīdzību iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts, kura maksimālā iedarbība ir: pulverveidā: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 2 000 U(1)/g endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 400 U(2)/g šķidrā veidā: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 500 U/ml endo-1,4-beta-ksilanāze: 350 U/ml	Gaļas cāļi	—	endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 70 U	—	1) Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. 2) Ieteicamā deva kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 70 U. 3) Izmantošanai barības maisījumā, kas bagātināts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk nekā 50 % miežu vai 60 % kviešu.	Uz neierobežotu laiku

(1) 1 U ir fermenta daudzums, kas vienā minūtē miežu beta-glikāna atbrīvo 5,55 mikromolus reducējošo cukuru (maltozes ekvivalentus), ja pH ir 5,0 un temperatūra ir 50 °C.
(2) 1 U ir fermenta daudzums, kas vienā minūtē no bērza koksnes ksilāna atbrīvo 4,00 mikromolus reducējošo cukuru (maltozes ekvivalentus), ja pH ir 5,5 un temperatūra ir 50 °C.

V PIELIKUMS

EC Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku sugas vai kategorijas	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņa beigas
					Aktīvās vienības uz 1 kg kompleksās barības			
Fermenti								
E 1605	endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Aspergillus aculeatus* (CBS 520.94) palīdzību iegūts endo-1,4(4)-beta-glikanāzes preparāts, kura maksimalā iedarbība ir: cietā veidā: endo-1,4-beta-ksilanāze: 600 U(1)/g šķidrā veidā: endo-1,4-beta-ksilanāze: 300 U/ml	Gaļas cāļi	—	300 U	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-ksilanāze: 300–600 U. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagātināts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk nekā 50 % kviešu.	Uz neierobežotu laiku

(1) 1 U ir fermenta daudzums, kas vienā minūtē no bērza koksnes ksilāna atbrīvo 1 mikromolu ksilozes, ja pH ir 5,3 un temperatūra ir 50 °C.

VI PIELIKUMS

EC Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku sugas vai kategorijas	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņa beigas
					Aktīvās vienības uz 1 kg kompleksās barības			
Fermenti								
E 1606	endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Bacillus subtilis* (LMG-S 15136) palīdzību iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts, kura maksimalā iedarbība ir: cietā un šķidrā veidā: 100 IU [1]/g vai ml	Gaļas cāļi	—	10 IU	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva kg kompleksās barības: 10 IU. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagātināts ar polisaharīdiem, kas nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāni), piemēram, kas satur vairāk nekā 40 % kviešu.	Uz neierobežotu laiku

[1] 1 IU ir fermenta daudzums, kas vienā minūtē no bērza koksnes ksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus), ja pH ir 4,5 un temperatūra ir 30 °C.