KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 902/2009

(2009. gada 28. septembris)

par atļaujas piešķiršanu no *Trichoderma reesei* (CBS 114044) iegūtam endo-1,4-beta-ksilanāzes fermentu preparātam kā barības piedevai, kas paredzēta atšķirtiem sivēniem, gaļas cāļiem, cāļiem dējējvistu audzēšanai, gaļas tītariem un vaislas tītariem (atļaujas turētājs *Roal Oy*)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ([1]) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka dzīvnieku barības piedevu izmantošanai jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2) Šajā regulā atļauja tiek piešķirta endo-1,4-beta-ksilanāzes fermentu preparātam kā barības piedevai, kas paredzēta atšķirtiem sivēniem, gaļas cāļiem, cāļiem dējējvistu audzēšanai, gaļas tītariem un vaislas tītariem.

(3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju preparātam, kas minēts šīs regulas pielikumā. Pieteikumam pievienotas vajadzīgās ziņas un dokumenti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punkta prasībām.

(4) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 8. panta 3. punktu Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") veica riska novērtējumu.

(5) Pieteikums attiecas par atļaujas piešķiršanu no *Trichoderma reesei* (CBS 114044) iegūtam endo-1,4-beta-ksilanāzes fermentu preparātam kā barības piedevai, kas paredzēta atšķirtiem sivēniem, gaļas cāļiem, cāļiem dējējvistu audzēšanai, gaļas tītariem un vaislas tītariem un kas klasificējama barības piedevu kategorijā "zootehniskās piedevas".

(6) Iestāde 2008. gada 21. maija atzinumā ([2]) un 2009. gada 21. aprīļa atzinumā ([3]) secināja, ka no *Trichoderma reesei* (CBS 114044) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts nerada kaitīgu ietekmi uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi un ka, izmantojot minēto preparātu, ievērojami var pieaugt dzīvnieku svars un barības izmantošana. Iestāde neuzskatīja, ka būtu vajadzīgas īpašas prasības veikt uzraudzību pēc preparāta laišanas tirgū. Iestāde arī pārbaudīja ziņojumu par barībā lietotās piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Kopienas references laboratorija.

(7) Minētā preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādējādi preparātu jāļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā "zootehniskās piedevas" un funkcionālajā grupā "gremošanas veicinātāji", ir atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

([1]) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

([2]) *The EFSA Journal* (2008) 712, 1.–20. lpp.

([3]) *The EFSA Journal* (2009) 1058, 1.–6. lpp.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 28. septembrī

Komisijas vārdā –
Komisijas locekle
Androulla VASSILIOU

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs / Maksimālais saturs: Kompleksās dzīvnieku barības ar mitruma saturu 12 % aktīvās vienības/kg		Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa — gremošanas veicinātāji									
4a8	*Roal Oy*	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Piedevas sastāvs No *Trichoderma reesei* (CBS 114044) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar vismaz šādu aktivitāti: cietā veidā 4×10^6 *BXU* (1)/g šķidrā veidā 4×10^5 *BXU*/g Aktīvās vielas raksturojums No *Trichoderma reesei* (CBS 114044) iegūta endo-1,4-beta-ksilanāze Analīzes metode (2): Piedevā un premiksā: endo-1,4-beta-ksilanāzes reducējošo cukuru nosaka ar dinitrosalicilskābes reaģentu kolometrisko reakciju uz reducējošo cukuru daudzumu, ja pH ir 5,3 un temperatūra ir 50 °C. Lopbarībā: kolorimetriskā metode, ar ko nosaka ūdenī šķīstošas krāsvielas daudzumu, ko ferments izdala no kviešu arabinoksilāna substrāta, kas saistīts ar azurīnu.	Sivēni (atšķirti)	—	24 000 *BXU*	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. 2. Paredzēts lietot sivēniem (atšķirtiem), kuru svars nepārsniedz 35 kg. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk nekā 20 % kviešu. 4. Drošības apsvērumi: apstrādes laikā izmanto elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	19.10.2019.
				Gaļas cāļi		8 000 *BXU*			
				Cāļi dējējvistu audzēšanai		8 000 *BXU*			
				Gaļas tītari		16 000 *BXU*			
				Vaislas tītari		16 000 *BXU*			

(1) 1 *BXU* ir fermenta daudzums, kas no bērza ksilāna 1 sekundē 50 °C temperatūrā, ja pH ir 5,3, šķeļ 1 *nmol* reducējošo cukuru kā ksilozi.
(2) Sīkāka informācija par analīzes metodēm ir pieejama Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives