372L0168

Nr L 103/6 *EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING* 2.5.72

KOMMISSIONENS DIREKTIV

av den 14 april 1972

om fastställande av egenskaper och minimikrav för besiktning av sorter av köksväxter

(72/168/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv av den 29 september 1970 om saluföring av utsäde av köksväxter[1], i dess lydelse enligt direktivet av den 30 mars 1971[2], särskilt artikel 7.2 i detta, och

med beaktande av följande:

Enligt bestämmelserna i ovannämnda direktiv är medlemsstaterna skyldiga att sammanställa en eller flera listor över de sorter som godtagits för certifiering och kontroll som standardutsäde och för saluföring i deras territorier.

Sortgodkännande omfattas av gemenskapens villkor, vilkas tillämpning måste övervakas genom officiella kontroller, i synnerhet genom kontroll av grödan.

Kontrollerna måste omfatta tillräckligt många karaktärer för att arterna skall kunna beskrivas.

Det minsta antal karaktärer som skall kontrolleras bör fastställas på gemenskapsnivå.

Vidare måste minimikrav för genomförande av kontrollerna fastställas.

Egenskaperna och minimikraven för kontroller bör fastställas med beaktande av den rådande tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, Üträdgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om att officiella kontroller som genomförs för sortgodkännande av köksväxter skall omfatta minst de egenskaper som anges i bilaga 1.

De skall se till att de minimikrav som anges i bilaga 2 är uppfyllda när kontrollerna genomförs.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 1 juli 1972 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 april 1972.

På kommissionens vägnar

S. L. MANSHOLT

Ordförande

---

[1] EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 7.
[2] EGT nr L 87, 17.4.1971, s. 24.

BILAGA 1

1. LÖK

Allium cepa L.

1. Blad:
   - 1.1 höjd
   - 1.2 färg
   - 1.3 vaxöverdrag: förekommer/saknas
2. Lök:
   - 2.1 färg: yttre skal
   - 2.2 färg på inre vävnad
   - 2.3 inre vävnad: ringbildning
   - 2.4 form
   - 2.5 torrsubstanshalt
3. Klassificering av mognad

2. PURJOLÖK

Allium porrum L.

1. Blad:
   - 1.1 växtsätt
   - 1.2 bladets form
   - 1.3 ytstruktur: utseende
   - 1.4 färg
   - 1.5 antocyaninfärgning: förekommer/saknas (mäts efter köldperiod)
2. Hals:
   - 2.1 längd
   - 2.2 tjocklek
   - 2.3 form
3. Frö (moget och torrt): storlek
4. Växttakt
5. Köldresistens

3. KÖRVEL

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

1. Planta: växtsätt
2. Blad:
   - 2.1 färg
   - 2.2 ytstruktur
   - 2.3 småbladens form
   - 2.4 tandning i småblad
3. Blomma: stjälkens längd

4. SELLERI

Apium graveolens L.

A. Bladselleri

1. Planta:
   - 1.1 växtsätt
   - 1.2 rotskott: förekommer/saknas
2. Blad:
   - 2.1 färg
   - 2.2 färgskiftning: förekommer/saknas
3. Bladskaft:
   - 3.1 struktur: massiv eller ihålig
   - 3.2 färg
   - 3.3 antocyaninfärgning: förekommer/saknas
   - 3.4 längd
   - 3.5 bredd
   - 3.6 form i tvärsnitt
4. Benägenhet för vitfärgning: naturlig eller artificiell

B. Rotselleri

1. Blad (i början av rottillväxt):
   - 1.1 växtsätt
   - 1.2 höjd
   - 1.3 antal
   - 1.4 småbladens storlek
   - 1.5 antocyaninfärgning av bladskaft: förekommer/saknas
2. Knöl:
   - 2.1 storlek
   - 2.2 form
   - 2.3 utlöpare: storlek
   - 2.4 typ av rotfäste
   - 2.5 antal rötter
   - 2.6 tjocklek på rötter
   - 2.7 epidermis: utseende
3. Färg vid tillagning

5. SPARRIS

Asparagus officinalis L.

1. Stängel:
   - 1.1 knopp: antocyaninfärgnings intensitet
   - 1.2 diameter
2. Könsbestämning: tvåkönad sort eller hansort
3. Klassificering av mognad

6. MANGOLD

Beta vulgaris L. var. *cycla* (L.) Ulrich

1. Planta:
   - 1.1 skott: förekommer/saknas
   - 1.2 bladens växtsätt
2. Blad (utvuxen planta):
   - 2.1 längd, inklusive bladskaft
   - 2.2 form
   - 2.3 blåsighet
   - 2.4 färg
   - 2.5 huvudbladets nervsystem: bredd
   - 2.6 bladskaft i tvärsnitt
3. Monogermitet

7. RÖDBETA

Beta vulgaris L. var *esculenta* L.

1. Blad:
   - 1.1 förhållande blad:rot
   - 1.2 antocyaninfärgnings intensitet
2. Rot:
   - 2.1 form
   - 2.2 basens form
   - 2.3 korkbildning på skal: utseende
   - 2.4 yttre färg
   - 2.5 köttets färg
3. Monogermitet
4. Klassificering av mognad

8. GRÖNKÅL

Brassica oleracea L. var. *acephala* D.C. subvar. *Laciniata* L.

1. Stjälkens höjd
2. Blad:
   - 2.1 form
   - 2.2 färg
   - 2.3 krusighet

9. BLOMKÅL

Brassica oleracea L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis*

1. Ung planta: antocyaninfärgning: förekommer/saknas
2. Mogen planta: storlek

3. Stjälk: längd

4. Mogen planta: yttre blad:

   4.1 växtsätt

   4.2 bladets form

   4.3 färg

   4.4 bladspets: krusighet

   4.5 blåsighet

   4.6 huvudbladets nervsystem: storlek

5. Blomma:

   5.1 storlek

   5.2 form

   5.3 ytstruktur

   5.4 fasthet

   5.5 hårighet: förekommer/saknas

   5.6 antocyaninfärgning: förekommer/saknas

6. Klassificering av mognad

10. BROCCOLI

Brassica oleracea L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *italica* Plenck

1. Stjälk:

   1.1 längd

   1.2 förgreningar: förekommer/saknas

2. Blad:

   2.1 utveckling av flikar i bladkant

   2.2 antocyaninfärgning: förekommer/saknas

3. Blomställning (före begynnande blomning):

   3.1 storlek

   3.2 form

   3.3 fasthet

   3.4 färg

   3.5 högblad: förekommer/saknas

   3.6 sannolikhet för andra blomning

11. BRYSSELKÅL

Brassica oleracea L. var. *bullata* subvar. *gemmifera* DC.

1. Stjälk: längd (mogen planta)

2. Blad: färg

3. Huvud:

   3.1 storlek

   3.2 form

4. Klassificering av mognad

12. SAVOYKÅL

Brassica oleracea L. var. *bullata* DC. et var. *sabauda* L.

13. VITKÅL

Brassica oleracea L. var. *capitata* L.f. *alba* DC.

14. RÖDKÅL

Brassica oleracea L. var. *capitata* L.f. *rubra* (L.) Thell

1. Planta:
   1.1 storlek
   1.2 stjälk: längd
2. Yttre blad:
   2.1 färg
   2.2 krusighet: förekommer/saknas
   2.3 vaxighet: förekommer/saknas
3. Huvud:
   3.1 storlek
   3.2 form
4. Klassificering av mognad

15. KÅLRABBI

Brassica oleracea L. var. *gongylodes* L.

1. Planta: storlek
2. Blad: färg
3. Knöl:
   3.1 form
   3.2 färg
4. Klassificering efter förekomst av trådighet
5. Klassificering av mognad

16. ROVA

Brassica rapa L. var. *rapa* (L.) Thell

1. Blad (strax före skörd, på mogen planta):
   1.1 bladtyp: helt eller ej
   1.2 förhållande blad:rot

2. Rot:

   2.1 form

   2.2 färg på ovandel

   2.3 köttets färg

17. CHILIPEPPAR, PAPRIKA, SPANSK PEPPAR

Capsicum annuum L.

1. Groddplanta:

   1.1 antocyaninfärgning på hypokotyl: förekommer/saknas

   1.2 grönfärgning av hypokotyl: intensitet

2. Planta: längd mellan noder

3. Frukt:

   3.1 växtsätt

   3.2 storlek

   3.3 form (förutom första frukten)

      3.3.1 form i längdsnitt

      3.3.2 skaftets form

      3.3.3 spetsens form

   3.4 färg

      3.4.1 färg (före mognad)

      3.4.2 färg (mogen frukt)

   3.5 köttets tjocklek

   3.6 fruktens ytstruktur: utseende

   3.7 kapsaicin: förekommer/saknas

4. Klassificering av mognad

18. FRISÉESALLAT

Cichorium endivia L.

1. Plantans växtsätt

2. Blad:

   2.1 hjärtats utseende

   2.2 form på unga blad i hjärtat (Scarole)

   2.3 mogen planta: form

   2.4 bladfärg

   2.5 bladens glansighet

   2.6 bladens ytstruktur: utseende (Scarole)

   2.7 bladkant: utseende

   2.8 antocyaninfärgning av bladens huvudnerver: förekommer/saknas (Frisée)

3. Klassificering av mognad

4. Resistens mot stocklöpning

19. CIKORIA

Cichorium intybus L. var. *foliosum* Bisch.

A. Witloof cikoria

1. Blad:

   tendens till tidig uttorkning (observeras på hösten första året)

2. Huvud: form

3. Klassificering av mognad vid drivning

4. Hjärtats växttakt

B. Storbladig cikoria (italiensk cikoria)

1. Blad (vegetativt stadium):

   1.1 form

   1.2 antocyaninfärgning: förekommer/saknas

2. Hjärta

   2.1 form

   2.2 skott: förekommer/saknas

   2.3 antocyaninfärgning: förekommer/saknas

   2.4 grönfärgning: intensitet

   2.5 blad: blåsighet

20. VATTENMELON

Citrullus vulgaris L.

1. Stjälkar:

   1.1 antocyaninfärgning: förekommer/saknas

   1.2 hårighet: förekommer/saknas

2. Blad (i början av blomning):

   2.1 tandning: djup

   2.2 hårighet: förekommer/saknas

3. Blomma (vid tidpunkt för bildning av första frukten):

   3.1 kronans form

   3.2 hårighet på blomfoder: förekommer/saknas

4. Kön

5. Frukt (stadium före mognad)

   5.1 storlek

   5.2 form

   5.3 ådror: förekommer/saknas

   5.4 skalets (epikarp) grundfärg

   5.5 färg på skalets (epikarp) marmorering

   5.6 köttets (endokarp) färg

   5.7 hålighet i kött: förekommer/saknas

   5.8 köttets struktur

   5.9 frön: förekommer/saknas

6. Frö: (moget och torrt)

   6.1 storlek

   6.2 form

   6.3 färg: enfärgat/flerfärgat

7. Ploiditetsgrad

21. MELON

Cucumis melo L.

1. Groddplanta:

   1.1 hypokotyl: längd

   1.2 hjärtbladens storlek

2. Kön

3. Frukt:

   3.1 storlek

   3.2 form

   3.3 stjälkavlossning

   3.4 ådror

   3.5 färgskiftningar

   3.6 skalets färg (före mognad)

   3.7 skalets färg (mogen frukt)

   3.8 marmorering och prickar

   3.9 köttets färg

4. Frö: (moget och torrt)

   4.1 storlek

   4.2 färg

5. Klassificering efter fruktens sockerhalt (mogen frukt)

6. Klassificering av mognad

22. GURKA

Cucumis sativus L.

1. Groddplantor: bitterhet: förekommer/saknas

2. Blomställning: antal honblommor per honnivå

3. Kön

4. Frukt:

   4.1 längd

   4.2 färg (före mognad och mogen frukt)

   4.3 taggar: storlek och färg

   4.4 hår: storlek och färg

   4.5 vårtor: antal och storlek

   4.6 räfflor

   4.7 färgskiftningar: mogen frukt

   4.8 hals: förekommer/saknas

   4.9 utveckling av partenokarp

   4.10 bitterhet: förekommer/saknas

5. Klassificering av mognad

23. PUMPA, SQUASH

Cucurbita pepo L.

1. Planta: växtsätt
2. Stjälkar:
   - 2.1 längd mellan noder
   - 2.2 tvärsnitt
3. Blad (i början av blomning)
   - 3.1 form
   - 3.2 tandning: djup
   - 3.3 fläckar: förekommer/saknas
   - 3.4 klängen: förekommer/saknas
4. Blommor:
   - 4.1 stjälk, hanblommor: längd
   - 4.2 blomkrona, honblomma: tendens till avlossning
5. Könsfördelning
6. Frukt:
   - 6.1 form (vid tidpunkt för skörd)
   - 6.2 räfflor: förekommer/saknas (vid tidpunkt för skörd)
   - 6.3 skalets grundfärg (vid tidpunkt för skörd)
   - 6.4 färg på skalets marmorering (vid tidpunkt för skörd)
   - 6.5 skalets färg (fullmogen frukt)
   - 6.6 marmorering: förekommer/saknas (fullmogen frukt)
7. Frö (moget och torrt): storlek
8. Klassificering efter tidig mognad

24. MOROT

Daucus carota L. ssp. *sativus* (Hoffm.) Hayek

1. Blad: höjd
2. Rot:
   - 2.1 längd
   - 2.2 form
   - 2.3 yttre färg
3. Frö (moget och torrt) — hårighet: förekommer/saknas
4. Klassificering av mognad

25. FÄNKÅL

Foeniculum vulgare P. Mill.

1. Plantans växtsätt
2. Blad: flikblad: mått
3. Ansvällning:
   - 3.1 form
   - 3.2 skidor: överlappning
   - 3.3 skidor: trådighet
   - 3.4 skott: förekommer/saknas

26. SALLAT

Lactuca sativa L.

1. Groddplanta:
   - 1.1 antocyaninfärgning på hypokotyl: förekommer/saknas
   - 1.2 antocyaninfärgning på hjärtblad: förekommer/saknas
2. Blad: (observeras från 3 och 4 bladet på ung planta)
   - 2.1 växtsätt
   - 2.2 bladform (hela bladet)
   - 2.3 basens form
   - 2.4 bladspetsens form
   - 2.5 bladkant: vågighet
   - 2.6 övre bladhalva: ytterlinje
   - 2.7 nedre bladhalva: ytterlinje
   - 2.8 färgens intensitet och nyans
   - 2.9 antocyaninfärgning: förekommer/saknas
3. Planta: (vid tidpunkt för skörd)
   - 3.1 typ av hjärta
   - 3.2 hjärtats profil
   - 3.3 bladstruktur
   - 3.4 yttre blad: blåsighet
   - 3.5 yttre blad: färgens intensitet och nyans
   - 3.6 antocyaninfärgning på yttre blad: förekommer/saknas
4. Frö (moget och torrt): färg
5. Klassificering av hjärtbildning
6. Klassificering av fröstocksbildning (långdagsklimat)

27. PERSILJA

Petroselinum hortense Hoffm.

1. Blad:
   - 1.1 höjd
   - 1.2 form
   - 1.3 färg
2. Rottyp

28. BLOMSTERBÖNA

Phaseolus coccineus L.

1. Växtsätt
2. Blomma: färg
3. Balja:
   - 3.1 längd
   - 3.2 trådar: förekommer/saknas
4. Frö (moget och torrt): färg

29. BÖNA

Phaseolus vulgaris L.

1. Groddplanta: färg på hypokotyl
2. Växtsätt: dvärgväxt eller klättrande
3. Blad: färg på småbladskaft, särskilt vid noden
4. Blomställning:
   - 4.1 blommans färg (enfärgad eller tvåfärgad)
   - 4.2 blommans högblad: storlek
5. Balja:
   - 5.1 längd
   - 5.2 tvärsnitt
   - 5.3 ytstruktur: utseende
   - 5.4 trådar: förekommer/saknas
   - 5.5 pergament: förekommer/saknas
   - 5.6 insnörning: mellan frön och på frönas nivå
   - 5.7 grundfärg och överliggande färg
   - 5.8 spröt: längd och form
   - 5.9 antal fröämnen
6. Frö (moget och torrt):
   - 6.1 storlek
   - 6.2 form i längdsnitt
   - 6.3 form i tvärsnitt
   - 6.4 färg (förutom hilumring)
   - 6.5 färg på hilumring
   - 6.6 färg på ring
   - 6.7 ådring
7. Klassificering av mognad
8. Resistens mot Colletotrichum Lindemuthianum

30. ÄRT

Pisum sativum L. (förutom *P. arvense* L.)

1. Planta

   1.1 Växtsätt (dvärg/klättrande)

   1.2 första blomnod (förutom hjärtbladsnod)

2. Blad:

   2.1 färg

   2.2 stipler: fläckighet: förekommer/saknas

3. Blomställning:

   3.1 antal blommor per blomställning

   3.2 vexillum-bas: V-form eller ej

4. Balja:

   4.1 längd (i torrt tillstånd)

   4.2 spets: form

   4.3 böjning (vid andra blomnoden)

   4.4 färg på grönt frö

   4.5 pergament: förekommer/saknas

   4.6 antal fröämnen

5. Frö (moget och torrt):

   5.1 storlek

   5.2 form (inkl. utseende)

   5.3 skalfärg

   5.4 hjärtbladens färg

   5.5 form på stärkelsekorn (enkel eller sammansatt)

31. RÄDISA

Raphanus sativus L.

A. ***Raphanus sativus*** *L. var.* ***niger*** *Pers.*

1. Blad: (från fjärde till sjunde bladet)

   1.1 längd

   1.2 allmän form

   1.3 tandning

   1.4 bladskaftets färg

   1.5 storlek: örtblad

   1.6 färg: örtblad

2. Rot:

   2.1 storlek

   2.2 form

   2.3 nackens form

   2.4 nackens färg

   2.5 spetsens form

   2.6 utseende på epidermis

   2.7 färg på epidermis

3. Klassificering av mognad

B. ***Raphanus sativus*** *L. var. radicula Pers.*

1. Blad: (från tredje bladet)

   1.1 längd

   1.2 allmän form

   1.3 tandning

   1.4 färg

2. Rot:

   2.1 form

   2.2 färg på epidermis

3. Klassificering av mognad

32. SVARTROT

Scorzonera hispanica L.

1. Rot:

   1.1 längd

   1.2 form

   1.3 utseende på epidermis

   1.4 färg på epidermis

33. TOMAT

Solanum lycopersicum L. *(Lycopersicum esculentum* Mill.)

1. Groddplanta: antocyaninfärgning på hypokotyl: förekommer/saknas

2. Växtsätt: bestämt/obestämt

3. Bladform: normal eller hela blad

4. Frukt:

   4.1 storlek([1])

   4.2 form([1])

   4.3 färg (före mognad)

   4.4 färg (mogen frukt)

   4.5 antal loculi([1])

5. Klassificering av mognad:

   5.1 tid mellan groning och blomning av tredje blomman på första klasen (odlingsförsök)

   5.2 tid mellan blomning och mognad([1])

6. Resistens:

   6.1 mot Verticillium alboatrum

   6.2 mot Fusarium oxysporum

([1]) Tredje frukten på andra och tredje klasen, mognad bedömd i början av färgändring.

34. ÄGGPLANTA

Solanum melongena L.

1. Groddplanta:
   - 1.1 antocyaninfärgning på hypokotyl: förekommer/saknas
   - 1.2 hjärtbladens växtsätt
   - 1.3 hjärtbladens form
2. Planta:
   - 2.1 längd mellan noderna
   - 2.2 form på moget blad
   - 2.3 hårighet på stjälkändar
   - 2.4 antocyaninfärgning på stjälkända: förekommer/saknas
   - 2.5 taggighet (observeras på blomfoder)
3. Frukt:
   - 3.1 storlek
   - 3.2 form
   - 3.3 färg
   - 3.4 glansighet
   - 3.5 pigmentfördelning
   - 3.6 pigment under blomfoder: förekommer/saknas
   - 3.7 antocyaninfärgning: förekommer/saknas
   - 3.8 typ av antocyaninfärgning
   - 3.9 köttets färg
4. Klassificering av mognad: tid mellan groning och blomning

35. SPENAT

Spinacia oleracea L.

1. Planta: tillväxttakt
2. Blad: (vid full utveckling av de första fyra bladen)
   - 2.1 bladskaftets växtsätt
   - 2.2 bladskaftets längd
   - 2.3 färg
3. Blad: (observeras från sjunde bladet när plantorna är fullt utvecklade)
   - 3.1 bladskaftets växtsätt
   - 3.2 bladskaftets längd
   - 3.3 färg
   - 3.4 bladform
   - 3.5 bladets ytstruktur
4. Frö (moget och torrt): form
5. Klassificering efter stocklöpning
6. Könsfördelning
7. Resistens mot Peronospora spinacial

36. VINTERSALLAT

Valerianella locusta (L.) Betcke *(V. olitoria* Polt.)

1. Plantans storlek
2. Blad (vid tidpunkt för skörd):
   - 2.1 växtsätt
   - 2.2 form
   - 2.3 färg
   - 2.4 ytstruktur: slät eller ådrad
   - 2.5 hårighet: förekommer/saknas
   - 2.6 form på bladkant (observeras från spetsen)
   - 2.7 tandning: förekommer/saknas
3. Frö (moget och torrt):
   - 3.1 storlek
   - 3.2 form
4. Klassificering av mognad

37. BONDBÖNA

Vicia faba major L.

1. Stjälk: längd
2. Stipler: fläckighet: förekommer/saknas
3. Blomma: färg
4. Balja:
   - 4.1 växtsätt
   - 4.2 längd
   - 4.3 antal fröämnen
5. Frö (moget och torrt):
   - 5.1 storlek
   - 5.2 allmän färg
   - 5.3 tannin: förekommer/saknas
   - 5.4 färg på hilum

38. POPCORNSMAJS

Zea mays convar. *microsperma* (Koern.)

39. SOCKERMAJS

Zea mays convar. *saccharata* (Koern.)

1. Stjälk:

   1.1 antocyaninfärgning på noder: förekommer/saknas

   1.2 höjd till övre kolv (fästet i stjälken) på huvudstjälk

2. Kolv:

   2.1 pistillfärg (två till tre dagar efter utveckling)

   2.2 kolvskaftets längd

   2.3 höljenas längd

   2.4 stjälkens längd (vid full mognad)

3. Frö:

   3.1 typ av skördat frö

   3.2 form

   3.3 färg på spets och sidor

4. Tid från groning till:

   4.1 hanblomning

   4.2 honblomning

BILAGA 2

A. ALLMÄNNA MINIMIKRAV

Nr	Art	P = enkla plantor, ej förkultivering P.P = enkla plantor, förkultivering P+Pa = enkla plantor och parceller	Antal plantor eller parceller per försök		Parceller per försök	Försök per år	Antal odlingsår
			Plantor	Parceller (m^2)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lök	P+Pa	150		2	2	2
2	Purjolök	P.P	40		2	2	2
3	Körvel						
	a) rötter	P+Pa	40		2	2	2
	b) blad	P+Pa	—	—	2	2	2
4	Selleri	P.P	40	2	2	2	2
5	Sparris	P.P	20		2	2	2
6	Mangold	P+Pa	40		2	2	2
7	Rödbeta	P+Pa	40		2	2	2
8	Grönkål	P.P	40		2	2	2
9	Blomkål	P.P	40		2	2	2
10	Broccoli	P.P	40		2	2	2
11	Brysselkål	P.P	40		2	2	2
12	Savoykål	P.P	40		2	2	2
13	Vitkål	P.P	40		2	2	2
14	Rödkål	P.P	40		2	2	2
15	Kålrabbi	P.P	40 (1)		2	2	2
16	Rova	P	40		2	2	2
17	Chilipeppar, paprika, spansk peppar	P.P	40 (1)		2	2	2
18	Friséesallat	P.P	40		2	2	2
19	Cikoria	P+Pa	100		2	2	2
20	Vattenmelon	P.P	20 (1)		2	2	2
21	Melon	P.P	20 (1)		2	2	2
22	Gurka	P	20 (1)		2	2	2
23	Pumpa, squash	P	20 (2)		2	2	2
24	Morot	P+Pa	200 (1)		2	2	2
25	Fänkål	P+Pa	40		2	2	2
26	Sallat	P.P	40 (1)		2	2	2
27	Persilja						
	a) blad	P+Pa	40		2	2	2
	b) rötter	P+Pa		2	2	2	2
28	Blomsterböna	P+Pa	60		2	2	2
29	Böna						
	a) dvärg	P+Pa	150 (1)		2	2	2
	b) klängande	P+Pa	60		2	2	2
30	Ärt (klängande)	P+Pa	100		2	2	2
31	Rädisa						
	a) var. *niger*	P+Pa	50		2	2	2
	b) var. *radicula*	P+Pa	100		2	2	2

Nr	Art	P = enkla plantor, ej förkultivering P.P = enkla plantor, förkultivering P+Pa = enkla plantor och parceller	Antal plantor eller parceller per försök		Parceller per försök	Försök per år	Antal odlingsår
			Plantor	Parceller (m^2)			
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Svartrot	P+Pa	100		2	2	2
33	Tomat	P.P	20 (1)		2	2	2
34	Äggplanta	P.P	30 (1)		2	2	2
35	Spenat	P+Pa	60 (1)		2	2	2
36	Vintersallat	P+Pa	60 (1)		2	2	2
37	Bondböna	P+Pa	40		2	2	2
38	Popcornsmajs	P+Pa	40		2	2	2
39	Sockermajs	P+Pa	40		2	2	2

(1) Detta antal minskas med hälften om försöket utförs i växthus.
(2) Detta antal minskas med hälften för klängande plantor.

B. ANMÄRKNINGAR

1. Den person som inger ansökan skall förse behörig myndighet med de mängder utsäde som myndigheten anser vara nödvändiga för att genomföra försöken och därpå följande kontroller.

2. Utsädet måste uppfylla kvalitetskraven för utsäde enligt bilaga 2 i rådets direktiv av den 29 september 1970 om saluföring av utsäde av köksväxter(1).

3. Vad beträffar perenna växter skall försöken fortgå till dess samtliga karaktärer har observerats och registrerats minst en gång.

4. Om osäkerhet råder huruvida den kontrollmetod som används i en viss medlemsstat också tillämpas i övriga medlemsstater skall metoden anges.

5. Om antalet försöksytor per år inte följs skall antalet parceller per år ökas i motsvarande utsträckning.

6. De minimikrav som fastställs i A får minskas för kontroll av de ingående komponenterna.

(1) EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 7.