DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 1972

concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi

(72/168/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi [1], modificata dalla direttiva del 30 marzo 1971 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che secondo le disposizioni della direttiva precitata, gli Stati membri sono tenuti a compilare uno o più cataloghi delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione, al controllo in quanto sementi standard ed alla commercializzazione sul loro territorio ;

considerando che l'ammissione delle varietà è regolata da delle condizioni comunitarie il rispetto delle quali deve essere assicurato da degli esami ufficiali e precisamente da dei controlli in coltura ;

considerando che gli esami devono essere fatti su un numero sufficiente di caratteri che permettono di descrivere le varietà ;

considerando che è necessario determinare sul piano comunitario i caratteri che devono essere almeno l'oggetto di un esame ;

considerando, inoltre, che devono essere fissate delle condizioni minime per l'esecuzione degli esami ;

considerando che questi caratteri e queste condizioni minime di esame devono essere fissate tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri prescrivono che gli esami ufficiali effettuati in vista dell'ammissione delle varietà di specie di piante agricole comprendano almeno i caratteri enumerati nell'allegato I.

Essi sorvegliano che le condizioni minime enumerate nell'allegato II siano compiute durante l'esecuzione degli esami.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore, il 1° luglio 1972 al più tardi, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

---

[1] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.
[2] GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 24.

ALLEGATO I

1. CIPOLLA

Allium cepa L.

1. Fogliame
   - 1.1 altezza
   - 1.2 colore
   - 1.3 glaucescenza : presente o assente

2. Bulbo
   - 2.1 colore delle tuniche esterne
   - 2.2 colore della polpa
   - 2.3 striature della polpa
   - 2.4 forma
   - 2.5 contenuto in sostanza secca

3. Classe di precocità

2. PORRO

Allium porrum L.

1. Fogliame
   - 1.1 portamento
   - 1.2 forma del lembo
   - 1.3 aspetto della superficie
   - 1.4 colore
   - 1.5 pigmentazione antocianica : presente o assente (da giudicarsi dopo il freddo)

2. Falso fusto
   - 2.1 lunghezza
   - 2.2 grossezza
   - 2.3 forma

3. Seme (maturo e secco) : grossezza

4. Velocità di accrescimento

5. Resistenza al freddo

3. CERFOGLIO

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

1. Portamento della pianta

2. Foglia
   - 2.1 colore
   - 2.2 superficie
   - 2.3 forma delle foglioline
   - 2.4 dentellatura delle foglioline

3. Fiore : altezza dello stelo fiorale

4. SEDANO

Apium graveolens L.

A. **Sedano a coste**

1. Pianta
   1.1 portamento
   1.2 polloni : presenti o assenti

2. Fogliame
   2.1 colore
   2.2 screziatura : presente o assente

3. Costa
   3.1 struttura : piena o vuota
   3.2 colore
   3.3 pigmentazione antocianica : presente o assente
   3.4 lunghezza
   3.5 larghezza
   3.6 forma della sezione

4. Imbianchimento : naturale o artificiale

B. **Sedano rapa**

1. Fogliame (da giudicarsi all'inizio dell'ingrossamento della radice)
   1.1 portamento
   1.2 altezza
   1.3 volume
   1.4 grandezza delle foglioline
   1.5 pigmentazione antocianica sulle coste : presente o assente

2. Radice
   2.1 grossezza
   2.2 forma
   2.3 importanza dell'inserzione fogliare al colletto
   2.4 tipo di inserzione delle radici
   2.5 quantità di radici secondarie
   2.6 grossezza delle radici secondarie
   2.7 aspetto della pelle della radice principale

3. Colorazione dopo la cottura

5. ASPARAGO

Asparagus officinalis L.

1. Turione
   1.1 intensità della colorazione antocianica sulla parte apicale
   1.2 diametro

2. Distribuzione dei tipi sessuali : varietà bisessuata o maschile

3. Classe di precocità

6. BIETOLA DA COSTE

Beta vulgaris L. var. cicla (L.) Ulrich

1. Pianta
   - 1.1 polloni : presenza o assenza
   - 1.2 portamento del fogliame

2. Foglia (allo stadio di pianta adulta)
   - 2.1 lunghezza, compreso il picciuolo
   - 2.2 forma
   - 2.3 bollosità del lembo
   - 2.4 colore
   - 2.5 larghezza della nervatura principale
   - 2.6 sezione della costa

3. Monogermia

7. BARBABIETOLA ROSSA

Beta vulgaris L. var. esculenta L.

1. Fogliame
   - 1.1 rapporto fogliame/radice
   - 1.2 intensità della colorazione antocianica

2. Radice
   - 2.1 forma
   - 2.2 forma della parte inferiore
   - 2.3 presenza di suberificazioni
   - 2.4 colore esterno
   - 2.5 colore della polpa

3. Monogermia

4. Classe di precocità

8. CAVOLO LACINIATO

Brassica oleracea L. var. acephala DC. subvar. laciniata L.

1. Altezza del gambo

2. Foglia
   - 2.1 forma
   - 2.2 colore
   - 2.3 importanza della laciniatura

9. CAVOLFIORE

Brassica oleracea (L.) convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis

1. Plantula : presenza o assenza di antociani

2. Pianta adulta : taglia

3. Gambo : lunghezza

4. Foglie esterne della pianta adulta
   4.1 portamento
   4.2 forma del lembo
   4.3 colore
   4.4 curvatura dell'estremità
   4.5 bollosità
   4.6 importanza della nervatura principale

5. Infiorescenza o corimbo
   5.1 mole
   5.2 forma
   5.3 rilievi
   5.4 compatezza
   5.5 villosità : presente o assente
   5.6 pigmentazione antocianica : presente o assente

6. Classe di precocità

10. CAVOLO BROCCOLO

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck

1. Gambo
   1.1 lunghezza
   1.2 ramificazioni : presenti o assenti

2. Foglia
   2.1 ondulazione del bordo del lembo
   2.2 pigmentazione antocianica : presente o assente

3. Infiorescenza (prima dell'antesi del primo fiore)
   3.1 taglia
   3.2 forma
   3.3 compattezza
   3.4 colore
   3.5 brattee : apparenti o non apparenti
   3.6 attitudine a rifiorire

11. CAVOLO DI BRUXELLES

Brassica oleracea L. var. bullata subvar. gemmifera DC.

1. Gambo : lunghezza (allo stadio di pianta adulta)

2. Foglia : colore

3. Gemma
   3.1 dimensioni
   3.2 forma

4 Classe di precocità

12. CAVOLO VERZA

Brassica oleracea L. var. bullata DC. e var. sabauda L.

13. CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO

Brassica oleracea L. var. capitata L.f. alba DC.

14. CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO

Brassica oleracea L. var. capitata L.f. rubra (L.) Thell

1. Pianta
   1.1 taglia
   1.2 gambo : lunghezza

2. Foglia esterna
   2.1 colore
   2.2 arriciatura : presente o asssente
   2.3 presenza di cera

3. Infiorescenza
   3.1 dimensioni
   3.2 forma

4. Classe di precocità

15. CAVOLO RAPA

Brassica oleracea L. var. gongylodes L.

1. Pianta : taglia

2. Foglia : colore

3. Tubero
   3.1 forma
   3.2 colore

4. Comparsa della fibrosità (classificazione)

5. Classe di precocità

16. RAPA PRIMAVERILE — RAPA AUTUNNALE

Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell

1. Fogliame (da giudicarsi prima della raccolta e su piante adulte)
   1.1 tipo di foglia : intera o no
   1.2 rapporto fogliame/radice

2. Radice
   2.1 forma
   2.2 colore del colletto
   2.3 colore della polpa

17. PEPERONE

Capsicum annuum L.

1. Plantula
   1.1 pigmentazione antocianica sull'asse ipocotile : presente o assente
   1.2 intensità della pigmentazione verde sull'asse ipocotile

2. Pianta : lunghezza degli internodi

3. Frutto
   3.1 portamento
   3.2 mole
   3.3 forma (escluso il primo frutto)
      3.3.1 forma della sezione longitudinale
      3.3.2 forma dell'inserzione peduncolare
      3.3.3 forma dell'estremità apicale
   3.4 colore
      3.4.1 colore (prima della maturazione)
      3.4.2 colore (alla maturazione)
   3.5 spessore della polpa
   3.6 aspetto della superficie del frutto
   3.7 capsicina : presente o assente

4. Classe di precocità

18. INDIVIA RICCIA — SCAROLA

Cichorium endivia L.

1. Portamento della pianta

2. Foglie
   2.1 aspetto del cuore
   2.2 forma delle giovani foglie del cuore (scarola)
   2.3 forma della foglia adulta
   2.4 colore della foglia
   2.5 lucentezza della foglia
   2.6 aspetto della pagina superiore del lembo (scarola)
   2.7 aspetto dei margini del lembo
   2.8 pigmentazione antocianica sulla nervatura principale : presente o assente (per l'indivia riccia)

3. Classe di precocità

4. Resistenza a montare

19. CICORIA

Cichorium intybus L. var. foliosum Bisch.

A. **Cicoria di tipo witloof**

1. Foglia : precocità di disseccamento (da osservarsi durante la prima annata, in autunno)

2. Forma del grumolo

3. Classe di precocità alla forzatura

4. Velocità di formazione del cespo

B. **Cicoria di tipo italiano** (o cicoria a foglia larga)

1. Foglia (durante la fase vegetativa)
   1.1 forma
   1.2 pigmentazione antocianica : presente o assente

2. Cespo
   2.1 forma
   2.2 ricaccio : presente o assente
   2.3 pigmentazione antocianica : presente o assente
   2.4 intensità della colorazione verde
   2.5 bollosità della foglia

20. ANGURIA

Citrullus vulgaris L.

1. Fusto
   1.1 pigmentazione antocianica : presente o assente
   1.2 villosità : presente o assente

2. Foglia (all'inizio della fioritura)
   2.1 profondità delle frastagliature
   2.2 villosità : presente o assente

3. Fiore (al momento della formazione dei primi frutti)
   3.1 forma della corolla
   3.2 villosità del calice

4. Tipo sessuale

5. Frutto (allo stadio che precede la maturazione)
   5.1 grossezza
   5.2 forma
   5.3 solchi : presenti o assenti
   5.4 colore di fondo dell'epicarpo
   5.5 colore della marezzatura dell'epicarpo
   5.6 colore della polpa (endocarpo)
   5.7 cavità della polpa : presente o assente
   5.8 tessitura della polpa
   5.9 semi : presenti o assenti

6. Seme (maturo e secco)
   6.1 grossezza
   6.2 forma
   6.3 colore : monocolore o multicolore

7. Grado di ploidia

21. MELONE

Cucumis melo L.

1. Plantula
   1.1 lunghezza dell'asse ipocotile
   1.2 mole dei cotiledoni

2. Tipo sessuale

3. Frutto
   3.1 mole
   3.2 forma
   3.3 attaccatura del peduncolo
   3.4 solchi
   3.5 presenza di rete o di verruche
   3.6 colore dell'epicarpo (prima della maturazione)
   3.7 colore dell'epicarpo (alla maturazione)
   3.8 marezzature o picchiettature
   3.9 colore della polpa

4. Seme (maturo e secco)
   4.1 mole
   4.2 colore

5. Tenore zuccherino (alla maturazione)

6. Classe di precocità

22. CETRIOLO CETRIOLINO

Cucumis sativus L.

1. Pianta : presenza o assenza del principio amaro

2. Infiorescenza : numero dei fiori femminili per infiorescenza

3. Tipo sessuale

4. Frutto
   4.1 lunghezza
   4.2 colore (prima e durante lo stadio di maturazione)
   4.3 importanza e colore delle spine
   4.4 importanza e colore dei peli
   4.5 frequenza e taglia delle verruche
   4.6 solchi
   4.7 reticolo sul frutto maturo
   4.8 collo : presente o assente
   4.9 sviluppo
   4.10 presenza o assenza del principio amaro

5. Classe di precocità

23. ZUCCHINO

Cucurbita pepo L.

1. Tipo di crescita della pianta

2. Fusto
   - 2.1 lunghezza degli internodi
   - 2.2 sezione

3. Foglia (all'inizio della fioritura)
   - 3.1 forma
   - 3.2 profondità dei solchi
   - 3.3 chiazze : presenti o assenti
   - 3.4 cirri : presenza o assenza

4. Fiori :
   - 4.1 lunghezza del peduncolo dei fiori maschili
   - 4.2 corolla dei fiori femminili : persistente o non persistente

5. Distribuzione sessuale

6. Frutti
   - 6.1 forma (in fase di raccolta)
   - 6.2 coste : presenti o assenti (in fase di raccolta)
   - 6.3 colore di fondo dell'epicarpo (in fase di raccolta)
   - 6.4 colore della marezzatura dell'epicarpo (in fase di raccolta)
   - 6.5 colore dell'epicarpo (alla completa maturità)
   - 6.6 marezzatura presente o assente (in fase di maturità completa)

7. seme (maturo e secco) : grossezza

8. Classe di precocità

24. CAROTA

Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek

1. Fogliame : altezza

2. Radice
   - 2.1 lunghezza
   - 2.2 forma
   - 2.3 colore esterno

3. Semi (maturi e secchi) : presenza o assenza di aculei

4. Classe di precocità

25. FINOCCHIO

Foeniculum vulgare P. Mill.

1. Portamento della pianta

2. Foglia : dimensioni delle laciniature

3. Grumolo
   - 3.1 forma
   - 3.2 embricatura delle guaine
   - 3.3 fibrosità delle guaine
   - 3.4 polloni : presenti o assenti

26. LATTUGA

Lactuca sativa L.

1. Plantula
   - 1.1 asse ipocotile : presenza o assenza di pigmentazione antocianica
   - 1.2 cotiledoni : presenza o assenza di pigmentazione antocianica (in fase di schiusura)

2. Foglia (da giudicare sulla terza e quarta foglia della giovane pianta)
   - 2.1 portamento
   - 2.2 forma generale
   - 2.3 forma della base
   - 2.4 forma dell'apice
   - 2.5 ondulazione del margine della foglia
   - 2.6 contorno della metà superiore
   - 2.7 contorno della metà inferiore
   - 2.8 intensità e sfumatura del colore
   - 2.9 presenza o assenza di pigmentazione antocianica

3. Pianta (al momento della raccolta)
   - 3.1 tipo di cespo
   - 3.2 profilo del cespo
   - 3.3 tessitura delle foglie
   - 3.4 bollosità delle foglie esterne
   - 3.5 intensità e sfumatura del colore delle foglie esterne
   - 3.6 pigmentazione antocianica delle foglie esterne : presente o assente

4. Seme (maturo e secco) : colore

5. Classe di precocità nella formazione del cespo

6. Classificazione della tendenza a montare a seme in condizioni di giorno lungo

27. PREZZEMOLO

Petroselinum hortense Hoffm.

1. Fogliame
   - 1.1 altezza
   - 1.2 forma del lembo
   - 1.3 colore

2. Tipo di radice

28. FAGIOLO DI SPAGNA

Phaseolus coccineus L.

1. Tipo di accrescimento

2. Fiore : colore

3. Baccello
   - 3.1 lunghezza
   - 3.2 filo : presente o assente

4. Seme (maturo e secco) : colore

29. FAGIUOLO

Phaseolus vulgaris L.

1. Plantula : colore dell'asse ipocotile

2. Tipo di accrescimento : nano o rampicante

3. Foglia : colore del peziolo particolarmente al nodo-motore

4. Infiorescenza
   - 4.1 colore del fiore (monocolore o bicolore)
   - 4.2 grandezza delle brattee fiorali

5. Baccello
   - 5.1 lunghezza
   - 5.2 sezione traversale
   - 5.3 aspetto della superficie
   - 5.4 filo
   - 5.5 membrana sclerenchimatica
   - 5.6 strozzatura : tra i semi o in corrispondenza ad essi
   - 5.7 colore di fondo e colore sovrapposto
   - 5.8 lunghezza e forma dello stelo
   - 5.9 numero degli ovuli

6. Seme (maturo e secco)
   - 6.1 mole
   - 6.2 forma della sezione longitudinale
   - 6.3 forma della sezione traversale
   - 6.4 colore (escluso il contorno dell'ilo)
   - 6.5 colore del contorno dell'ilo
   - 6.6 colore dell'aureola
   - 6.7 venature

7. Classe di precocità

8. Resistenza al Colletotrichum Lind (antracnosi)

30. PISELLO

Pisum sativum L. (escl. P. arvense L.)

1. Pianta
   - 1.1 tipo di accrescimento (nano o ramificato)
   - 1.2 numero d'ordine del primo nodo fiorale escluso il nodo cotiledonare

2. Foglia
   - 2.1 colore
   - 2.2 maculazione delle stipule : presente o assente

3. Infiorescenza
   - 3.1 numero dei fiori per infiorescenza
   - 3.2 forma della base del vessillo a forma di V o no

4. Baccello
   - 4.1 lunghezza (allo stato secco)
   - 4.2 forma dell'estremità libera
   - 4.3 profilo dorsale (al secondo nodo fiorale)
   - 4.4 colore del seme verde
   - 4.5 membrana sclerenchimatica : presente o assente
   - 4.6 numero degli ovuli

5. Sele (maturo e secco)
   - 5.1 mole
   - 5.2 forma (compreso l'aspetto)
   - 5.3 colore del tegumento
   - 5.4 colore dei cotiledoni
   - 5.5 forma dei granuli d'amido (semplice o composta)

31. RAVANELLO

Raphanus sativus L.

A. **Raphanus saticus L. var. niger Pers.**

1. Foglia (osservazioni da fare dalla quarta alla settima foglia)
   - 1.1 lunghezza
   - 1.2 forma generale
   - 1.3 frastagliatura
   - 1.4 colore del picciuolo
   - 1.5 grandezza della fogliolina terminale
   - 1.6 colore della fogliolina terminale

2. Radice
   - 2.1 taglia
   - 2.2 forma
   - 2.3 forma delle spalle
   - 2.4 colorazione delle spalle
   - 2.5 forma dell'estremità
   - 2.6 aspetto dell'epidermide
   - 2.7 colore dell'epidermide

3. Classe di precocità

B. **Raphanus sativus L. var. radicula Pers.**

1. Foglia (osservazioni da fare sulla terza foglia)
   - 1.1 lunghezza
   - 1.2 forma generale
   - 1.3 frastagliatura
   - 1.4 colore
2. Radice
   - 2.1 forma
   - 2.2 colore dell'epidermide
3. Classe di precocità

32. SCORZONERA

Scorzonera hispanica L.

1. Radice
   - 1.1 lunghezza
   - 1.2 forma
   - 1.3 aspetto dell'epidermide
   - 1.4 colore dell'epidermide

33. POMODORO

Solanum lycopersicum L. (Lycopersicum esculentum Mill.)

1. Plantula : pigmentazione antocianica sull'asse ipocotile : presente o assente
2. Tipo di accrescimento : determinato o indeterminato
3. Forma della foglia : foglioline normali o intere
4. Frutto
   - 4.1 grossezza (1)
   - 4.2 forma (1)
   - 4.3 colore (prima della maturazione)
   - 4.4 colore (allo stadio di maturazione)
   - 4.5 numero di logge (1)
5. Classificazione delle precocità
   - 5.1 periodo che intercorre dalla levata alla fioritura del terzo fiore del primo mazzetto fiorale (prove di pieno campo)
   - 5.2 periodo che intercorre dalla fioritura alla maturazione (1)
6. Resistenza
   - 6.1 al verticillium alboatrum (verticillosi)
   - 6.2 al Fusarium oxysporum (fusariosi)

(1) Terzo frutto della seconda e terza infiorescenza ; la maturazione va valutata all'inizio della colorazione.

34. MELANZANA

Solanum melongena L.

1. Plantula
   - 1.1 pigmentazione antocianica sull'asse ipocotile : presente o assente
   - 1.2 portamento dei cotiledoni
   - 1.3 forma dei cotiledoni

2. Pianta
   - 2.1 lunghezza degli internodi
   - 2.2 forma della foglia adulta
   - 2.3 villosità all'estremità dei fusti
   - 2.4 pigmentazione antocianica all'estremità dei fusti : presente o assente
   - 2.5 spinosità (da stimare sul calice)

3. Frutto
   - 3.1 grossezza
   - 3.2 forma
   - 3.3 colore
   - 3.4 brillantezza
   - 3.5 distribuzione dei pigmenti
   - 3.6 pigmenti sotto il calice : presenti o assenti
   - 3.7 antociani : presenti o assenti
   - 3.8 natura dell'antociano
   - 3.9 colore della polpa

4. Precocità : periodo che intercorre dalla levata alla fioritura

35. SPINACIO

Spinacia oleracea L.

1. Pianta : velocità di accrescimento

2. Foglia (allo stadio di sviluppo massimo delle quattro prime foglie)
   - 2.1 portamento del peziolo
   - 2.2 lunghezza del peziolo
   - 2.3 colore

3. Foglie (da osservarsi sulla settima foglia al momento dello sviluppo massimo delle piante)
   - 3.1 portamento del peziolo
   - 3.2 lunghezza del peziolo
   - 3.3 colore
   - 3.4 forma del lembo
   - 3.5 superficie del lembo

4. Seme (maturo e secco) : forma

5. Attitudine a montare a seme

6. Distribuzione sessuale

7. Resistenza alla peronospora spinaciae

36. VALERIANA

Valerianella locusta (L.) Betcke (v. olitoria Polt.)

1. Taglia della pianta

2. Foglia (al momento della raccolta)
   - 2.1 portamento
   - 2.2 forma
   - 2.3 colore
   - 2.4 superficie : liscia o venata
   - 2.5 villosità : presente o assente
   - 2.6 forma del bordo della foglia (da osservarsi all'estremità)
   - 2.7 dentellatura : presente o assente

3. Seme (maturo e secco)
   - 3.1 grossezza
   - 3.2 forma

4. Classe di precocità

37. FAVA

Vicia faba major L.

1. Stelo : lunghezza

2. Stipula : maculata o non maculata

3. Fiore : colore

4. Baccello
   - 4.1 portamento
   - 4.2 lunghezza
   - 4.3 numero di ovuli

5. Seme (maturo e secco)
   - 5.1 grossezza
   - 5.2 colore generale
   - 5.3 tannino : presente o assente
   - 5.4 colore dell'ilo

38. GRANTURCO DA SCOPPIO — POPCORN

Zea mais convar. microsperma Koern.

39. GRANTURCO DOLCE

Zea mais convar. saccharata Koern.

1. Stelo
   - 1.1 pigmentazione antocianica sui nodi : presente o assente
   - 1.2 altezza dell'inserzione della spiga superiore sullo stelo principale

2. Spiga
   - 2.1 colore degli stimmi (da 2 a 3 giorni dopo l'emissione)
   - 2.2 lunghezza del peduncolo
   - 2.3 lunghezza delle brattee
   - 2.4 colore del tutolo (al momento della maturazione completa)

3. Seme
   - 3.1 tipo di seme raccolto
   - 3.2 forma
   - 3.3 colore della sommità e dei lati

4. Periodo che intercorre dalla levata a
   - 4.1 la fioritura maschile
   - 4.2 la fioritura femminile

ALLEGATO II

A. CONDIZIONI MINIME GENERALI

N.	Specie	P = piante isolate senza precoltura P.P = piante isolate con precoltura P + Pa = piante isolate e parcelle	Numero minimo di piante o superficie minima di parcelle per prova		Parcelle per prova	Prove per anno	Anni di semina
			Piante	Parcelle (m²)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	cipolla	P + Pa	150		2	2	2
2	porro	P.P	40		2	2	2
3	cerfoglio						
	a) radici	P + Pa	40	—	2	2	2
	b) foglie	P + Pa	—	2	2	2	2
4	sedano	P.P	40		2	2	2
5	asparago	P.P	20		2	2	1
6	bietola da coste	P + Pa	40		2	2	2
7	barbabietola rossa	P + Pa	40		2	2	2
8	cavolo laciniato	P.P	40		2	2	2
9	cavolfiore	P.P	40		2	2	2
10	cavolo broccolo	P.P	40		2	2	2
11	cavolo di Bruxelles	P.P	40		2	2	2
12	cavolo verza	P.P	40		2	2	2
13	cavolo cappuccio bianco	P.P	40		2	2	2
14	cavolo cappuccio rosso	P.P	40		2	2	2
15	cavolo rapa	P.P	40 (1)		2	2	2
16	rapa primaverile rapa autunnale	P	40		2	2	2
17	peperone	P.P	40 (1)		2	2	2
18	indivia riccia-scarola	P.P	40		2	2	2
19	cicoria	P + Pa	100		2	2	2
20	anguria	P.P	20 (1)		2	2	2
21	melone	P.P	20 (1)		2	3	2
22	cetriolo-cetriolino	P	20 (1)		2	2	2
23	zucchino	P	20 (2)		2	2	2
24	carota	P + Pa	200 (1)		2	2	2
25	finocchio	P + Pa	40		2	2	2
26	lattuga	P.P	40 (1)		2	2	2
27	prezzemolo						
	a) foglie	P + Pa	40		2	2	2
	b) radici	P + Pa		2	2	2	2
28	fagiolo di Spagna	P + Pa	60		2	2	2
29	fagiolo						
	a) nano	P + Pa	150 (1)		2	2	2
	b) rampicante	P + Pa	60		2	2	2
30	pisello	P + Pa	100		2	2	2
31	ravanello						
	a) var. niger	P + Pa	50		2	2	2
	b) var. radicula	P + Pa	100		2	2	2
32	scorzonera	P + Pa	100		2	2	2
33	pomodoro	P.P	20 (1)		2	2	2
34	melanzana	P.P	30 (1)		2	2	2
35	spinacio	P + Pa	60 (1)		2	2	2
36	valeriana	P + Pa	60 (1)		2	2	2
37	fava	P + Pa	40		2	2	2
38	granturco da scoppio-popcorn	P + Pa	40		2	2	2
39	granturco dolce	P + Pa	40		2	2	2

(1) Il numero indicato è ridotto della metà se la prova è effettuata in serra.
(2) Il numero indicato è ridotto della metà se si tratta di piante rampicanti.

B. OSSERVAZIONI PARTICOLARI

1. Il richiedente mette a disposizione dei servizi ufficiali competenti le quantità di seme che questi ultimi giudicano necessarie per l'esecuzione delle prove e dei controlli ulteriori.

2. Il seme deve soddisfare alle condizioni relative alla qualità del seme, prescritte all'allegato II della direttiva del Consiglio, del 29 settembre 1970 [1], concernente la commercializzazione di sementi di piante ortive.

3. Nel caso di piante perenni, le prove devono essere eseguite fino al momento in cui tutti i caratteri sono stati osservati e notati almeno una volta.

4. Se non è certo che il metodo d'esame impiegato in uno Stato membro è applicato nel medesimo modo negli altri Stati membri, questo metodo deve essere indicato.

5. Se il numero di luoghi di prove per anno non è rispettato, si deve aumentare di conseguenza il numero di parcelle per anno.

6. Quando si renda necessario l'esame dei componenti genealogici le condizioni minime fissate in A possono essere ridotte.

[1] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.