Nr. L 103/6 De Europæiske Fællesskabers Tidende 2. 5. 72

KOMMISSIONENS DIREKTIV

af 14. april 1972

om fastsættelsen af kendte tegn og mindstekrav for afprøvning af grønsagsarternes sorter/stammer

(72/168/EØF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR

under henvsining til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv af 29. september 1970 om handel med grønsagsfrø[1]), ændret ved direktiv af 30. marts 1971[2]), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

Medlemsstaterne er ifølge nævnte direktiv forpligtet til at udarbejde en eller flere lister over de sorter/stammer, der er anerkendt til godkendelse, kontrol som standardsåsæd og til forhandling på deres område;

anerkendelsen af sorterne/stammerne bestemmes af Fællesskabets betingelser, hvis overholdelse skal sikres ved officielle afprøvninger og særlig ved kontrol under dyrkning;

undersøgelserne skal omfatte et tilstrækkeligt antal kendetegn for at muliggøre beskrivelse af sorterne/stammerne;

det er nødvendigt på Fællesskabsplan at bestemme, hvilke kendetegn der i det mindste skal undersøges;

endvidere skal mindstekravene til gennemførelse af afprøvninger fastsættes;

disse kendetegn og disse mindstekrav til en afprøvning skal fastsættes under hensyntagen til den videnskabelige og tekniske videns udviklingstrin;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra den stående Komité for frø- og plantemateriale henhørende under landbrug, havebrug og skovbrug,

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Medlemsstaterne foreskriver, at de officielle afprøvninger, der foretages med henblik på anerkendelsen af grønsagsarternes sorter/stammer i det mindste skal omfatte de kendetegn, der er opført i bilag I.

De skal påse, at de mindstekrav, der er opført i bilag II opfyldes ved afprøvningernes gennemførelse.

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter senest den 1. juli 1972 de nødvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme bestemmelserne i dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. april 1972.

På Kommissionens vegne
S. L. MANSHOLT
Formand

[1]) EFT nr. L 225 af 12. 10. 1970, s. 7.
[2]) EFT nr. L 87 af 17. 4. 1971, s. 24.

BILAG I

1. KEPALØG

Allium cepa L.

1. Løv:
   1.1 højde
   1.2 farve
   1.3 (antagelse af) søgrøn farve: til stede eller manglende
2. Løg:
   2.1 de ydre skæls farve
   2.2 kødets farve
   2.3 kødets ringdannelse
   2.4 form
   2.5 tørstofindhold
3. Tidlighedsklassificering

2. PORRE

Allium porrum L.

1. Løv:
   1.1 vækstform
   1.2 bladpladens form
   1.3 overfladens udseende
   1.4 farve
   1.5 blåt farvestof (anthocyan): til stede eller manglende (bedømmes efter kuldepåvirkning)
2. Skaft:
   2.1 længde
   2.2 størrelse
   2.3 form
3. Frø (modent og tørt): størrelse
4. Væksthastighed
5. Resistens mod kulde

3. KØRVEL

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

1. Plantens vækstform
2. Blad:
   2.1 farve
   2.2 overflade
   2.3 smådækbladenes form
   2.4 smådækbladenes indskæringer
3. Blomst: blomsterstænglens længde

4. SELLERI

Apium graveolens L.

A. Bladselleri

1. Plante:
   1.1 vækstform
   1.2 rodskud: til stede eller manglende

2. Løv:
   2.1 farve
   2.2 panachering: til stede eller manglende

3. Bladstilk:
   3.1 struktur: fyldt eller hul
   3.2 farve
   3.3 blåt farvestof (anthocyan): til stede eller manglende
   3.4 længde
   3.5 bredde
   3.6 tværsnitsform

4. Evne til blegning: naturlig eller kunstig

B. Knoldselleri

1. Løv (bedømmes ved knolddannelsens begyndelse):
   1.1 vækstform
   1.2 højde
   1.3 fylde
   1.4 smådækbladenes størrelse
   1.5 blåt farvestof (anthocyan) på bladstilken: til stede eller manglende

2. Knold:
   2.1 størrelse
   2.2 form
   2.3 omfanget af ringformede udvækster
   2.4 røddernes indpodningstype
   2.5 antal rødder
   2.6 røddernes tykkelse
   2.7 overhudens udseende

3. Farvning ved kogning

5. ASPARGES

Asparagus officinalis L.

1. Årsskud:
   1.1 styrken af blåt farvestof (anthocyan) i spidsen
   1.2 diameter

2. Kønsfordeling: tvekønnet sort/stamme eller hankønssort/-stamme

3. Tidlighedsklassificering

6. BLADBEDE

Beta vulgaris L. var. cycla (L.) Ulrich

1. Plante:
   1.1 rodskud: til stede eller manglende
   1.2 løvbladenes vækstform
2. Blad (fuldt udviklet plante):
   2.1 længde, inklusive bladstilk
   2.2 form
   2.3 blæredannelse
   2.4 farve
   2.5 hovednervens bredde
   2.6 bladstilkens tværsnit
3. Monogermi

7. RØDBEDE

Beta vulgaris L. var. esculenta L.

1. Løv:
   1.1 forholdet løv/rod
   1.2 styrken af blåt farvestof (anthocyan)
2. Rod:
   2.1 form
   2.2 formen på basis
   2.3 korkdannelse på skallen
   2.4 udvendig farve
   2.5 kødets farve
3. Monogermi
4. Tidlighedsklassificering

8. GRØNKÅL

Brassica oleracea L. var. acephala DC. subvar. Laciniata L.

1. Stokhøjde
2. Blad:
   2.1 form
   2.2 farve
   2.3 krusningens omfang

9. BLOMKÅL

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis

1. Kimplante: blåt farvestof (anthocyan): til stede eller manglende

2. Fuldt udviklet plante: størrelse

3. Stok: længde

4. Ydre blade på den fuldt udviklede plante:
   4.1 vækstform
   4.2 bladpladens form
   4.3 farve
   4.4 bladspidsens krumning
   4.5 blæredannelse
   4.6 hovednervens størrelse

5. Hoved:
   5.1 størrelse
   5.2 form
   5.3 korning
   5.4 tæthed
   5.5 behåret eller ikke behåret
   5.6 blåt farvestof (anthocyan): til stede eller manglende

6. Tidlighedsklassificering

10. BROCCOLI

Brassica oleracea L. convar. botrytis L. Alef. var. italica Plenck

1. Stængel:
   1.1 længde
   1.2 forgrening: til stede eller manglende

2. Blad:
   2.1 bølgedannelse af bladpladens kanter
   2.2 blåt farvestof (anthocyan): til stede eller manglende

3. Blomsterstand (før den første blomst springer ud):
   3.1 størrelse
   3.2 form
   3.3 tæthed
   3.4 farve
   3.5 dækblade: synlige eller ikke synlige
   3.6 evne til at remontere

11. ROSENKÅL

Brassica oleracea L. var. bullata subvar. gemmifera DC.

1. Stængel: længde (for fuldt udviklet plante)

2. Blad: farve

3. Hoved:
   3.1 størrelse
   3.2 form

4. Tidlighedsklassificering

12. SAVOYKÅL

Brassica oleracea L. var. bullata DC. et var. sabauda L.

13. HOVEDKÅL

Brassica oleracea L. var. capitata L.f. alba DC.

14. RØDKÅL

Brassica oleracea L. var. capitata L.f. rubra (L.) Thell

1. Plante:
   1.1 højde
   1.2 stok: længde
2. Yderblad:
   2.1 farve
   2.2 krusning: til stede eller manglende
   2.3 forekomst af vokslag
3. Hoved:
   3.1 størrelse
   3.2 form
4. Tidlighedsklassificering

15. KÅLRABI

Brassica oleracea L. var, gongylodes L.

1. Plante: højde
2. Blad: farve
3. Knold:
   3.1 form
   3.2 farve
4. Klassificering af synlig træethed
5. Tidlighedsklassificering

16. MAJROE — HØSTROE

Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell

1. Løv (bedømmes lige før høsten og på de voksne planter):
   1.1 bladtype: helrandet eller ikke
   1.2 forholdet løv/rod
2. Rod:
   2.1 form
   2.2 rodhalsens farve
   2.3 kødets farve

17. SPANSK PEBER

Capsicum annuum L.

1. Kimplante:
   1.1 blåt farvestof (anthocyan) på den hypokotyle stængel: til stede eller manglende
   1.2 den grønne farves styrke på den hypokotyle stængel
2. Plante: stængelleddenes længde
3. Frugt:
   3.1 vækststilling
   3.2 størrelse
   3.3 form (dog ikke den første frugt)
      3.3.1 længdesnittets form
      3.3.2 stilkfæstets form
      3.3.3 form af den yderste spids
   3.4 farve
      3.4.1 farve (før modenhedsstadiet)
      3.4.2 farve (på modenhedsstadiet)
   3.5 kødets tykkelse
   3.6 frugtoverfladens udseende
   3.7 capsaicin: til stede eller manglende
4. Tidlighedsklassificering

18. ENDIVIE

Cichorium endivia L.

1. Plantens vækstform
2. Blade:
   2.1 hjertebladets udseende
   2.2 de unge hjerteblades form (bredbladet endivie)
   2.3 det fuldt udviklede blads form
   2.4 bladets farve
   2.5 bladets glans
   2.6 udseende af bladpladens overflade (bredbladet endivie)
   2.7 udseende af bladpladens rande
   2.8 blåt farvestof (anthocyan) på hovednerven: til stede eller manglende (kruset endivie)
3. Tidlighedsklassificering
4. Resistens mod stokløbning

19. WITLOOF-CIKORIE (JULESALAT)

Cichorium intybus L. var. foliosum Bisch.

A. **Witloof-cikorie (julesalat)**
   1. Blade: udtørringens tidlighed (iagttages det første år, om efteråret)
   2. Hoved: form
   3. Tidlighedsklassificering ved fremdrivning

4. Hovedets væksthastighed

B. **Cikorie med brede blade (italiensk cikorie)**

1. Blad (vækststadiet):
   1.1 form
   1.2 blåt farvestof (anthocyan): til stede eller manglende

2. Hoved:
   2.1 form
   2.2 rodskud: til stede eller manglende
   2.3 blåt farvestof (anthocyan): til stede eller manglende
   2.4 den grønne farves styrke
   2.5 bladets blæredannelse

20. VANDMELON

Citrullus vulgaris L.

1. Stængler:
   1.1 blåt farvestof (anthocyan): til stede eller manglende
   1.2 behåring: til stede eller manglende

2. Blad (ved blomstringens begyndelse):
   2.1 indskæringernes dybde
   2.2 behåring: til stede eller manglende

3. Blomst (på tidspunktet for dannelsen af de første frugter):
   3.1 kronens form
   3.2 bægerets behåring: til stede eller manglende

4. Kønstype

5. Frugt (på stadiet forud for modningen):
   5.1 størrelse
   5.2 form
   5.3 striber: til stede eller manglende
   5.4 skallens bundfarve (epikarpium)
   5.5 marmoreringens farve på skallen (epikarpium)
   5.6 kødets farve (endokarpium)
   5.7 hulrum i kødet: til stede eller manglende
   5.8 kødets tekstur
   5.9 kerner: til stede eller manglende

6. Kerne (moden og tør):
   6.1 størrelse
   6.2 form
   6.3 farve: ensfarvet eller flerfarvet

7. Ploidniveau

21. MELON

Cucumis melo L.

1. Kimplante:
   1.1 den hypokotyle stængels længde
   1.2 kimbladenes størrelse

2. Kønstype

3. Frugt:
   3.1 størrelse
   3.2 form
   3.3 stilkens abscission
   3.4 striber
   3.5 netmønster
   3.6 skallens farve (før modenhedsstadiet)
   3.7 skallens farve (på modenhedsstadiet)
   3.8 marmorering og pletter
   3.9 kødets farve

4. Kerne: (moden og tør)
   4.1 størrelse
   4.2 farve

5. Klassificering af frugtens sukkerindhold (på modenhedsstadiet)

6. Tidlighedsklassificering

22. ALMINDELIG AGURK — LILLE AGURK

Cucumis sativus L.

1. Plante: bitterstof: til stede eller manglende

2. Blomsterstand: antal hunblomster pr. hunblomsterstand

3. Kønstype

4. Frugt
   4.1 længde
   4.2 farve (før modenhedsstadiet og på modenhedsstadiet)
   4.3 tornenes størrelse og farve
   4.4 hårenes størrelse og farve
   4.5 vorternes hyppighed og størrelse
   4.6 riller
   4.7 den modne frugts netmønster
   4.8 hals: til stede eller manglende
   4.9 partenokarpi-udvikling
   4.10 bitterstof: til stede eller manglende

5. Tidlighedsklassificering

23. MANDELGRÆSKAR

Cucurbita pepo L.

1. Plantens vækstype

2. Stængel:
   2.1 stængelleddenes længde
   2.2 tværsnit

3. Blad (ved blomstringens begyndelse):
   3.1 form
   3.2 indskæringernes dybde

3.3 pletter: til stede eller manglende
3.4 ranker: til stede eller manglende

4. Blomster:

4.1 hanblomsternes stilklængde
4.2 hunblomsternes krone: afkastes eller afkastes ikke

5. Kønsfordeling

6. Frugter:

6.1 form (på høststadiet)
6.2 striber: til stede eller manglende (på høststadiet)
6.3 skallens bundfarve (på høststadiet)
6.4 farven på skallens marmorering (på høststadiet)
6.5 skrællens farve (på fuldmodenhedsstadiet)
6.6 marmorering: til stede eller manglende (på fuldmodenhedsstadiet)

7. Kerne (moden og tør): størrelse

8. Tidlighedsklassificering

24. GULEROD

Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek

1. Løv: højde

2. Rod:

2.1 længde
2.2 form
2.3 ydre farve

3. Frø (modent og tørt) — behåring: til stede eller manglende

4. Tidlighedsklassificering

25. FENNIKEL

Foeniculum vulgare P. Mill

1. Plantens vækstform

2. Blad: fligenes dimensioner

3. Grumolo (svibelformet bladroset):

3.1 form
3.2 bladskedernes taglægning
3.3 bladskedernes vævsstruktur
3.4 rodskud: til stede eller manglende

26. SALAT

Lactuca sativa L.

1. Kimplante:

1.1 den hypokotyle stængel: blåt farvestof (anthocyan): til stede eller manglende
1.2 kimblade: blåt farvestof (anthocyan): til stede eller manglende (på udfoldningsstadiet)

2. Blad (bedømmes på den unge plantes 3. og 4. blad):

   2.1 vækstform
   2.2 almindelig form
   2.3 formen på bladbasis
   2.4 bladspidsens form
   2.5 bladkantens bølgning
   2.6 den øverste halvdels omrids
   2.7 den nederste halvdels omrids
   2.8 farvestyrke og -tone
   2.9 blåt farvestof (anthocyan): til stede eller manglende

3. Plante: (på høststadiet):

   3.1 hoveddannelsestype
   3.2 hovedets profil
   3.3 bladenes tekstur
   3.4 blæredannelse på yderbladene
   3.5 yderbladenes farvestyrke og -tone
   3.6 blåt farvestof (anthocyan) på yderbladene: til stede eller manglende

4. Frø (modent og tørt): farve

5. Klassificering af hoveddannelsens tidlighed

6. Klassificering af stokløbing på lange dage

27. PERSILLE

Petroselinum hortense Hoffm.

1. Løv:

   1.1 højde
   1.2 bladpladens form
   1.3 farve

2. Rodtype

28. PRALBØNNE

Phaseolus coccineus L.

1. Vækstype

2. Blomst: farve

3. Bælg:

   3.1 længde
   3.2 ribber: til stede eller manglende

4. Frø (modent og tørt): farve

29. ALM. HAVEBØNNE

Phaseolus vulgaris L.

1. Kimplante: den hypokotyle stængels farve

2. Vækstype: kryb- eller stangbønne

3. Blad: stilkens farve især ved bladfæstet

4. Blomsterstand:

   4.1 blomstens farve (ensfarvet eller tofarvet)
   4.2 højbladenes størrelse

5. Bælg:

   5.1 længde
   5.2 tværsnit
   5.3 overfladens udseende
   5.4 ribber: til stede eller manglende
   5.5 hinde: til stede eller manglende
   5.6 indsnævring: mellem frøene og i højde med disse
   5.7 bundfarve og overliggende farve
   5.8 griflens længde og form
   5.9 antal frøknopper

6. Frø (modent og tørt):

   6.1 størrelse
   6.2 længdesnittets form
   6.3 tværsnittets form
   6.4 farve (bortset fra navleringen)
   6.5 navleringens farve
   6.6 frøskallens farve
   6.7 årer

7. Tidlighedsklassificering

8. Resistens mod Colletotrichum Lindemuthianum (bønnesyge)

30. ÆRT

Pisum sativum L. (undtagen P. arvense L.)

1. Plante:

   1.1 væksttype (krybært eller haveært)
   1.2 den første blomsterknops udviklingsfølge (dog ikke kimbladknop)

2. Blad:

   2.1 farve
   2.2 pletter på akselbladene: til stede eller manglende

3. Blomsterstand:

   3.1 antal blomster pr. blomsterstand
   3.2 formen på fanebasis: i V-form eller ikke

4. Bælg:

   4.1 længde (i tør tilstand)
   4.2 den frie endes form
   4.3 rygprofil (ved 2. blomsterknop)
   4.4 det grønne frøs farve
   4.5 hinde: til stede eller manglende
   4.6 antal frøknopper

5. Frø (modent og tørt):

   5.1 størrelse
   5.2 form (inkl. udseende)

5.3 frøskallens farve
5.4 kimbladenes farve
5.5 stivelseskornenes form (enkel eller sammensat)

31. RADISE

Raphanus sativus L.

A. Raphanus sativus L. var. niger Pers.

1. Blad: (iagttagelserne rettes mod 4. til 7. blad):
   1.1 længde
   1.2 almindelig form
   1.3 indskæringer
   1.4 bladstilkens farve
   1.5 endesmådækbladets størrelse
   1.6 endesmådækbladets farve
2. Rod:
   2.1 størrelse
   2.2 form
   2.3 halsform
   2.4 halsfarvning
   2.5 rodendens form
   2.6 overhudens udseende
   2.7 overhudens farve
3. Tidlighedsklassificering

B. Raphanus sativus L. var. radicula Pers.

1. Blad: (iagttagelserne rettes mod. 3. blad):
   1.1 længde
   1.2 almindelig form
   1.3 indskæringer
   1.4 farve
2. Rod:
   2.1 form
   2.2 overhudens farve
3. Tidlighedsklassificering

32. SKORZONERROD

Scorzonera hispanica L.

1. Rod:
   1.1 længde
   1.2 form
   1.3 overhudens udseende
   1.4 overhudens farve

33. TOMAT

Solanum lycopersicum L. (Lycopersicum esculentum Mill.)

1. Kimplante: blåt farvestof (anthocyan) på den hypokotyle stængel: til stede eller manglende

2. Væksttype: begrænset eller ubegrænset

3. Bladets form: normale eller hele smådækblade

4. Frugt:
   - 4.1 størrelse[1])
   - 4.2 form[1])
   - 4.3 farve (før modenhedsstadiet)
   - 4.4 farve (på modenhedsstadiet)
   - 4.5 antal frørum[1])

5. Tidlighedsklassificering:
   - 5.1 tidsrummet mellem spiringen og 3. blomsts blomstring i første klase (forsøg på friland)
   - 5.2 tidsrummet mellem blomstringen og modningen[1])

6. Resistens:
   - 6.1 mod Verticillium alboatrum
   - 6.2 mod Fisarium oxysporum

34. AUBERGINE

Solanum melongena L.

1. Kimplante
   - 1.1 blåt farvestof (anthocyan) på den hypokotyle stængel: til stede eller manglende
   - 1.2 kimbladenes vækstform
   - 1.3 kimbladenes form

2. Plante:
   - 2.1 stængelleddenes længde
   - 2.2 det fuldt udviklede blads form
   - 2.3 stængelendernes behåring
   - 2.4 blåt farvestof (anthocyan) på stængelenderne: til stede eller manglende
   - 2.5 tornethed (bedømmes på bægeret)

3. Frugt:
   - 3.1 størrelse
   - 3.2 form
   - 3.3 farve
   - 3.4 glans
   - 3.5 pigmenternes fordeling
   - 3.6 pigmenter under bægeret: til stede eller manglende
   - 3.7 blåt farvestof (anthocyan): til stede eller manglende
   - 3.8 arten af anthocyan
   - 3.9 kødets farve

4. Tidlighedsklassificering: tidsrummet mellem spiringen og blomstringen

---

[1]) 2. og 3. klasses 3. frugt; modenhed vurderes ved farvningens indtræden.

35. SPINAT

Spinacia oleracea L.

1. Plante: væksthastighed

2. Blad (på det stadium hvor de fire første blade er fuldt udviklede):
   - 2.1 bladstilkens vækstform
   - 2.2 bladstilkens længde
   - 2.3 farve

3. Blade (iagttages på det 7. blad på det stadium hvor planterne er fuldt udviklede):
   - 3.1 bladstilkens vækstform
   - 3.2 bladstilkens længde
   - 3.3 farve
   - 3.4 bladpladens form
   - 3.5 bladpladens overflade

4. Frø (modent og tørt): form

5. Stokløbningsklassificering

6. Kønsfordeling

7. Resistens mod Peronospora spinaciae (spinatskimmel)

36. VÅRSALAT

Valerianella locusta (L.) Betcke (v. olitoria Polt.)

1. Plantens højde

2. Blad (på høststadiet):
   - 2.1 vækstform
   - 2.2 form
   - 2.3 farve
   - 2.4 overflade: glat eller ribbet
   - 2.5 behåring: til stede eller manglende
   - 2.6 bladrandens form (iagttages på bladets yderste ende)
   - 2.7 indskæringer: til stede eller manglende

3. Frø (modent og tørt):
   - 3.1 størrelse
   - 3.2 form

4. Tidlighedsklassificering

37. VÆLSK BØNNE (HESTEBØNNE)

Vicia faba major L.

1. Stængel: længde

2. Akselblad: plettet eller ikke plettet

3. Blomst: farve

4. Bælg:
   4.1 stilling
   4.2 længde
   4.3 antal frøknopper

5. Frø (modent og tørt):
   5.1 størrelse
   5.2 almindelig farve
   5.3 tannin: til stede eller manglende
   5.4 navlens farve

38. POPCORN

Zea mays convar. Microsperma Koern.

39. SUKKERMAJS

Zia mays convar. Saccharata Koern.

1. Stængel:
   1.1 blåt farvestof (anthocyan) på bladfæsterne: til stede eller manglende
   1.2 den øverste kolbes indpodningshøjde på hovedstænglen

2. Kolbe:
   2.1 støvfangenes farve (2-3 dage efter fremkomsten)
   2.2 stilkens længde
   2.3 hylsterbladenes længde
   2.4 majskolbens farve (på fuldmodenhedsstadiet)

3. Frø:
   3.1 den høstede frøtype
   3.2 form
   3.3 spidsernes og sidernes farve

4. Tidsrummet mellem spiringen og:
   4.1 hanblomstringen
   4.2 hunblomstringen

BILAG II

A. Almindelige minimumskrav

Nr.	Art	E = enkeltplanter uden forkultur EF = enkeltplanter med forkultur E+P = enkeltplanter og parceller	Antal planter eller parcelareal pr. forsøg		Parceller pr. forsøg	Forsøg pr. år	Tilsåningsår
			Planter	Parceller (m²)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	kepaløg	E+P	150		2	2	2
2	porre	EF	40		2	2	2
3	kørvel						
	a) rødder	E+P	40	—	2	2	2
	b) blade	E+P	—	2	2	2	2
4	selleri	EF	40		2	2	2
5	asparges	EF	20		2	2	1
6	bladbede	E+P	40		2	2	2
7	rødbede	E+P	40		2	2	2
8	grønkål	EF	40		2	2	2
9	blomkål	EF	40		2	2	2
10	broccoli	EF	40		2	2	2
11	rosenkål	EF	40		2	2	2
12	savoykål	EF	40		2	2	2
13	hovedkål	EF	40		2	2	2
14	rødkål	EF	40		2	2	2
15	kålrabi	EF	40[1])		2	2	2
16	majroe høstroe	E	40		2	2	2
17	spansk peber	EF	40[1])		2	2	2
18	kruset endivie bredbladet endivie	EF	40		2	2	2
19	witloof-cikorie (julesalat)	E+P	100		2	2	2
20	vandmelon	EF	20[1])		2	2	2
21	melon	EF	20[1])		2	3	2
22	almindelig agurk lille agurk	E	20[1])		2	2	2
23	mandelgræskar	E	20[2])		2	2	2
24	gulerod	E+P	200[1])		2	2	2
25	fennikel	E+P	40		2	2	2
26	salat	EF	40[1])		2	2	2
27	persille						
	a) blade	E+P	40		2	2	2
	b) rødder	E+P		2	2	2	2
28	pralbønne	E+P	60		2	2	2
29	alm. havebønne						
	a) krybbønnne	E+P	150[1])		2	2	2
	b) stangbønne	E+P	60		2	2	2
30	ært (på støttepinde)	E+P	100		2	2	2
31	radise						
	a) var. niger	E+P	50		2	2	2
	b) var. radicula	E+P	100		2	2	2
32	skorzonerrod	E+P	100		2	2	2
33	tomat	EF	20[1])		2	2	2
34	aubergine	EF	30[1])		2	2	2
35	spinat	E+P	60[1])		2	2	2
36	vårsalat	E+P	60[1])		2	2	2
37	vælsk bønne	E+P	40		2	2	2
38	popcorn	E+P	40		2	2	2
39	sukkermajs	E+P	40		2	2	2

[1]) Det anførte antal halveres, hvis forsøget foretages under glas.
[2]) Det anførte antal halveres, hvis det drejer sig om krybende planter.

B. SÆRLIGE BEMÆRKNINGER

1. Ansøgeren stiller de mængder såsæd til rådighed for de kompetente officielle tjenestegrene, som disse skønner nødvendige til udførelsen af forsøgene og den senere kontrol.

2. Såsæden skal opfylde de betingelser for sås ædskvalitet, der er foreskrevet i bilag II til Rådets direktiv af 29. september 1970 om handel med grønsagsfrø[1])

3. Når det drejer sig om flerårige planter skal forsøgene fortsættes indtil det tidspunkt, da alle kendetegn er blevet iagttaget og noteret mindst én gang.

4. Såfremt det ikke er sikkert, at den i en medlemsstat anvendte undersøgelsesmetode ligeledes anvendes i de andre medlemsstater, skal denne metode anføres.

5. Såfremt antallet af forsøgssteder pr. år ikke overholdes, må antallet af parceller pr. år følgelig forøges.

6. Under kontrollen af slægtskomponenterne kan de i del A anførte minimumskrav nedsættes

1) EFT nr. L 225 12. 10. 1970, s. 7.