Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►**B**

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 256/2002

2002 m. vasario 12 d.

dėl laikino leidimo naudoti naujus priedus, laikino leidimo naudoti priedą pratęsimo ir nuolatinio leidimo naudoti pašarų priedą

(tekstas svarbus EEE)

(OL L 41, 2002 2 13, p. 6)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►**M1**	2007 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1143/2007	L 256	23	2007 10 2
►**M2**	2015 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1399	L 217	1	2015 8 18

▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 256/2002

2002 m. vasario 12 d.

dėl laikino leidimo naudoti naujus priedus, laikino leidimo naudoti priedą pratęsimo ir nuolatinio leidimo naudoti pašarų priedą

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų ([1]) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2205/2001 ([2]), ypač į jos 3, 9d ir 9e straipsnius,

kadangi:

(1) Direktyvoje 70/524/EEB yra numatyta, kad persvarsčius paraišką, pateiktą remiantis tos direktyvos 4 straipsnio nuostatomis, gali būti leidžiama naudoti naujus priedus ar nauja paskirtimi senuosius.

(2) Direktyvos 70/524/EEB 9e straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad gali būti laikinai leidžiama naudoti naujus priedus arba naujai paskirčiai senuosius, jei laikomasi šios direktyvos 3a straipsnio b–e punktų reikalavimų ir jeigu, atsižvelgiant į turimus rezultatus, galima pagrįstai daryti prielaidą, kad naudojami pašaruose jie turi vieną iš 2 straipsnio a punkte nurodytų poveikių. Minėtos direktyvos C priedo II dalyje nurodytiems priedams šis laikinas leidimas suteikiamas ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui.

(3) Įvertinus pateiktus dokumentus dėl I priede aprašytų birumą gerinančių medžiagų „natrio ferocianido“ ir „kalio ferocianido“ paaiškėjo, kad šie priedai atitinka anksčiau minėtus reikalavimus. 2001 m. gruodžio 3 d. Gyvūnų mitybos mokslinis komitetas (SCAN) pateikė palankią nuomonę dėl birumą gerinančių medžiagų saugumo. Todėl laikinai, ne ilgiau kaip ketverius metus, jas turėtų būti leidžiama naudoti.

(4) Komisijos reglamente (EB) Nr. 937/2001 ([3]) pratęstas laikinas leidimas naudoti mikroorganizmų preparatą *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40 112; Toyocerin®), skirtą mėsiniams viščiukams, dedeklėms vištoms, veršeliams, penimiems galvijams, patelėms ir penimiems triušiams. Leidimas suteiktas iki 2002 m. kovo 1 d., kad pakaktų laiko iš naujo įvertinti padermės atsparumą tetraciklinui, kaip to reikalauja SCAN, atsižvelgdamas į informaciją, gautą nuo to laiko, kai ši medžiaga buvo pirmą kartą laikinai patvirtinta.

(5) Reikalingus duomenis Komisija gavo 2001 m. rugsėjo 17 d. Remdamasis jais, SCAN savo ataskaitoje apie produktą Toyocerin®, patvirtintoje 2001 m. gruodžio 5 d., padarė išvadą, kad, įvertinus pateiktus dokumentus, minimą produktą galima lakyti saugiu toksinų susidarymo ir atsparumo antibiotikams atžvilgiu.

([1]) OL L 270, 1970 12 14, p. 1.
([2]) OL L 297, 2001 11 15, p. 3.
([3]) OL L 130, 2001 5 12, p. 25.

▼B

(6) Po to, kai Komisija, remdamasi naujais duomenimis, įsitikino, kad yra laikomasi Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnio b–e punktų reikalavimų, laikiną leidimą naudoti preparatą *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40 112) mėsiniams viščiukams, dedeklėms vištoms, veršeliams, penimiems galvijams, patelėms ir penimiems triušiams šerti reikėtų suteikti likusiai didžiausio leistino penkerių metų laikotarpio daliai. Atsižvelgiant į tai, kad laikinas leidimas nuo 2001 m. vasario 21 d. iki 2001 m. gegužės 31 d. buvo laikinai sustabdytas, jis turėtų baigtis 2004 m. spalio 7 d.

(7) Laikinas leidimas mikroorganizmų preparatą *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40 112) naudoti šeriant paršelius, kiaules ir paršavedes baigėsi 1999 m. balandžio 21 d., pasibaigus didžiausiam leistinam penkerių metų laikotarpiui.

(8) Savo ataskaitoje apie produktą Toyocerin®, patvirtintoje 2001 m. gruodžio 5 d., SCAN patvirtino, kad šis produktas, naudojamas šeriant paršelius, kiaules ir paršavedes, atitinka Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnio b–e punktų reikalavimus. Be to, SCAN ataskaitoje yra padaryta palanki išvada dėl Toyocerin® veiksmingumo paršeliams iki dviejų mėnesių ir paršavedėms.

(9) Dėl to, kad laikomasi visų Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnio reikalavimų, turėtų būti suteiktas nuolatinis leidimas naudoti mikroorganizmų preparatą *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40 112) paršeliams ir paršavedėms šerti laikantis III priede aprašytų sąlygų.

(10) Įvertinus dokumentus paaiškėjo, kad, norint apsaugoti darbuotojus nuo priedų poveikio, gali būti reikalaujama laikytis tam tikros tvarkos. Tačiau minėtą apsaugą turėtų užtikrinti 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti ([1]) taikymas.

(11) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

I priede išvardytus „rišiklių, birumą gerinančių medžiagų ir koaguliantų“ grupei priskiriamus priedus leidžiama naudoti kaip pašarų priedus laikantis minėtame priede nustatytų reikalavimų.

2 straipsnis

Laikinas leidimas naudoti II priede nurodytą „mikroorganizmų“ grupei priskiriamą preparatą pratęsiamas laikantis tame priede nustatytų reikalavimų.

([1]) OL L 183, 1989 6 29, p. 1.

▼M2

———————

▼B

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼B

I PRIEDAS

Rišikliai, birumą gerinančios medžiagos ir koaguliantai

Nr. (arba ES Nr.)	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma	Didžiausia norma	Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					mg/kg visaverčių pašarų	mg/kg visaverčių pašarų		
E 535	Natrio ferocianidas	$Na_4[Fe(CN)_6]\cdot 10H_2O$	Visos rūšys arba kategorijos	–	–	–	Didžiausias kiekis: 80 mg/kg NaCl (išreikšta ferocianido anijonu)	2006 3 1
E 536	Kalio ferocianidas	$K_4[Fe(CN)_6]\cdot 3H_2O$	Visos rūšys arba kategorijos	–	–	–	Didžiausias kiekis: 80 mg/kg NaCl (išreikšta ferocianido anijonu)	2006 3 1

▼B

II PRIEDAS

Mikroorganizmai

Nr. (arba ES Nr.)	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma	Didžiausia norma	Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					KSV/kg visaverčių pašarų	KSV/kg visaverčių pašarų		
1	*Bacillus cereus* var. *toyoi* NCIMB 40112/CNCM/I-1012	*Bacillus cereus* var. *toyoi* preparatas, turintis mažiausiai 1 x 10^{10} KSV/g priedo	Mėsiniai viščiukai	–	0,2 x 10^9	1 x 10^9	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant Gali būti naudojamas kombinuotuosiuose pašaruose, kuriuose yra šių leistinų kokcidiostatų: natrio monenzino, natrio lasalocido, natrio salinomicino, dekokvinato, robenido, narazino, halofuginono	2004 10 7
			Dedeklės vištos	–	0,2 x 10^9	1 x 10^9	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant	2004 10 7
			Veršeliai	6 mėn.	0,5 x 10^9	1 x 10^9	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant	2004 10 7

▼B

Nr. (arba ES Nr.)	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma	Didžiausia norma	Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					KSV/kg visaverčių pašarų	KSV/kg visaverčių pašarų		
			Penimi galvijai	–	$0,2 \times 10^9$	$0,2 \times 10^9$	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant *Bacillus cereus* var. *toyoi*dienos raciono kiekis neturi viršyti $1,0 \times 10^9$ KSV 100 kg kūno svorio. Kiekvienam papildomam 100 kg kūno svorio pridėkite $0,2 \times 10^9$ KSV	2004 10 7
			Veislinės patelės	–	$0,1 \times 10^9$	5×10^9	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant Gali būti naudojamas kombinuotuosiuose pašaruose, kuriuose yra šių leistinų kokcidiostatų: robenidino	2004 10 7
			Penimi triušiai	–	$0,1 \times 10^9$	5×10^9	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant Gali būti naudojamas kombinuotuosiuose pašaruose, kuriuose yra šių leistinų kokcidiostatų: robenidino, natrio salinomicino	2004 10 7

▼M2