KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1812/2005

(2005. gada 4. novembris),

ar ko groza Regulas (EK) Nr. 490/2004, 1288/2004, 521/2005 un 833/2005 attiecībā uz atļaujas nosacījumiem dažām dzīvnieku barības piedevām no fermentu un mikroorganismu grupas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām [1], un jo īpaši tās 3. pantu un 9.d panta 1. punktu un 9.e panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām [2], un jo īpaši tās 25. pantu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 paredzētas atļaujas piedevu izmantošanai dzīvnieku ēdināšanā.

(2) Regulas (EK) Nr. 1831/2003 25. pantā noteikti pārejas posma pasākumi lopbarības piedevu atļauju pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas dienas.

(3) Atļaujas pieteikumi piedevām, kas uzskaitītas šīs Regulas pielikumos, tika iesniegti pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 stāšanās spēkā.

(4) Sākotnējās piezīmes par šiem pieteikumiem saskaņā ar Direktīvas 70/524/EEK 4. panta 4. punktu Komisijai tika iesniegtas pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas dienas. Tādējādi minētie pieteikumi jāizskata saskaņā ar Direktīvas 70/524/EEK 4. pantu.

(5) Pagaidu atļauja uz 4 gadiem zirgu barībā izmantot *Saccharomyces cerevisiae* (CBS 493.94) mikroorganismu preparātu pirmo reizi tika dota ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 490/2004 [3]. Iesniegti jauni dati šā preparāta kolonijveidotāju vienību (CFU) minimālā satura paaugstināšanas pamatošanai ailē "ķīmiskais sastāvs, apraksts", atstājot bez izmaiņām atļaujas nosacījumos noteikto minimālo, maksimālo un ieteicamo saturu kompleksajā barībā. To novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Tāpēc šā mikroorganismu preparāta izmantošana kā noteikts I pielikumā, jāatļauj līdz 2008. gada 20. martam.

(6) Beztermiņa atļauja teļu un gaļas liellopu barībā izmantot *Saccharomyces cerevisiae* (CBS 493.94) mikroorganismu preparātu dota ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1288/2004 [4]. Iesniegti jauni dati šā preparāta kolonijveidotāju vienību *(CFU)* minimālā satura paaugstināšanas pamatošanai, kas norādīts ailē "ķīmiskais sastāvs, apraksts", atstājot bez izmaiņām atļaujas nosacījumos noteikto minimālo, maksimālo un ieteicamo saturu kompleksajā barībā. To novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Tāpēc šo mikroorganismu preparātu kā noteikts II pielikumā, jāatļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

(7) Beztermiņa atļauja gaļas cāļu barībā izmantot no *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) iegūtu endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, no *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) iegūtu endo-1,4-beta-ksilanāzes un no *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) iegūtu subtilizīna fermentu preparātu Nr. E 1623 dota ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 521/2005 [5]. Iesniegti jauni dati šā fermentu preparāta minimālās aktivitātes izmaiņu pamatošanai, kas norādīti ailē "ķīmiskais sastāvs, apraksts", atstājot bez izmaiņām atļaujas nosacījumos noteikto minimālo, maksimālo un ieteicamo saturu kompleksajā barībā. To novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Tādējādi minēto fermentu preparātu kā noteikts III pielikumā, jāatļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

[1] OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1800/2004 (OV L 317, 16.10.2004., 37. lpp.).

[2] OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regula grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

[3] OV L 79, 17.3.2004., 23. lpp.

[4] OV L 243, 15.7.2004., 10. lpp.

[5] OV L 84, 2.4.2005., 3. lpp.

(8) Beztermiņa atļauja nobarojamo cūku barībā izmantot no *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) iegūtu endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un no *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) iegūtu endo-1,4-beta-ksilanāzes fermentu preparātu Nr. E 1627 dota ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 833/2005 ([1]). Iesniegti jauni dati šā preparāta sastāva izmaiņu pamatošanai, kas norādīti ailē "ķīmiskais sastāvs, apraksts", atstājot bez izmaiņām atļaujas nosacījumos noteikto minimālo, maksimālo un ieteicamo saturu kompleksajā barībā. To novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Tādēļ minēto fermentu preparātu, kas norādīts IV pielikumā, jāatļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

(9) Tāpēc attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 490/2004, 1288/2004, 521/2005 un 833/2005.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 490/2004 pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1288/2004 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Regulas (EK) Nr. 521/2005 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikumu.

4. pants

Regulas (EK) Nr. 833/2005 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu.

5. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Markos KYPRIANOU

([1]) OV L 138, 1.6.2005., 5. lpp.

I PIELIKUMS

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskais sastāvs, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					CFU/kg kompleksās lopbarības			
Mikroorganismi								
5	*Saccharomyces cerevisiae* CBS 493.94	*Saccharomyces cerevisiae* preparāts, kas satur vismaz 1×10^9 *CFU*/g piedevas	Zirgi	—	4×10^9	$2,5 \times 10^{10}$	Piedevas un premiksa lietošanas instrukcijā jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un stabilitāte pēc granulēšanas. *Saccharomyces cerevisiae* daudzums dienas devā nedrīkst pārsniegt $4,17 \times 10^{10}$ *CFU* uz 100 kg dzīvsvara. Atļauts sākt izmantot 2 mēnešus pēc atšķiršanas	20.3.2008

II PIELIKUMS

Ierakstu par E 1704 Regulas (EK) Nr. 1288/2004 I pielikumā aizstāj ar šādu:

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskais sastāvs, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					CFU/kg kompleksās lopbarības			
Mikroorganismi								
"E 1704	*Saccharomyces cerevisiae* CBS 493.94	*Saccharomyces cerevisiae* preparāts, kas satur vismaz 1×10^9 CFU/g piedevas	Teļi	6 mēn.	2×10^8	2×10^9	Piedevas un premiksa lietošanas instrukcijā jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un stabilitāte pēc granulēšanas	Beztermiņa
			Gaļas liellopi	—	$1{,}7 \times 10^8$	$1{,}7 \times 10^8$	Piedevas un premiksa lietošanas instrukcijā jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un stabilitāte pēc granulēšanas *Saccharomyces cerevisiae* daudzums dienas devā nedrīkst pārsniegt $7{,}5 \times 10^8$ *CFU* uz 100 kg dzīvsvara Pievienot 1×10^8 *CFU* uz katriem papildu 100 kg dzīvsvara	Beztermiņa"

III PIELIKUMS

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskais sastāvs, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Aktivitātes vienības/1 kg kompleksās barības			
Fermenti								
E 1623	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Subtilizīns EC 3.4.21.62	No *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) iegūtas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, no *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes un no *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) iegūta subtilizīna preparāts ar šādu minimālo aktivitāti: endo-1,3(4)-beta-glikanāzes – 200 U [1]/g endo-1,4-beta-ksilanāzes – 5 000 U [2]/g subtilizīna – 1 600 U [3]/g	Gaļas cāļi	—	endo-1,3(4)-beta-glikanāzes: 25 U endo-1,4-beta-ksilanāzes: 625 U subtilizīna: 200 U	— — —	1. Piedevas un premiksa lietošanas instrukcijā jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un stabilitāte pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz 1 kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāzes: 25–100 U endo-1,4-beta-ksilanāzes: 625–2 500 U subtilizīna: 200–800 U 3. Izmantošana barības maisījumos, piemēram, maisījumos, kas satur vairāk nekā 30 % kviešu un 10 % miežu.	Beztermiņa

[1] 1 U ir fermenta daudzums, kas no miežu beta-glikāna fermentatīvās noārdīšanas rezultātā vienā minūtē 30°C temperatūrā pie pH 5,0 izdala 1 mikromolu reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentos).
[2] 1 U ir fermenta daudzums, kas no auzu pelavu ksilāna fermentatīvās noārdīšanas rezultātā vienā minūtē 50°C temperatūrā pie pH 5,3 izdala 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentos).
[3] 1 U ir fermenta daudzums, kas no kazeīna substrāta fermentatīvās noārdīšanas rezultātā vienā minūtē 40°C temperatūrā pie pH 7,5 izdala 1 mikrogramu fenolu (tirozīna ekvivalentos).

IV PIELIKUMS

Ierakstu par E 1627 Regulas (EK) Nr. 833/2005 pielikumā aizstāj ar šādu:

"E 1627	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	No *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un no *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: pulvera veidā – endo-1,3(4)-beta-glikanāzes: 800 U [1]/g endo-1,4-beta-ksilanāzes: 800 U [2]/g šķidruma veidā – endo-1,3(4)-beta-glikanāzes: 800 U/ml endo-1,4-beta-ksilanāzes: 800 U/ml	Nobarojamās cūkas	—	endo-1,3(4)-beta-glikanāzes: 400 U endo-1,4-beta-ksilanāzes: 400 U	— —	1. Piedevas un premiksa lietošanas instrukcijā jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un stabilitāte pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz 1 kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāzes: 400 U endo-1,4-beta-ksilanāzes: 400 U 3. Izmantošanai barības maisījumos, kuros ir daudz polisaharīdu, izņemot cieti (galvenokārt beta-glikānu un arabinoksilānu), piemēram, maisījumos, kas satur vairāk par 65 % miežu	Beztermiņa

([1]) 1 U ir fermenta daudzums, kas no miežu beta-glikāna substrāta fermentatīvās noārdīšanas rezultātā vienā minūtē 30 °C temperatūrā pie pH 5,0 izdala 1 mikrogramu reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentos).
([2]) 1 U ir fermenta daudzums, kas no miežu beta-glikāna substrāta fermentatīvās noārdīšanas rezultātā vienā minūtē 50 °C temperatūrā pie pH 5,3 izdala 1 mikrogramu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentos)."