KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 721/2008,

25. juuli 2008,

millega antakse luba punase karotenoidi rikka bakteri *Paracoccus carotinifaciens* abil saadud valmistise kasutamiseks söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ([1]) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise alused ja menetlused.

(2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus käesoleva määruse lisas kirjeldatud valmistise kasutamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(3) Taotluses käsitletakse punase karotenoidi rikka bakteri *Paracoccus carotinifaciens* (NITE SD 00017) kuivatatud surmatud rakkudest saadud valmistise lubamist lõhede ja forellide söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooria „organoleptilised lisandid" alla.

(4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet") jõudis 18. septembri 2007. aasta arvamuses järeldusele, et punase karotenoidi rikka bakteri *Paracoccus carotinifaciens* (NITE SD 00017) kuivatatud surmatud rakkudest saadud valmistis ei avalda kahjulikku mõju inimeste ja loomade tervisele ja keskkonnale ning mõjutab soodsalt loomsete toiduainete omadusi. ([2]) Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et valmistis ei põhjusta muid ohte, mis võiksid määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 5 lõike 2 alusel välistada loa andmist selle kasutamiseks. Toiduohutusamet andis soovituse piirnormide kohta. Toiduohutusameti arvates ei ole vaja turustusjärgse järelevalve erinõudeid. Kõnealuses arvamuses kinnitatakse ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse referentlabori aruanne söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(5) Kõnealuse valmistise hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid" ja funktsionaalrühma a „värvained" alarühma ii „ained, mis loomadele söötmise korral annavad loomse päritoluga toidule värvuse", lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

([1]) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

([2]) Scientific Opinion of the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) on a request from the European Commission on safety and efficacy of Panaferd-AX (red carotenoid-rich bacterium *Paracoccus carotinifaciens*) as feed additive for salmon and trout. *The EFSA Journal* (2007) 546, p. 1–30.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. juuli 2008

Komisjoni nimel
komisjoni liige
Androulla VASSILIOU

LISA

Lisandi identifitseerimisnumber	Lisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Jääkide piirnormid asjaomases loomset päritolu toiduaines	Loa kehtivusaja lõpp
					mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %				
Organoleptiliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: värvained: ained, mis loomadele söötmise korral annavad loomse päritoluga toidule värvuse									
2a(ii) 167	Punase karotenoidi rikas *Paracoccus carotinifaciens*	*Toimeained:* astaksantiin ($C_{40}H_{52}O_4$, CASi nr: 472-61-7) adonirubiin ($C_{40}H_{52}O_3$, 3-hüdroksü-ß,ß-karoteen-4,4′-dioon, CASi nr: 511-23801) kantaksantiin ($C_{40}H_{52}O_2$, CASi nr: 514-78-3) *Söödalisandi koostis:* Kuivatatud surmatud *Paracoccus carotinifaciens*'i (NITE SD 00017) rakkude valmistis, mis sisaldab: — 20–23 g/kg astaksantiini — 10–15 g/kg adonirubiini — 3–5 g/kg kantaksantiini *Analüüsimeetodid:* Kõrgefektiivne normaalfaasi vedelikkromatograafia ultraviolett- ja nähtava valguse detektsiooniga astaksantiini, adonirubiini ja kantaksantiini määramiseks söödas ja kalakoes (1)	Lõhe ja forell	—	—	100	1. Maksimumsisaldus esitatakse astaksantiini, adonirubiini ja kantaksantiini summaarse sisaldusena. 2. Kasutamine lubatud alates vanusest kuus kuud või alates kaalust 50 g. 3. Lisandi segamine astaksantiini või kantaksantiiniga on lubatud, kui muudest allikatest pärineva astaksantiini, adonirubiini ja kantaksantiini kogusisaldus ei ületa 100 mg/kg täissöödas.	Lõhe puhul: 10 mg/kg adonirubiini ja kantaksantiini kogusisaldus kg-s lihas (märgkaal). Forelli puhul: 8 mg/kg adonirubiini ja kantaksantiini kogusisaldus kg-s lihas (märgkaal).	15.8.2018

(1) Täpsem teave analüüsimeetodite kohta on kättesaadav ühenduse referentlabori veebilehel: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives