REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2209 AL COMISIEI

din 5 septembrie 2024

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1423 în ceea ce privește modificările administrative și modificările minore aduse autorizației Uniunii pentru familia de produse biocide „Hydrogen Peroxide Family 1”

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide ([1]), în special articolul 50 alineatul (2),

întrucât:

(1) La 22 iulie 2022, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1423 al Comisiei ([2]), s-a acordat societății Ecolab Deutschland GmbH o autorizație a Uniunii cu numărul de autorizație EU-0024303-0000 pentru punerea la dispoziție pe piață și utilizarea familiei de produse biocide „Hydrogen Peroxide Family 1”.

(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013 al Comisiei ([3]) prevede normele procedurale pentru diferitele categorii de modificări menționate la articolul 50 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. La primirea unui aviz din partea Agenției Europene pentru Produse Chimice („agenția”) cu privire la o cerere din partea unui titular al unei autorizații a Uniunii prin care se urmărește modificarea oricăreia dintre informațiile transmise pentru cererea inițială de autorizare, Comisiei îi revine sarcina să decidă dacă sunt îndeplinite în continuare condițiile prevăzute la articolul 19 sau, după caz, la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 și dacă este necesară modificarea termenilor și a condițiilor autorizației.

(3) La 28 septembrie 2022, Ecolab Deutschland GmbH a transmis agenției o notificare, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013, privind modificări administrative ale autorizației Uniunii pentru familia de produse biocide „Hydrogen Peroxide Family 1”, astfel cum se menționează în titlul 1 din anexa la respectivul regulament. Societatea Ecolab Deutschland GmbH a propus adăugarea denumirilor comerciale pentru cinci produse biocide din familie, adăugarea a patru producători și modificarea detaliilor administrative pentru doi producători. Notificarea a fost înregistrată cu numărul de caz BC-RU080137-08 în Registrul produselor biocide (denumit în continuare „registrul”).

(4) La 13 octombrie 2022, Ecolab Deutschland GmbH a transmis agenției, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013, o cerere de modificare minoră a autorizației Uniunii pentru familia de produse biocide „Hydrogen Peroxide Family 1”, astfel cum se menționează în titlul 2 din anexa la respectivul regulament. Ecolab Deutschland GmbH a depus o cerere de prelungire de la șase la 18 luni a perioadei de valabilitate a produselor din meta-rezumatul caracteristicilor produsului biocid (RCP) 8. Cererea a fost înregistrată în Registrul produselor biocide cu numărul de caz BC-SX080682-96.

([1]) JO L 167, 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1423 al Comisiei din 22 iulie 2022 de acordare a unei autorizații din partea Uniunii pentru familia de produse biocide „Hydrogen Peroxide Family 1” (JO L 222, 26.8.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1423/oj).

([3]) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013 al Comisiei din 18 aprilie 2013 privind modificări ale produselor biocide autorizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 109, 19.4.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) La 5 decembrie 2022, Ecolab Deutschland GmbH a mai transmis agenției o cerere, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013, de modificare minoră a autorizației Uniunii pentru familia de produse biocide „Hydrogen Peroxide Family 1”. În cererea respectivă, societatea Ecolab Deutschland GmbH a solicitat adăugarea mai multor materiale de ambalare și dimensiuni ale ambalajului pentru produsele din meta-RCP 1, 5 și 11, adăugarea unor noi materiale de ștergere pentru produsele din meta-RCP 1 și eliminarea unui material de ambalare pentru produsele din meta-RCP 1. Cererea a fost înregistrată în Registrul produselor biocide cu numărul de caz BC-SR082474-07.

(6) La 4 noiembrie 2022, agenția a transmis Comisiei un aviz ([4]) cu privire la modificările administrative notificate, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013, împreună cu un rezumat revizuit al caracteristicilor produsului biocid. Avizul concluzionează că modificările autorizației existente solicitate de titularul autorizației se încadrează la articolul 3 alineatul (1) litera (aa) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 și că, după punerea în aplicare a modificărilor, condițiile prevăzute la articolul 19 din regulamentul respectiv sunt, în continuare, îndeplinite.

(7) La 11 octombrie 2023, agenția a transmis Comisiei avizele Comitetului pentru produse biocide ([5]) cu privire la cele două cereri de modificări minore, în conformitate cu articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013, împreună cu un rezumat revizuit al caracteristicilor produsului biocid și un raport de evaluare revizuit. Concluzia ambelor avize este că, după punerea în aplicare a modificărilor, condițiile prevăzute la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 sunt îndeplinite în continuare.

(8) La 10 noiembrie 2023, agenția a transmis Comisiei rezumatul revizuit al caracteristicilor produsului biocid din autorizația Uniunii pentru familia de produse biocide „Hydrogen Peroxide Family 1”, în toate limbile oficiale ale Uniunii, incluzând toate modificările administrative și modificările minore notificate și solicitate, în conformitate cu articolul 11 alineatul (6) și cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013.

(9) Comisia este de acord cu avizele agenției și, prin urmare, consideră că este oportun să se modifice autorizația Uniunii pentru familia de produse biocide „Hydrogen Peroxide Family 1” în vederea introducerii modificărilor administrative și modificărilor minore solicitate de societatea Ecolab Deutschland GmbH.

(10) Cu excepția modificărilor administrative și a modificărilor minore, toate celelalte informații incluse în rezumatul caracteristicilor produsului biocid „Hydrogen Peroxide Family 1”, astfel cum figurează în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1423, rămân neschimbate.

(11) Pentru o claritate sporită și pentru a se facilita accesul utilizatorilor și al părților interesate la versiunea consolidată finală a rezumatului caracteristicilor produsului biocid, care urmează să fie publicată de agenție, este necesar ca anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1423 să fie înlocuită în întregime.

(12) Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1423 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1423 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

([4]) *ECHA Opinion of 4 November 2022 on the administrative change of the Union authorisation of the biocidal product family: Hydrogen Peroxide Family 1* (Avizul ECHA din 4 noiembrie 2022 privind modificarea administrativă a autorizației Uniunii pentru familia de produse biocide „Hydrogen Peroxide Family 1”), aviz nr. UAD-C-1622642-38-00/F, https://echa.europa.eu/documents/10162/3443008/opinion_for_ua-admin_changes_bc-ru080137-08_en.pdf/469baca4-81c1-8874-38b5-9c2527e91b22?t=1686113940831.

([5]) *Opinion of the Biocidal Products Committee of 10 October 2023 on the minor change to the Union authorisation of the biocidal product family 'Hydrogen Peroxide Family 1'* (Avizul Comitetului pentru produse biocide din 10 octombrie 2023 privind modificarea minoră a autorizației Uniunii pentru familia de produse biocide „Hydrogen Peroxide Family 1”), ECHA/BPC/398/2023, https://echa.europa.eu/documents/10162/79839763/hydrogen_peroxide_fam1_ua_mic_bc_SX080682_96_final_bpc_opinion_en.pdf/cd4031f2-7320-012f-abf1-f2a3cde1b836?t=1714715369299, și *Opinion of the Biocidal Products Committee of 10 October 2023 on the minor change to the Union authorisation of the biocidal product family 'Hydrogen Peroxide Family 1'* (Avizul Comitetului pentru produse biocide din 10 octombrie 2023 privind modificarea minoră a autorizației Uniunii pentru familia de produse biocide „Hydrogen Peroxide Family 1”), ECHA/BPC/399/2023, https://echa.europa.eu/documents/10162/3443008/hydrogen_peroxide_fam1_ua_mic_bc_SR082474_07_final_bpc_opinion_en.pdf/f2800274-60a5-ec70-011b-57a6ab561b7e?t=1714716331548.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 septembrie 2024.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru o familie de produse biocide

Hydrogen Peroxide Family 1

Tip(uri) de produs

TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

TP 3: Igienă veterinară

TP 1: Igienă umană

TP 4: Industria alimentară și a furajelor

Numărul autorizației EU-0024303-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP EU-0024303-0000

PARTE I.

PRIMUL NIVEL DE INFORMARE

Cap. 1. **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Denumirea familiei de produse**

Denumire	Hydrogen Peroxide Family 1

1.2. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale TP 4: Industria alimentară și a furajelor TP 3: Igienă veterinară TP 1: Igienă umană

1.3. **Deținătorul autorizației**

Denumirea și adresa deținătorului autorizației	Denumire	Ecolab Deutschland GmbH
	Adresă	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein DE
Numărul autorizației	EU-0024303-0000	
Numărul deciziei de reglementare R4BP	EU-0024303-0000	
Data autorizației	15 septembrie 2022	
Data de expirare a autorizației	31 august 2032	

1.4. **Producătorul (producătorii) produsului**

Denumirea producătorului	Ecolab Europe GmbH
Adresa producătorului	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Elveția
Adresa locurilor de producție	Ecolab Europe GmbH site 1 A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Germania Ecolab Europe GmbH site 2 ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Bizkaia Spania

	Ecolab Europe GmbH site 3 ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Zaragoza Spania
	Ecolab Europe GmbH site 4 ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
	Ecolab Europe GmbH site 5 Arkema GmbH Morschheimer Srtrasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Germania
	Ecolab Europe GmbH site 6 AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. 2800 Kgs Lyngby Danemarca
	Ecolab Europe GmbH site 7 Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Ljubljana Slovenia
	Ecolab Europe GmbH site 8 BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moscova Federația Rusă
	Ecolab Europe GmbH site 9 BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH159LH Burgess Hill Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
	Ecolab Europe GmbH site 10 BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon sur Saône Cedex Franța
	Ecolab Europe GmbH site 11 Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Italia
	Ecolab Europe GmbH site 12 BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron Franța
	Ecolab Europe GmbH site 13 BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Austria
	Ecolab Europe GmbH site 14 BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/ Heilbronn Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Muehlheim Germania
	Ecolab Europe GmbH site 15 BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Germania
	Ecolab Europe GmbH site 16 BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Muehlheim Germania
	Ecolab Europe GmbH site 17 BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Danemarca
	Ecolab Europe GmbH site 18 Brenntag Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Danemarca
	Ecolab Europe GmbH site 19 BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville Franța
	Ecolab Europe GmbH site 20 BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Polonia
	Ecolab Europe GmbH site 21 Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo 28906 Madrid Spania
	Ecolab Europe GmbH site 22 BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Basel Elveția
	Ecolab Europe GmbH site 23 Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhause Germania
	Ecolab Europe GmbH site 24 Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Düsseldorf Germania
	Ecolab Europe GmbH site 25 Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 Comitatul Cork Irlanda
	Ecolab Europe GmbH site 26 COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Germania
	Ecolab Europe GmbH site 27 COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. "COFARCAS" Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos Spania

	Ecolab Europe GmbH site 28 COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARCELONA Spania
	Ecolab Europe GmbH site 29 COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL Franța
	Ecolab Europe GmbH site 30 DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Israel
	Ecolab Europe GmbH site 31 Denteck BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Țările de Jos
	Ecolab Europe GmbH site 32 DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (INSULELE BALEARE) Spania
	Ecolab Europe GmbH site 33 ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Germania
	Ecolab Europe GmbH site 34 ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Girona Spania
	Ecolab Europe GmbH site 35 ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Franța
	Ecolab Europe GmbH site 36 ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Cisterna di Latina Italia
	Ecolab Europe GmbH site 37 ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
	Ecolab Europe GmbH site 38 ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
	Ecolab Europe GmbH site 39 ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATENA Grecia
	Ecolab Europe GmbH site 40 ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Slovenia
	Ecolab Europe GmbH site 41 ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Țările de Jos
	Ecolab Europe GmbH site 42 ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Malta
	Ecolab Europe GmbH site 43 ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Țările de Jos
	Ecolab Europe GmbH site 44 ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Italia
	Ecolab Europe GmbH site 45 ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Italia
	Ecolab Europe GmbH site 46 ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikummuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Finlanda
	Ecolab Europe GmbH site 47 ECL Tessenderlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessenderlo Belgia
	Ecolab Europe GmbH site 48 Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
	Ecolab Europe GmbH site 49 EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle Franța
	Ecolab Europe GmbH site 50 Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Germania
	Ecolab Europe GmbH site 51 F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Franța

	Ecolab Europe GmbH site 52 Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
	Ecolab Europe GmbH site 53 GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Spania
	Ecolab Europe GmbH site 54 GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Țările de Jos
	Ecolab Europe GmbH site 55 HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt StroiTel ei Russia 413116 Engels Federația Rusă
	Ecolab Europe GmbH site 56 Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Germania
	Ecolab Europe GmbH site 57 INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Tosno - Leningradskaya Federația Rusă
	Ecolab Europe GmbH site 58 JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Portugalia
	Ecolab Europe GmbH site 59 Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Germania
	Ecolab Europe GmbH site 60 Kompak Nederland B.V. Ambachtsweg 4, 4854 MK, Bavel Țările de Jos
	Ecolab Europe GmbH site 61 La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Sevilla Spania
	Ecolab Europe GmbH site 62 LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Franța
	Ecolab Europe GmbH site 63 LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Franța
	Ecolab Europe GmbH site 64 LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Germania
	Ecolab Europe GmbH site 65 Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Germania
	Ecolab Europe GmbH site 66 McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent Spania
	Ecolab Europe GmbH site 67 Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Țările de Jos
	Ecolab Europe GmbH site 68 NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Danemarca
	Ecolab Europe GmbH site 69 PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
	Ecolab Europe GmbH site 70 Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Germania
	Ecolab Europe GmbH site 71 Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Danemarca
	Ecolab Europe GmbH site 72 PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valencia Spania
	Ecolab Europe GmbH site 73 THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
	Ecolab Europe GmbH site 74 QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Spania
	Ecolab Europe GmbH site 75 RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Segade Portugalia
	Ecolab Europe GmbH site 76 ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Franța

	Ecolab Europe GmbH site 77 RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ LAMBOURN Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
	Ecolab Europe GmbH site 78 SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Barcelona Spania
	Ecolab Europe GmbH site 79 Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industries-traße 3 D-86456 Gablingen Germania
	Ecolab Europe GmbH site 80 Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Germania
	Ecolab Europe GmbH site 81 SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Țările de Jos
	Ecolab Europe GmbH site 82 Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
	Ecolab Europe GmbH site 83 Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milano Milano Italia
	Ecolab Europe GmbH site 84 van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Țările de Jos
	Ecolab Europe GmbH site 85 Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry Mory Franța
	Ecolab Europe GmbH site 86 Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset Franța
	Ecolab Europe GmbH site 87 INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Germania
	Ecolab Europe GmbH site 88 Sima Pharma, 54 Avenue de la Plaine, ZI 13106 Rousset Cedex Franța
	Ecolab Europe GmbH site 89 Techtex (Technical Textile Services Ltd) Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silburn Way, Middleton, M24 4NE Manchester Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
	Ecolab Europe GmbH site 90 Helico B.V. Hoogschaijksestraat 31 5374 EC Schaijk Țările de Jos
	Ecolab Europe GmbH site 91 INCARE BV Keizersveld 99 5803 AP Venray Țările de Jos
	Ecolab Europe GmbH site 92 ECL Mullingar Ecolab Ltd (IE). Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Irlanda
	Ecolab Europe GmbH site 93 ECL Mullingar. Ecolab Manufacturing IE Ltd (IE) Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91 Mullingar, Co. Westmeath Westmeath Irlanda
	Ecolab Europe GmbH site 94 ECL Weavergate Site: Nalco Manufacturing Limited, Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich, Cheshire (Postal Address: PO Box 11, Winnington Avenue, Northwich, Cheshire CW8 4DX) Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
	Ecolab Europe GmbH site 95 ECL Weavergate, Ecolab Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
	Ecolab Europe GmbH site 96 ECL Weavergate, Ecolab Manufacturing UK Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

1.5. **Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active**

Substanță activă	Peroxid de hidrogen
Denumirea producătorului	Evonik Degussa Antwerpen NV
Adresa producătorului	Tijsmanstunnel West 2040 Anvers Belgia
Adresa locurilor de producție	Evonik Degussa Antwerpen NV site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Anvers Belgia

Substanță activă	Peroxid de hidrogen
Denumirea producătorului	Evonik Degussa GmbH
Adresa producătorului	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Germania
Adresa locurilor de producție	Evonik Degussa GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Germania

Substanță activă	Peroxid de hidrogen
Denumirea producătorului	Evonik Peroxid GmbH
Adresa producătorului	Industriestraβe 1 9721 Weiβenstein Austria
Adresa locurilor de producție	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestraβe 1 9721 Weiβenstein Austria

Substanță activă	Peroxid de hidrogen
Denumirea producătorului	Evonik Peroxide Netherlands BV
Adresa producătorului	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Țările de Jos
Adresa locurilor de producție	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Țările de Jos

Substanță activă	Peroxid de hidrogen
Denumirea producătorului	Belinka Perkemija D.O.O
Adresa producătorului	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenia
Adresa locurilor de producție	Belinka Perkemija D.O.O site 1 Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenia

Substanță activă	Peroxid de hidrogen
Denumirea producătorului	Solvay Chemie SA
Adresa producătorului	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgia
Adresa locurilor de producție	Solvay Chemie SA site 1 Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgia

Substanță activă	Peroxid de hidrogen
Denumirea producătorului	Solvay Chimica Italia S.p.A
Adresa producătorului	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italia
Adresa locurilor de producție	Solvay Chimica Italia S.p.A site 1 Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italia

Substanță activă	Peroxid de hidrogen
Denumirea producătorului	Solvay Chemicals GmbH
Adresa producătorului	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Germania
Adresa locurilor de producție	Solvay Chemicals GmbH site 1 Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Germania

Substanță activă	Peroxid de hidrogen
Denumirea producătorului	Solvay Interox Limited
Adresa producătorului	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Adresa locurilor de producție	Solvay Interox Limited site 1 Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Substanță activă	Peroxid de hidrogen
Denumirea producătorului	Solvay Chemicals Finland OY
Adresa producătorului	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finlanda
Adresa locurilor de producție	Solvay Chemicals Finland OY site 1 Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finlanda

Substanță activă	Peroxid de hidrogen
Denumirea producătorului	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Adresa producătorului	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugalia
Adresa locurilor de producție	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA site 1 Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugalia

Substanță activă	Peroxid de hidrogen
Denumirea producătorului	Kemira Rotterdam BV
Adresa producătorului	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Țările de Jos
Adresa locurilor de producție	Kemira Rotterdam BV site 1 Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Țările de Jos

Substanță activă	Peroxid de hidrogen
Denumirea producătorului	Kemira Chemical Oy
Adresa producătorului	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlanda
Adresa locurilor de producție	Kemira Chemical Oy site 1 Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlanda

Substanță activă	Peroxid de hidrogen
Denumirea producătorului	Kemira Kemi AB
Adresa producătorului	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Suedia
Adresa locurilor de producție	Kemira Kemi AB site 1 Industrigatan 83 25109 Helsingborg Suedia

Substanță activă	Peroxid de hidrogen
Denumirea producătorului	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
Adresa producătorului	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Franța
Adresa locurilor de producție	ARKEMA France – USINE DE JARRIE site 1 Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Franța

Substanță activă	Peroxid de hidrogen
Denumirea producătorului	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
Adresa producătorului	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Germania
Adresa locurilor de producție	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA site 1 Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Germania

Substanță activă	Peroxid de hidrogen
Denumirea producătorului	Ecolab Europe GmbH
Adresa producătorului	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Germania
Adresa locurilor de producție	Ecolab Europe GmbH site 1 Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Germania

Cap. 2. **COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA FAMILIEI DE PRODUSE**

2.1. **Informații calitative și cantitative despre compoziția familiei de produse**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	1 - 36,75 % (de greutate)
N-propanol	Propan-1-ol	Substanța inactivă	71-23-8	200-746-9	0 - 17,5 % (de greutate)
Acid citric monohidrat	2-hidroxi-propan -1,2,3-acid tricarboxilic	Substanța inactivă	5949-29-1	201-069-1	0 - 0,9 % (de greutate)
Fenoxietanol	2-fenoxieta-nol	Substanța inactivă	122-99-6	204-589-7	0 - 0,9 % (de greutate)
Lauril sulfat de sodiu	Dodecil sul-fat de sodiu	Substanța inactivă	151-21-3	205-788-1	0 - 3,88 % (de greutate)
Acid L-glutamic, derivați N-cocoaci-lici, săruri monosodice	Sodiu;(4S)-4-amino-5-hidroxi-5-oxopenta-noat	Substanța inactivă	68187-32-6	269-087-2	0 - 2 % (de greutate)
Acid sulfuric, mono-C12-14 esteri de alchil, săruri de amoniu (lauril sulfat de amoniu Texapon)	Acid sulfuric, mono-C12-14 esteri de alchil, săruri de amoniu	Substanța inactivă	90583-11-2	292-209-0	0 - 1,12 % (de greutate)

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid fosforic	Acid ortofosforic	Substanța inactivă	7664-38-2	231-633-2	0 - 1,5 % (de greutate)
Acid azotic	Acid azotic	Substanța inactivă	7697-37-2	231-714-2	0 - 3,71 % (de greutate)
Ester fosfat alcool EO	Poli (oxi-1,2-e-tandiil), .alfa.-hidro-.omega.-hidroxi-, mono-C8-10-alchil eteri, fosfați	Substanța inactivă	68130-47-2		0 - 14,625 % (de greutate)
Alchil poliglucozid C8-C10	(3R,4S,5S,6-R)-2-decoxi-6-(hidroxi-metil) oxan-3,4,5--triol	Substanța inactivă	68515-73-1	500-220-1	0 - 6,35 % (de greutate)
Alcooli, C10-C16 etoxilați propoxilați (Dehydol 980)	Alcooli, C10-C16 etoxilați propoxilați	Substanța inactivă	69227-22-1		0 - 3 % (de greutate)
Capryleth-9 acid carboxilic (amestec de acid carboxilic alchil eter)	Poli (oxi-1,2-e-tandiil), .alfa.-(carbo-ximetil)-.omega.-(octiloxi)-(4-11 EO)	Substanța inactivă	53563-70-5		0 - 2,15 % (de greutate)
Hexeth-4 acid carboxilic (amestec de acid carboxilic alchil eter)	Poli (oxi-1,2-e-tandiil), .alfa.-(carbo-ximetil)-.omega.-(hexiloxi)- (3 EO)	Substanța inactivă	105391-15-9		0 - 0,62 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare**

Tip(uri) de formulare	AL Orice alt lichid GW Gel solubil în apă SL Concentrat solubil

PARTE II.

AL DOILEA NIVEL DE INFORMARE - META-RCP(-URI)

Cap. 1. **META-RCP 1 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 1 identificator**

Identificator	Meta SPC: META SPC 1

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-1

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

Cap. 2. **COMPOZIȚIA META RCP 1**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 1**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	6 - 6,6 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 1**

Tip(uri) de formulare	AL Orice alt lichid

Cap. 3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 1**

Fraze de pericol	H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Fraze de precauție	P264: Spălați-vă mâinile bine după utilizare. P280: Purtați echipament de protecție a ochilor. P280: Purtați echipament de protecție a feței. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

Cap. 4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabel 1.

Dezinfectarea camerelor sterile de uz medical, prin pulverizare cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci și ștergere cu șervețele uscate

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: Nu există date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Spori de bacterii Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Pulverizare cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci și ștergere cu șervețele uscate Descriere detaliata: Dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni, a aparatelor și a echipamentelor din camerele sterile de uz medical, clasificate de la gradul A până la D în conformitate cu clasificarea UE privind bunele practici de fabricație (BPF), și din spațiile adiacente. Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de curățenie: — 15 minute pentru bacterii și fungi; — 5 minute pentru levuri; — 60 de minute pentru virusuri și spori de bacterii. Durată de contact pentru pulverizare și ștergere, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru bacterii, levuri și fungi; — 60 de minute pentru virusuri și spori de bacterii.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 10 ml/m^2 Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) sau polietilenă (PE) opacă, 1-5 l Flacon-pulverizator din polipropilenă și polietilenă (PP+PE) opacă, 0,5-5 l

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Pentru rezultate optime, țineți flaconul în poziție verticală și pulverizați de la o distanță de 10-20 cm. Pulverizați produsul pe un șervețel uscat și ștergeți suprafețele de mici dimensiuni, cum ar fi blaturile de lucru și echipamentele, sau pulverizați produsul pe suprafață, după care ștergeți suprafața respectivă cu un șervețel curat și uscat și lăsați să se usuce la aer. Închideți întotdeauna duza după utilizare. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

În timpul manipulării produsului este obligatorie utilizarea de dispozitive de protecție a ochilor.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 1.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 1.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 1.

4.2. **Descrierea utilizării**

Tabel 2.

Dezinfectarea camerelor sterile de uz medical prin ștergere, folosind un mop plat și găleată

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Spori de bacterii Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior

Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată Descriere detaliata: Dezinfectarea podelelor din camerele sterile de uz medical, clasificate de la gradul A până la D în conformitate cu clasificarea UE privind bunele practici de fabricație (BPF), și din spațiile adiacente. Durată de contact pentru spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru bacterii, levuri și fungi; — 60 de minute pentru virusuri și spori de bacterii.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 20 ml/m^2 Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din HDPE sau PE opacă, 0,5-5 l

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicați pe suprafețe cu ajutorul unui mop, apoi lăsați să se usuce la aer.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

În timpul manipulării produsului este obligatorie utilizarea de dispozitive de protecție a ochilor.

Este obligatorie purtarea unui echipament de protecție respiratorie (EPR) cu factor de protecție 10 de către utilizatorii profesioniști care aplică produsul, precum și de către alți utilizatori profesioniști prezenți în zona tratată. Este necesar cel puțin un aparat de purificare a aerului respirat cu cască/glugă/mască (TH1/TM1), sau o mască completă/parțială cu filtru combinat gaz/P2 [tip de filtru (literă de cod, culoare) care să fie specificat de către titularul autorizației, în informațiile referitoare la produs]. În cazul în care se repetă aplicarea sau se reintră în încăpere, utilizatorii profesioniști trebuie să respecte aceleași măsuri de combatere a riscurilor, la fel ca în cazul primei aplicări a produsului în încăpere.

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 1.

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 1.

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 1.

4.3. **Descrierea utilizării**

Tabel 3.

Dezinfectarea camerelor sterile de uz medical, prin ștergere cu șervețele impregnate cu produs gata de utilizare

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Spori de bacterii Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Ștergere cu șervețele impregnate cu produs gata de utilizare Descriere detaliata: Dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni, a aparatelor și a echipamentelor din camerele sterile de uz medical, clasificate de la gradul A până la D în conformitate cu clasificarea UE privind bunele practici de fabricație (BPF), și din spațiile adiacente. Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru bacterii, levuri și fungi; — 60 de minute pentru virusuri și spori de bacterii.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 1 șervețel pentru fiecare m^2 (corespunde unei cantități de 10 ml/m^2) Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pungă din PP sau PET/PE sau EVA/PP sau aluminiu/PE sau pungă din PE opacă, cu 10-100 de șervețele impregnate, din amestec de 45% poliester și 55% celuloză (dimensiunea unui șervețel: 200x200 mm) Pungă din PP sau PET/PE sau EVA/PP sau aluminiu/PE sau pungă din PE opacă, cu 10-100 de șervețele impregnate, din 100% poliester (dimensiunea unui șervețel: 200x200 mm). Pungă din PP sau PET/PE sau EVA/PP sau aluminiu/PE sau pungă din PE opacă, cu 10-100 de șervețele impregnate, din 100% poliester (dimensiunea unui șervețel: 300x300 mm)

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Lăsați suprafața să se usuce la aer după utilizarea produsului. Închideți recipientul după utilizare. Nu utilizați șervețelele uscate. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Nu vă atingeți ochii cu mâinile.

4.3.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 1.

4.3.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 1.

4.3.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 1.

4.4. **Descrierea utilizării**

Tabel 4.

Dezinfectarea camerelor sterile de uz medical, prin ștergere cu mopul, folosind șervețele impregnate pentru podele, gata de utilizare

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Spori de bacterii Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Ștergere cu mopul, folosind șervețele impregnate pentru podele, gata de utilizare Descriere detaliata: Dezinfectarea podelelor din camerele sterile de uz medical, clasificate de la gradul A până la D în conformitate cu clasificarea UE privind bunele practici de fabricație (BPF), și din spațiile adiacente. Durată de contact pentru spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru bacterii, levuri și fungi; — 60 de minute pentru virusuri și spori de bacterii.

Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 1 șervețel pentru fiecare m^2 (corespunde unei cantități de 10 ml/m^2) Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pungă din PP sau PET/PE sau EVA/PP sau aluminiu/PE sau pungă din PE opacă, cu 10-100 de șervețele impregnate, din amestec de 45% poliester și 55% celuloză (dimensiunea unui șervețel: 420x250 mm). Pungă din PP sau PET/PE sau EVA/PP sau aluminiu/PE sau pungă din PE opacă, cu 10-100 de șervețele impregnate, din 100% poliester (dimensiunea unui șervețel: 300x300 mm).

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Lăsați suprafața să se usuce la aer după utilizarea produsului. Închideți recipientul după utilizare. Nu utilizați șervețelele uscate. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Nu vă atingeți ochii cu mâinile.

Este obligatorie purtarea unui echipament de protecție respiratorie (EPR) cu factor de protecție 10 de către utilizatorii profesioniști care aplică produsul, precum și de către alți utilizatori profesioniști prezenți în zona tratată. Este necesar cel puțin un aparat de purificare a aerului respirat cu cască/glugă/mască (TH1/TM1), sau o mască completă/parțială cu filtru combinat gaz/P2 [tip de filtru (literă de cod, culoare) care să fie specificat de către titularul autorizației, în informațiile referitoare la produs]. În cazul în care se repetă aplicarea sau se reintră în încăpere, utilizatorii profesioniști trebuie să respecte aceleași măsuri de combatere a riscurilor, la fel ca în cazul primei aplicări a produsului în încăpere.

4.4.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 1.

4.4.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 1.

4.4.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 1.

Cap. 5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 1**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și respectați toate instrucțiunile furnizate. Curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Produsul trebuie aplicat pe o suprafață curată și uscată. Umeziți complet suprafața cu produs. Nu clătiți suprafața după utilizarea produsului. Nu utilizați pe suprafețe sensibile la agenți oxidanți (de ex., marmură, cupru sau alamă).

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Consultați măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare din meta-RCP 1.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

În cazul contactului cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Solicitați asistență medicală.

În cazul contactului cu pielea: Clătiți cu multă apă.

În caz de înghițire: Clătiți gura. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

În caz de inhalare: Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

MĂSURI DE URGENȚĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Împiedicați pătrunderea produsului în sol, în apele de suprafață sau pânza freatică.

Respectați dispozițiile cu privire la amplasarea mijloacelor de izolare în jurul recipientelor de depozitare.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Produs: Dacă este posibil, este de preferat reciclarea produsului în locul eliminării la gropile de gunoi sau al incinerării. În cazul în care reciclarea nu este posibilă, eliminați produsul cu respectarea reglementărilor naționale. Eliminați deșeurile la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor.

Ambalajele contaminate: Eliminați recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Depozitați în recipiente adecvate, etichetate corespunzător.

Temperatura de depozitare: 0-35 °C

Perioada de valabilitate: 24 luni

Cap. 6. **ALTE INFORMAȚII**

Produsul conține peroxid de hidrogen (Nr. CAS: 7722-84-1), pentru care a fost agreată o valoare europeană de referință de 1.25 mg/m³ pentru uz profesional, iar aceasta a fost utilizată pentru evaluarea riscului prezentat de produs.

Cap. 7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 1**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide	zona Piata: UE
	Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide	zona Piata: UE
	ANIOS H2O2 6% IP STERILE	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0024303-0001 1-1	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	6 % (de greutate)

Cap. 1. **META-RCP 2 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 2 identificator**

Identificator	Meta SPC: META SPC 2

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-2

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale TP 4: Industria alimentară și a furajelor

Cap. 2. **COMPOZIȚIA META RCP 2**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 2**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 2**

Tip(uri) de formulare	AL Orice alt lichid

Cap. 3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 2**

Fraze de pericol	
Fraze de precauție	

Cap. 4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabel 1.

Dezinfectarea suprafețelor de mici și/sau de mari dimensiuni din sectorul industrial (de ex., cantine, toalete) prin pulverizare folosind un pulverizator cu trăgaci și prin ștergere uscată și/sau spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Micobacterii Denumirea comună: Micobacterii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Pulverizare cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci și ștergere cu șervețele uscate Descriere detaliata: Dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni din sectorul industrial. Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii și levuri; — 15 minute pentru fungi; — 60 de minute pentru micobacterii. Metoda: Spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată Descriere detaliata: Dezinfectarea suprafețelor de mari dimensiuni din sectorul industrial. Durată de contact pentru spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii și levuri; — 15 minute pentru fungi; — 60 de minute pentru micobacterii. Metoda: Pulverizare, folosind un pulverizator cu trăgaci, și ștergere cu șervețel uscat, și spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată. Descriere detaliata: Dezinfectarea suprafețelor de mici și de mari dimensiuni din sectorul industrial. Durată de contact pentru pulverizare și spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii și levuri; — 15 minute pentru fungi; — 60 de minute pentru micobacterii.

Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Cantitatea aplicată prin pulverizare: 10 ml/m^2 Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare în cazul pulverizării cu un pulverizator cu trăgaci: până la de 10 ori pe zi per încăpere Frecvența de aplicare: Cantitatea aplicată prin spălare cu mopul: 20 ml/m^2 Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare în cazul ștergerii cu mopul: până la de 2 ori pe zi per încăpere Frecvența de aplicare: Cantitatea aplicată prin pulverizare: 10 ml/m^2; Cantitatea aplicată prin spălare cu mopul: 20 ml/m^2 Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare în cazul în care se combină pulverizarea cu un pulverizator cu trăgaci cu spălarea cu mopul: o dată pe zi per încăpere.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Recipient din HDPE opacă, 1-100 l Canistră din HDPE opacă, 1-100 l Recipient intermediar în vrac (IBC) din HDPE opacă, 600-1000 l Butoi din HDPE opacă, 60-220 l Flacon din HDPE opacă, 0,1-5 l Flacon-pulverizator din HDPE/PE opacă, 0,5-1 l

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Pulverizare: Pentru rezultate optime, țineți flaconul în poziție verticală și pulverizați de la o distanță de 30 cm. Pulverizați produsul pe suprafață, așteptați 5 minute, după care ștergeți suprafața cu un șervețel curat și uscat sau lăsați să se usuce la aer. Închideți întotdeauna duza după utilizare. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

Spălare cu mopul: Eliminați surplusul de apă prin ștergerea podelei cu un mop uscat. Umpleți găleata cu produsul gata de utilizare și distribuiți-l pe podea cu ajutorul unui mop plat. Așteptați 5 minute, după care ștergeți suprafața cu un mop curat și uscat sau lăsați să se usuce la aer.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Pentru pulverizarea suprafețelor mari, sunt valabile următoarele: Suprafața care urmează să fie dezinfectată (în m^2) nu trebuie să fie mai mare de 1/10 din volumul încăperii (în m^3), de ex., într-o încăpere cu un volum de 120 m^3, suprafața maximă care trebuie dezinfectată este de 12 m^2.

Pentru pulverizarea suprafețelor de mici dimensiuni, nu este valabilă măsura specifică de reducere a riscurilor de mai sus.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 2.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 2.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*
Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 2.

4.2. **Descrierea utilizării**

Tabel 2.

Dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni (podele) din sectorul industrial [(de ex., cantine, toalete)] prin spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Micobacterii Denumirea comună: Micobacterii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată Descriere detaliata: Dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni (podele) din sectorul industrial Durată de contact pentru spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii și levuri; — 15 minute pentru fungi; — 60 de minute pentru micobacterii.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 20 ml/m^2 Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Recipient din HDPE opacă, 1-100 l Canistră din HDPE opacă, 1-100 l Container IBC din HDPE opacă, 600-1.000 l Butoi din HDPE opacă, 60-220 l Flacon din HDPE opacă, 0,1-5 l

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Umpleți găleata cu produsul gata de utilizare și distribuiți-l pe podea cu ajutorul unui mop plat, după care ștergeți suprafața cu un mop curat și uscat sau lăsați să se usuce la aer.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Nu există

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 2.

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 2

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 2

4.3. **Descrierea utilizării**

Tabel 3.

Dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni din industria alimentară și a băuturilor, care intră în contact cu alimentele, prin pulverizare folosind un pulverizator cu trăgaci, urmată de ștergere cu un șervețel uscat

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Micobacterii Denumirea comună: Micobacterii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Pulverizare cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci și ștergere cu șervețele uscate Descriere detaliata: Dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni din fabricile de procesare a alimentelor. Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii și levuri. Durată de contact pentru pulverizare și ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii și levuri; — 15 minute pentru fungi; — 60 de minute pentru micobacterii.

Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 10 ml/m^2 Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 10 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Recipient din HDPE opacă, 1-100 l Canistră din HDPE opacă, 1-100 l Container IBC din HDPE opacă, 600-1.000 l Butoi din HDPE opacă, 60-220 l Flacon din HDPE opacă, 0,1-5 l Flacon-pulverizator din HDPE/PE opacă, 0,5-1 l

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Pentru rezultate optime, țineți flaconul în poziție verticală și pulverizați de la o distanță de 30 cm. Pulverizați produsul pe suprafață, lăsați să acționeze durata necesară de contact, după care îndepărtați surplusul de lichid cu un șervețel uscat, sau lăsați să se usuce la aer. Închideți întotdeauna duza după utilizare. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Țineți alimentele, băuturile și hrana pentru animale departe de suprafețele tratate, până când acestea sunt uscate. Nu utilizați produsul direct pe sau în apropierea alimentelor, a hranei pentru animale și a băuturilor.

4.3.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 2.

4.3.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 2.

4.3.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 2.

4.4. **Descrierea utilizării**

Tabel 4.

Dezinfectarea suprafețelor din industria alimentară și a băuturilor care intră în contact cu alimentele, prin utilizarea unui pulverizator instalat pe un suport fix

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date

Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Pulverizare de la un pulverizator instalat pe un suport fix Descriere detaliata: Utilizare pentru dezinfectarea automată a instalațiilor industriale de procesare. Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii și levuri.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 300 l maximum pentru fiecare aplicare Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: o dată pe săptămână
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Recipient din HDPE opacă, 1-100 l Canistră din HDPE opacă, 1-100 l Container IBC din HDPE opacă, 600-1.000 l Butoi din HDPE opacă, 60-220 l Flacon din HDPE opacă, 0,1-5 l

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Utilizați în afara orelor de producție a alimentelor, o dată pe săptămână.

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Se aplică numai după încheierea turei de lucru/peste noapte.

În timpul aplicării prin pulverizare, nu va fi prezentă nicio persoană.

Pentru stabilirea momentelor adecvate pentru reintrarea în încăpere după aplicarea produsului, vor fi efectuate măsurători pentru stabilirea dozelor de la locul de muncă, cu folosirea unor aparate de măsură corespunzătoare, după montarea dispozitivului fix de pulverizare, iar apoi la intervale regulate (se recomandă intervalele anuale), precum și după orice modificare a limitelor relevante. Vor fi respectate reglementările naționale privind măsurătorile efectuate la locul de muncă. În cazul în care sunt efectuate operațiuni de întreținere neprogramată în timpul aplicării prin pulverizare, este obligatorie folosirea unui echipament de protecție respiratorie cu factor de protecție 10.

4.4.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 2.

4.4.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 2.

4.4.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 2.

Cap. 5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 2**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și respectați toate instrucțiunile furnizate. Produsul trebuie aplicat pe o suprafață uscată. Umeziți complet suprafața cu produs. Nu clătiți suprafața după utilizarea produsului. Nu utilizați pe suprafețe sensibile la agenți oxidanți (de ex., marmură, cupru sau alamă).

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Consultați măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare din meta-RCP 2.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

În cazul contactului cu ochii: Clătiți cu multă apă.

În cazul contactului cu pielea: Clătiți cu multă apă.

În caz de înghițire: Clătiți gura. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

În caz de inhalare: Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

MĂSURI DE URGENȚĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Împiedicați pătrunderea produsului în sol, în apele de suprafață sau pânza freatică.

Respectați dispozițiile cu privire la amplasarea mijloacelor de izolare în jurul recipientelor de depozitare.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Produs: Dacă este posibil, este de preferat reciclarea produsului în locul eliminării la gropile de gunoi sau al incinerării. În cazul în care reciclarea nu este posibilă, eliminați produsul cu respectarea reglementărilor naționale. Eliminați deșeurile la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor.

Ambalajele contaminate: Eliminați recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Depozitați în recipiente adecvate, etichetate corespunzător.

Temperatura de depozitare:0-35 °C

Perioada de valabilitate: 24 luni

Cap. 6. **ALTE INFORMAȚII**

Produsul conține peroxid de hidrogen (Nr. CAS: 7722-84-1), pentru care a fost agreată o valoare europeană de referință de 1.25 mg/m³ pentru uz profesional, iar aceasta a fost utilizată pentru evaluarea riscului prezentat de produs.

Cap. 7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 2**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	DrySan Oxy	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0024303-0002 1-2	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	1 % (de greutate)

Cap. 1. **META-RCP 3 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 3 identificator**

Identificator	Meta SPC: META SPC 3

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-3

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor

Cap. 2. **COMPOZIȚIA META RCP 3**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 3**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	35 - 36,75 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 3**

Tip(uri) de formulare	AL Orice alt lichid

Cap. 3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 3**

Fraze de pericol	H272: Poate agrava un incendiu; oxidant. H302: Nociv în caz de înghițire. H315: Provoacă iritarea pielii. H318: Provoacă leziuni oculare grave. H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție	P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P220: A se păstra departe de îmbrăcăminte sau alte materiale combustibile. P261: Evitați să inspirați vaporii. P261: Evitați să inspirați spray-ul. P264: Spălați-vă mâinile bine după utilizare.

	P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P271: A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. P273: Evitați dispersarea în mediu. P280: Purtați echipament de protecție a ochilor. P280: Purtați echipament de protecție a feței. P280: Purtați mănuși de protecție. P301+P312: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați la un la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ, dacă nu vă simțiți bine. P330: Clătiți gura. P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. P332+P313: În caz de iritare a pielii: consultați medicul. P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați victima la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. P312: Sunați la un la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ, dacă nu vă simțiți bine. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P310: Sunați imediat la un la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ. P310: Sunați imediat la un un medic. P321: Tratament specific (a se vedea măsurile de prim-ajutor pe această etichetă). P362+P364: Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. P370+P378: În caz de incendiu: Utilizați apă pentru stingere. P403+P233: A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. P405: A se depozita sub cheie. P501: Aruncați conținutul la în conformitate cu reglementările naționale. P501: Aruncați recipientul la în conformitate cu reglementările naționale.

Cap. 4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabel 1.

Dezinfectarea suprafețelor din industria alimentară și a băuturilor care intră în contact cu alimentele, prin scufundare automată în produs sau prin pulverizare în sistem închis

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Spori de bacterii Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior

Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Scufundare în lichid sau pulverizare automată, în sistem închis Descriere detaliata: Dezinfectarea ambalajelor (umplere aseptică) prin scufundare automată în produs și prin pulverizare (proces închis). Dezinfectarea ambalajelor în industria de producție a alimentelor, băuturilor și a hranei pentru animale (aplicare prin scufundare și prin pulverizare). Durată de contact pentru scufundare în lichid și pulverizare, la 60°C, în condiții de curățenie: — 1 minut pentru bacterii, levuri, fungi și spori de bacterii.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: dozare constantă automată Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: dozare constantă automată
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Recipient din HDPE opacă pentru livrare în vrac, > 1 l - vrac Canistră din HDPE opacă, 1-100 l Container IBC din HDPE opacă, 600-1.000 l Butoi din HDPE opacă, 60-220 l Flacon din HDPE opacă, 0,1-5 l.

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Dezinfectarea ambalajelor în industria de producție a alimentelor, băuturilor și a hranei pentru animale (aplicare prin pulverizare sau prin scufundare în produs):

— Dozarea produsului direct în ambalajul care urmează să fie dezinfectat sau introducerea produsului în aburul suplimentar

— Utilizarea continuă a produsului

— Temperatura de aplicare: 60 °C

— Aplicarea are loc într-un sistem închis și ventilat.

Nu clătiți suprafața după utilizarea produsului. După sterilizare, uscați ambalajul folosind aer steril fierbinte.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Nu inspirați vaporii/spray-ul.

În timpul desfășurării funcționării, asigurați o ventilație adecvată în jurul instalațiilor cu o ventilație locală de evacuare (LEV), precum și ventilație tehnică în halele industriale.

În timpul activităților manuale de întreținere, asigurați o ventilație adecvată în interiorul instalației (ventilație locală de evacuare – LEV), înainte să deschideți ușile către zona aseptică.

1. După amestecare și încărcare în instalație, produsul va fi trasferat numai prin conducte închise. Nu sunt permise circuite deschise de produs și de ape uzate.
2. Vor fi efectuate măsurători pentru stabilirea dozelor de la locul de muncă, cu folosirea unor aparate de măsură corespunzătoare, la montarea instalației de ambalare aseptică, iar apoi la intervale regulate (se recomandă intervalele anuale), precum și după orice modificare a limitelor relevante. Vor fi respectate reglementările naționale privind măsurătorile efectuate la locul de muncă.

3. În cazul efectuării de lucrări de întreținere la instalația de ambalare aseptică (de ex., curățare manuală, incidente tehnice sau reparații), este necesară purtarea de EPP corespunzător (inclusiv echipament de protecție respiratorie, mănuși rezistente la substanțe chimice, salopetă de protecție la contactul cu substanțe chimice, dispozitive de protecție a ochilor). Tipul de EPR, tipul filtrului (codul, culoarea) și materialul mănușilor vor fi specificate de titularul autorizației, în informațiile referitoare la produs.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 3.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 3.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 3.

4.2. **Descrierea utilizării**

Tabel 2.

Dezinfectarea suprafețelor din industria alimentară și a băuturilor, care intră în contact cu alimentele, prin curățare la fața locului (CIP)

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: CIP (curățenie la fața locului) Descriere detaliata: Dezinfectarea în industria alimentelor și a băuturilor (contact cu alimentele). Durată de contact pentru sistemele închise, la 60°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru bacterii și levuri; — 15 minute pentru fungi.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: dozare automată Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: o dată pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Recipient din HDPE opacă pentru livrare în vrac, > 1 l - vrac Canistră din HDPE opacă, 1-100 l Container IBC din HDPE opacă, 600-1.000 l Butoi din HDPE opacă, 60-220 l Flacon din HDPE opacă, 0,1-5 l.

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Înainte de efectuarea dezinfectării, sistemul trebuie spălat. Dezinfectarea rezervoarelor și pompelor pentru curățarea la fața locului (CIP), a conductelor și a sistemelor interne ale instalațiilor de procesare a alimentelor, băuturilor și hranei pentru animale, inclusiv igienizarea stațiilor de muls (sisteme închise). Clătiți cu apă după efectuarea tratării.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Țineți alimentele, băuturile și hrana pentru animale departe de suprafața tratată, până la clătirea acesteia cu apă.

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 3.

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 3.

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 3.

Cap. 5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 3**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Consultați instrucțiunile specifice de utilizare din meta-RCP 3.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

În timpul manipulării produsului purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (materialul mănușilor este specificat de titularul autorizației în informațiile referitoare la produs).

În timpul manipulării produsului este obligatorie utilizarea de dispozitive de protecție a ochilor.

Procesul de diluare trebuie să fie efectuat cu ajutorul unui sistem de dozare automată.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

În cazul contactului cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Apelați imediat la asistență medicală.

În cazul contactului cu pielea: Îndepărtați produsul prin spălare cu apă din abundență, timp de cel puțin 15 minute. Utilizați un săpun delicat, dacă este disponibil. Solicitați asistență medicală dacă apare și persistă iritația.

În caz de înghițire: Clătiți gura. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

În caz de inhalare: Scoateți persoana la aer curat. Tratați simptomatic. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

MĂSURI DE URGENȚĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Împiedicați pătrunderea produsului în sol, în apele de suprafață sau pânza freatică.

Respectați dispozițiile cu privire la amplasarea mijloacelor de izolare în jurul recipientelor de depozitare.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Produs: Dacă este posibil, este de preferat reciclarea produsului în locul eliminării la gropile de gunoi sau al incinerării. În cazul în care reciclarea nu este posibilă, eliminați produsul cu respectarea reglementărilor naționale. Eliminați deșeurile la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor.

Ambalajele contaminate: Eliminați recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Depozitați în recipiente adecvate, etichetate corespunzător.

Temperatura de depozitare: 0-35 °C

Perioada de valabilitate: 24 luni

Cap. 6. **ALTE INFORMAȚII**

Produsul conține peroxid de hidrogen (Nr. CAS: 7722-84-1), pentru care a fost agreată o valoare europeană de referință de 1.25 mg/m³ pentru uz profesional, iar aceasta a fost utilizată pentru evaluarea riscului prezentat de produs.

Cap. 7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 3**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	Oxypak D	zona Piata: UE
	Oxypak S	zona Piata: UE
	Oxypak S10	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0024303-0003 1-3	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	35 % (de greutate)

Cap. 1. **META-RCP 4 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 4 identificator**

Identificator	Meta SPC: META SPC 4

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-4

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 3: Igienă veterinară

Cap. 2. **COMPOZIȚIA META RCP 4**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 4**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 % (de greutate)
Acid citric monohidrat	2-hidroxi-propan -1,2,3-acid tricarboxi-lic	Substanța inactivă	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 % (de greutate)
Fenoxietanol	2-fenoxie-tanol	Substanța inactivă	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 % (de greutate)
Lauril sulfat de sodiu	Dodecil sul-fat de sodiu	Substanța inactivă	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 % (de greutate)
Acid L-glutamic, deri-vați N-cocoacilici, săruri monosodice	Sodiu;(4S)-4-amino-5-hidroxi-5-oxopen-tanoat	Substanța inactivă	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 % (de greutate)
Acid sulfuric, mono-C12-14 esteri de alchil, săruri de amoniu (lauril sulfat de amoniu Texapon)	Acid sulfu-ric, mono-C12-14 esteri de alchil, săruri de amoniu	Substanța inactivă	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 4**

Tip(uri) de formulare	AL Orice alt lichid

Cap. 3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 4**

Fraze de pericol	H290: Poate fi coroziv pentru metale. H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Fraze de precauție	P234: Păstrați numai în recipientul original. P264: Spălați-vă mâinile bine după utilizare. P280: Purtați echipament de protecție a ochilor. P280: Purtați echipament de protecție a feței.

	P390: Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere. P406: Depozitați într-un rezistent la coroziune cu dublură interioară rezistentă la coroziune. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

Cap. 4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabel 1.

Cupe pentru scufundarea mameloanelor în vederea dezinfectării înainte de mulgere

Tip de produs	TP 3: Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Scufundare manuală în produs, folosind o cupă/un pahar din spumă (dezinfectare înainte de mulgere) Descriere detaliata: Dezinfectarea mameloanelor înainte de mulgere, prin scufundare manuală în produs, folosind o cupă/un pahar din spumă. Durată de contact pentru scufundare în lichid, la 30°C, în condiții de curățenie: — 60 de secunde pentru bacterii și levuri.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 4 ml de produs pentru fiecare aplicare (mai exact, 1 ml pentru fiecare mamelon, prin urmare 4 ml de produs pentru animalele cu 4 mameloane) Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Recipiente cu toartă din HDPE opacă, 1-100 l Canistră din HDPE opacă, 1-100 l Container IBC din HDPE opacă, 600-1.000 l Butoi din HDPE opacă, 60-220 l Flacon din HDPE opacă, 0,1-5 l Pungă din HDPE/PE opacă de 0,5-100 l

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 4.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 4.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 4.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 4.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 4.

Cap. 5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 4**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și respectați toate instrucțiunile furnizate. Produsul se va aplica înainte de mulgere, cu ajutorul unei cupe/a unui pahar din spumă. Înainte de utilizare, produsul trebuie să fie adus la temperatura camerei.

Curățați mamelonul în prealabil cu un șervețel uscat, umpleți paharul din spumă cu produs și apăsați pe pahar până se formează spumă. Introduceți mamelonul în pahar. Aplicați spuma pe mamelon și lăsați să acționeze 60 de secunde. Ștergeți produsul folosind un șervețel curat. Nu clătiți suprafața după utilizarea produsului.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Evitați stropirile și scurgerile de produs.

Nu vă atingeți ochii cu mâinile.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

În cazul contactului cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Solicitați asistență medicală.

În cazul contactului cu pielea: Clătiți cu multă apă.

În caz de înghițire: Clătiți gura. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

În caz de inhalare: Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

MĂSURI DE URGENȚĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Împiedicați pătrunderea produsului în sol, în apele de suprafață sau pânza freatică.

Respectați dispozițiile cu privire la amplasarea mijloacelor de izolare în jurul recipientelor de depozitare.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Produs: Dacă este posibil, este de preferat reciclarea produsului în locul eliminării la gropile de gunoi sau al incinerării. În cazul în care reciclarea nu este posibilă, eliminați produsul cu respectarea reglementărilor naționale. Eliminați deșeurile la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor.

Ambalajele contaminate: Eliminați recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Depozitați în recipiente adecvate, etichetate corespunzător.

Temperatura de depozitare: 0-25 °C

Perioada de valabilitate: 18 luni

Cap. 6. **ALTE INFORMAȚII**

Produsul conține peroxid de hidrogen (Nr. CAS: 7722-84-1), pentru care a fost agreată o valoare europeană de referință de 1.25 mg/m³ pentru uz profesional, iar aceasta a fost utilizată pentru evaluarea riscului prezentat de produs.

Cap. 7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 4**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	OxyFoamPlus	zona Piata: UE
	MEPA Foampro D	zona Piata: UE
	Predip PLUS	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0024303-0004 1-4	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	1,4 % (de greutate)
Acid citric monohidrat	2-hidroxi-propan -1,2,3-acid tricarboxilic	Substanța inactivă	5949-29-1	201-069-1	0,9 % (de greutate)
Fenoxietanol	2-fenoxieta-nol	Substanța inactivă	122-99-6	204-589-7	0,9 % (de greutate)
Lauril sulfat de sodiu	Dodecil sul-fat de sodiu	Substanța inactivă	151-21-3	205-788-1	3,88 % (de greutate)
Acid L-glutamic, deri-vați N-cocoacilici, săruri monosodice	Sodiu;(4S)-4-amino-5-hidroxi-5-oxopenta-noat	Substanța inactivă	68187-32-6	269-087-2	2 % (de greutate)
Acid sulfuric, mono-C12-14 esteri de alchil, săruri de amoniu (lauril sulfat de amoniu Texapon)	Acid sulfuric, mono-C12-14 esteri de alchil, săruri de amoniu	Substanța inactivă	90583-11-2	292-209-0	1,12 % (de greutate)

Cap. 1. **META-RCP 5 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 5 identificator**

Identificator	Meta SPC: META SPC 5

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-5

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale TP 4: Industria alimentară și a furajelor

Cap. 2. **COMPOZIȚIA META RCP 5**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 5**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 5**

Tip(uri) de formulare	AL Orice alt lichid

Cap. 3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 5**

Fraze de pericol	
Fraze de precauție	

Cap. 4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabel 1.

Dezinfectarea camerelor sterile de uz medical, prin pulverizare cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci și ștergere cu șervețele uscate

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-

Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Micobacterii Denumirea comună: Micobacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Spori de bacterii Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Clostridium difficile Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Pulverizare cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci și ștergere cu șervețele uscate Descriere detaliata: Dezinfectarea suprafețelor, a aparatelor și a echipamentelor utilizate în camerele sterile de uz medical, de tip A – D, precum și a spațiilor adiacente (de ex., în industria farmaceutică). Dezinfectarea la transfer sau dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni. Durată de contact pentru pulverizare și ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie: — 1 minut pentru bacterii și levuri; — 5 minute pentru fungi și micobacterii; — 60 de minute pentru spori de bacterii; — 30 de minute pentru virusuri. Durată de contact pentru pulverizare și ștergere, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru spori de Clostridium difficile; — 30 de minute pentru spori de bacterii. Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru bacterii, levuri și fungi; — 30 de minute pentru virusuri și spori de bacterii.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 10 ml/m^2 Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon-pulverizator din polietilenă tereftalată (PET) opacă, 0,25-1 l Flacon-pulverizator din polipropilenă și polietilenă (PP+PE) opacă, 0,25-1 l Flacon din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) sau polietilenă (PE) opacă, 1-5 l

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Pentru rezultate optime, țineți flaconul în poziție verticală și pulverizați de la o distanță de 10-20 cm. Pulverizați produsul pe un șervețel uscat și ștergeți suprafețele de mici dimensiuni, cum ar fi blaturile de lucru și echipamentele, sau pulverizați produsul pe suprafață, după care ștergeți suprafața respectivă cu un șervețel curat și uscat și lăsați să se usuce la aer. Închideți întotdeauna duza după utilizare. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.2. **Descrierea utilizării**

Tabel 2.

Dezinfectarea camerelor sterile de uz medical prin ștergere, folosind un mop plat și găleată

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Micobacterii Denumirea comună: Micobacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date

	Denumirea stiintifica: Spori de bacterii Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Clostridium difficile Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată Descriere detaliata: Dezinfectarea podelelor din camerele sterile de uz medical, precum și a spațiilor adiacente (de ex., în industria farmaceutică). Durată de contact pentru spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de murdărie: — 1 minut pentru bacterii și levuri; — 5 minute pentru fungi și micobacterii; — 60 de minute pentru spori de bacterii; — 30 de minute pentru virusuri. Durată de contact pentru spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru spori de Clostridium difficile; — 30 de minute pentru spori de bacterii.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 20 ml/m^2 Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din HDPE sau PE opacă, 1-5 l

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Aplicați pe suprafețe prin spălare cu mopul.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.3. **Descrierea utilizării**

Tabel 3.

Dezinfectarea suprafețelor de mici și/sau de mari dimensiuni, care nu intră în contact cu alimentele, din spațiile medicale, prin pulverizare folosind un pulverizator cu trăgaci și prin ștergere cu un șervețel uscat

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Micobacterii Denumirea comună: Micobacterii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Pulverizare cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci și ștergere cu șervețele uscate Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică și nesistematică a suprafețelor mici și mari din saloanele de spital și din cabinetele medicale. Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de murdărie: — 1 minut pentru bacterii și levuri; — 5 minute pentru fungi; — 15 minute pentru micobacterii.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 10 ml/m^2 Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon-pulverizator din PET opacă, 0,25-1 l Canistră din HDPE opacă, 1-5 l

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Dezinfectare sistematică: Dezinfectarea suprafețelor care pot fi contaminate în mod regulat cu patogeni în timpul activității medicilor sau a asistenților medicali, în vederea reducerii riscului de transmitere a respectivelor microorganisme prin intermediul suprafețelor.

Dezinfectare nesistematică: Dezinfectarea efectuată în situații de risc specifice (cu excepția cazului în care acest lucru este reglementat în mod diferit de autoritățile naționale de sănătate publică).

Produsul este destinat curățării și dezinfectării într-o singură etapă. Pentru rezultate optime, țineți flaconul în poziție verticală și pulverizați de la o distanță de 30 cm. Pulverizați produs pe suprafață, după care ștergeți-o cu un șervețel curat și uscat și lăsați-o să se usuce. Închideți întotdeauna duza după utilizare. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Suprafața care urmează să fie dezinfectată (în m^2) nu trebuie să fie mai mare de 1/10 din volumul încăperii (în m^3); de ex., într-o încăpere cu un volum de 120 m^3, suprafața maximă care trebuie dezinfectată este de 12 m^2.

4.3.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.3.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.3.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.4. **Descrierea utilizării**

Tabel 4.

Dezinfectarea suprafețelor de mici și/sau de mari dimensiuni, care nu intră în contact cu alimentele, din spațiile medicale, prin pulverizare folosind un pulverizator cu trăgaci și prin ștergere cu un șervețel uscat

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Micobacterii Denumirea comună: Micobacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Spori de bacterii Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date

	Denumirea stiintifica: Clostridium difficile Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Pulverizare cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci și ștergere cu șervețele uscate Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică și nesistematică a suprafețelor mici și mari din saloanele de spital și din cabinetele medicale. Durată de contact pentru pulverizare și ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie: — 1 minut pentru bacterii și levuri; — 5 minute pentru fungi și micobacterii; — 60 de minute pentru spori de bacterii; — 30 de minute pentru virusuri. Durată de contact pentru pulverizare și ștergere, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru spori de Clostridium difficile; — 30 de minute pentru spori de bacterii. Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru bacterii, levuri și fungi; — 30 de minute pentru virusuri și spori de bacterii.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 10 ml/m^2 Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din HDPE opacă, 1-5 l Flacon-pulverizator din PET opacă, 0,25-1 l Canistră din HDPE opacă, 1-5 l

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Dezinfectare sistematică: Dezinfectarea suprafețelor care pot fi contaminate în mod regulat cu patogeni în timpul activității medicilor sau a asistenților medicali, în vederea reducerii riscului de transmitere a respectivelor microorganisme prin intermediul suprafețelor.

Dezinfectare nesistematică: Dezinfectarea efectuată în situații de risc specifice (cu excepția cazului în care acest lucru este reglementat în mod diferit de autoritățile naționale de sănătate publică).

Produsul este destinat curățării și dezinfectării într-o singură etapă. Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Pentru rezultate optime, țineți flaconul în poziție verticală și pulverizați de la o distanță de 30 cm. Pulverizați produs pe un șervețel uscat și ștergeți suprafețele de mici dimensiuni (blaturi de lucru, echipamente) sau pulverizați produs pe suprafață, după care ștergeți-o cu un șervețel curat și uscat și lăsați-o să se usuce. Închideți întotdeauna duza după utilizare. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Suprafața care urmează să fie dezinfectată (în m^2) nu trebuie să fie mai mare de 1/10 din volumul încăperii (în m^3), de ex., într-o încăpere cu un volum de 120 m^3, suprafața maximă care trebuie dezinfectată este de 12 m^2.

4.4.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.4.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.4.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.5. **Descrierea utilizării**

Tabel 5.

Dezinfectarea suprafețelor de mici și/sau de mari dimensiuni, care nu intră în contact cu alimentele, din spațiile medicale, prin ștergere cu o lavetă curată/un șervețel curat, de unică folosință, și o găleată

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Micobacterii Denumirea comună: Micobacterii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Ștergere folosind o lavetă/un șervețel și găleată Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică și nesistematică a suprafețelor mici și mari din saloanele de spital și din cabinetele medicale. Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie: — 1 minut pentru bacterii și levuri; — 5 minute pentru fungi; — 15 minute pentru micobacterii.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 10 ml/m^2 Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere

Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Canistră din HDPE opacă, 1-5 l

4.5.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Dezinfectare sistematică: Dezinfectarea suprafețelor care pot fi contaminate în mod regulat cu patogeni în timpul activității medicilor sau a asistenților medicali, în vederea reducerii riscului de transmitere a respectivelor microorganisme prin intermediul suprafețelor.

Dezinfectare nesistematică: Dezinfectarea efectuată în situații de risc specifice (cu excepția cazului în care acest lucru este reglementat în mod diferit de autoritățile naționale de sănătate publică).

Produsul este destinat curățării și dezinfectării într-o singură etapă. Turnați produsul într-o găleată curată și distribuiți pe suprafață folosind o lavetă/un șervețel, de unică folosință, după care lăsați să se usuce la aer. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.5.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.5.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.5.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.5.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.6. **Descrierea utilizării**

Tabel 6.

Dezinfectarea suprafețelor de mici și/sau de mari dimensiuni, care nu intră în contact cu alimentele, din spațiile medicale, prin ștergere cu o lavetă curată/un șervețel curat, de unică folosință, și o găleată

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Micobacterii Denumirea comună: Micobacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Spori de bacterii Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date

	Denumirea stiintifica: Clostridium difficile Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Ștergere folosind o lavetă/un șervețel și găleată Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică și nesistematică a suprafețelor mici și mari din saloanele de spital și din cabinetele medicale. Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie: — 1 minut pentru bacterii și levuri; — 5 minute pentru fungi și micobacterii; — 60 de minute pentru spori de bacterii; — 30 de minute pentru virusuri. Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru spori de Clostridium difficile; — 30 de minute pentru spori de bacterii.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 10 ml/m^2 Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din HDPE opacă, 1-5 l Canistră din HDPE opacă, 1-5 l

4.6.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Dezinfectare sistematică: Dezinfectarea suprafețelor care pot fi contaminate în mod regulat cu patogeni în timpul activității medicilor sau a asistenților medicali, în vederea reducerii riscului de transmitere a respectivelor microorganisme prin intermediul suprafețelor.

Dezinfectare nesistematică: Dezinfectarea efectuată în situații de risc specifice (cu excepția cazului în care acest lucru este reglementat în mod diferit de autoritățile naționale de sănătate publică).

Produsul este destinat curățării și dezinfectării într-o singură etapă. Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Turnați produsul într-o găleată curată și distribuiți pe suprafață folosind o lavetă/un șervețel, de unică folosință, după care lăsați să se usuce la aer. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.6.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.6.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.6.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*
Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.6.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*
Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.7. **Descrierea utilizării**

Tabel 7.

Dezinfectarea suprafețelor de mari dimensiuni din spațiile medicale, care nu intră în contact cu alimentele, prin spălare cu mopul, folosind un mop și o găleată

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Micobacterii Denumirea comună: Micobacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Spori de bacterii Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Clostridium difficile Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Spălare, folosind un mop și o găleată Descriere detaliata: Dezinfectarea nesistematică a suprafețelor de mari dimensiuni din saloanele de spital. Durată de contact pentru spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de murdărie: — 1 minut pentru bacterii și levuri; — 5 minute pentru fungi și micobacterii; — 60 de minute pentru spori de bacterii; — 30 de minute pentru virusuri. Durată de contact pentru spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru spori de Clostridium difficile; — 30 de minute pentru spori de bacterii.

Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 20 ml/m^2 Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din HDPE opacă, 1-5 l Canistră din HDPE opacă, 1-5 l

4.7.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Dezinfectare nesistematică: Dezinfectarea efectuată în situații de risc specifice (cu excepția cazului în care acest lucru este reglementat în mod diferit de autoritățile naționale de sănătate publică).

Produsul este destinat curățării și dezinfectării într-o singură etapă. Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Umpleți găleata cu produs gata de utilizare și distribuiți-l pe podea cu ajutorul unui mop, după care lăsați să se usuce la aer.

4.7.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.7.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.7.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.7.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.8. **Descrierea utilizării**

Tabel 8.

Dezinfectarea suprafețelor de mari dimensiuni din spațiile medicale, care nu intră în contact cu alimentele, prin spălare cu mopul, folosind un mop și o găleată

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Micobacterii Denumirea comună: Micobacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date

	Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Spori de bacterii Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Clostridium difficile Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Spălare, folosind un mop și o găleată Descriere detaliata: Dezinfectarea nesistematică a suprafețelor de mari dimensiuni din cabinetele medicale. Durată de contact pentru spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de murdărie: — 1 minut pentru bacterii și levuri; — 5 minute pentru fungi și micobacterii; — 60 de minute pentru spori de bacterii; — 30 de minute pentru virusuri. Durată de contact pentru spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru spori de Clostridium difficile; — 30 de minute pentru spori de bacterii.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 20 ml/m^2 Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din HDPE opacă, 1-5 l Canistră din HDPE opacă, 1-5 l

4.8.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Dezinfectare nesistematică: Dezinfectarea efectuată în situații de risc specifice (cu excepția cazului în care acest lucru este reglementat în mod diferit de autoritățile naționale de sănătate publică).

Produsul este destinat curățării și dezinfectării într-o singură etapă. Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Umpleți găleata cu produs gata de utilizare și distribuiți-l pe podea cu ajutorul unui mop, ștergeți suprafața cu un mop curat și uscat, după care lăsați să se usuce la aer.

4.8.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.8.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.8.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.8.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.9. **Descrierea utilizării**

Tabel 9.

Dezinfectarea suprafețelor de mici și/sau de mari dimensiuni din spațiile medicale, care nu intră în contact cu alimentele, prin pulverizare pe suprafață și apoi prin ștergere cu o lavetă curată/un șervețel curat sau prin pulverizare de lichid pe un șervețel și apoi prin ștergerea suprafeței, sau prin turnarea de dezinfectant într-o găleată și ștergerea suprafeței folosind o lavetă curată/un șervețel curat, de unică folosință, precum și dezinfectarea nesistematică a suprafețelor de dimensiuni mai mari, prin ștergere, folosind un mop și o găleată

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Micobacterii Denumirea comună: Micobacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Spori de bacterii Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Clostridium difficile Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Pulverizare, folosind un pulverizator cu trăgaci, și prin ștergere și spălare cu mopul, folosind un mop plat și găleată Descriere detaliata: Dezinfectarea nesistematică a suprafețelor de mici și de mari dimensiuni, din saloanele de spital și din cabinetele medicale.

	Durată de contact pentru pulverizare, ștergere și spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de murdărie: — 1 minut pentru bacterii și levuri; — 5 minute pentru fungi și micobacterii; — 60 de minute pentru spori de bacterii; — 30 de minute pentru virusuri. Durată de contact pentru pulverizare, ștergere și spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru spori de Clostridium difficile; — 30 de minute pentru spori de bacterii. Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru bacterii, levuri și fungi; — 30 de minute pentru virusuri și spori de bacterii. Metoda: Ștergere folosind o lavetă/un șervețel și o găleată; spălare cu mopul, folosind un mop și o găleată Descriere detaliata: Dezinfectarea nesistematică a suprafețelor de mici și de mari dimensiuni, din saloanele de spital și din cabinetele medicale. Durată de contact pentru ștergere și spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de murdărie: — 1 minut pentru bacterii și levuri; — 5 minute pentru fungi și micobacterii; — 60 de minute pentru spori de bacterii; — 30 de minute pentru virusuri. Durată de contact pentru ștergere și spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru spori de Clostridium difficile; — 30 de minute pentru spori de bacterii.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Cantitatea aplicată prin pulverizare: 10 ml/m^2; Cantitatea aplicată prin spălare cu mopul: 20 ml/m^2 Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare în cazul în care se combină pulverizarea cu un pulverizator cu trăgaci cu spălarea cu mopul: până la de 2 ori pe zi per încăpere Frecvența de aplicare: Cantitatea aplicată pentru ștergere: 10 ml/m^2; Cantitatea aplicată prin spălare cu mopul: 20 ml/m^2 Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare în cazul în care se combină ștergerea cu laveta și spălarea cu mopul: până la de 2 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din HDPE opacă, 1-5 l Flacon-pulverizator din PET opacă, 0,25-1 l Canistră din HDPE opacă, 1-5 l

4.9.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Produsul este destinat curățării și dezinfectării într-o singură etapă. Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul.

Dezinfectare nesistematică: Dezinfectarea efectuată în situații de risc specifice (cu excepția cazului în care acest lucru este reglementat în mod diferit de autoritățile naționale de sănătate publică).

Pulverizare folosind un pulverizator cu trăgaci, urmată de ștergere cu un șervețel uscat: Pentru rezultate optime, țineți flaconul în poziție verticală și pulverizați de la o distanță de 30 cm. Pulverizați produsul pe un șervețel uscat și ștergeți suprafețele de mici dimensiuni, cum ar fi blaturile de lucru și echipamentele, sau pulverizați produsul pe suprafață, după care ștergeți suprafața respectivă cu un șervețel curat și uscat și lăsați să se usuce la aer. Închideți întotdeauna duza după utilizare. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

Spălare, folosind un mop și o găleată: Umpleți găleata cu produs gata de utilizare și distribuiți-l pe podea cu ajutorul unui mop, ștergeți suprafața cu un mop curat și uscat, după care lăsați să se usuce la aer.

Ștergere folosind o lavetă/un șervețel și găleată: Turnați produsul într-o găleată curată și distribuiți-l pe suprafață cu ajutorul unei lavete/a unui șervețel, de unică folosință, ștergeți suprafața cu o lavetă curată/un șervețel curat și apoi lăsați să se usuce la aer. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.9.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Pentru pulverizare: Suprafața care urmează să fie dezinfectată (în m^2) nu trebuie să fie mai mare de 1/10 din volumul încăperii (în m^3); de ex., într-o încăpere cu un volum de 120 m^3, suprafața maximă care trebuie dezinfectată este de 12 m^2.

4.9.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.9.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.9.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.10. **Descrierea utilizării**

Tabel 10.

Dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni din clădirile instituționale/comerciale, care nu intră în contact cu alimentele, prin pulverizare folosind un pulverizator cu trăgaci și prin ștergere cu un șervețel uscat

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Micobacterii Denumirea comună: Micobacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date

	Denumirea stiintifica: Spori de bacterii Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Clostridium difficile Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Pulverizare cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci și ștergere cu șervețele uscate Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mici dimensiuni din încăperi mici, care nu intră în contact cu alimentele (de ex., toalete). Durată de contact pentru pulverizare și ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie: — 1 minut pentru bacterii și levuri; — 5 minute pentru fungi și micobacterii; — 60 de minute pentru spori de bacterii; — 30 de minute pentru virusuri. Durată de contact pentru pulverizare și ștergere, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru spori de Clostridium difficile; — 30 de minute pentru spori de bacterii. Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru bacterii, levuri și fungi; — 30 de minute pentru virusuri și spori de bacterii.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 10 ml/m^2 Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 10 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din HDPE opacă, 1-5 l Flacon-pulverizator din PET opacă, 0,25-1 l

4.10.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Pentru rezultate optime, țineți flaconul în poziție verticală și pulverizați de la o distanță de 30 cm. Pulverizați produsul pe un șervețel uscat și ștergeți suprafețele de mici dimensiuni, cum ar fi blaturile de lucru și echipamentele, sau pulverizați produsul pe suprafață, după care ștergeți suprafața respectivă cu un șervețel curat și uscat și lăsați să se usuce la aer. Închideți întotdeauna duza după utilizare. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.10.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.10.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.10.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.10.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5

4.11. **Descrierea utilizării**

Tabel 11.

Dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni din clădirile instituționale/comerciale, care intră în contact cu alimentele, prin pulverizare folosind un pulverizator cu trăgaci și prin ștergere cu un șervețel uscat

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Micobacterii Denumirea comună: Micobacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Spori de bacterii Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Clostridium difficile Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Pulverizare cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci și ștergere cu șervețele uscate Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mici dimensiuni din încăperi mici, care intră în contact cu alimentele (de ex., bucătării). Durată de contact pentru pulverizare și ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie: — 1 minut pentru bacterii și levuri; — 5 minute pentru fungi și micobacterii; — 60 de minute pentru spori de bacterii; — 30 de minute pentru virusuri.

	Durată de contact pentru pulverizare și ștergere, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru spori de Clostridium difficile; — 30 de minute pentru spori de bacterii. Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru bacterii, levuri și fungi; — 30 de minute pentru virusuri și spori de bacterii.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 10 ml/m^2 Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 10 ori pe zi per încăpere.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din HDPE opacă, 1-5 l Flacon-pulverizator din PET opacă, 0,25-1 l

4.11.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Pentru rezultate optime, țineți flaconul în poziție verticală și pulverizați de la o distanță de 30 cm. Pulverizați produsul pe un șervețel uscat și ștergeți suprafețele de mici dimensiuni, cum ar fi blaturile de lucru și echipamentele, sau pulverizați produsul pe suprafață, după care ștergeți suprafața respectivă cu un șervețel curat și uscat și lăsați să se usuce la aer. Închideți întotdeauna duza după utilizare. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.11.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Țineți alimentele, băuturile și hrana pentru animale departe de suprafața tratată, până când aceasta este uscată. Nu utilizați produsul direct pe sau în apropierea alimentelor, a hranei pentru animale și a băuturilor.

4.11.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.11.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

4.11.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 5.

Cap. 5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 5**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și respectați toate instrucțiunile furnizate. Produsul trebuie aplicat pe o suprafață uscată. Umeziți complet suprafața cu produs. Nu clătiți suprafața după utilizarea produsului. Nu utilizați pe suprafețe sensibile la agenți oxidanți (de ex., marmură, cupru sau alamă).

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

-

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

În cazul contactului cu ochii: Clătiți cu multă apă.

În cazul contactului cu pielea: Clătiți cu multă apă.

În caz de înghițire: Clătiți gura. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

În caz de inhalare: Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

MĂSURI DE URGENȚĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Împiedicați pătrunderea produsului în sol, în apele de suprafață sau pânza freatică.

Respectați dispozițiile cu privire la amplasarea mijloacelor de izolare în jurul recipientelor de depozitare.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Produs: Dacă este posibil, este de preferat reciclarea produsului în locul eliminării la gropile de gunoi sau al incinerării. În cazul în care reciclarea nu este posibilă, eliminați produsul cu respectarea reglementărilor naționale. Eliminați deșeurile la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor.

Ambalajele contaminate: Eliminați recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Depozitați în recipiente adecvate, etichetate corespunzător.

Temperatura de depozitare:0-35 °C. Feriți de îngheț.

Perioada de valabilitate: 18 luni

Cap. 6. **ALTE INFORMAȚII**

Produsul conține peroxid de hidrogen (Nr. CAS: 7722-84-1), pentru care a fost agreată o valoare europeană de referință de 1.25 mg/m³ pentru uz profesional, iar aceasta a fost utilizată pentru evaluarea riscului prezentat de produs.

Cap. 7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 5**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	Incidin OxyFoam	zona Piata: UE			
Numărul autorizației	EU-0024303-0005 1-5				
Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (de greutate)

7.2. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	Incidin OxyFoam S	zona Piata: UE

	Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide	zona Piata: UE
	KitchenPro Oxy Foam S	zona Piata: UE
	Anios Low Peroxide IP sterile	zona Piata: UE
	Sirafan Oxy	zona Piata: UE

Numărul autorizației	EU-0024303-0006 1-5				
Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (de greutate)

Cap. 1. **META-RCP 6 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 6 identificator**

Identificator	Meta SPC: META SPC 6

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-6

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale TP 4: Industria alimentară și a furajelor

Cap. 2. **COMPOZIȚIA META RCP 6**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 6**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 % (de greutate)
N-propanol	Propan-1-ol	Substanța inactivă	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 6**

Tip(uri) de formulare	AL Orice alt lichid

Cap. 3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 6**

Fraze de pericol	H226: Lichid și vapori inflamabili. H318: Provoacă leziuni oculare grave.
Fraze de precauție	P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P233: Păstrați recipientul închis etanș. P240: Legătură la pământ și conexiune echipotențială cu recipientul și cu echipamentul de recepție. P241: Utilizați echipamente electrice antideflagrante. P241: Utilizați echipamente de ventilare antideflagrante. P241: Utilizați echipamente de iluminat antideflagrante. P242: Nu utilizați unelte care produc scântei. P243: Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice. P280: Purtați echipament de protecție a ochilor. P280: Purtați echipament de protecție a feței. P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P310: Sunați imediat la un un medic. P310: Sunați imediat la un la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ. P370+P378: În caz de incendiu: Utilizați apă pentru stingere. P403+P235: A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. P501: Aruncați conținutul la în conformitate cu reglementările naționale. P501: Aruncați recipientul la în conformitate cu reglementările naționale.

Cap. 4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabel 1.

Dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni din sectorul industrial (de ex., cantine, toalete) prin pulverizare folosind un pulverizator cu trăgaci

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Pulverizare cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci și ștergere cu șervețele uscate Descriere detaliata: Dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni din sectorul industrial (de ex., cantine, toalete).

	Durată de contact pentru pulverizare, la 10°C și la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii și levuri. Durată de contact pentru pulverizare, la 10°C, în condiții de curățenie: — 1 minut pentru bacterii și levuri.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 10 ml/m^2 Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 3 ori pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Recipient din HDPE opacă, 1-100 l Canistră din HDPE opacă, 1-100 l Container IBC din HDPE opacă, 600-1.000 l Butoi din HDPE opacă, 60-220 l Flacon din HDPE opacă, 0,1-5 l Flacon-pulverizator din HDPE opacă, de până la 1 l

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 6.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 6.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 6.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 6.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 6.

4.2. **Descrierea utilizării**

Tabel 2.

Dezinfectarea suprafețelor din industria alimentară și a băuturilor, care intră în contact cu alimentele, prin pulverizare folosind un pulverizator cu trăgaci

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date

	Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Pulverizare cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci și ștergere cu șervețele uscate Descriere detaliata: Dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni din fabricile de procesare a alimentelor. Durată de contact pentru pulverizare, la 10°C și la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii și levuri. Durată de contact pentru pulverizare, la 10°C, în condiții de curățenie: — 1 minut pentru bacterii și levuri.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 10 ml/m^2 Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 4 ori pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Recipient din HDPE opacă, 1-100 l Canistră din HDPE opacă, 1-100 l Container IBC din HDPE opacă, 600-1.000 l Butoi din HDPE opacă, 60-220 l Flacon din HDPE opacă, 0,1-5 l Flacon-pulverizator din HDPE opacă, de până la 1 l

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 6.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Țineți alimentele, băuturile și hrana pentru animale departe de suprafața tratată, până când aceasta este uscată. Nu utilizați produsul direct pe sau în apropierea alimentelor, a hranei pentru animale și a băuturilor.

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 6.

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 6.

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 6.

Cap. 5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 6**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și respectați toate instrucțiunile furnizate. Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Produsul trebuie aplicat pe o suprafață uscată. Pentru rezultate optime, țineți flaconul în poziție verticală și pulverizați de la o distanță de 10-20 cm. Pulverizați produsul pe suprafață și ștergeți suprafața cu un șervețel curat și uscat sau lăsați-o să se usuce la aer. Închideți întotdeauna duza după utilizare. Umeziți complet suprafața cu produs. Nu clătiți suprafața după utilizarea produsului. Nu utilizați pe suprafețe sensibile la agenți oxidanți (de ex., marmură, cupru sau alamă). Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

În timpul manipulării produsului este obligatorie utilizarea de dispozitive de protecție a ochilor.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

În cazul contactului cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Apelați imediat la asistență medicală.

În cazul contactului cu pielea: Clătiți cu multă apă.

În caz de înghițire: Clătiți gura. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

În caz de inhalare: Scoateți persoana la aer curat. Tratați simptomatic. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

MĂSURI DE URGENȚĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Împiedicați pătrunderea produsului în sol, în apele de suprafață sau pânza freatică.

Respectați dispozițiile cu privire la amplasarea mijloacelor de izolare în jurul recipientelor de depozitare.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Produs: Dacă este posibil, este de preferat reciclarea produsului în locul eliminării la gropile de gunoi sau al incinerării. În cazul în care reciclarea nu este posibilă, eliminați produsul cu respectarea reglementărilor naționale. Eliminați deșeurile la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor.

Ambalajele contaminate: Eliminați recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Depozitați în recipiente adecvate, etichetate corespunzător. Depozitați departe de căldură și de sursele de aprindere. Depozitați într-un spațiu răcoros și bine aerisit. Depozitați departe de agenții oxidanți.

Temperatura de depozitare: 0-30 °C

Perioada de valabilitate: 24 luni

Cap. 6. **ALTE INFORMAȚII**

Produsul conține peroxid de hidrogen (Nr. CAS: 7722-84-1), pentru care a fost agreată o valoare europeană de referință de 1.25 mg/m³ pentru uz profesional, iar aceasta a fost utilizată pentru evaluarea riscului prezentat de produs.

Cap. 7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 6**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	OxyDes Rapid	zona Piata: UE			
Numărul autorizației	EU-0024303-0007 1-6				
Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	2 % (de greutate)
N-propanol	Propan-1-ol	Substanța inactivă	71-23-8	200-746-9	17,5 % (de greutate)

Cap. 1. **META-RCP 7 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 7 identificator**

Identificator	Meta SPC: META SPC 7

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-7

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale TP 4: Industria alimentară și a furajelor

Cap. 2. **COMPOZIȚIA META RCP 7**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 7**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	4,95 - 5,45 % (de greutate)
Capryleth-9 acid carboxilic (amestec de acid carboxilic alchil eter)	Poli(oxi-1,2-etandiil), .alfa.-(carboximetil)-.omega.-(octiloxi)- (4-11 EO)	Substanța inactivă	53563-70-5		2,15 - 2,15 % (de greutate)

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Hexeth-4 acid carboxilic (amestec de acid carboxilic alchil eter)	Poli(oxi-1,2-e-tandiil), .alfa.-(carboximetil)-.omega.-(hexiloxi)- (3 EO)	Substanța inactivă	105391-15-9		0,62 - 0,62 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 7**

Tip(uri) de formulare	SL Concentrat solubil

Cap. 3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 7**

Fraze de pericol	H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
Fraze de precauție	P260: Nu inspirați spray-ul. P260: Nu inspirați vaporii. P264: Spălați-vă mâinile bine după utilizare. P280: Purtați echipament de protecție a ochilor. P280: Purtați echipament de protecție a feței. P280: Purtați mănuși de protecție. P280: Purtați îmbrăcăminte de protecție. P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați voma. P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. P310: Sunați imediat la un la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ. P310: Sunați imediat la un un medic. P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați victima la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. P321: Tratament specific (a se vedea măsurile de prim-ajutor pe această etichetă). P363: Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare. P405: A se depozita sub cheie. P501: Aruncați conținutul la în conformitate cu reglementările naționale. P501: Aruncați recipientul la în conformitate cu reglementările naționale.

Cap. 4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabel 1.

Dezinfectarea suprafețelor din spațiile medicale, care nu intră în contact cu alimentele, prin spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-

Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică și nesistematică a podelelor din saloanele de spital și din cabinetele medicale care sunt și care nu sunt frecvent atinse de persoane. Durată de contact pentru spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru bacterii și levuri (diluție 10%); — 15 minute pentru bacterii (diluție 7.5%).
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 20 ml/m^2 Diluare (%): Diluție (%): 7.5-10 Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 10 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din HDPE opacă, 0,5-5 l Bidon din HDPE opacă, 1-100 l Pungă din HDPE opacă, de 0,01-1 l Recipient cu toartă din HDPE opacă, de 0,5-5 l

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Dezinfectare sistematică: Dezinfectarea suprafețelor care pot fi contaminate în mod regulat cu patogeni în timpul activității medicilor sau a asistenților medicali, în vederea reducerii riscului de transmitere a respectivelor microorganisme prin intermediul suprafețelor.

Dezinfectare nesistematică: Dezinfectarea efectuată în situații de risc specifice (cu excepția cazului în care acest lucru este reglementat în mod diferit de autoritățile naționale de sănătate publică).

Produsul este destinat curățării și dezinfectării într-o singură etapă. Curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Umpleți găleata cu produs diluat și distribuiți-l pe podea cu ajutorul unui mop plat, apoi ștergeți suprafața cu un mop curat și uscat, după care lăsați să se usuce la aer. Nu clătiți suprafața după utilizarea produsului.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 7.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 7.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 7.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 7.

4.2. **Descrierea utilizării**

Tabel 2.

Dezinfectarea suprafețelor de mici și/sau de mari dimensiuni din clădirile instituționale/comerciale, care nu intră în contact cu alimentele, prin pulverizare cu un pulverizator cu trăgaci și prin ștergere cu un șervețel uscat și/sau prin spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Pulverizare cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci și ștergere cu șervețele uscate Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mici dimensiuni din încăperi mici, care nu intră în contact cu alimentele (de ex., toalete). Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru bacterii și levuri (diluție 10%); — 15 minute pentru bacterii (diluție 7.5%). Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii (diluție 10%); — 5 minute pentru levuri (diluție 15%); — 15 minute pentru bacterii (diluție 7.5%). Metoda: Spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mari dimensiuni din încăperi mici, care nu intră în contact cu alimentele (de ex., toalete). Durată de contact pentru spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru bacterii și levuri (diluție 10%); — 15 minute pentru bacterii (diluție 7.5%). Metoda: Pulverizare, folosind un pulverizator cu trăgaci, și ștergere cu șervețel uscat, și spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată

	Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mici și de mari dimensiuni din încăperi mici, care nu intră în contact cu alimentele (de ex., toalete). Durată de contact pentru pulverizare și spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru bacterii și levuri (diluție 10%); — 15 minute pentru bacterii (diluție 7.5%). Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii (diluție 10%); — 5 minute pentru levuri (diluție 15%); — 15 minute pentru bacterii (diluție 7.5%).
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Cantitatea aplicată prin pulverizare: 10 ml/m^2 Diluare (%): Diluție (%): 7.5-15 Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare în cazul pulverizării cu un pulverizator cu trăgaci: până la de 10 ori pe zi per încăpere Frecvența de aplicare: Cantitatea aplicată prin spălare cu mopul: 20 ml/m^2 Diluare (%): Diluție (%): 7.5-10 Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare în cazul ștergerii cu mopul: până la de 2 ori pe zi per încăpere Frecvența de aplicare: Cantitatea aplicată prin pulverizare: 10 ml/m^2; Cantitatea aplicată prin spălare cu mopul: 20 ml/m^2 Diluare (%): Diluție (%): 7.5-15 Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare în cazul în care se combină pulverizarea cu un pulverizator cu trăgaci cu spălarea cu mopul: o dată pe zi per încăpere.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din HDPE opacă, 0,5-5 l Bidon din HDPE opacă, 1-100 l Pungă din HDPE opacă, de 0,01-1 l Recipient cu toartă din HDPE opacă, de 0,5-5 l

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Nu clătiți suprafața după utilizarea produsului.

Pulverizare: Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Pentru rezultate optime, țineți flaconul în poziție verticală și pulverizați de la o distanță de 10-20 cm. Pulverizați produsul diluat pe suprafață, ștergeți suprafața cu un șervețel curat și uscat și lăsați să se usuce la aer. Închideți întotdeauna duza după utilizare. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

Spălare cu mopul: Produsul este destinat curățării și dezinfectării într-o singură etapă. Curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Umpleți găleata cu produs diluat, distribuiți-l pe podea cu ajutorul unui mop plat, apoi ștergeți suprafața cu un mop curat și uscat, după care lăsați să se usuce la aer.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Nu inspirați vaporii/spray-ul.

Pentru pulverizare: Suprafața care urmează să fie dezinfectată (în m^2) nu trebuie să fie mai mare de 1/10 din volumul încăperii (în m^3); de ex., într-o încăpere cu un volum de 120 m^3, suprafața maximă care trebuie dezinfectată este de 12 m^2.

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 7.

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 7.

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 7.

4.3. **Descrierea utilizării**

Tabel 3.

Dezinfectarea suprafețelor de mari dimensiuni din clădirile instituționale/comerciale, care nu intră în contact cu alimentele, prin spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mari dimensiuni din spațiile mari care nu intră în contact cu alimentele. Durată de contact pentru spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru bacterii și levuri (diluție 10%); — 15 minute pentru bacterii (diluție 7.5%).
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 20 ml/m^2 Diluare (%): Diluție (%): 7.5-10 Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 10 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din HDPE opacă, 0,5-5 l Bidon din HDPE opacă, 1-100 l Pungă din HDPE opacă, de 0,01-1 l Recipient cu toartă din HDPE opacă, de 0,5-5 l

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Produsul este destinat curățării și dezinfectării într-o singură etapă. Curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Umpleți găleata cu produs diluat și distribuiți-l pe podea cu ajutorul unui mop plat, apoi ștergeți suprafața cu un mop curat și uscat, după care lăsați să se usuce la aer. Nu clătiți suprafața după utilizarea produsului.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 7.

4.3.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 7.

4.3.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 7.

4.3.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 7.

4.4. **Descrierea utilizării**

Tabel 4.

Dezinfectarea suprafețelor de mari dimensiuni din clădirile instituționale/comerciale, care nu intră în contact cu alimentele, prin pulverizare cu ajutorul unui dispozitiv montat pe perete

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Pulverizare cu ajutorul unui dispozitiv montat pe perete Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mari dimensiuni din spațiile care intră/nu intră în contact cu alimentele. Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru bacterii și levuri (diluție 10%); — 15 minute pentru bacterii (diluție 7.5%). Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii (diluție 10%); — 5 minute pentru levuri (diluție 15%); — 15 minute pentru bacterii (diluție 7.5%).

Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 180 ml/m² Diluare (%): Diluție (%): 7.5-15 Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: o dată pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din HDPE opacă, 0,5-5 l Bidon din HDPE opacă, 1-100 l Pungă din HDPE opacă, de 0,01-1 l Recipient cu toartă din HDPE opacă, de 0,5-5 l

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicați produsul cu ajutorul unui dispozitiv montat pe perete. Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Clătiți după aplicare.

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Nu inspirați vaporii/spray-ul.

Asigurați ventilația tehnică cu cel puțin 15 cicluri de schimbare a aerului/oră.

4.4.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 7.

4.4.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 7.

4.4.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 7.

4.5. **Descrierea utilizării**

Tabel 5.

Dezinfectarea suprafețelor de mari dimensiuni din clădirile instituționale/comerciale, care intră în contact cu alimentele, prin pulverizare folosind un pulverizator cu trăgaci

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior

Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Pulverizare cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci și ștergere cu șervețele uscate Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mari dimensiuni care intră în contact cu alimentele (de ex., bucătării). Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru bacterii și levuri (diluție 10%); — 15 minute pentru bacterii (diluție 7.5%). Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii (diluție 10%); — 5 minute pentru levuri (diluție 15%); — 15 minute pentru bacterii (diluție 7.5%).
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 10 ml/m^2 Diluare (%): Diluție (%): 7.5-15 Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 10 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din HDPE opacă, 0,5-5 l Bidon din HDPE opacă, 1-100 l Pungă din HDPE opacă, de 0,01-1 l Recipient cu toartă din HDPE opacă, de 0,5-5 l

4.5.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Pentru rezultate optime, țineți flaconul în poziție verticală și pulverizați de la o distanță de 10-20 cm. Pulverizați produsul diluat pe suprafață, ștergeți suprafața cu un șervețel curat și uscat și lăsați să se usuce la aer. Închideți întotdeauna duza după utilizare. Nu clătiți suprafața după utilizarea produsului. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.5.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Nu inspirați vaporii/spray-ul.

Țineți alimentele, băuturile și hrana pentru animale departe de suprafețele tratate, până când acestea sunt uscate. Nu utilizați produsul direct pe sau în apropierea alimentelor, a hranei pentru animale și a băuturilor.

Suprafața care urmează să fie dezinfectată (în m^2) nu trebuie să fie mai mare de 1/10 din volumul încăperii (în m^3); de ex., într-o încăpere cu un volum de 120 m^3, suprafața maximă care trebuie dezinfectată este de 12 m^2.

4.5.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 7.

4.5.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 7.

4.5.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 7.

Cap. 5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 7**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și respectați toate instrucțiunile furnizate. Produsul trebuie aplicat pe o suprafață uscată. Umeziți complet suprafața cu produs. Nu utilizați pe suprafețe sensibile la agenți oxidanți (de ex., marmură, cupru sau alamă).

Instrucțiuni privind diluarea (7.5%): pentru obținerea unui litru de dezinfectant diluat pentru suprafețe, adăugați 75 ml de produs concentrat la aproximativ 500 ml de apă distilată sau apă de calitate similară (de ex., apă demineralizată), după care amestecați și completați până la 1 litru cu apă distilată, sau cu apă de calitate similară.

Instrucțiuni privind diluarea (10%): pentru obținerea unui litru de dezinfectant diluat pentru suprafețe, adăugați 100 ml de produs concentrat la aproximativ 500 ml de apă distilată sau apă de calitate similară (de ex., apă demineralizată), după care amestecați și completați până la 1 litru cu apă distilată, sau cu apă de calitate similară.

Instrucțiuni privind diluarea (15%): pentru obținerea unui litru de dezinfectant diluat pentru suprafețe, adăugați 150 ml de produs concentrat la aproximativ 500 ml de apă distilată sau apă de calitate similară (de ex., apă demineralizată), după care amestecați și completați până la 1 litru cu apă distilată, sau cu apă de calitate similară.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

În timpul manipulării produsului purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (materialul mănușilor este specificat de titularul autorizației în informațiile referitoare la produs).

În timpul manipulării produsului este obligatorie utilizarea de dispozitive de protecție a ochilor.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

În cazul contactului cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Apelați imediat la asistență medicală.

În cazul contactului cu pielea: Îndepărtați produsul prin spălare cu apă din abundență, timp de cel puțin 15 minute. Utilizați un săpun delicat, dacă este disponibil. Spălați îmbrăcămintea înainte de reutilizare. Curățați cu atenție încălțămintea înainte de reutilizare. Apelați imediat la asistență medicală.

În caz de înghițire: Clătiți gura cu apă. NU provocați voma. Nu administrați niciodată nimic pe gură unei persoane inconștiente. Apelați imediat la asistență medicală.

În caz de inhalare: Scoateți persoana la aer curat. Tratați simptomatic. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

MĂSURI DE URGENȚĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Împiedicați pătrunderea produsului în sol, în apele de suprafață sau pânza freatică.

Respectați dispozițiile cu privire la amplasarea mijloacelor de izolare în jurul recipientelor de depozitare.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Produs: Dacă este posibil, este de preferat reciclarea produsului în locul eliminării la gropile de gunoi sau al incinerării. În cazul în care reciclarea nu este posibilă, eliminați produsul cu respectarea reglementărilor naționale. Eliminați deșeurile la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor.

Ambalajele contaminate: Eliminați recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Depozitați în recipiente adecvate, etichetate corespunzător.

Temperatura de depozitare: 0-25 °C. Feriți de îngheț.

Perioada de valabilitate: 18 luni

Cap. 6. **ALTE INFORMAȚII**

Produsul conține peroxid de hidrogen (Nr. CAS: 7722-84-1), pentru care a fost agreată o valoare europeană de referință de 1.25 mg/m³ pentru uz profesional, iar aceasta a fost utilizată pentru evaluarea riscului prezentat de produs.

Cap. 7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 7**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	Incidin OxyConcentrate	zona Piata: UE
	UltraSan Floor	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0024303-0008 1-7	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	4,95 % (de greutate)
Capryleth-9 acid carboxilic (amestec de acid carboxilic alchil eter)	Poli (oxi-1,2-etandiil), .alfa.-(carboximetil)-.omega.-(octiloxi)-(4-11 EO)	Substanța inactivă	53563-70-5		2,15 % (de greutate)
Hexeth-4 acid carboxilic (amestec de acid carboxilic alchil eter)	Poli (oxi-1,2-etandiil), .alfa.-(carboximetil)-.omega.-(hexiloxi)-(3 EO)	Substanța inactivă	105391-15-9		0,62 % (de greutate)

7.2. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	KitchenPro Oxy Des Super Concentrate	zona Piata: UE
	Incidin OxyConcentrate FF	zona Piata: UE
	CidalSan Large Area	zona Piata: UE

Numărul autorizației	EU-0024303-0009 1-7				
Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	4,95 % (de greutate)
Capryleth-9 acid carboxilic (amestec de acid carboxilic alchil eter)	Poli (oxi-1,2-etandiil), .alfa.-(carboximetil)-.omega.-(octiloxi)-(4-11 EO)	Substanța inactivă	53563-70-5		2,15 % (de greutate)
Hexeth-4 acid carboxilic (amestec de acid carboxilic alchil eter)	Poli (oxi-1,2-etandiil), .alfa.-(carboximetil)-.omega.-(hexiloxi)-(3 EO)	Substanța inactivă	105391-15-9		0,62 % (de greutate)

Cap. 1. **META-RCP 8 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. Meta-RCP 8 identificator

Identificator	Meta SPC: META SPC 8

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-8

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale TP 4: Industria alimentară și a furajelor

Cap. 2. **COMPOZIȚIA META RCP 8**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 8**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 8**

Tip(uri) de formulare	AL Orice alt lichid

Cap. 3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 8**

Fraze de pericol	
Fraze de precauție	

Cap. 4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabel 1.

Dezinfectarea suprafețelor din sectorul industrial (de ex., cantine, toalete) prin ștergerea cu șervețele impregnate cu produs gata de utilizare

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Micobacterii Denumirea comună: Micobacterii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Ștergere cu șervețele impregnate cu produs gata de utilizare Descriere detaliata: Dezinfectarea suprafețelor din sectorul industrial (de ex., cantine, toalete). Durată de contact pentru ștergere, la 10°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii și levuri; Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie: — 2 minute pentru bacterii; — 5 minute pentru levuri; — 15 minute pentru fungi; — 60 de minute pentru micobacterii.

Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 1 șervețel pentru fiecare m^2 (corespunde unei cantități de 10 ml/m^2) Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 10 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Găleată din PP opacă, cu 10-5 000 de șervețele impregnate, din amestec de 60% poliester și 40% lyocell sau șervețele din material nețesut, 100% polipropilenă (dimensiunea șervețelului: 200 x 250 mm sau 200 x 200 mm). Pungă din PP opacă, cu 10-5 000 de șervețele impregnate, din amestec de 60% poliester și 40% lyocell sau șervețele din material nețesut, 100% polipropilenă (dimensiunea șervețelului: 200 x 250 mm sau 200 x 200 mm).

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 8.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

-

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 8.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 8.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 8.

4.2. **Descrierea utilizării**

Tabel 2.

Dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni din industria alimentară și a băuturilor care intră în contact cu alimentele, prin ștergere cu șervețele impregnate cu produs gata de utilizare

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Micobacterii Denumirea comună: Micobacterii Etapă de dezvoltare: fără date

Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Ștergere cu șervețele impregnate cu produs gata de utilizare Descriere detaliata: Dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni din fabricile de procesare a alimentelor. Durată de contact pentru ștergere, la 10°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii și levuri; Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie: — 2 minute pentru bacterii; — 5 minute pentru levuri; — 15 minute pentru fungi; — 60 de minute pentru micobacterii.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 1 șervețel pentru fiecare m^2 (corespunde unei cantități de 10 ml/m^2) Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 10 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Găleată din PP opacă, cu 10-5.000 de șervețele impregnate, din amestec de 60% poliester și 40% lyocell sau șervețele din material nețesut, 100% polipropilenă (dimensiunea șervețelului: 200 x 250 mm sau 200 x 200 mm). Pungă din PP opacă, cu 10-5.000 de șervețele impregnate, din amestec de 60% poliester și 40% lyocell sau șervețele din material nețesut, 100% polipropilenă (dimensiunea șervețelului: 200 x 250 mm sau 200 x 200 mm).

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 8.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Țineți alimentele, băuturile și hrana pentru animale departe de suprafața tratată, până când aceasta este uscată. Nu utilizați produsul direct pe sau în apropierea alimentelor, a hranei pentru animale și a băuturilor.

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 8.

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 8.

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 8.

4.3. **Descrierea utilizării**

Tabel 3.

Dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni din spațiile medicale, care nu intră în contact cu alimentele, prin ștergere cu șervețele impregnate cu produs, gata de utilizare

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Micobacterii Denumirea comună: Micobacterii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Ștergere cu șervețele impregnate cu produs gata de utilizare Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mici dimensiuni din saloanele de spital și din cabinetele medicale care nu sunt frecvent atinse de persoane. Durată de contact pentru ștergere, la 10°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii și levuri; Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie: — 15 minute pentru bacterii, levuri și fungi; — 60 de minute pentru micobacterii.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 1 șervețel pentru fiecare m^2 (corespunde unei cantități de 10 ml/m^2) Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Găleată din PP opacă, cu 10-5.000 de șervețele impregnate, din amestec de 60% poliester și 40% lyocell sau șervețele din material nețesut, 100% polipropilenă (dimensiunea șervețelului: 200 x 250 mm sau 200 x 200 mm). Pungă din PP opacă, cu 10-5.000 de șervețele impregnate, din amestec de 60% poliester și 40% lyocell sau șervețele din material nețesut, 100% polipropilenă (dimensiunea șervețelului: 200 x 250 mm sau 200 x 200 mm).

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Dezinfectare sistematică: Dezinfectarea suprafețelor care pot fi contaminate în mod regulat cu patogeni în timpul activității medicilor sau a asistenților medicali, în vederea reducerii riscului de transmitere a respectivelor microorganisme prin intermediul suprafețelor.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

-

4.3.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 8.

4.3.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 8.

4.3.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 8.

Cap. 5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 8**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Produsul este destinat curățării și dezinfectării într-o singură etapă. Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și respectați toate instrucțiunile furnizate. Produsul trebuie aplicat pe o suprafață uscată. Umeziți complet suprafața cu produs. Lăsați suprafața să se usuce la aer după utilizarea produsului. Nu clătiți suprafața după utilizarea produsului. Închideți recipientul după utilizare. Nu utilizați șervețelele uscate. Eliminați recipientul după golire. Nu utilizați pe suprafețe sensibile la agenți oxidanți (de ex., marmură, cupru sau alamă). Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

-

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

În cazul contactului cu ochii: Clătiți cu multă apă.

În cazul contactului cu pielea: Clătiți cu multă apă.

În caz de înghițire: Clătiți gura. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

În caz de inhalare: Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

MĂSURI DE URGENȚĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Împiedicați pătrunderea produsului în sol, în apele de suprafață sau pânza freatică.

Respectați dispozițiile cu privire la amplasarea mijloacelor de izolare în jurul recipientelor de depozitare.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Produs: Dacă este posibil, este de preferat reciclarea produsului în locul eliminării la gropile de gunoi sau al incinerării. În cazul în care reciclarea nu este posibilă, eliminați produsul cu respectarea reglementărilor naționale. Eliminați deșeurile la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor.

Ambalajele contaminate: Eliminați recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Depozitați în recipiente adecvate, etichetate corespunzător.

Temperatura de depozitare: 0-35 °C. Feriți de îngheț.

Perioada de valabilitate: 18 luni

Cap. 6. **ALTE INFORMAȚII**

Produsul conține peroxid de hidrogen (Nr. CAS: 7722-84-1), pentru care a fost agreată o valoare europeană de referință de 1.25 mg/m³ pentru uz profesional, iar aceasta a fost utilizată pentru evaluarea riscului prezentat de produs.

Cap. 7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 8**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	DrySan Oxy Wipes	zona Piata: UE
	IncidinOxyWipe	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0024303-0010 1-8	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	1 % (de greutate)

Cap. 1. **META-RCP 9 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 9 identificator**

Identificator	Meta SPC: META SPC 9

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-9

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale TP 4: Industria alimentară și a furajelor

Cap. 2. **COMPOZIȚIA META RCP 9**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 9**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	7 - 7,7 % (de greutate)
Acid fosforic	Acid orto-fosforic	Substanța inactivă	7664-38-2	231-633-2	1,5 - 1,5 % (de greutate)
Acid azotic	Acid azotic	Substanța inactivă	7697-37-2	231-714-2	3,71 - 3,71 % (de greutate)
Ester fosfat alcool EO	Poli (oxi-1,2-e-tandiil), .alfa.-hidro-.omega.-hidroxi-, mono-C8-10-alchil eteri, fosfați	Substanța inactivă	68130-47-2		14,625 - 14,625 % (de greutate)
Alchil poliglu-cozid C8-C10	(3R,4S,5-S,6R)-2-decoxi-6-(hidroxi-metil) oxa-n-3,4,5-triol	Substanța inactivă	68515-73-1	500-220-1	6,35 - 6,35 % (de greutate)
Alcooli, C10-C16 eto-xilați propoxi-lați (Dehydol 980)	Alcooli, C10-C16 etoxilați propoxilați	Substanța inactivă	69227-22-1		3 - 3 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 9**

Tip(uri) de formulare	SL Concentrat solubil

Cap. 3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 9**

Fraze de pericol	H290: Poate fi coroziv pentru metale. H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
Fraze de precauție	P234: Păstrați numai în recipientul original. P264: Spălați-vă mâinile bine după utilizare. P260: Nu inspirați vaporii. P260: Nu inspirați spray-ul. P280: Purtați echipament de protecție a feței. P280: Purtați mănuși de protecție. P280: Purtați echipament de protecție a ochilor. P280: Purtați îmbrăcăminte de protecție.

	P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați voma. P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. P310: Sunați imediat la un un medic. P310: Sunați imediat la un la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ. P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați victima la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. P321: Tratament specific (a se vedea măsurile de prim-ajutor pe această etichetă). P363: Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare. P390: Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere. P406: Depozitați într-un rezistent la coroziune cu dublură interioară rezistentă la coroziune. P405: A se depozita sub cheie. P501: Aruncați conținutul la în conformitate cu reglementările naționale. P501: Aruncați recipientul la în conformitate cu reglementările naționale.

Cap. 4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabel 1.

Dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni din spațiile medicale, care nu intră în contact cu alimentele, prin ștergere cu o lavetă curată/un șervețel curat, de unică folosință, și o găleată

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Ștergere folosind o lavetă/un șervețel și găleată Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică și nesistematică a suprafețelor de mici dimensiuni din saloanele de spital și din cabinetele medicale care sunt și care nu sunt frecvent atinse de persoane. Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii (diluție 5%); — 5 minute pentru levuri (diluție 3%); — 5 minute pentru fungi (diluție 4%); — 50 de minute pentru virusuri (diluție 5%).

Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 10 ml/m^2 Diluare (%): Diluție (%): 3-5 Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 10 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din HDPE opacă, 0,5-5 l Recipient cu toartă din HDPE opacă, de 0,5-5 l Pungă din HDPE opacă, de 0,01-1 l

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Dezinfectare sistematică: Dezinfectarea suprafețelor care pot fi contaminate în mod regulat cu patogeni în timpul activității medicilor sau a asistenților medicali, în vederea reducerii riscului de transmitere a respectivelor microorganisme prin intermediul suprafețelor.

Dezinfectare nesistematică: Dezinfectarea efectuată în situații de risc specifice (cu excepția cazului în care acest lucru este reglementat în mod diferit de autoritățile naționale de sănătate publică).

Produsul este destinat curățării și dezinfectării într-o singură etapă. Turnați produsul diluat într-o găleată curată și distribuiți-l pe suprafață cu ajutorul unei lavete/a unui șervețel, de unică folosință, după care ștergeți suprafața cu o lavetă curată/un șervețel curat și lăsați să se usuce la aer. Nu clătiți suprafața după utilizarea produsului. Nu utilizați pe suprafețe sensibile la agenți oxidanți (de ex., marmură, cupru sau alamă). Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

4.2. **Descrierea utilizării**

Tabel 2.

Dezinfectarea suprafețelor de mari dimensiuni din spațiile medicale, care nu intră în contact cu alimentele, prin spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date

	Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică și nesistematică a suprafețelor de mari dimensiuni din saloanele de spital și din cabinetele medicale care sunt și care nu sunt frecvent atinse de persoane. Durată de contact pentru spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii (diluție 5%); — 5 minute pentru levuri (diluție 3%); — 5 minute pentru fungi (diluție 4%); — 50 de minute pentru virusuri (diluție 5%).
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 20 ml/m^2 Diluare (%): Diluție (%): 3-5 Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 10 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din HDPE opacă, 0,5-5 l Recipient cu toartă din HDPE opacă, de 0,5-5 l Pungă din HDPE opacă, de 0,01-1 l

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Dezinfectare sistematică: Dezinfectarea suprafețelor care pot fi contaminate în mod regulat cu patogeni în timpul activității medicilor sau a asistenților medicali, în vederea reducerii riscului de transmitere a respectivelor microorganisme prin intermediul suprafețelor.

Dezinfectare nesistematică: Dezinfectarea efectuată în situații de risc specifice (cu excepția cazului în care acest lucru este reglementat în mod diferit de autoritățile naționale de sănătate publică).

Produsul este destinat curățării și dezinfectării într-o singură etapă. Umpleți găleata cu produs diluat, distribuiți-l pe podea cu ajutorul unui mop plat, apoi ștergeți suprafața cu un mop curat și uscat, după care lăsați să se usuce la aer. Nu clătiți suprafața după utilizarea produsului.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

4.3. **Descrierea utilizării**

Tabel 3.

Dezinfectarea suprafețelor de mici și/sau de mari dimensiuni din clădirile instituționale/comerciale, care nu intră în contact cu alimentele, prin pulverizare folosind un pulverizator cu trăgaci și prin ștergerea cu un șervețel uscat sau cu o lavetă de unică folosință și o găleată, și/sau dezinfectarea podelelor prin spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Pulverizare cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci și ștergere cu șervețele uscate Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mici dimensiuni din încăperi mici, care nu intră în contact cu alimentele (de ex., toalete). Durată de contact pentru pulverizare și ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii (diluție 5%); — 5 minute pentru levuri (diluție 3%); — 5 minute pentru fungi (diluție 4%); — 50 de minute pentru virusuri (diluție 5%). Metoda: Ștergere folosind o lavetă/un șervețel, de unică folosință, și o găleată Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mici dimensiuni din încăperi mici, care nu intră în contact cu alimentele (de ex., toalete). Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii (diluție 5%);

	— 5 minute pentru levuri (diluție 3%); — 5 minute pentru fungi (diluție 4%); — 50 de minute pentru virusuri (diluție 5%). Metoda: Spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mari dimensiuni din încăperi mici, care nu intră în contact cu alimentele (de ex., toalete). Durată de contact pentru spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii (diluție 5%); — 5 minute pentru levuri (diluție 3%); — 5 minute pentru fungi (diluție 4%); — 50 de minute pentru virusuri (diluție 5%). Metoda: Pulverizare, folosind un pulverizator cu trăgaci, și ștergere cu șervețel uscat, și spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mici și de mari dimensiuni din încăperi mici, care nu intră în contact cu alimentele (de ex., toalete). Durată de contact pentru pulverizare, ștergere și spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii (diluție 5%); — 5 minute pentru levuri (diluție 3%); — 5 minute pentru fungi (diluție 4%); — 50 de minute pentru virusuri (diluție 5%). Metoda: Ștergere folosind o lavetă/un șervețel și o găleată, și spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mici și de mari dimensiuni din încăperi mici, care nu intră în contact cu alimentele (de ex., toalete). Durată de contact pentru ștergere și spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii (diluție 5%); — 5 minute pentru levuri (diluție 3%); — 5 minute pentru fungi (diluție 4%); — 50 de minute pentru virusuri (diluție 5%).
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Cantitatea aplicată prin pulverizare: 10 ml/m^2 Diluare (%): Diluție (%): 3-5 Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare în cazul pulverizării cu un pulverizator cu trăgaci: până la de 10 ori pe zi per încăpere Frecvența de aplicare: Cantitatea aplicată pentru ștergere: 10 ml/m^2 Diluare (%): Diluție (%): 3-5 Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare pentru ștergere: de până la 10 ori pe zi per încăpere Frecvența de aplicare: Cantitatea aplicată prin spălare cu mopul: 20 ml/m^2

	Diluare (%): Diluție (%): 3-5 Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare în cazul ștergerii cu mopul: până la de 2 ori pe zi per încăpere Frecvența de aplicare: Cantitatea aplicată prin pulverizare: 10 ml/m^2; Cantitatea aplicată prin spălare cu mopul: 20 ml/m^2 Diluare (%): Diluție (%): 3-5 Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare în cazul în care se combină pulverizarea cu un pulverizator cu trăgaci cu spălarea cu mopul: o dată pe zi per încăpere. Frecvența de aplicare: Cantitatea aplicată pentru ștergere: 10 ml/m^2; Cantitatea aplicată prin spălare cu mopul: 20 ml/m^2 Diluare (%): Diluție (%): 3-5 Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare în cazul în care se combină ștergerea cu laveta și spălarea cu mopul: o dată pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din HDPE opacă, 0,5-5 l Recipient cu toartă din HDPE opacă, de 0,5-5 l Pungă din HDPE opacă, de 0,01-1 l

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Nu clătiți suprafața după utilizarea produsului.

Pulverizare: Pentru rezultate optime, țineți flaconul în poziție verticală și pulverizați de la o distanță de 30 cm. Pulverizați produsul diluat pe un șervețel uscat și ștergeți suprafețele de mici dimensiuni, cum ar fi blaturile de lucru și echipamentele, sau pulverizați produsul diluat pe suprafață, după care ștergeți suprafața cu un șervețel curat și uscat, sau lăsați să se usuce la aer. Închideți întotdeauna duza după utilizare. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

Ștergere: Turnați produsul diluat într-o găleată curată și distribuiți-l pe suprafață cu ajutorul unei lavete/a unui șervețel, de unică folosință, după care ștergeți suprafața cu o lavetă curată/un șervețel curat și lăsați să se usuce la aer. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

Spălare cu mopul: Umpleți găleata cu produs diluat, distribuiți-l pe podea cu ajutorul unui mop plat, apoi ștergeți suprafața cu un mop curat și uscat, după care lăsați să se usuce la aer.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Nu inspirați vaporii/spray-ul.

Pentru pulverizare: Suprafața care urmează să fie dezinfectată (în m^2) nu trebuie să fie mai mare de 1/10 din volumul încăperii (în m^3), de ex., într-o încăpere cu un volum de 120 m^3, suprafața maximă care trebuie dezinfectată este de 12 m^2.

4.3.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

4.3.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

4.3.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

4.4. **Descrierea utilizării**

Tabel 4.

Dezinfectarea suprafețelor de mari dimensiuni din clădirile instituționale/comerciale, care nu intră în contact cu alimentele, prin spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Spălare cu mopul, folosind un mop plat și o găleată Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mari dimensiuni din spațiile mari care nu intră în contact cu alimentele. Durată de contact pentru spălare cu mopul, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii (diluție 5%); — 5 minute pentru levuri (diluție 3%); — 5 minute pentru fungi (diluție 4%); — 50 de minute pentru virusuri (diluție 5%).
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 20 ml/m^2 Diluare (%): Diluție (%): 3-5 Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 10 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din HDPE opacă, 0,5-5 l Recipient cu toartă din HDPE opacă, de 0,5-5 l Pungă din HDPE opacă, de 0,01-1 l

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Umpleți găleata cu produs diluat, distribuiți-l pe podea cu ajutorul unui mop plat, apoi ștergeți suprafața cu un mop curat și uscat, după care lăsați să se usuce la aer. Nu clătiți suprafața după utilizarea produsului.

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Asigurați ventilația tehnică cu cel puțin 15 cicluri de schimbare a aerului/oră.

4.4.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

4.4.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

4.4.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

4.5. **Descrierea utilizării**

Tabel 5.

Dezinfectarea suprafețelor de mari dimensiuni din clădirile instituționale/comerciale, care nu intră în contact cu alimentele, prin pulverizare cu ajutorul unui dispozitiv montat pe perete

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Pulverizare cu ajutorul unui dispozitiv montat pe perete Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mari dimensiuni din spațiile care intră/nu intră în contact cu alimentele. Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii și levuri (diluție 3%). Durată de contact pentru pulverizare, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru bacterii (diluție 1.5%); — 15 minute pentru levuri (diluție 2%).
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 180 ml/m^2 Diluare (%): Diluție (%): 1.5-3 Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: o dată pe zi per încăpere

Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din HDPE opacă, 0,5-5 l Recipient cu toartă din HDPE opacă, de 0,5-5 l Pungă din HDPE opacă, de 0,01-1 l

4.5.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Aplicați produsul cu ajutorul unui dispozitiv montat pe perete. Clătiți după aplicare.

4.5.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Nu inspirați vaporii/spray-ul.

Asigurați ventilația tehnică cu cel puțin 15 cicluri de schimbare a aerului/oră.

4.5.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

4.5.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

4.5.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

4.6. **Descrierea utilizării**

Tabel 6.

Dezinfectarea suprafețelor de mari dimensiuni din clădirile instituționale/comerciale, care intră în contact cu alimentele, prin pulverizare pe suprafață folosind un pulverizator cu trăgaci și prin ștergere cu un șervețel uscat

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Pulverizare cu ajutorul unui pulverizator cu trăgaci și ștergere cu șervețele uscate Descriere detaliata:

	Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mari dimensiuni care intră în contact cu alimentele (de ex., bucătării). Durată de contact pentru pulverizare și ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii (diluție 5%); — 5 minute pentru levuri (diluție 3%); — 5 minute pentru fungi (diluție 4%); — 50 de minute pentru virusuri (diluție 5%).
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 10 ml/m^2 Diluare (%): Diluție (%): 3-5 Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 10 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din HDPE opacă, 0,5-5 l Recipient cu toartă din HDPE opacă, de 0,5-5 l Pungă din HDPE opacă, de 0,01-1 l

4.6.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Pentru rezultate optime, țineți flaconul în poziție verticală și pulverizați de la o distanță de 30 cm. Pulverizați produsul diluat pe un șervețel uscat și ștergeți suprafețele de mici dimensiuni, cum ar fi blaturile de lucru și echipamentele, sau pulverizați produsul diluat pe suprafață, după care ștergeți suprafața cu un șervețel curat și uscat și lăsați să se usuce la aer. Închideți întotdeauna duza după utilizare. Nu clătiți suprafața după utilizarea produsului. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.6.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Nu inspirați vaporii/spray-ul.

Țineți alimentele, băuturile și hrana pentru animale departe de suprafața tratată, până când aceasta este uscată. Nu utilizați produsul direct pe sau în apropierea alimentelor, a hranei pentru animale și a băuturilor.

Suprafața care urmează să fie dezinfectată (în m^2) nu trebuie să fie mai mare de 1/10 din volumul încăperii (în m^3), de ex., într-o încăpere cu un volum de 120 m^3, suprafața maximă care trebuie dezinfectată este de 12 m^2.

4.6.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

4.6.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

4.6.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

4.7. **Descrierea utilizării**

Tabel 7.

Dezinfectarea suprafețelor de mari dimensiuni din clădirile instituționale/comerciale, care intră în contact cu alimentele, prin ștergere cu o lavetă de unică folosință și o găleată

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Ștergere folosind o lavetă/un șervețel, de unică folosință, și o găleată Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mari dimensiuni care intră în contact cu alimentele (de ex., bucătării). Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii (diluție 5%); — 5 minute pentru levuri (diluție 3%); — 5 minute pentru fungi (diluție 4%); — 50 de minute pentru virusuri (diluție 5%).
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 10 ml/m^2 Diluare (%): Diluție (%): 3-5 Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 10 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon din HDPE opacă, 0,5-5 l Recipient cu toartă din HDPE opacă, de 0,5-5 l Pungă din HDPE opacă, de 0,01-1 l

4.7.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Turnați produsul diluat într-o găleată curată și distribuiți-l pe suprafață cu ajutorul unei lavete/a unui șervețel, de unică folosință, după care ștergeți suprafața cu o lavetă curată/un șervețel curat și lăsați să se usuce la aer. Nu clătiți suprafața după utilizarea produsului. Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

4.7.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Țineți alimentele, băuturile și hrana pentru animale departe de suprafața tratată, până când aceasta este uscată. Nu utilizați produsul direct pe sau în apropierea alimentelor, a hranei pentru animale și a băuturilor.

4.7.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

4.7.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

4.7.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 9.

Cap. 5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 9**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și respectați toate instrucțiunile furnizate. Produsul trebuie aplicat pe o suprafață uscată. Umeziți complet suprafața cu produs. Nu utilizați pe suprafețe sensibile la agenți oxidanți (de ex., marmură, cupru sau alamă).

Instrucțiuni privind diluarea (1.5%): pentru obținerea unui litru de dezinfectant diluat pentru suprafețe, adăugați 15 ml de produs concentrat la aproximativ 500 ml de apă distilată sau apă de calitate similară (de ex., apă demineralizată), după care amestecați și completați până la 1 litru cu apă distilată, sau cu apă de calitate similară.

Instrucțiuni privind diluarea (2%): pentru obținerea unui litru de dezinfectant diluat pentru suprafețe, adăugați 20 ml de produs concentrat la aproximativ 500 ml de apă distilată sau apă de calitate similară (de ex., apă demineralizată), după care amestecați și completați până la 1 litru cu apă distilată, sau cu apă de calitate similară.

Instrucțiuni privind diluarea (3%): pentru obținerea unui litru de dezinfectant diluat pentru suprafețe, adăugați 30 ml de produs concentrat la aproximativ 500 ml de apă distilată sau apă de calitate similară (de ex., apă demineralizată), după care amestecați și completați până la 1 litru cu apă distilată, sau cu apă de calitate similară.

Instrucțiuni privind diluarea (4%): pentru obținerea unui litru de dezinfectant diluat pentru suprafețe, adăugați 40 ml de produs concentrat la aproximativ 500 ml de apă distilată sau apă de calitate similară (de ex., apă demineralizată), după care amestecați și completați până la 1 litru cu apă distilată, sau cu apă de calitate similară.

Instrucțiuni privind diluarea (5%): pentru obținerea unui litru de dezinfectant diluat pentru suprafețe, adăugați 50 ml de produs concentrat la aproximativ 500 ml de apă distilată sau apă de calitate similară (de ex., apă demineralizată), după care amestecați și completați până la 1 litru cu apă distilată, sau cu apă de calitate similară.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

În timpul manipulării produsului purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (materialul mănușilor este specificat de titularul autorizației în informațiile referitoare la produs).

În timpul manipulării produsului este obligatorie utilizarea de dispozitive de protecție a ochilor.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

În cazul contactului cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Apelați imediat la asistență medicală.

În cazul contactului cu pielea: Îndepărtați produsul prin spălare cu apă din abundență, timp de cel puțin 15 minute. Utilizați un săpun delicat, dacă este disponibil. Spălați îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare. Curățați cu atenție încălțămintea înainte de reutilizare. Apelați imediat la asistență medicală.

În caz de înghițire: Clătiți gura cu apă. NU provocați voma. Nu administrați niciodată nimic pe gură unei persoane inconștiente. Apelați imediat la asistență medicală.

În caz de inhalare: Scoateți persoana la aer curat. Tratați simptomatic. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

MĂSURI DE URGENȚĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Împiedicați pătrunderea produsului în sol, în apele de suprafață sau pânza freatică.

Respectați dispozițiile cu privire la amplasarea mijloacelor de izolare în jurul recipientelor de depozitare.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Produs: Dacă este posibil, este de preferat reciclarea produsului în locul eliminării la gropile de gunoi sau al incinerării. În cazul în care reciclarea nu este posibilă, eliminați produsul cu respectarea reglementărilor naționale. Eliminați deșeurile la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor.

Ambalajele contaminate: Eliminați recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Depozitați în recipiente adecvate, etichetate corespunzător.

Temperatura de depozitare: 0-25 °C. Feriți de îngheț.

Perioada de valabilitate: 18 luni

Cap. 6. **ALTE INFORMAȚII**

Produsul conține peroxid de hidrogen (Nr. CAS: 7722-84-1), pentru care a fost agreată o valoare europeană de referință de 1.25 mg/m³ pentru uz profesional, iar aceasta a fost utilizată pentru evaluarea riscului prezentat de produs.

Cap. 7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 9**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	KitchenPro Oxy Des Concentrate	zona Piata: UE
	Incidin OxyPro	zona Piata: UE
	Sirafan Oxy Conc	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0024303-0011 1-9	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	7 % (de greutate)
Acid fosforic	Acid ortofosforic	Substanța inactivă	7664-38-2	231-633-2	1,5 % (de greutate)
Acid azotic	Acid azotic	Substanța inactivă	7697-37-2	231-714-2	3,71 % (de greutate)
Ester fosfat alcool EO	Poli(oxi-1,2-etandiil), .alfa.-hidro-.omega.-hidroxi-, mono-C8-10-alchil eteri, fosfați	Substanța inactivă	68130-47-2		14,625 % (de greutate)
Alchil poliglucozid C8-C10	(3R,4S,5S,6-R)-2-decoxi-6-(hidroximetil) oxan-3,4,5-triol	Substanța inactivă	68515-73-1	500-220-1	6,35 % (de greutate)
Alcooli, C10-C16 etoxilați propoxilați (Dehydol 980)	Alcooli, C10-C16 etoxilați propoxilați	Substanța inactivă	69227-22-1		3 % (de greutate)

7.2. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	Oasis Pro Oxy Des	zona Piata: UE
	Maxx Oxy Des 2	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0024303-0012 1-9	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	7 % (de greutate)
Acid fosforic	Acid ortofosforic	Substanța inactivă	7664-38-2	231-633-2	1,5 % (de greutate)
Acid azotic	Acid azotic	Substanța inactivă	7697-37-2	231-714-2	3,71 % (de greutate)

Ester fosfat alcool EO	Poli (oxi-1,2-e-tandiil), .alfa.-hidro-.omega.-hidroxi-, mono-C8-10-alch-il eteri, fosfați	Substanța inactivă	68130-47-2		14,625 % (de greutate)
Alchil poliglucozid C8-C10	(3R,4S,5-S,6R)-2-decoxi-6-(hidroxi-metil) oxa-n-3,4,5-tri-ol	Substanța inactivă	68515-73-1	500-220-1	6,35 % (de greutate)
Alcooli, C10-C16 etoxilați propoxilați (Dehydol 980)	Alcooli, C10-C16 etoxilați propoxilați	Substanța inactivă	69227-22-1		3 % (de greutate)

Cap. 1. **META-RCP 10 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 10 identificator**

Identificator	Meta SPC: META SPC 10

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-10

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 1: Igienă umană

Cap. 2. **COMPOZIȚIA META RCP 10**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 10**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 % (de greutate)
Acid citric monohidrat	2-hidroxi-propan -1,2,3-acid tricarboxi-lic	Substanța inactivă	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 % (de greutate)

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Fenoxietanol	2-fenoxie-tanol	Substanța inactivă	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 % (de greutate)
Lauril sulfat de sodiu	Dodecil sulfat de sodiu	Substanța inactivă	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 % (de greutate)
Acid L-glutamic, derivați N-cocoacilici, săruri monosodice	Sodiu;(4S)-4-amino-5-hidroxi-5-oxopen-tanoat	Substanța inactivă	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 % (de greutate)
Acid sulfuric, mono-C12-14 esteri de alchil, săruri de amo-niu (lauril sulfat de amoniu Texapon)	Acid sulfu-ric, mono-C12-14 esteri de alchil, săruri de amoniu	Substanța inactivă	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 10**

Tip(uri) de formulare	AL Orice alt lichid

Cap. 3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 10**

Fraze de pericol	H290: Poate fi coroziv pentru metale. H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Fraze de precauție	P234: Păstrați numai în recipientul original. P264: Spălați-vă mâinile bine după utilizare. P280: Purtați echipament de protecție a ochilor. P280: Purtați echipament de protecție a feței. P390: Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere. P406: Depozitați într-un rezistent la coroziune cu dublură interioară rezistentă la coroziune. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

Cap. 4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabel 1.

Săpun lichid antibacterian pentru mâini

Tip de produs	TP 1: Igienă umană
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-

Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Aplicare directă pe piele Descriere detaliata: Săpun antimicrobian pentru mâini, destinat exclusiv dezinfectării mâinilor, în industria alimentară și a băuturilor. Durată de contact la 20°C, în condiții de murdărie: — 60 de secunde pentru bacterii și levuri.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 3 ml de produs la fiecare aplicare Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: de 1-10 ori/zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Recipient cu toartă din HDPE opacă, de 1-100 l Canistră din HDPE opacă, 1-100 l Container IBC din HDPE opacă, 600-1.000 l Butoi din HDPE opacă, 60-220 l Flacon din HDPE opacă, 0,1-5 l Pungă din HDPE opacă, de 0,5-100 l

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 10.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 10.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 10.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 10.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 10.

Cap. 5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 10**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Aplicați aprox. 3 ml de produs pe mâinile umede și frecați timp de 60 de secunde. Clătiți bine cu apă de la robinet timp de aproximativ 30 de secunde.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Evitați stropirile și scurgerile de produs.

Nu vă atingeți ochii cu mâinile.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

În cazul contactului cu ochii: Clătiți cu apă.

În cazul contactului cu pielea: Clătiți cu apă.

În caz de înghițire: Clătiți gura. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

În caz de inhalare: Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

MĂSURI DE URGENȚĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Împiedicați pătrunderea produsului în sol, în apele de suprafață sau pânza freatică.

Respectați dispozițiile cu privire la amplasarea mijloacelor de izolare în jurul recipientelor de depozitare.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Produs: Dacă este posibil, este de preferat reciclarea produsului în locul eliminării la gropile de gunoi sau al incinerării. În cazul în care reciclarea nu este posibilă, eliminați produsul cu respectarea reglementărilor naționale. Eliminați deșeurile la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor.

Ambalajele contaminate: Eliminați recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Depozitați în recipiente adecvate, etichetate corespunzător.

Temperatura de depozitare: 0-25 °C

Perioada de valabilitate: 18 luni

Cap. 6. **ALTE INFORMAȚII**

Produsul conține peroxid de hidrogen (Nr. CAS: 7722-84-1), pentru care a fost agreată o valoare europeană de referință de 1.25 mg/m^3 pentru uz profesional, iar aceasta a fost utilizată pentru evaluarea riscului prezentat de produs.

Cap. 7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 10**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	Manosan Oxy	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0024303-0013 1-10	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	1,4 % (de greutate)
Acid citric monohidrat	2-hidroxi-propan -1,2,3-acid tricarboxilic	Substanța inactivă	5949-29-1	201-069-1	0,9 % (de greutate)
Fenoxietanol	2-fenoxieta-nol	Substanța inactivă	122-99-6	204-589-7	0,9 % (de greutate)
Lauril sulfat de sodiu	Dodecil sul-fat de sodiu	Substanța inactivă	151-21-3	205-788-1	3,88 % (de greutate)
Acid L-glutamic, derivați N-cocoaci-lici, săruri monosodice	Sodiu;(4S)-4-amino-5-hidroxi-5-oxopenta-noat	Substanța inactivă	68187-32-6	269-087-2	2 % (de greutate)
Acid sulfuric, mono-C12-14 esteri de alchil, săruri de amoniu (lauril sulfat de amoniu Texapon)	Acid sulfuric, mono-C12-14 esteri de alchil, săruri de amoniu	Substanța inactivă	90583-11-2	292-209-0	1,12 % (de greutate)

Cap. 1. **META-RCP 11 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 11 identificator**

Identificator	Meta SPC: META SPC 11

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-11

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale TP 4: Industria alimentară și a furajelor

Cap. 2. **COMPOZIȚIA META RCP 11**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 11**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 11**

Tip(uri) de formulare	AL Orice alt lichid

Cap. 3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 11**

Fraze de pericol	
Fraze de precauție	

Cap. 4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabel 1.

Dezinfectarea camerelor sterile de uz medical, prin ștergere cu șervețele impregnate cu produs gata de utilizare

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Spori de bacterii Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Clostridium difficile Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Micobacterii Denumirea comună: Micobacterii Etapă de dezvoltare: fără date

Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Ștergere cu șervețele impregnate cu produs gata de utilizare Descriere detaliata: Dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni, a aparatelor și a echipamentelor utilizate în camerele sterile de uz medical, precum și a spațiilor adiacente (de ex., în industria farmaceutică), precum și dezinfectarea în caz de transfer. Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii, levuri, fungi și micobacterii; — 30 de minute pentru virusuri; — 60 de minute pentru spori de bacterii. Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru spori de Clostridium difficile; — 30 de minute pentru spori de bacterii.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 1 șervețel pentru fiecare m^2 (corespunde unei cantități de 10 ml/m^2) Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Găleată din PET sau PE opacă, cu 10-5000 de șervețele impregnate, din amestec de 45% poliester și 55% celuloză (dimensiunea unui șervețel: 420x250 mm sau 200x200 mm). Pungă din PET/PE sau EVA/PP sau aluminiu/PE sau pungă din PE opacă, cu 10-100 de șervețele impregnate, din amestec de 45% poliester și 55% celuloză (dimensiunea unui șervețel: 420x250 mm sau 200x200 mm)

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 11.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

-

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 11.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 11.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 11.

4.2. **Descrierea utilizării**

Tabel 2.

Dezinfectarea camerelor sterile de uz medical, prin ștergere cu mopul, folosind șervețele impregnate pentru podele, gata de utilizare

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Spori de bacterii Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Clostridium difficile Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Micobacterii Denumirea comună: Micobacterii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Ștergere cu mopul, folosind șervețele impregnate pentru podele, gata de utilizare Descriere detaliata: Dezinfectarea podelelor din camerele sterile de uz medical, precum și a spațiilor adiacente (de ex., în industria farmaceutică). Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii, levuri, fungi și micobacterii; — 30 de minute pentru virusuri; — 60 de minute pentru spori de bacterii. Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de curățenie: — 5 minute pentru spori de Clostridium difficile; — 30 de minute pentru spori de bacterii.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 1 șervețel pentru fiecare m^2 (corespunde unei cantități de 10 ml/m^2) Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere

Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Găleată din PET sau PE opacă, cu 10-5000 de șervețele impregnate, din amestec de 45% poliester și 55% celuloză (dimensiunea unui șervețel: 420x250 mm sau 200x200 mm) Pungă din PET/PE sau EVA/PP sau aluminiu/PE sau pungă din PE opacă, cu 10-100 de șervețele impregnate, din amestec de 45% poliester și 55% celuloză (dimensiunea unui șervețel: 420x250 mm sau 200x200 mm)

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 11.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

-

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 11.

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 11.

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 11.

4.3. **Descrierea utilizării**

Tabel 3.

Dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni din spațiile medicale, care nu intră în contact cu alimentele, prin ștergere cu șervețele impregnate cu produs, gata de utilizare

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: Nu există date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Micobacterii Denumirea comună: Micobacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Spori de bacterii Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date

	Denumirea stiintifica: Clostridium difficile Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Ștergere cu șervețele impregnate cu produs gata de utilizare Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mici dimensiuni din saloanele de spital și din cabinetele medicale care nu sunt frecvent atinse de persoane. Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de curățenie: — 15 minute pentru Clostridium difficile; — 30 de minute pentru spori de bacterii, micobacterii și virusuri. Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie: — 15 minute pentru bacterii și levuri; — 30 de minute pentru fungi, micobacterii și virusuri.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 1 șervețel pentru fiecare m^2 (corespunde unei cantități de 10 ml/m^2) Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 2 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pungă opacă preimprimată, cu 10-100 de șervețele impregnate, din amestec de 60% poliester / 40% lyocell (dimensiunea șervețelului: 420 x 250 mm sau 200 x 200 mm). Bidon din PET opacă, cu 10-1.000 de șervețele impregnate, din amestec de 60% poliester și 40% lyocell (dimensiunea șervețelului: 420 x 250 mm sau 200 x 200 mm). Găleată din PET opacă, cu 10-1.000 de șervețele impregnate, din amestec de 60% poliester și 40% lyocell (dimensiunea șervețelului: 420 x 250 mm sau 200 x 200 mm). Pungă din PET opacă, cu 10-1.000 de șervețele impregnate, din amestec de 60% poliester și 40% lyocell (dimensiunea șervețelului: 420 x 250 mm sau 200 x 200 mm).

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Dezinfectare sistematică: Dezinfectarea suprafețelor care pot fi contaminate în mod regulat cu patogeni în timpul activității medicilor sau a asistenților medicali, în vederea reducerii riscului de transmitere a respectivelor microorganisme prin intermediul suprafețelor.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

-

4.3.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 11.

4.3.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 11.

4.3.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 11.

4.4. **Descrierea utilizării**

Tabel 4.

Dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni din clădirile instituționale/comerciale, care nu intră în contact cu alimentele, prin ștergere cu șervețele impregnate cu produs, gata de utilizare

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: Nu există date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Micobacterii Denumirea comună: Micobacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Spori de bacterii Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Clostridium difficile Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Ștergere cu șervețele impregnate cu produs gata de utilizare Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mici dimensiuni din încăperi mici, care nu intră în contact cu alimentele (de ex., toalete). Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de curățenie: 15 minute pentru spori de Clostridium difficile; — 30 de minute pentru spori de bacterii, micobacterii și virusuri.

	Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie: — 2 minute pentru bacterii; — 15 minute pentru levuri; — 30 de minute pentru fungi, micobacterii și virusuri.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 1 șervețel pentru fiecare m^2 (corespunde unei cantități de 10 ml/m^2) Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 10 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pungă opacă preimprimată, cu 10-100 de șervețele impregnate, din amestec de 60% poliester / 40% lyocell (dimensiunea șervețelului: 420 x 250 mm sau 200 x 200 mm). Bidon din PET opacă, cu 10-1.000 de șervețele impregnate, din amestec de 60% poliester și 40% lyocell (dimensiunea șervețelului: 420 x 250 mm sau 200 x 200 mm). Găleată din PET opacă, cu 10-1.000 de șervețele impregnate, din amestec de 60% poliester și 40% lyocell (dimensiunea șervețelului: 420 x 250 mm sau 200 x 200 mm). Pungă din PET opacă, cu 10-1.000 de șervețele impregnate, din amestec de 60% poliester și 40% lyocell (dimensiunea șervețelului: 420 x 250 mm sau 200 x 200 mm).

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 11.

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

-

4.4.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 11.

4.4.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 11.

4.4.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 11.

4.5. **Descrierea utilizării**

Tabel 5.

Dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni din clădirile instituționale/comerciale, care intră în contact cu alimentele, prin ștergere cu șervețele impregnate cu produs, gata de utilizare

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-

Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: Nu există date Denumirea stiintifica: Fungi Denumirea comună: fungi Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Micobacterii Denumirea comună: Micobacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Spori de bacterii Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Clostridium difficile Denumirea comună: Spori de bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Virusuri Denumirea comună: Virusuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Ștergere cu șervețele impregnate cu produs gata de utilizare Descriere detaliata: Dezinfectarea sistematică a suprafețelor de mici dimensiuni din încăperi mici, care intră în contact cu alimentele (de ex., bucătării). Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de curățenie: — 15 minute pentru spori de Clostridium difficile; — 30 de minute pentru spori de bacterii, micobacterii și virusuri. Durată de contact pentru ștergere, la 20°C, în condiții de murdărie: — 2 minute pentru bacterii; — 15 minute pentru levuri; — 30 de minute pentru fungi, micobacterii și virusuri.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 1 șervețel pentru fiecare m^2 (corespunde unei cantități de 10 ml/m^2) Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 10 ori pe zi per încăpere
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pungă opacă preimprimată, cu 10-100 de șervețele impregnate, din amestec de 60% poliester / 40% lyocell (dimensiunea șervețelului: 420 x 250 mm sau 200 x 200 mm). Bidon din PET opacă, cu 10-1.000 de șervețele impregnate, din amestec de 60% poliester și 40% lyocell (dimensiunea șervețelului: 420 x 250 mm sau 200 x 200 mm).

	Găleată din PET opacă, cu 10-1.000 de șervețele impregnate, din amestec de 60% poliester și 40% lyocell (dimensiunea șervețelului: 420 x 250 mm sau 200 x 200 mm). Pungă din PET opacă, cu 10-1.000 de șervețele impregnate, din amestec de 60% poliester și 40% lyocell (dimensiunea șervețelului: 420 x 250 mm sau 200 x 200 mm).

4.5.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 11.

4.5.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Țineți alimentele, băuturile și hrana pentru animale departe de suprafața tratată, până când aceasta este uscată. Nu utilizați produsul direct pe sau în apropierea alimentelor, a hranei pentru animale și a băuturilor.

4.5.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 11.

4.5.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 11.

4.5.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 11.

Cap. 5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 11**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Produsul este destinat curățării și dezinfectării într-o singură etapă. Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și respectați toate instrucțiunile furnizate. Atunci când utilizați produsul în spații sterile: curățați suprafața înainte să aplicați produsul. Aplicați produsul pe o suprafață uscată. Umeziți complet suprafața cu produs. Lăsați suprafața să se usuce la aer. Nu clătiți suprafața după utilizarea produsului. Închideți recipientul după utilizare. Nu utilizați șervețelele uscate. Eliminați recipientul după golire. Nu utilizați pe suprafețe sensibile la agenți oxidanți (de ex., marmură, cupru sau alamă). Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

-

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

În cazul contactului cu ochii: Clătiți cu multă apă.

În cazul contactului cu pielea: Clătiți cu multă apă.

În caz de înghițire: Clătiți gura. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

În caz de inhalare: Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

MĂSURI DE URGENȚĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Împiedicați pătrunderea produsului în sol, în apele de suprafață sau pânza freatică.

Respectați dispozițiile cu privire la amplasarea mijloacelor de izolare în jurul recipientelor de depozitare.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Produs: Dacă este posibil, este de preferat reciclarea produsului în locul eliminării la gropile de gunoi sau al incinerării. În cazul în care reciclarea nu este posibilă, eliminați produsul cu respectarea reglementărilor naționale. Eliminați deșeurile la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor.

Ambalajele contaminate: Eliminați recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Depozitați în recipiente adecvate, etichetate corespunzător.

Temperatura de depozitare: 0-35 °C. Feriți de îngheț.

Perioada de valabilitate: 18 luni

Cap. 6. **ALTE INFORMAȚII**

Produsul conține peroxid de hidrogen (Nr. CAS: 7722-84-1), pentru care a fost agreată o valoare europeană de referință de 1.25 mg/m³ pentru uz profesional, iar aceasta a fost utilizată pentru evaluarea riscului prezentat de produs.

Cap. 7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 11**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide	zona Piata: UE			
	Anios Low Peroxide IP sterile wipes	zona Piata: UE			
Numărul autorizației	EU-0024303-0014 1-11				
Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (de greutate)

7.2. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	Incidin OxyWipe S	zona Piata: UE
	KitchenPro Oxy Wipes S	zona Piata: UE
	Sirafan Oxy Wipes	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0024303-0015 1-11	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (de greutate)

Cap. 1. **META-RCP 12 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 12 identificator**

Identificator	Meta SPC: META SPC 12

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-12

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale TP 4: Industria alimentară și a furajelor

Cap. 2. **COMPOZIȚIA META RCP 12**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 12**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 % (de greutate)
N-propanol	Propan-1-ol	Substanța inactivă	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 12**

Tip(uri) de formulare	AL Orice alt lichid

Cap. 3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 12**

Fraze de pericol	H226: Lichid și vapori inflamabili. H318: Provoacă leziuni oculare grave.
Fraze de precauție	P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P233: Păstrați recipientul închis etanș. P240: Legătură la pământ și conexiune echipotențială cu recipientul și cu echipamentul de recepție.

	P241: Utilizați echipamente electrice antideflagrante. P241: Utilizați echipamente de ventilare antideflagrante. P241: Utilizați echipamente de iluminat antideflagrante. P242: Nu utilizați unelte care produc scântei. P243: Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice. P280: Purtați echipament de protecție a ochilor. P280: Purtați echipament de protecție a feței. P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P310: Sunați imediat la un la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ. P310: Sunați imediat la un un medic. P370+P378: În caz de incendiu: Utilizați apă pentru stingere. P403+P235: A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. P501: Aruncați conținutul la în conformitate cu reglementările naționale. P501: Aruncați recipientul la în conformitate cu reglementările naționale.

Cap. 4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabel 1.

Dezinfectarea suprafețelor din sectorul industrial (de ex., cantine, toalete) prin ștergerea cu șervețele impregnate cu produs gata de utilizare

Tip de produs	TP 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Ștergere cu șervețele impregnate cu produs gata de utilizare Descriere detaliata: Dezinfectarea suprafețelor din sectorul industrial (de ex., cantine, toalete). Durată de contact pentru ștergere, la 10°C și la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii și levuri;
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 1 șervețel pentru fiecare m^2 (corespunde unei cantități de 10 ml/m^2) Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 3 ori pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Găleată din PP opacă, cu 10-5.000 de șervețele impregnate, din material nețesut, 100% polipropilenă (dimensiunea șervețelului: 200 x 250 mm). Pungă din PE opacă, cu 10-5.000 de șervețele impregnate, din material nețesut, 100% polipropilenă (dimensiunea șervețelului: 200 x 250 mm).

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 12.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 12.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 12.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 12.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 12.

4.2. **Descrierea utilizării**

Tabel 2.

Dezinfectarea suprafețelor din industria alimentară și a băuturilor care intră în contact cu alimentele, prin ștergere cu șervețele impregnate cu produs gata de utilizare

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: Bacterii Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: Levuri Denumirea comună: Levuri Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Ștergere cu șervețele impregnate cu produs gata de utilizare Descriere detaliata: Dezinfectarea suprafețelor de mici dimensiuni din fabricile de procesare a alimentelor. Durată de contact pentru ștergere, la 10°C și la 20°C, în condiții de murdărie: — 5 minute pentru bacterii și levuri;
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Rata de aplicare: 1 șervețel pentru fiecare m^2 (corespunde unei cantități de 10 ml/m^2) Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența de aplicare: până la de 4 ori pe zi

Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Găleată din PP opacă, cu 10-5.000 de șervețele impregnate, din material nețesut, 100% polipropilenă (dimensiunea șervețelului: 200 x 250 mm). Pungă din PE opacă, cu 10-5.000 de șervețele impregnate, din material nețesut, 100% polipropilenă (dimensiunea șervețelului: 200 x 250 mm).

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 12.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Țineți alimentele, băuturile și hrana pentru animale departe de suprafața tratată, până când aceasta este uscată. Nu utilizați produsul direct pe sau în apropierea alimentelor, a hranei pentru animale și a băuturilor.

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 12.

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 12.

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare din meta-RCP 12.

Cap. 5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 12**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și respectați toate instrucțiunile furnizate. Produsul trebuie aplicat pe o suprafață uscată. Umeziți complet suprafața cu produs. Lăsați suprafața să se usuce la aer după utilizarea produsului. Nu clătiți suprafața după utilizarea produsului. Închideți recipientul după utilizare. Nu utilizați șervețelele uscate. Eliminați recipientul după golire. Nu utilizați pe suprafețe sensibile la agenți oxidanți (de ex., marmură, cupru sau alamă). Aruncați șervețelele utilizate într-un recipient închis.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Nu vă atingeți ochii cu mâinile.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

În cazul contactului cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Apelați imediat la asistență medicală.

În cazul contactului cu pielea: Clătiți cu multă apă.

În caz de înghițire: Clătiți gura. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

În caz de inhalare: Scoateți persoana la aer curat. Tratați simptomatic. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

MĂSURI DE URGENȚĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Împiedicați pătrunderea produsului în sol, în apele de suprafață sau pânza freatică.

Respectați dispozițiile cu privire la amplasarea mijloacelor de izolare în jurul recipientelor de depozitare

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Produs: Dacă este posibil, este de preferat reciclarea produsului în locul eliminării la gropile de gunoi sau al incinerării. În cazul în care reciclarea nu este posibilă, eliminați produsul cu respectarea reglementărilor naționale. Eliminați deșeurile la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor.

Ambalajele contaminate: Eliminați recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Depozitați în recipiente adecvate, etichetate corespunzător. Depozitați departe de căldură și de sursele de aprindere. Depozitați într-un spațiu răcoros și bine aerisit. Depozitați departe de agenții oxidanți.

Temperatura de depozitare: 0-30 °C.

Perioada de valabilitate: 12 luni

Cap. 6. **ALTE INFORMAȚII**

Produsul conține peroxid de hidrogen (Nr. CAS: 7722-84-1), pentru care a fost agreată o valoare europeană de referință de 1.25 mg/m³ pentru uz profesional, iar aceasta a fost utilizată pentru evaluarea riscului prezentat de produs.

Cap. 7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 12**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	OxyDes Maxi Wipes	zona Piata: UE			
Numărul autorizației	EU-0024303-0016 1-12				
Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Peroxid de hidrogen		substanță activă	7722-84-1	231-765-0	2 % (de greutate)
N-propanol	Propan-1-ol	Substanța inactivă	71-23-8	200-746-9	17,5 % (de greutate)