Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2024/2209

11.9.2024

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/2209

z dne 5. septembra 2024

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2022/1423 glede upravnih in manjših sprememb dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „Hydrogen Peroxide Family 1“

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov ([1]) ter zlasti člena 50(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1423 ([2]) je bilo 22. julija 2022 družbi Ecolab Deutschland GmbH izdano dovoljenje Unije s številko dovoljenja EU-0024303-0000 za dostopnost na trgu in uporabo družine biocidnih proizvodov „Hydrogen Peroxide Family 1“.

(2) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 354/2013 ([3]) določa postopkovna pravila za različne kategorije sprememb iz člena 50(3) Uredbe (EU) št. 528/2012. Komisija po prejemu mnenja Evropske agencije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o vlogi imetnika dovoljenja Unije za spremembo katere od informacij, predloženih za prvotno vlogo za izdajo dovoljenja, odloči, ali so pogoji iz člena 19 ali po potrebi iz člena 25 Uredbe (EU) št. 528/2012 še vedno izpolnjeni in ali je treba spremeniti pogoje dovoljenja.

(3) Družba Ecolab Deutschland GmbH je 28. septembra 2022 v skladu s členom 11(1) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 354/2013 Agenciji predložila obvestilo v zvezi z upravnimi spremembami dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „Hydrogen Peroxide Family 1“ iz naslova 1 Priloge k navedeni uredbi. Družba Ecolab Deutschland GmbH je predlagala, da se dodajo trgovska imena za pet biocidnih proizvodov iz družine in štirje proizvajalci proizvodov ter da se spremenijo upravne podrobnosti dveh proizvajalcev proizvodov. Obvestilo je bilo v registru biocidnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: register) evidentirano pod številko zadeve BC-RU080137-08.

(4) Družba Ecolab Deutschland GmbH je 13. oktobra 2022 v skladu s členom 12(1) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 354/2013 Agenciji predložila vlogo za manjšo spremembo dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „Hydrogen Peroxide Family 1“ iz naslova 2 Priloge k navedeni uredbi. Družba Ecolab Deutschland GmbH je predložila vlogo za podaljšanje roka uporabnosti s 6 mesecev na 18 mesecev za proizvode iz meta povzetka lastnosti biocidnega proizvoda (SPC) 8. Vloga je bila v registru evidentirana pod številko zadeve BC-SX080682-96.

([1]) UL L 167, 27.6.2012, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1423 z dne 22. julija 2022 o izdaji dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „Hydrogen Peroxide Family 1“ (UL L 222, 26.8.2022, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1423/oj).

([3]) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 354/2013 z dne 18. aprila 2013 o spremembah biocidnih proizvodov, za katere je bilo izdano dovoljenje v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 109, 19.4.2013, str. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) Družba Ecolab Deutschland GmbH je 5. decembra 2022 v skladu s členom 12(1) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 354/2013 Agenciji predložila nadaljnjo vlogo za manjšo spremembo dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „Hydrogen Peroxide Family 1“. Družba Ecolab Deutschland GmbH je v navedeni vlogi zaprosila, da se doda več embalažnih materialov in velikosti embalaže za proizvode iz meta povzetka lastnosti biocidnih proizvodov 1, 5 in 11 ter nov material robčkov za proizvode iz meta povzetka lastnosti biocidnega proizvoda 1 in da se odstrani embalažni material za proizvode iz meta povzetka lastnosti biocidnega proizvoda 1. Vloga je bila v registru evidentirana pod številko zadeve BC-SR082474-07.

(6) Agencija je 4. novembra 2022 v skladu s členom 11(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 354/2013 Komisiji predložila mnenje ([4]) o predlaganih upravnih spremembah skupaj z revidiranim povzetkom značilnosti biocidnega proizvoda. V mnenju je ugotovljeno, da spremembe obstoječega dovoljenja, ki jih predlaga imetnik dovoljenja, spadajo na področje uporabe člena 3(1), točka (aa), Uredbe (EU) št. 528/2012 in da so po uvedbi sprememb pogoji iz člena 19 navedene uredbe še vedno izpolnjeni.

(7) Agencija je 11. oktobra 2023 v skladu s členom 12(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 354/2013 Komisiji predložila mnenji Odbora za biocidne proizvode ([5]) o dveh vlogah za manjši spremembi skupaj z revidiranim povzetkom značilnosti biocidnega proizvoda in revidiranim poročilom o oceni. V obeh mnenjih je ugotovljeno, da so po uvedbi sprememb pogoji iz člena 19 Uredbe (EU) št. 528/2012 še vedno izpolnjeni.

(8) Agencija je 10. novembra 2023 Komisiji v skladu s členom 11(6) in členom 12(6) Izvedbene uredbe (EU) št. 354/2013 predložila revidirani povzetek značilnosti biocidnega proizvoda iz dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „Hydrogen Peroxide Family 1“ v vseh uradnih jezikih Unije, ki zajema vse predlagane in zahtevane upravne in manjše spremembe.

(9) Komisija se strinja z mnenjema Agencije in torej meni, da je primerno spremeniti dovoljenje Unije za družino biocidnih proizvodov „Hydrogen Peroxide Family 1“, da se uvedejo upravne in manjše spremembe, ki jih je zahtevala družba Ecolab Deutschland GmbH.

(10) Razen sprememb, povezanih z upravnimi in manjšimi spremembami, vse druge informacije, vključene v povzetek značilnosti biocidnega proizvoda „Hydrogen Peroxide Family 1“ iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2022/1423, ostanejo nespremenjene.

(11) Za večjo jasnost in olajšanje dostopa uporabnikov in zainteresiranih strani do končne konsolidirane različice povzetka značilnosti biocidnega proizvoda, ki ga Agencija objavi, bi bilo treba Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) 2022/1423 v celoti nadomestiti.

(12) Izvedbeno uredbo (EU) 2022/1423 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2022/1423 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

([4]) Mnenje ECHA z dne 4. novembra 2022 o upravni spremembi dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „Hydrogen Peroxide Family 1“, mnenje št. UAD-C-1622642-38-00/F, https://echa.europa.eu/documents/10162/3443008/opinion_for_ua-admin_changes_bc-ru080137-08_en.pdf/469baca4-81c1-8874-38b5-9c2527e91b22?t=1686113940831.

([5]) Mnenje Odbora za biocidne proizvode z dne 10. oktobra 2023 o manjši spremembi dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „Hydrogen Peroxide Family 1“, ECHA/BPC/398/2023, https://echa.europa.eu/documents/10162/79839763/hydrogen_peroxide_fam1_ua_mic_bc_SX080682_96_final_bpc_opinion_en.pdf/cd4031f2-7320-012f-abf1-f2a3cde1b836?t=1714715369299, in mnenje Odbora za biocidne proizvode z dne 10. oktobra 2023 o manjši spremembi dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „Hydrogen Peroxide Family 1“, ECHA/BPC/399/2023, https://echa.europa.eu/documents/10162/3443008/hydrogen_peroxide_fam1_ua_mic_bc_SR082474_07_final_bpc_opinion_en.pdf/f2800274-60a5-ec70-011b-57a6ab561b7e?t=1714716331548.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. septembra 2024

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

Povzetek značilnosti družine biocidnega proizvoda

Hydrogen Peroxide Family 1

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih

Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

Vrsta proizvoda 03 (PT03): Veterinarska higiena

Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena

Številka dovoljenja EU-0024303-0000

Številka proizvoda v R4BP EU-0024303-0000

Del I.

PRVA RAVEN INFORMACIJ

Poglavje 1. **UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Ime družine**

Ime	Hydrogen Peroxide Family 1

1.2. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo Vrsta proizvoda 03 (PT03): Veterinarska higiena Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena

1.3. **Imetnik dovoljenja**

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Ecolab Deutschland GmbH
	Naslov	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein DE
Številka dovoljenja	EU-0024303-0000	
Številka proizvoda v R4BP	EU-0024303-0000	
Datum dovoljenja	15. September 2022	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	31. avgust 2032	

1.4. **Proizvajalec(-ci) proizvoda**

Ime proizvajalca	Ecolab Europe GmbH
Naslov proizvajalca	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Švica
Kraj proizvodnih obratov	Ecolab Europe GmbH site 1 A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Nemčija Ecolab Europe GmbH site 2 ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Bizkaia Španija

	Ecolab Europe GmbH site 3 ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Zaragoza Španija
	Ecolab Europe GmbH site 4 ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 5 Arkema GmbH Morschheimer Srtrasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Nemčija
	Ecolab Europe GmbH site 6 AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. 2800 Kgs Lyngby Danska
	Ecolab Europe GmbH site 7 Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Ljubljana Slovenija
	Ecolab Europe GmbH site 8 BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moskva Ruska federacija
	Ecolab Europe GmbH site 9 BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH1 59LH Burgess Hill Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 10 BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon sur Saöne Cedex Francija
	Ecolab Europe GmbH site 11 Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Italija
	Ecolab Europe GmbH site 12 BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron Francija
	Ecolab Europe GmbH site 13 BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Avstrija
	Ecolab Europe GmbH site 14 BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Muehlheim Nemčija
	Ecolab Europe GmbH site 15 BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Nemčija
	Ecolab Europe GmbH site 16 BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Muehlheim Nemčija
	Ecolab Europe GmbH site 17 BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Danska
	Ecolab Europe GmbH site 18 Brenntag Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Danska
	Ecolab Europe GmbH site 19 BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville Francija
	Ecolab Europe GmbH site 20 BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Poljska
	Ecolab Europe GmbH site 21 Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo 28906 Madrid Španija
	Ecolab Europe GmbH site 22 BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Basel Švica
	Ecolab Europe GmbH site 23 Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhause Nemčija
	Ecolab Europe GmbH site 24 Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Duesseldorf Nemčija
	Ecolab Europe GmbH site 25 Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 County Cork Irska
	Ecolab Europe GmbH site 26 COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Nemčija
	Ecolab Europe GmbH site 27 COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. “COFARCAS” Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos Španija

	Ecolab Europe GmbH site 28 COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARCELONA Španija Ecolab Europe GmbH site 29 COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL Francija Ecolab Europe GmbH site 30 DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Izrael Ecolab Europe GmbH site 31 Denteck BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Nizozemska Ecolab Europe GmbH site 32 DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (ILLES BALEARES) Španija Ecolab Europe GmbH site 33 ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Nemčija Ecolab Europe GmbH site 34 ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Girona Španija Ecolab Europe GmbH site 35 ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Francija Ecolab Europe GmbH site 36 ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Cisterna di Latina Italija Ecolab Europe GmbH site 37 ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske Ecolab Europe GmbH site 38 ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske Ecolab Europe GmbH site 39 ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATENE Grčija Ecolab Europe GmbH site 40 ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Slovenija Ecolab Europe GmbH site 41 ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Nizozemska Ecolab Europe GmbH site 42 ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Malta Ecolab Europe GmbH site 43 ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Nizozemska Ecolab Europe GmbH site 44 ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Italija Ecolab Europe GmbH site 45 ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Italija Ecolab Europe GmbH site 46 ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikummuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Finska Ecolab Europe GmbH site 47 ECL Tessenderlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessenderlo Belgija Ecolab Europe GmbH site 48 Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske Ecolab Europe GmbH site 49 EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle Francija Ecolab Europe GmbH site 50 Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Nemčija Ecolab Europe GmbH site 51 F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Francija

	Ecolab Europe GmbH site 52 Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 53 GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Španija
	Ecolab Europe GmbH site 54 GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Nizozemska
	Ecolab Europe GmbH site 55 HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt StroiTel ei Russia 413116 Engels Ruska federacija
	Ecolab Europe GmbH site 56 Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Nemčija
	Ecolab Europe GmbH site 57 INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Tosno - Leningradskaya Ruska federacija
	Ecolab Europe GmbH site 58 JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Portugalska
	Ecolab Europe GmbH site 59 Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Nemčija
	Ecolab Europe GmbH site 60 Kompak Nederland B.V. Ambachtsweg 4, 4854 MK, Bavel Nizozemska
	Ecolab Europe GmbH site 61 La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Sevilla Španija
	Ecolab Europe GmbH site 62 LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Francija
	Ecolab Europe GmbH site 63 LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Francija
	Ecolab Europe GmbH site 64 LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Nemčija
	Ecolab Europe GmbH site 65 Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Nemčija
	Ecolab Europe GmbH site 66 McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent Španija
	Ecolab Europe GmbH site 67 Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Nizozemska
	Ecolab Europe GmbH site 68 NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Danska
	Ecolab Europe GmbH site 69 PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 70 Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Nemčija
	Ecolab Europe GmbH site 71 Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Danska
	Ecolab Europe GmbH site 72 PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valencia Španija
	Ecolab Europe GmbH site 73 THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 74 QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Španija
	Ecolab Europe GmbH site 75 RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Segade Portugalska
	Ecolab Europe GmbH site 76 ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Francija

	Ecolab Europe GmbH site 77 RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ LAMBOURN Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 78 SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Barcelona Španija
	Ecolab Europe GmbH site 79 Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3 D-86456 Gablingen Nemčija
	Ecolab Europe GmbH site 80 Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Nemčija
	Ecolab Europe GmbH site 81 SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Nizozemska
	Ecolab Europe GmbH site 82 Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 83 Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milano Milano Italija
	Ecolab Europe GmbH site 84 van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Nizozemska
	Ecolab Europe GmbH site 85 Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry Mory Francija
	Ecolab Europe GmbH site 86 Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset Francija
	Ecolab Europe GmbH site 87 INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Nemčija
	Ecolab Europe GmbH site 88 Sima Pharma, 54 Avenue de la Plaine, ZI 13106 Rousset Cedex Francija
	Ecolab Europe GmbH site 89 Techtex (Technical Textile Services Ltd) Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silburn Way, Middleton, M24 4NE Manchester Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 90 Helico B.V. Hoogschaijksestraat 31 5374 EC Schaijk Nizozemska
	Ecolab Europe GmbH site 91 INCARE BV Keizersveld 99 5803 AP Venray Nizozemska
	Ecolab Europe GmbH site 92 ECL Mullingar Ecolab Ltd (IE). Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Irska
	Ecolab Europe GmbH site 93 ECL Mullingar. Ecolab Manufacturing IE Ltd (IE) Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91 Mullingar, Co. Westmeath Westmeath Irska
	Ecolab Europe GmbH site 94 ECL Weavergate Site: Nalco Manufacturing Limited, Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich, Cheshire (Postal Address: PO Box 11, Winnington Avenue, Northwich, Cheshire CW8 4DX) Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 95 ECL Weavergate, Ecolab Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
	Ecolab Europe GmbH site 96 ECL Weavergate, Ecolab Manufacturing UK Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

1.5. **Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi**

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Evonik Degussa Antwerpen NV
Naslov proizvajalca	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgija
Kraj proizvodnih obratov	Evonik Degussa Antwerpen NV site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgija

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Evonik Degussa GmbH
Naslov proizvajalca	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Evonik Degussa GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Nemčija

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Evonik Peroxid GmbH
Naslov proizvajalca	Industriestraβe 1 9721 Weiβenstein Avstrija
Kraj proizvodnih obratov	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestraβe 1 9721 Weiβenstein Avstrija

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Evonik Peroxide Netherlands BV
Naslov proizvajalca	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Nizozemska
Kraj proizvodnih obratov	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Nizozemska

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Belinka Perkemija D.O.O
Naslov proizvajalca	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenija
Kraj proizvodnih obratov	Belinka Perkemija D.O.O site 1 Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenija

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Solvay Chemie SA
Naslov proizvajalca	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgija
Kraj proizvodnih obratov	Solvay Chemie SA site 1 Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgija

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Solvay Chimica Italia S.p.A
Naslov proizvajalca	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italija
Kraj proizvodnih obratov	Solvay Chimica Italia S.p.A site 1 Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italija

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Solvay Chemicals GmbH
Naslov proizvajalca	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Solvay Chemicals GmbH site 1 Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Nemčija

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Solvay Interox Limited
Naslov proizvajalca	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Kraj proizvodnih obratov	Solvay Interox Limited site 1 Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Solvay Chemicals Finland OY
Naslov proizvajalca	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finska
Kraj proizvodnih obratov	Solvay Chemicals Finland OY site 1 Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finska

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Naslov proizvajalca	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugalska
Kraj proizvodnih obratov	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA site 1 Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugalska

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Kemira Rotterdam BV
Naslov proizvajalca	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Nizozemska
Kraj proizvodnih obratov	Kemira Rotterdam BV site 1 Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Nizozemska

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Kemira Chemical Oy
Naslov proizvajalca	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finska
Kraj proizvodnih obratov	Kemira Chemical Oy site 1 Typpitie PL 171 90101 Oulu Finska

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Kemira Kemi AB
Naslov proizvajalca	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Švedska
Kraj proizvodnih obratov	Kemira Kemi AB site 1 Industrigatan 83 25109 Helsingborg Švedska

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
Naslov proizvajalca	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Francija
Kraj proizvodnih obratov	ARKEMA France – USINE DE JARRIE site 1 Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Francija

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
Naslov proizvajalca	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA site 1 Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Nemčija

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Ecolab Europe GmbH
Naslov proizvajalca	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Ecolab Europe GmbH site 1 Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Nemčija

Poglavje 2. **SESTAVA IN FORMULACIJA DRUŽINE PROIZVODOV**

2.1. **Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi družine**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	1 - 36,75 % (m/m)
N-propanol	Propan-1-ol	Neaktivna snov	71-23-8	200-746-9	0 - 17,5 % (m/m)
Monohidrat citronske kisline	2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilna kislina	Neaktivna snov	5949-29-1	201-069-1	0 - 0,9 % (m/m)
Fenoksietanol	2-Fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0 - 0,9 % (m/m)
Natrijev lavril sulfat	Natrijev dodecil sulfat	Neaktivna snov	151-21-3	205-788-1	0 - 3,88 % (m/m)
L-Glutaminska kislina, deriv. N-koko acil, mononatrijeve soli	Natrijev;(4S)-4-amino-5-hidroksi-5-oksopentanoat	Neaktivna snov	68187-32-6	269-087-2	0 - 2 % (m/m)
Žveplova kislina, mono-C12-14-alkil estri, amonijeve soli (Texapon ALS)	Žveplova kislina, mono-C12-14-alkil estri, amonijeve soli	Neaktivna snov	90583-11-2	292-209-0	0 - 1,12 % (m/m)

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Fosforna kislina	Ortožveplova kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	0 - 1,5 % (m/m)
Dušikova kislina	Dušikova kislina	Neaktivna snov	7697-37-2	231-714-2	0 - 3,71 % (m/m)
Alkohol EO fosfat ester	Poli(oksi-1,2-etanediil), .alfa.-hidro-.omega.-hidroksi-, mono-C8-10-alkil etri, fosfati	Neaktivna snov	68130-47-2		0 - 14,625 % (m/m)
Alkilpoliglikozid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dekoksi-6-(hidroksimetil) oksan-3,4,5-triol	Neaktivna snov	68515-73-1	500-220-1	0 - 6,35 % (m/m)
Alkoholi, C10-C16 etoksilirani propoksilirani (Dehydol 980)	Alkoholi, C10-C16 etoksilirani propoksilirani	Neaktivna snov	69227-22-1		0 - 3 % (m/m)
Kaprilet-9 karboksilna kislina (zmes alkil etra karboksilne kisline)	Poli(oksi-1,2-etanediil), .alfa.-(karboksimetil)-.omega.-(oktiloksi)- (4-11 EO)	Neaktivna snov	53563-70-5		0 - 2,15 % (m/m)
Hekset-4 karboksilna kislina (zmes alkil etra karboksilne kisline)	Poli(oksi-1,2-etanediil), .alfa.-(karboksimetil)-.omega.-(heksiloksi)- (3 EO)	Neaktivna snov	105391-15-9		0 - 0,62 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine GW Vodotopen gel SL Topen koncentrat

DEL II.

DRUGA RAVEN INFORMACIJ – META SPC(-ji)

Poglavje 1. **META SPC 1 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 1 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: META SPC 1

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-1

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih

Poglavje 2. **SESTAVA META SPC 1**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 1**

Splošno ime	me IUPAC	unkcija	tevilka CAS	tevilka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	6 - 6,6 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 1**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

Poglavje 3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 1**

Stavki o nevarnosti	H319: Povzroča hudo draženje oči.
Previdnostni stavki	P264: Po uporabi temeljito umiti roke . P280: Nositi zaščito za oči. P280: Nositi zaščito za obraz. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha,: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Poglavje 4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Dezinfekcija čistih sob za biološke vede s pršenjem z razpršilko in brisanjem s suho krpo

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: Ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Bakterijske spore Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje z razpršilko in brisanjem s suho krpo Podroben opis: Dezinfekcija majhnih površin, materialov in opreme v čistih sobah za biološke vede, razvrščenih v razrede A do D z razvrstitvijo EU na področju dobre proizvodne prakse (GMP), in podporna okolja. Čas stika za pršenje pri 20°C v čistih pogojih: — 15 min za bakterije in glive; — 5 min za kvasovke; — 60 min za viruse in bakterijske spore. Čas stika za pršenje in brisanje pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za bakterije, kvasovke in glive; — 60 min za viruse in bakterijske spore.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 10 ml/m^2 Redčenje (%): Proizvod, pripravljen za uporabo Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 2-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak

Velikosti in material embalaže	Steklenica iz polietilena visoke gostote (HDPE) ali polietilena (PE), zaščitena pred svetlobo, 1–5 litrov Steklenica za pršenje iz polipropilena in polietilena (PP+PE), zaščitena pred svetlobo, 0,5–5 litrov

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Najbolje je, da steklenico držite pokonci in pršite z razdalje 10 cm do 20 cm. Proizvod napršiti na suho krpo in obrisati majhne površine, kot so delavni pulti in oprema, ali napršiti proizvod na površino, obrisati površino s čisto, suho krpo in pustiti, da se posuši na zraku. Po uporabi vedno zaprite šobo. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med ravnanjem s proizvodom je obvezna uporaba opreme za zaščito oči.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Dezinfekcija čistih sob za biološke vede z brisanjem s ploskim brisalom in vedrom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Bakterijske spore Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih

Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje s ploskim brisalom in vedrom Podroben opis: Dezinfekcija tal v čistih sobah za biološke vede, razvrščenih v razrede A do D z razvrstitvijo EU na področju dobre proizvodne prakse (GMP), in podporna okolja. Čas stika za brisanje z brisalom pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za bakterije, kvasovke in glive; — 60 min za viruse in bakterijske spore.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 20 ml/m^2 Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 2-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica iz HDPE ali PE, zaščitena pred svetlobo, 0,5–5 l

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Na površine nanesti z brisanjem z brisalom in pustiti, da se posuši na zraku.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med ravnanjem s proizvodom je obvezna uporaba opreme za zaščito oči.

Uporaba opreme z zaščito dihal (RPE), ki zagotavlja faktor zaščite 10, je obvezna za poklicne delavce, ki nanašajo proizvod, in druge poklicne delavce, ki se nahajajo na obdelovanem območju. Potreben je vsaj respirator s čiščenjem zraka s čelado/kapuco/masko (TH1/TM1) ali polovična/cela maska s kombinacijo filtra za plin/P2 (tip filtra (črka kode, barva) mora imetnik dovoljenja navesti v podatkih o proizvodu). Za ponovno uporabo ali ponoven vstop v sobo morajo delavci upoštevati iste ukrepe za zmanjšanje tveganja kot pri prvi uporabi v sobi.

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Dezinfekcija čistih sob za biološke vede z brisanjem z impregniranimi robčki RTU

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Bakterijske spore Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje z impregniranimi robčki RTU Podroben opis: Dezinfekcija majhnih površin, materialov in opreme v čistih sobah za biološke vede, razvrščenih v razrede A do D z razvrstitvijo EU na področju dobre proizvodne prakse (GMP), in podporna okolja. Čas stika za brisanje pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za bakterije, kvasovke in glive; — 60 min za viruse in bakterijske spore.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 1 robček na m^2 (ustreza 10 ml/m^2) Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 2-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Vreča iz PP ali PET/PE ali EVA/PP ali aluminija/PE, zaščitena pred svetlobo, ali vreča iz PE z 10–100 impregniranimi robčki iz mešanice 45 % poliestra/55 % celuloze (velikost robčka: 200 x 200 mm) Vreča iz PP ali PET/PE ali EVA/PP ali aluminija/PE, zaščitena pred svetlobo, ali vreča iz PE z 10–100 impregniranimi robčki iz 100 % poliestra (velikost robčka: 200 x 200 mm). Vreča iz PP ali PET/PE ali EVA/PP ali aluminija/PE, zaščitena pred svetlobo, ali vreča iz PE z 10–100 impregniranimi robčki iz 100 % poliestra (velikost robčka: 300 x 300 mm)

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Po uporabi proizvoda pustiti, da se površina posuši na zraku. Ko ni v uporabi, naj bo posoda zaprta. Ne uporabljati krp za brisanje, ki so bile dehidrirane. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Izogibajte se prenosu z rok na oči.

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Dezinfekcija čistih sob za biološke vede z brisanjem z brisalom z impregniranimi robčki RTU

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Bakterijske spore Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje z brisalom z impregniranimi robčki RTU Podroben opis: Dezinfekcija tal v čistih sobah za biološke vede, razvrščenih v razrede A do D z razvrstitvijo EU na področju dobre proizvodne prakse (GMP), in podporna okolja. Čas stika za brisanje z brisalom pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za bakterije, kvasovke in glive; — 60 min za viruse in bakterijske spore.

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 1 robček na m^2 (ustreza 10 ml/m^2) Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 2-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Vreča iz PP ali PET/PE ali EVA/PP ali aluminija/PE, zaščitena pred svetlobo, ali vreča iz PE z 10–100 impregniranimi robčki iz mešanice 45 % poliestra/55 % celuloze (velikost robčka: 420 x 250 mm). Vreča iz PP ali PET/PE ali EVA/PP ali aluminija/PE, zaščitena pred svetlobo, ali vreča iz PE z 10–100 impregniranimi robčki iz 100 % poliestra (velikost robčka: 300 x 300 mm).

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Po uporabi proizvoda pustiti, da se površina posuši na zraku. Ko ni v uporabi, naj bo posoda zaprta. Ne uporabljati krp za brisanje, ki so bile dehidrirane. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Izogibajte se prenosu z rok na oči.

Uporaba opreme z zaščito dihal (RPE), ki zagotavlja faktor zaščite 10, je obvezna za poklicne delavce, ki nanašajo proizvod, in druge poklicne delavce, ki se nahajajo na obdelovanem območju. Potreben je vsaj respirator s čiščenjem zraka s čelado/kapuco/masko (TH1/TM1) ali polovična/cela maska s kombinacijo filtra za plin/P2 (tip filtra (črka kode, barva) mora imetnik dovoljenja navesti v podatkih o proizvodu). Za ponovno uporabo ali ponoven vstop v sobo morajo delavci upoštevati iste ukrepe za zmanjšanje tveganja kot pri prvi uporabi v sobi.

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

Poglavje 5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 1**

5.1. **Navodila za uporabo**

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila. Pred nanosom proizvoda očistiti površino. Proizvod je treba nanesti na čisto suho površino. Površino popolnoma namočiti z uporabo proizvoda. Po uporabi ne spirajte. Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na oksidacijska sredstva, kot na primer marmor, baker ali medenina.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Glej specifične ukrepe za zmanjšanje tveganja za meta SPC 1.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

UKREPI ZA PRVO POMOČ

V primeru stika z očmi: Takoj spirati z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Poiščite zdravniško pomoč.

V primeru stika s kožo: Sprati z obilo vode.

Pri zaužitju: Izprati usta. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Pri vdihavanju: Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

OKOLJSKI UKREPI V SILI

Ne dopustiti stika z zemljo, površinsko vodo ali podzemnico.

Upoštevajte možnost kontaminacije okoli posod za skladiščenje.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Proizvod: Če je mogoče, je recikliranje boljše od odlaganja ali zažiganja. Če recikliranje ni mogoče, odložiti v skladu z nacionalnimi predpisi. Odstranite odpadke na odobrenem mestu za zbiranje odpadkov.

Kontaminirana embalaža: Posodo odložite skladno z nacionalnimi predpisi.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti v primernih, označenih posodah.

Temperatura skladiščenja: 0-35°C

Rok uporabe: 24 mesecev

Poglavje 6. **DRUGE INFORMACIJE**

Proizvod vsebuje vodikov peroksid (št. CAS: 7722-84-1), za katerega je bila za oceno tveganja tega proizvoda dogovorjena in uporabljena evropska referenčna vrednost 1.25 mg/m³ za poklicnega uporabnika.

Poglavje 7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 1**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide	Področje trženja: EU
	Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide	Področje trženja: EU
	ANIOS H2O2 6% IP STERILE	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0024303-0001 1-1	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	6 % (m/m)

Poglavje 1. **META SPC 2 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 2 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: META SPC 2

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-2

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

Poglavje 2. **SESTAVA META SPC 2**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 2**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 2**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

Poglavje 3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 2**

Stavki o nevarnosti	
Previdnostni stavki	

Poglavje 4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Dezinfekcija majhnih in/ali velikih površin v industriji (npr. jedilnice, kopalnice) s pršenjem z razpršilko in brisanjem s suho krpo in/ali z brisanjem s ploskim brisalom in vedrom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: Mycobacteria Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje z razpršilko in brisanjem s suho krpo Podroben opis: Dezinfekcija majhnih površin v industriji. Čas stika za pršenje pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke; — 15 min za glive; — 60 min za mikobakterije. Metoda: Brisanje s ploskim brisalom in vedrom Podroben opis: Dezinfekcija velikih površin v industriji. Čas stika za brisanje z brisalom pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke; — 15 min za glive; — 60 min za mikobakterije. Metoda: Pršenje z razpršilko in suho krpo ter brisanje s ploskim brisalom in vedrom. Podroben opis: Dezinfekcija majhnih in velikih površin v industriji. Čas stika za pršenje in brisanje z brisalom pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke; — 15 min za glive; — 60 min za mikobakterije.

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos s pršenjem: 10 ml/m^2 Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa s pršenjem z razpršilko: do 10-krat na dan na sobo Odmerek: Odmerek za nanos z brisanjem z brisalom: 20 ml/m^2 Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa za brisanje z brisalom: do 2-krat na dan na sobo Odmerek: Odmerek za nanos s pršenjem: 10 ml/m^2; Odmerek za nanos z brisanjem z brisalom: 20 ml/m^2 Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa za kombinirano pršenje z razpršilko in brisanje z brisalom: enkrat na dan na sobo.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Posoda HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–100 l Kanta HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–100 l Vmesne posode za razsuti tovor (IBC) iz HDPE, zaščiten pred svetlobo, 600–1000 l Sod HDPE, zaščiten pred svetlobo, 60–220 l Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,1–5 l Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo; steklenica PE z razpršilko, 0,5–1 l

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Pršenje: Najbolje je steklenico držati pokonci in pršiti z razdalje 30 cm. Proizvod napršiti na površino, počakati 5 minut, nato pa površino obrisati s čistim, suhim robčkom ali pustiti, da se posuši na zraku. Po uporabi vedno zaprite šobo. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

Brisanje z brisalom: Odstraniti odvečno vodo s suhim brisalom za tla. Napolniti vedro s proizvodom, pripravljenim za uporabo, in razporediti po tleh s ploskim brisalom. Počakati 5 minut, nato površino obrisati s čistim, suhim brisalom in pustiti, da se posuši na zraku.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Za pršenje velikih površin velja naslednje: Površina, ki se dezinficira (v m^2), ne sme presegati 1/10 sobne prostornine (v m^3), npr. v sobi s prostornino 120 m^3 se lahko dezinficira največ 12 m^2.

Za pršenje majhnih površin ne veljajo zgoraj navedeni ukrepi za zmanjšanje tveganja.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Dezinfekcija majhnih površin (tal) v industriji [(npr. jedilnice, kopalnice)] z brisanjem s ploskim brisalom in vedrom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: Mycobacteria Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje s ploskim brisalom in vedrom Podroben opis: Dezinfekcija majhnih površin (tal) v industrijskih obratih Čas stika za brisanje z brisalom pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke; — 15 min za glive; — 60 min za mikobakterije.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 20 ml/m^2 Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 2-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Posoda HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–100 l Kanta HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–100 l IBC HDPE, zaščiten pred svetlobo, 600–1000 l Sod HDPE, zaščiten pred svetlobo, 60–220 l Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,1–5 l

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Vedro napolniti s proizvodom, pripravljenim za uporabo, in ga razporediti po tleh s ploskim brisalom, nato pa površino obrisati s čistim, suhim brisalom ali pustiti, da se posuši na zraku.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Ne obstaja

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Dezinfekcija majhnih prehrambenih kontaktnih površin v prehrambeni industriji in industriji pijač s pršenjem z uporabo razpršilca in suhe krpe

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: Mycobacteria Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje z razpršilko in brisanjem s suho krpo Podroben opis: Dezinfekcija majhnih površin v živilsko-predelovalnih obratih. Čas stika za pršenje pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke. Čas stika za pršenje in brisanje pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke; — 15 min za glive; — 60 min za mikobakterije.

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 10 ml/m^2 Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 10-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Posoda HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–100 l Kanta HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–100 l IBC HDPE, zaščiten pred svetlobo, 600–1000 l Sod HDPE, zaščiten pred svetlobo, 60–220 l Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,1–5 l Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo; steklenica PE z razpršilko, 0,5–1 l

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Najbolje je steklenico držati pokonci in pršiti z razdalje 30 cm. Napršiti proizvod na površino, pustiti potreben kontaktni čas, nato pa odstraniti odvečno tekočino s suho krpo ali pustiti, da se posuši na zraku. Po uporabi vedno zaprite šobo. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Hrane, krme ali pijač ne dajajte na obdelane površine, dokler se ne posušijo. Ne uporabljajte neposredno ali blizu hrane, krme ali pijače.

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Dezinfekcija prehrambenih kontaktnih površin v prehrambeni industriji in industriji pijač s pršenjem s fiksno nameščenim razpršilnikom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Fiksno nameščen razpršilnik Podroben opis: Avtomatizirana dezinfekcija v industrijski procesni opremi. Čas stika za pršenje pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: Največ 300 l na nanos Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: enkrat na teden
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Posoda HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–100 l Kanta HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–100 l IBC HDPE, zaščiten pred svetlobo, 600–1000 l Sod HDPE, zaščiten pred svetlobo, 60–220 l Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,1–5 l

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Uporabljati izven časa proizvodnje živil, enkrat na teden.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Nanos samo po nanosu med delavno izmeno/prek noči.

Med pršenjem, ne sme biti nihče prisoten.

Za določitev ustreznega časa ponovnega vstopa po nanosu proizvoda je treba izvesti meritve sproščanja na delovnem mestu s primerno merilno opremo po namestitvi fiksnega pršenja in kasneje v rednih intervalih (priporočajo se letni intervali) in po vsaki spremembi v zadevnih pogojih omejitve. Upoštevati je treba nacionalne predpise za meritve na delovnem mestu. V primeru nezaščitenega vzdrževanja med nanašanjem s pršenjem je obvezna uporaba opreme z zaščito dihal (RPE) z zaščitnim faktorjem 10.

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 2.

Poglavje 5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 2**

5.1. **Navodila za uporabo**

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila. Proizvod je treba nanesti na suho površino. Površino popolnoma namočiti z uporabo proizvoda. Po uporabi ne spirajte. Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na oksidacijska sredstva, kot na primer marmor, baker ali medenina.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Glej specifične ukrepe za zmanjšanje tveganja za meta SPC 2.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

UKREPI ZA PRVO POMOČ

V primeru stika z očmi: Sprati z obilo vode.

V primeru stika s kožo: Sprati z obilo vode.

Pri zaužitju: Izprati usta. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Pri vdihavanju: Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

OKOLJSKI UKREPI V SILI

Ne dopustiti stika z zemljo, površinsko vodo ali podzemnico.

Upoštevajte možnost kontaminacije okoli posod za skladiščenje.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Proizvod: Če je mogoče, je recikliranje boljše od odlaganja ali zažiganja. Če recikliranje ni mogoče, odložiti v skladu z nacionalnimi predpisi. Odstranite odpadke na odobrenem mestu za zbiranje odpadkov.

Kontaminirana embalaža: Posodo odložite skladno z nacionalnimi predpisi.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti v primernih, označenih posodah.

Temperatura skladiščenja:0-35 °C

Rok uporabe: 24 mesecev

Poglavje 6. **DRUGE INFORMACIJE**

Proizvod vsebuje vodikov peroksid (št. CAS: 7722-84-1), za katerega je bila za oceno tveganja tega proizvoda dogovorjena in uporabljena evropska referenčna vrednost 1.25 mg/m³ za poklicnega uporabnika.

Poglavje 7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 2**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	DrySan Oxy	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0024303-0002 1-2	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	1 % (m/m)

Poglavje 1. **META SPC 3 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 3 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: META SPC 3

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-3

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

Poglavje 2. **SESTAVA META SPC 3**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 3**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	35 - 36,75 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 3**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

Poglavje 3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 3**

Stavki o nevarnosti	H272: Lahko okrepi požar; oksidativna snov. H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju. H315: Povzroča draženje kože. H318: Povzroča hude poškodbe oči. H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P220: Hraniti ločeno od oblačil in drugih vnetljivih materialov. P261: Ne vdihavati hlapov. P261: Ne vdihavati razpršila. P264: Po uporabi temeljito umiti roke .

	P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P273: Preprečiti sproščanje v okolje. P280: Nositi zaščito za oči. P280: Nositi zaščito za obraz. P280: Nositi zaščitne rokavice. P301 + P312: PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P330: Izprati usta. P302 + P352: PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P332 + P313: Če nastopi draženje kože,: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P310: Takoj pokličite zdravnika. P321: Posebno zdravljenje (glejte navodila za prvo pomoč na tej etiketi). P362 + P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. P370 + P378: V primeru požara: za gašenje uporabiti voda . P403 + P233: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Odstraniti vsebino v skladu z nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Poglavje 4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Dezinfekcija prehrambenih kontaktnih površin v prehrambeni industriji in industriji pijač z avtomatiziranim namakanjem ali pršenjem v zaprtem sistemu

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Bakterijske spore Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih

Način(-i) uporabe	Metoda: Avtomatsko namakanje ali pršenje v zaprtem sistemu Podroben opis: Dezinfekcija embalaže (aseptično polnjenje) s popolnoma avtomatiziranim pomakanjem in pršenjem (zaprt proces). Dezinfekcija embalaže v proizvodnji hrane, pijač in krme (pomakanje in pršenje). Čas stika za namakanje in pršenje pri 60°C v čistih pogojih: — 1 min za bakterije, kvasovke, glive in bakterijske spore.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: stalno avtomatizirano odmerjanje Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: stalno avtomatizirano odmerjanje
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Zaboj za dostavo v nepakirani obliki HDPE, zaščiten pred svetlobo, > 1 l – nepakirano Kanta HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–100 l IBC HDPE, zaščiten pred svetlobo, 600–1000 l Sod HDPE, zaščiten pred svetlobo, 60–220 l Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,1–5 l.

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Dezinfekcija embalaže v proizvodnji hrane, pijač in krme (pršenje ali pomakanje):

— Odmerjanje proizvoda neposredno v embalažo za dezinfekcijo ali uporaba v dodatni pari

— Stalna uporaba proizvoda

— Temperatura nanosa: 60 °C

— Nanos se opravi v zaprtem in zračenem sistemu.

Po uporabi ne spirajte. Po sterilizaciji, embalažo posušiti s sterilnimi vročim zrakom.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Ne vdihavati hlapov/razpršila.

Med operacijo zagotoviti ustrezno zračenje z lokalnim izčrpavanjem ob strojih (LEV) in v industrijskih prostorih (tehnično zračenje).

Med ročnim vzdrževanjem zagotoviti ustrezno zračenje v stroju (LEV) pred odpiranjem vrat aseptičnega območja.

1. Proizvod se po mešanju in nakladanju lahko prenaša le v zaprtih ceveh. Odprti tok proizvoda in odpadne vode ni dovoljen.

2. Treba je izvajati meritve sproščanja na delovnem mestu s primerno merilno opremo po vzpostavitvi aseptičnega obrata za pakiranje in kasneje v rednih intervalih (priporočajo se letni intervali) in po vsaki spremembi v zadevnih pogojih omejitve. Upoštevati je treba nacionalne predpise za meritve na delovnem mestu.

3. V primeru obrata za aseptično pakiranje (npr. ročno čiščenje, tehnični incidenti ali popravilo), je treba uporabiti ustrezen OVO (vključno z dihalno zaščitno opremo, rokavicami za kemično zaščito, kombinezonom za kemično zaščito, zaščito za oči). Tip RPE, tip filtra (črka kode, barva) in material rokavic mora opredeliti imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Dezinfekcija prehrambenih kontaktnih površin v prehrambeni industriji in industriji pijač s čiščenjem na mestu (CIP)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: CIP Podroben opis: Dezinfekcija v industriji hrane in pijač (stik s hrano). Čas stika za zaprte sisteme pri 60°C v čistih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke; — 15 min za glive.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: avtomatizirano odmerjanje Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: enkrat na dan
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak

Velikosti in material embalaže	Zaboj za dostavo v nepakirani obliki HDPE, zaščiten pred svetlobo, > 1 l – nepakirano Kanta HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–100 l IBC HDPE, zaščiten pred svetlobo, 600–1000 l Sod HDPE, zaščiten pred svetlobo, 60–220 l Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,1–5 l.

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Pred dezinfekcijo je treba sistem oprati. Dezinfekcija rezervoarjev CIP, črpalk CIP, cevi in notranjega sistema procesne opreme za hrano, pijačo in krmo, vključno s higieno molznih strojev (zaprti sistemi). Po obdelavi sprati z vodo.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Hrane, krme ali pijač ne dajajte na obdelano površino, dokler se ne spere z vodo.

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

Poglavje 5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 3**

5.1. **Navodila za uporabo**

Glej specifična navodila za uporabo meta SPC 3.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Med ravnanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic mora navesti imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

Med ravnanjem s proizvodom je obvezna uporaba opreme za zaščito oči.

Postopek redčenja se izvede s sistemom samodejnega odmerjanja.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

UKREPI ZA PRVO POMOČ

V primeru stika z očmi: Takoj spirati z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

V primeru stika s kožo: Takoj vsaj 15 minut spirati z obilo vode. Uporabiti blago milo, če je na voljo. Če nastopi draženje in se ne izboljša, poiščite zdravniško pomoč.

Pri zaužitju: Izprati usta. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Pri vdihavanju: Prenesti osebo na svež zrak. Simptomatsko zdravljenje. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

OKOLJSKI UKREPI V SILI

Ne dopustiti stika z zemljo, površinsko vodo ali podzemnico.

Upoštevajte možnost kontaminacije okoli posod za skladiščenje.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Proizvod: Če je mogoče, je recikliranje boljše od odlaganja ali zažiganja. Če recikliranje ni mogoče, odložiti v skladu z nacionalnimi predpisi. Odstranite odpadke na odobrenem mestu za zbiranje odpadkov.

Kontaminirana embalaža: Posodo odložite skladno z nacionalnimi predpisi.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti v primernih, označenih posodah.

Temperatura skladiščenja: 0 - 35 °C

Rok uporabe: 24 mesecev

Poglavje 6. **DRUGE INFORMACIJE**

Proizvod vsebuje vodikov peroksid (št. CAS: 7722-84-1), za katerega je bila za oceno tveganja tega proizvoda dogovorjena in uporabljena evropska referenčna vrednost 1.25 mg/m³ za poklicnega uporabnika.

Poglavje 7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 3**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Oxypak D		Področje trženja: EU		
	Oxypak S		Področje trženja: EU		
	Oxypak S10		Področje trženja: EU		
Številka dovoljenja	EU-0024303-0003 1-3				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	35 % (m/m)

Poglavje 1. **META SPC 4 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 4 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: META SPC 4

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-4

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 03 (PT03): Veterinarska higiena

Poglavje 2. **SESTAVA META SPC 4**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 4**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 % (m/m)
Monohidrat citronske kisline	2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilna kislina	Neaktivna snov	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 % (m/m)
Fenoksietanol	2-Fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 % (m/m)
Natrijev lavril sulfat	Natrijev dodecil sulfat	Neaktivna snov	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 % (m/m)
L-Glutaminska kislina, deriv. N-koko acil, mononatrijeve soli	Natrijev;(4S)-4-amino-5-hidroksi-5-oksopentanoat	Neaktivna snov	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 % (m/m)
Žveplova kislina, mono-C12-14-alkil estri, amonijeve soli (Texapon ALS)	Žveplova kislina, mono-C12-14-alkil estri, amonijeve soli	Neaktivna snov	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 4**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

Poglavje 3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 4**

Stavki o nevarnosti	H290: Lahko je jedko za kovine. H319: Povzroča hudo draženje oči.
Previdnostni stavki	P234: Hraniti samo v originalni embalaži. P264: Po uporabi temeljito umiti roke . P280: Nositi zaščito za oči. P280: Nositi zaščito za obraz.

	P390: Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. P406: Hraniti v odporni proti koroziji, z odporno notranjo oblogo. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha,: poiščite zdravniško oskrbo/pomoč.

Poglavje 4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Sredstvo za dezinfekcijo seskov z namakanjem pred molžo

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03 (PT03): Veterinarska higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročno namakanje z uporabo skodelice za namakanje/peno (dezinfekcija pred molžo) Podroben opis: Dezinfekcija seskov pred molžo z ročnim namakanjem z uporabo skodelice za namakanje/peno. Čas stika za namakanje pri 30°C v čistih pogojih: — 60 sekund za bakterije in kvasovke.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 4 ml proizvoda na nanos (tj. 1 ml na sesek, torej 4 ml proizvoda na žival s štirimi seski) Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do dvakrat na dan
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Vrč HDPE, zaščiten pred svetlobo, 1–100 l Kanta HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–100 l IBC HDPE, zaščiten pred svetlobo, 600–1000 l Sod HDPE, zaščiten pred svetlobo, 60–220 l Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,1–5 l HDPE, zaščiten pred svetlobo; vreča PE, 0,5–100 l

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 4.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 4.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 4.

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 4.

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 4.

Poglavje 5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 4**

5.1. **Navodila za uporabo**

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila. Proizvod se nanese pred molžo z uporabo skodelice za namakanje/peno. Pred uporabo morate proizvod segreti na sobno temperaturo.

Očistiti sesek s suho krpo, napolniti skodelico za peno s proizvodom in pritiskati skodelico za peno, dokler se ne ustvari pena. Namočite sesek v skodelico. Peno nanesite na sesek za 60 sekund. Proizvod obrišite s čisto brisačo. Po uporabi ne spirajte.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Izogibati se pljuskanju in polivanju.

Izogibajte se prenosu z rok na oči.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

UKREPI ZA PRVO POMOČ

V primeru stika z očmi: Takoj spirati z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Poiščite zdravniško pomoč.

V primeru stika s kožo: Sprati z obilo vode.

Pri zaužitju: Izprati usta. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Pri vdihavanju: Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

OKOLJSKI UKREPI V SILI

Ne dopustiti stika z zemljo, površinsko vodo ali podzemnico.

Upoštevajte možnost kontaminacije okoli posod za skladiščenje.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Proizvod: Če je mogoče, je recikliranje boljše od odlaganja ali zažiganja. Če recikliranje ni mogoče, odložiti v skladu z nacionalnimi predpisi. Odstranite odpadke na odobrenem mestu za zbiranje odpadkov.

Kontaminirana embalaža: Posodo odložite skladno z nacionalnimi predpisi.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti v primernih, označenih posodah.

Temperatura skladiščenja: 0-25 °C

Rok uporabe: 18 mesecev

Poglavje 6. **DRUGE INFORMACIJE**

Proizvod vsebuje vodikov peroksid (št. CAS: 7722-84-1), za katerega je bila za oceno tveganja tega proizvoda dogovorjena in uporabljena evropska referenčna vrednost 1.25 mg/m^3 za poklicnega uporabnika.

Poglavje 7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 4**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	OxyFoamPlus	Področje trženja: EU			
	MEPA Foampro D	Področje trženja: EU			
	Predip PLUS	Področje trženja: EU			
Številka dovoljenja	EU-0024303-0004 1-4				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	1,4 % (m/m)
Monohidrat citronske kisline	2-hidroksi-pro-pan-1,2,3-tri-karboksilna kislina	Neaktivna snov	5949-29-1	201-069-1	0,9 % (m/m)
Fenoksietanol	2-Fenoksieta-nol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0,9 % (m/m)
Natrijev lavril sulfat	Natrijev dode-cil sulfat	Neaktivna snov	151-21-3	205-788-1	3,88 % (m/m)
L-Glutaminska kislina, deriv. N-koko acil, mono-natrijeve soli	Natrijev;(4S)-4-amino-5-hidroksi-5-oksopenta-noat	Neaktivna snov	68187-32-6	269-087-2	2 % (m/m)
Žveplova kislina, mono-C12-14-alkil estri, amoni-jeve soli (Texapon ALS)	Žveplova kislina, mono-C12-14-alkil estri, amoni-jeve soli	Neaktivna snov	90583-11-2	292-209-0	1,12 % (m/m)

Poglavje 1. **META SPC 5 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 5 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: META SPC 5

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-5

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

Poglavje 2. **SESTAVA META SPC 5**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 5**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 5**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

Poglavje 3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 5**

Stavki o nevarnosti	
Previdnostni stavki	

Poglavje 4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Dezinfekcija čistih sob za biološke vede s pršenjem z razpršilko in brisanjem s suho krpo

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: Mycobacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Bakterijske spore Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Clostridium difficile Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje z razpršilko in brisanjem s suho krpo Podroben opis: Dezinfekcija površin, materialov in opreme v čistih sobah za biološke vede A–D in podpornih okoljih (npr. farmacevtska industrija). Dezinfekcija prenos ali dezinfekcija majhnih površin. Čas stika za pršenje in brisanje pri 20°C v umazanih pogojih: — 1 min za bakterije in kvasovke; — 5 min za glive in mikobakterije; — 60 min za bakterijske spore; — 30 min za viruse. Čas stika za pršenje in brisanje pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore. Čas stika za pršenje pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za bakterije, kvasovke in glive; — 30 min za viruse in bakterijske spore.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 10 ml/m^2 Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 2-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak

Velikosti in material embalaže	Steklenica za pršenje iz polietilen tereftalata (PET), zaščitena pred svetlobo, 0,25–1 litra Steklenica za pršenje iz polipropilena in polietilena (PP+PE), zaščitena pred svetlobo, 0,25–1 litra Steklenica iz polietilena visoke gostote (HDPE) ali polietilena (PE), zaščitena pred svetlobo, 1–5 litrov

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Pri uporabi v čistih pogojih: pred nanosom proizvoda očistiti površino. Najbolje je, da steklenico držite pokonci in pršite z razdalje 10 cm do 20 cm. Proizvod napršiti na suho krpo in obrisati majhne površine, kot so delavni pulti in oprema, ali napršiti proizvod na površino, obrisati površino s čisto, suho krpo in pustiti, da se posuši na zraku. Po uporabi vedno zaprite šobo. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Dezinfekcija čistih sob za biološke vede z brisanjem s ploskim brisalom in vedrom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: Mycobacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov

	Znanstveno ime: Bakterijske spore Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Clostridium difficile Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje s ploskim brisalom in vedrom Podroben opis: Dezinfekcija tal v čistih sobah za biološke vede in podpornih okoljih (npr. farmacevtska industrija). Čas stika za brisanje z brisalom pri 20°C v umazanih pogojih: — 1 min za bakterije in kvasovke; — 5 min za glive in mikobakterije; — 60 min za bakterijske spore; — 30 min za viruse. Čas stika za brisanje z brisalom pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 20 ml/m^2 Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 2-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica iz HDPE ali PE, zaščitena pred svetlobo, 1–5 l

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Pri uporabi v čistih pogojih: pred nanosom proizvoda očistiti površino. Na površino nanesti z brisanjem z brisalom.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Dezinfekcija majhnih in/ali velikih neprehrambenih kontaktnih površin v zdravstvu s pršenjem z razpršilko in brisanjem s suho krpo

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: Mikobakterije Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje z razpršilko in brisanjem s suho krpo Podroben opis: Rutinska in nerutinska dezinfekcija majhnih in velikih površin v bolnišničnih sobah in zdravniških ordinacijah. Čas stika za pršenje pri 20°C v umazanih pogojih: — 1 min za bakterije in kvasovke; — 5 min za glive; — 15 min za mikobakterije.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 10 ml/m^2 Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 2-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica za pršenje PET, zaščitena pred svetlobo, 0,25–1 l Kanta HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–5 l

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Rutinska dezinfekcija: Redna dezinfekcija površin, ki bi se lahko kontaminirale s patogeni med medicinskimi postopki ali postopki nege, da se zmanjša tveganje prenosa takih organizmov prek površin.

Nerutinska dezinfekcija: Dezinfekcija v posebnih tveganih situacijah (razen če nacionalni organ za javno zdravje predpiše drugače).

Proizvod je namenjen čiščenju in dezinficiranju v enem koraku. Najbolje je steklenico držati pokonci in pršiti z razdalje 30 cm. Proizvod napršiti na površino, nato obrisati proizvod s čisto, suho krpo in pustiti, da se posuši. Po uporabi vedno zaprite šobo. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Površine, ki se dezinficirajo, (v m^2) ne smejo presegati 1/10 sobne prostornine (v m^3), npr. v sobi s prostornino 120 m^3 se lahko dezinficira največ 12 m^2.

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Dezinfekcija majhnih in/ali velikih neprehrambenih kontaktnih površin v zdravstvu s pršenjem z razpršilko in brisanjem s suho krpo

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: Mycobacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Bakterijske spore Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov

	Znanstveno ime: Clostridium difficile Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje z razpršilko in brisanjem s suho krpo Podroben opis: Rutinska in nerutinska dezinfekcija majhnih in velikih površin v bolnišničnih sobah in zdravniških ordinacijah. Čas stika za pršenje in brisanje pri 20°C v umazanih pogojih: — 1 min za bakterije in kvasovke; — 5 min za glive in mikobakterije; — 60 min za bakterijske spore; — 30 min za viruse. Čas stika za pršenje in brisanje pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore. Čas stika za pršenje pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za bakterije, kvasovke in glive; — 30 min za viruse in bakterijske spore.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 10 ml/m^2 Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 2-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–5 l Steklenica za pršenje PET, zaščitena pred svetlobo, 0,25–1 l Kanta HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–5 l

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Rutinska dezinfekcija: Redna dezinfekcija površin, ki bi se lahko kontaminirale s patogeni med medicinskimi postopki ali postopki nege, da se zmanjša tveganje prenosa takih organizmov prek površin.

Nerutinska dezinfekcija: Dezinfekcija v posebnih tveganih situacijah (razen če nacionalni organ za javno zdravje predpiše drugače).

Proizvod je namenjen čiščenju in dezinficiranju v enem koraku. Pri uporabi v čistih pogojih: pred nanosom proizvoda očistiti površino. Najbolje je steklenico držati pokonci in pršiti z razdalje 30 cm. Proizvod napršiti na suho krpo in obrisati majhne površine, kot so delavni pulti in oprema, ali napršiti proizvod na površino, obrisati površino s čisto, suho krpo in pustiti, da se posuši na zraku. Po uporabi vedno zaprite šobo. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Površina, ki se dezinficira (v m^2), ne sme presegati 1/10 sobne prostornine (v m^3), npr. v sobi s prostornino 120 m^3 se lahko dezinficira največ 12 m^2.

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5

4.5. **Opis uporabe**

Tabela 5.

Dezinfekcija majhnih in/ali velikih neprehrambenih kontaktnih površin v zdravstvu z brisanjem s čisto krpo/robčkom za enkratno uporabo in vedrom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: Mikobakterije Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje s krpo/robčkom in vedra Podroben opis: Rutinska in nerutinska dezinfekcija majhnih in velikih površin v bolnišničnih sobah in zdravniških ordinacijah. Čas stika za brisanje pri 20°C v umazanih pogojih: — 1 min za bakterije in kvasovke; — 5 min za glive; — 15 min za mikobakterije.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 10 ml/m^2 Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 2-krat na dan na sobo

Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Kanta HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–5 l

4.5.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Rutinska dezinfekcija: Redna dezinfekcija površin, ki bi se lahko kontaminirale s patogeni med medicinskimi postopki ali postopki nege, da se zmanjša tveganje prenosa takih organizmov prek površin.

Nerutinska dezinfekcija: Dezinfekcija v posebnih tveganih situacijah (razen če nacionalni organ za javno zdravje predpiše drugače).

Proizvod je namenjen čiščenju in dezinficiranju v enem koraku. Natočiti proizvod v čisto vedro in razporediti po površini s krpo/robčkom za enkratno uporabo ter pustiti, da se posuši na zraku. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

4.5.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.5.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.5.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.5.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.6. **Opis uporabe**

Tabela 6.

Dezinfekcija majhnih in/ali velikih neprehrambenih kontaktnih površin v zdravstvu z brisanjem s čisto krpo/robčkom za enkratno uporabo in vedrom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: Mycobacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Bakterijske spore Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov

	Znanstveno ime: Clostridium difficile Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje s krpo/robčkom in vedra Podroben opis: Rutinska in nerutinska dezinfekcija majhnih in velikih površin v bolnišničnih sobah in zdravniških ordinacijah. Čas stika za brisanje pri 20°C v umazanih pogojih: — 1 min za bakterije in kvasovke; — 5 min za glive in mikobakterije; — 60 min za bakterijske spore; — 30 min za viruse. Čas stika za brisanje pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 10 ml/m^2 Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 2-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–5 l Kanta HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–5 l

4.6.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Rutinska dezinfekcija: Redna dezinfekcija površin, ki bi se lahko kontaminirale s patogeni med medicinskimi postopki ali postopki nege, da se zmanjša tveganje prenosa takih organizmov prek površin.

Nerutinska dezinfekcija: Dezinfekcija v posebnih tveganih situacijah (razen če nacionalni organ za javno zdravje predpiše drugače).

Proizvod je namenjen čiščenju in dezinficiranju v enem koraku. Pri uporabi v čistih pogojih: pred nanosom proizvoda očistiti površino. Natočiti proizvod v čisto vedro in razporediti po površini s krpo/robčkom za enkratno uporabo ter pustiti, da se posuši na zraku. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

4.6.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.6.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5

4.6.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.6.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5

4.7. **Opis uporabe**

Tabela 7.

Dezinfekcija velikih neprehrambenih kontaktnih površin v zdravstvu z brisanjem z brisalom in vedrom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: Mycobacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Bakterijske spore Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Clostridium difficile Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje z brisalom in vedrom Podroben opis: Nerutinska dezinfekcija večjih površin v bolnišničnih sobah. Čas stika za brisanje z brisalom pri 20°C v umazanih pogojih: — 1 min za bakterije in kvasovke; — 5 min za glive in mikobakterije; — 60 min za bakterijske spore; — 30 min za viruse. Čas stika za brisanje z brisalom pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore.

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 20 ml/m^2 Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 2-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–5 l Kanta HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–5 l

4.7.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Nerutinska dezinfekcija: Dezinfekcija v posebnih tveganih situacijah (razen če nacionalni organ za javno zdravje predpiše drugače).

Proizvod je namenjen čiščenju in dezinficiranju v enem koraku. Pri uporabi v čistih pogojih: pred nanosom proizvoda očistiti površino. Napolniti vedro s proizvodom, pripravljenim za uporabo, in razporediti po tleh z brisalom ter pustiti, da se posuši.

4.7.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.7.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5

4.7.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5

4.7.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5

4.8. **Opis uporabe**

Tabela 8.

Dezinfekcija velikih neprehrambenih kontaktnih površin v zdravstvu z brisanjem z brisalom in vedrom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: Mycobacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov

	Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Bakterijske spore Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Clostridium difficile Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje z brisalom in vedrom Podroben opis: Nerutinska dezinfekcija večjih površin v zdravniških ordinacijah. Čas stika za brisanje z brisalom pri 20°C v umazanih pogojih: — 1 min za bakterije in kvasovke; — 5 min za glive in mikobakterije; — 60 min za bakterijske spore; — 30 min za viruse. Čas stika za brisanje z brisalom pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 20 ml/m^2 Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 2-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–5 l Kanta HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–5 l

4.8.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Nerutinska dezinfekcija: Dezinfekcija v posebnih tveganih situacijah (razen če nacionalni organ za javno zdravje predpiše drugače).

Proizvod je namenjen čiščenju in dezinficiranju v enem koraku. Pri uporabi v čistih pogojih: pred nanosom proizvoda očistiti površino. Vedro napolniti s proizvodom, pripravljenim za uporabo, in razporediti po tleh z brisalom, površino obrisati s čistim, suhim brisalom in pustiti, da se posuši na zraku.

4.8.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.8.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.8.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5

4.8.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5

4.9. **Opis uporabe**

Tabela 9.

Dezinfekcija majhnih in/ali velikih neprehrambenih kontaktnih površin v zdravstvu s pršenjem površine in naknadnim brisanjem s čisto krpo/robčkom ali pršenjem tekočine na robček in brisanjem površine ali z dezinfekcijskim sredstvom v vedru in brisanjem s krpo/robčkom za enkratno uporabo in neredno razkuževanje velikih površin z brisanjem z brisalom in vedrom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: Mycobacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Bakterijske spore Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Clostridium difficile Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje z razpršilko in suho krpo ter brisanje z brisalom in vedrom Podroben opis: Rutinska in nerutinska dezinfekcija majhnih in velikih površin v bolnišničnih sobah in zdravniških ordinacijah.

	Čas stika za pršenje in brisanje, brisanje z brisalom pri 20° C v umazanih pogojih: — 1 min za bakterije in kvasovke; — 5 min za glive in mikobakterije; — 60 min za bakterijske spore; — 30 min za viruse. Čas stika za pršenje in brisanje, brisanje z brisalom pri 20° C v čistih pogojih: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore. Čas stika za pršenje pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za bakterije, kvasovke in glive; — 30 min za viruse in bakterijske spore. Metoda: Brisanje s krpo/robčkom in vedrom ter brisanje z brisalom in vedrom Podroben opis: Rutinska in nerutinska dezinfekcija majhnih in velikih površin v bolnišničnih sobah in zdravniških ordinacijah. Čas stika za brisanje in brisanje z brisalom pri 20°C v umazanih pogojih: — 1 min za bakterije in kvasovke; — 5 min za glive in mikobakterije; — 60 min za bakterijske spore; — 30 min za viruse. Čas stika za brisanje in brisanje z brisalom pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos s pršenjem: 10 ml/m^2; Odmerek za nanos z brisanjem z brisalom: 20 ml/m^2 Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa za kombinirano pršenje z razpršilko in brisanje z brisalom: do 2-krat na dan na sobo Odmerek: Odmerek za nanos z brisanjem: 10 ml/m^2; Odmerek za nanos z brisanjem z brisalom: 20 ml/m^2 Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa za kombinirano brisanje in čiščenje z brisalom: do 2-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–5 l Steklenica za pršenje PET, zaščitena pred svetlobo, 0,25–1 l Kanta HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–5 l

4.9.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je namenjen čiščenju in dezinficiranju v enem koraku. Pri uporabi v čistih pogojih: pred nanosom proizvoda očistiti površino.

Nerutinska dezinfekcija: Dezinfekcija v posebnih tveganih situacijah (razen če nacionalni organ za javno zdravje predpiše drugače).

Pršenje z razpršilko in brisanje s suho krpo: Najbolje je steklenico držati pokonci in pršiti z razdalje 30 cm. Proizvod napršiti na suho krpo in obrisati majhne površine, kot so delavni pulti in oprema, ali napršiti proizvod na površino, obrisati površino s čisto, suho krpo in pustiti, da se posuši na zraku. Po uporabi vedno zaprite šobo. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

Brisanje z brisalom in vedrom: Vedro napolniti s proizvodom, pripravljenim za uporabo, in razporediti po tleh z brisalom, površino obrisati s čistim, suhim brisalom in pustiti, da se posuši na zraku.

Brisanje s krpo/robčkom in vedra: Natočiti proizvod v čisto vedro in razporediti po površini s krpo/robčkom za enkratno uporabo, obrisati površino s čisto krpo/robčkom in pustiti, da se posuši na zraku. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

4.9.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Za pršenje: Površine, ki se dezinficirajo, (v m^2) ne smejo presegati 1/10 sobne prostornine (v m^3), npr. v sobi s prostornino 120 m^3 se lahko dezinficira največ 12 m^2.

4.9.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5

4.9.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.9.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5

4.10. **Opis uporabe**

Tabela 10.

Dezinfekcija majhnih neprehrambenih kontaktnih površin v institucionalnih/komercialnih stavbah s pršenjem z razpršilko in brisanjem s suho krpo

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: Mycobacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov

	Znanstveno ime: Bakterijske spore Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Clostridium difficile Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje z razpršilko in brisanjem s suho krpo Podroben opis: Rutinska dezinfekcija majhnih površin na majhnih neprehrambenih območjih (npr. kopalnice). Čas stika za pršenje in brisanje pri 20°C v umazanih pogojih: — 1 min za bakterije in kvasovke; — 5 min za glive in mikobakterije; — 60 min za bakterijske spore; — 30 min za viruse. Čas stika za pršenje in brisanje pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore. Čas stika za pršenje pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za bakterije, kvasovke in glive; — 30 min za viruse in bakterijske spore.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 10 ml/m^2 Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 10-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–5 litrov Steklenica za pršenje PET, zaščitena pred svetlobo, 0,25–1 litra

4.10.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Pri uporabi v čistih pogojih: pred nanosom proizvoda očistiti površino. Najbolje je steklenico držati pokonci in pršiti z razdalje 30 cm. Proizvod napršiti na suho krpo in obrisati majhne površine, kot so delavni pulti in oprema, ali napršiti proizvod na površino, obrisati površino s čisto, suho krpo in pustiti, da se posuši na zraku. Po uporabi vedno zaprite šobo. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

4.10.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.10.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5

4.10.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.10.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5

4.11. **Opis uporabe**

Tabela 11.

Dezinfekcija majhnih prehrambenih kontaktnih površin v institucionalnih/komercialnih stavbah s pršenjem z razpršilko in brisanjem s suho krpo

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: Mycobacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Bakterijske spore Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Clostridium difficile Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje z razpršilko in brisanjem s suho krpo Podroben opis: Rutinska dezinfekcija majhnih površin na majhnih prehrambenih območjih (npr. kuhinje). Čas stika za pršenje in brisanje pri 20°C v umazanih pogojih: — 1 min za bakterije in kvasovke; — 5 min za glive in mikobakterije; — 60 min za bakterijske spore; — 30 min za viruse.

	Čas stika za pršenje in brisanje pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore. Čas stika za pršenje pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za bakterije, kvasovke in glive; — 30 min za viruse in bakterijske spore.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 10 ml/m^2 Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 10-krat na dan na sobo.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–5 litrov Steklenica za pršenje PET, zaščitena pred svetlobo, 0,25–1 litra

4.11.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Pri uporabi v čistih pogojih: pred nanosom proizvoda očistiti površino. Najbolje je steklenico držati pokonci in pršiti z razdalje 30 cm. Proizvod napršiti na suho krpo in obrisati majhne površine, kot so delavni pulti in oprema, ali napršiti proizvod na površino, obrisati površino s čisto, suho krpo in pustiti, da se posuši na zraku. Po uporabi vedno zaprite šobo. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

4.11.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Hrane, krme ali pijač ne dajajte na obdelano površino, dokler se ne posuši. Ne uporabljajte neposredno ali blizu hrane, krme ali pijače.

4.11.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.11.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

4.11.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 5.

Poglavje 5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 5**

5.1. **Navodila za uporabo**

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila. Proizvod je treba nanesti na suho površino. Površino popolnoma namočiti z uporabo proizvoda. Po uporabi ne spirajte. Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na oksidacijska sredstva, kot na primer marmor, baker ali medenina.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

-

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

UKREPI ZA PRVO POMOČ

V primeru stika z očmi: Sprati z obilo vode.

V primeru stika s kožo: Sprati z obilo vode.

Pri zaužitju: Izprati usta. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Pri vdihavanju: Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

OKOLJSKI UKREPI V SILI

Ne dopustiti stika z zemljo, površinsko vodo ali podzemnico.

Upoštevajte možnost kontaminacije okoli posod za skladiščenje.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Proizvod: Če je mogoče, je recikliranje boljše od odlaganja ali zažiganja. Če recikliranje ni mogoče, odložiti v skladu z nacionalnimi predpisi. Odstranite odpadke na odobrenem mestu za zbiranje odpadkov.

Kontaminirana embalaža: Posodo odložite skladno z nacionalnimi predpisi.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti v primernih, označenih posodah.

Temperatura skladiščenja:0-35 °C. Zaščitite pred zmrzaljo.

Rok uporabe: 18 mesecev

Poglavje 6. **DRUGE INFORMACIJE**

Proizvod vsebuje vodikov peroksid (št. CAS: 7722-84-1), za katerega je bila za oceno tveganja tega proizvoda dogovorjena in uporabljena evropska referenčna vrednost 1.25 mg/m³ za poklicnega uporabnika.

Poglavje 7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 5**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Incidin OxyFoam		Področje trženja: EU		
Številka dovoljenja	EU-0024303-0005 1-5				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (m/m)

7.2. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Incidin OxyFoam S	Področje trženja: EU

	Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide	Področje trženja: EU
	KitchenPro Oxy Foam S	Področje trženja: EU
	Anios Low Peroxide IP sterile	Področje trženja: EU
	Sirafan Oxy	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0024303-0006 1-5	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (m/m)

Poglavje 1. **META SPC 6 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 6 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: META SPC 6

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-6

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

Poglavje 2. **SESTAVA META SPC 6**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 6**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 % (m/m)
N-propanol	Propan-1-ol	Neaktivna snov	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 6**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

Poglavje 3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 6**

Stavki o nevarnosti	H226: Vnetljiva tekočina in hlapi. H318: Povzroča hude poškodbe oči.
Previdnostni stavki	P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P233: Hraniti v tesno zaprti posodi. P240: Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine ter izenačiti potenciale. P241: Uporabiti električno opremo, odporno proti eksplozijam. P241: Uporabiti prezračevalno opremo, odporno proti eksplozijam. P241: Uporabiti opremo za razsvetljavo, odporno proti eksplozijam. P242: Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. P243: Preprečiti statično naelektrenje. P280: Nositi zaščito za oči. P280: Nositi zaščito za obraz. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310: Takoj pokličite zdravnika. P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P370 + P378: V primeru požara: za gašenje uporabiti voda . P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501: Odstraniti vsebino v skladu z nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Poglavje 4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Dezinfekcija majhni površin v industriji (npr. jedilnice, kopalnice) s pršenjem z razpršilko

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje z razpršilko in brisanjem s suho krpo Podroben opis: Dezinfekcija majhnih površin v industriji (npr. jedilnice, kopalnice).

	Čas stika za pršenje pri 10°C in 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke. Čas stika za pršenje pri 10°C v čistih pogojih: — 1 min za bakterije in kvasovke.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 10 ml/m^2 Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 3-krat na dan
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Posoda HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–100 l Kanta HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–100 l IBC HDPE, zaščiten pred svetlobo, 600–1000 l Sod HDPE, zaščiten pred svetlobo, 60–220 l Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,1–5 l Steklenica za pršenje HDPE, zaščitena pred svetlobo, do 1 l

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 6.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 6.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 6.

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 6.

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 6.

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Dezinfekcija prehrambenih kontaktnih površin v prehrambeni industriji in industriji pijač s pršenjem z razpršilko

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov

	Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje z razpršilko in brisanjem s suho krpo Podroben opis: Dezinfekcija majhnih površin v živilsko-predelovalnih obratih. Čas stika za pršenje pri 10°C in 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke. Čas stika za pršenje pri 10°C v čistih pogojih: — 1 min za bakterije in kvasovke.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 10 ml/m^2 Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 4-krat na dan
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Posoda HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–100 l Kanta HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–100 l IBC HDPE, zaščiten pred svetlobo, 600–1000 l Sod HDPE, zaščiten pred svetlobo, 60–220 l Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,1–5 l Steklenica za pršenje HDPE, zaščitena pred svetlobo, do 1 l

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 6.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Hrane, krme ali pijač ne dajajte na obdelano površino, dokler se ne posuši. Ne uporabljajte neposredno ali blizu hrane, krme ali pijače.

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 6.

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 6.

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 6.

Poglavje 5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 6**

5.1. **Navodila za uporabo**

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila. Pri uporabi v čistih pogojih: pred nanosom proizvoda očistiti površino. Proizvod je treba nanesti na suho površino. Najbolje je, da steklenico držite pokonci in pršite z razdalje 10 cm do 20 cm. Proizvod napršiti na površino, površino obrisati s čistim, suhim robčkom ali pustiti, da se posuši na zraku. Po uporabi vedno zaprite šobo. Površino popolnoma namočiti z uporabo proizvoda. Po uporabi ne spirajte. Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na oksidacijska sredstva, kot na primer marmor, baker ali medenina. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Med ravnanjem s proizvodom je obvezna uporaba opreme za zaščito oči.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

UKREPI ZA PRVO POMOČ

V primeru stika z očmi: Takoj spirati z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

V primeru stika s kožo: Sprati z obilo vode.

Pri zaužitju: Izprati usta. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Pri vdihavanju: Prenesti osebo na svež zrak. Simptomatsko zdravljenje. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

OKOLJSKI UKREPI V SILI

Ne dopustiti stika z zemljo, površinsko vodo ali podzemnico.

Upoštevajte možnost kontaminacije okoli posod za skladiščenje.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Proizvod: Če je mogoče, je recikliranje boljše od odlaganja ali zažiganja. Če recikliranje ni mogoče, odložiti v skladu z nacionalnimi predpisi. Odstranite odpadke na odobrenem mestu za zbiranje odpadkov.

Kontaminirana embalaža: Posodo odložite skladno z nacionalnimi predpisi.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti v primernih, označenih posodah. Hraniti pred vročino in viri vžiga. Hraniti v hladnem, dobro zračenem prostoru. Hraniti pred oksidacijskimi sredstvi.

Temperatura skladiščenja: 0-30 °C

Rok uporabe: 24 mesecev

Poglavje 6. **DRUGE INFORMACIJE**

Proizvod vsebuje vodikov peroksid (št. CAS: 7722-84-1), za katerega je bila za oceno tveganja tega proizvoda dogovorjena in uporabljena evropska referenčna vrednost 1.25 mg/m^3 za poklicnega uporabnika.

Poglavje 7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 6**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	OxyDes Rapid		Področje trženja: EU		
Številka dovoljenja	EU-0024303-0007 1-6				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	2 % (m/m)
N-propanol	Propan-1-ol	Neaktivna snov	71-23-8	200-746-9	17,5 % (m/m)

Poglavje 1. **META SPC 7 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 7 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: META SPC 7

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-7

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

Poglavje 2. **SESTAVA META SPC 7**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 7**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	4,95 - 5,45 % (m/m)
Kaprilet-9 karboksilna kislina (zmes alkil etra karboksilne kisline)	Poli(oksi-1,2-e-tanediil), .alfa.-(karboksimetil)-.omega.-(okti-loksi)- (4-11 EO)	Neaktivna snov	53563-70-5		2,15 - 2,15 % (m/m)

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Hekset-4 karboksilna kislina (zmes alkil etra karboksilne kisline)	Poli(oksi-1,2-e-tanediil), .alfa.-(karboksimetil)-.omega.-(heksi-loksi)- (3 EO)	Neaktivna snov	105391-15-9		0,62 - 0,62 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 7**

Vrsta(-e) formulacije	SL Topen koncentrat

Poglavje 3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 7**

Stavki o nevarnosti	H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Previdnostni stavki	P260: Ne vdihavati razpršila. P260: Ne vdihavati hlapov. P264: Po uporabi temeljito umiti roke . P280: Nositi zaščito za oči. P280: Nositi zaščito za obraz. P280: Nositi zaščitne rokavice. P280: Nositi zaščitno obleko. P301 + P330 + P331: PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P310: Takoj pokličite zdravnika. P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P321: Posebno zdravljenje (glejte navodila za prvo pomoč na tej etiketi). P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Odstraniti vsebino v skladu z nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Poglavje 4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Dezinfekcija neprehrambenih kontaktnih površin v zdravstvu z brisanjem s ploskim brisalom in vedrom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje s ploskim brisalom in vedrom Podroben opis: Rutinska in nerutinska dezinfekcija tal v bolnišničnih sobah in zdravniških ordinacijah, ki se jih ljudje pogosto dotikajo in ki se jih ljudje ne dotikajo pogosto. Čas stika za brisanje z brisalom pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke (10-% redčenje); — 15 min za bakterije (7.5-% redčenje).
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 20 ml/m^2 Redčenje (%): Redčenje (%): 7.5–10 Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 10-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,5–5 litrov Posoda HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–100 litrov Vreča HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,01–1 litra Vrč HDPE, zaščiten pred svetlobo, 0,5–5 litrov

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Rutinska dezinfekcija: Redna dezinfekcija površin, ki bi se lahko kontaminirale s patogeni med medicinskimi postopki ali postopki nege, da se zmanjša tveganje prenosa takih organizmov prek površin.

Nerutinska dezinfekcija: Dezinfekcija v posebnih tveganih situacijah (razen če nacionalni organ za javno zdravje predpiše drugače).

Proizvod je namenjen čiščenju in dezinficiranju v enem koraku. Pred nanosom proizvoda očistiti površino. Vedro napolniti z razredčenim proizvodom in razporediti po tleh s ploskim brisalom, površino obrisati s čistim, suhim brisalom za tla in pustiti, da se posuši na zraku. Po uporabi ne spirajte.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 7.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 7.

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 7.

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 7.

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Dezinfekcija majhnih in/ali velikih neprehrambenih kontaktnih površin v institucionalnih/komercialnih stavbah s pršenjem z razpršilko in brisanjem s suho krpo in/ali z brisanjem s ploskim brisalom in vedrom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje z razpršilko in brisanjem s suho krpo Podroben opis: Rutinska dezinfekcija majhnih površin na majhnih neprehrambenih območjih (npr. kopalnice). Čas stika za pršenje pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke (10-% redčenje); — 15 min za bakterije (7.5-% redčenje). Čas stika za pršenje pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije (10-% redčenje); — 5 min za kvasovke (15-% redčenje); — 15 min za bakterije (7.5-% redčenje). Metoda: Brisanje s ploskim brisalom in vedrom Podroben opis: Rutinska dezinfekcija velikih površin na majhnih neprehrambenih območjih (npr. kopalnice). Čas stika za brisanje z brisalom pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke (10-% redčenje); — 15 min za bakterije (7.5-% redčenje). Metoda: Pršenje z razpršilko in suho krpo ter brisanje s ploskim brisalom in vedrom

	Podroben opis: Rutinska dezinfekcija majhnih in velikih površin na majhnih neprehrambenih območjih (npr. kopalnice). Čas stika za pršenje in brisanje z brisalom pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke (10-% redčenje); — 15 min za bakterije (7.5-% redčenje). Čas stika za pršenje pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije (10-% redčenje); — 5 min za kvasovke (15-% redčenje); — 15 min za bakterije (7.5-% redčenje).
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos s pršenjem: 10 ml/m^2 Redčenje (%): Redčenje (%): 7.5–15 Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa s pršenjem z razpršilko: do 10-krat na dan na sobo Odmerek: Odmerek za nanos z brisanjem z brisalom: 20 ml/m^2 Redčenje (%): Redčenje (%): 7.5–10 Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa za brisanje z brisalom: do 2-krat na dan na sobo Odmerek: Odmerek za nanos s pršenjem: 10 ml/m^2; Odmerek za nanos z brisanjem z brisalom: 20 ml/m^2 Redčenje (%): Redčenje (%): 7.5–15 Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa za kombinirano pršenje z razpršilko in brisanje z brisalom: enkrat na dan na sobo.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,5–5 litrov Posoda HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–100 litrov Vreča HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,01–1 litrov Vrč HDPE, zaščiten pred svetlobo, 0,5–5 litrov

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Po uporabi ne spirajte.

Pršenje: Pri uporabi v čistih pogojih: pred nanosom proizvoda očistiti površino. Najbolje je, da steklenico držite pokonci in pršite z razdalje 10 cm do 20 cm. Razredčen proizvod napršiti na površino, površino obrisati s čistim, suhim robčkom in pustiti, da se posuši na zraku. Po uporabi vedno zaprite šobo. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

Brisanje z brisalom: Proizvod je namenjen čiščenju in dezinficiranju v enem koraku. Pred nanosom proizvoda očistiti površino. Vedro napolniti z razredčenim proizvodom in razporediti po tleh s ploskim brisalom, površino obrisati s čistim, suhim brisalom in pustiti, da se posuši na zraku.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Ne vdihavati hlapov/razpršila.

Za pršenje: Površine, ki se dezinficirajo, (v m^2) ne smejo presegati 1/10 sobne prostornine (v m^3), npr. v sobi s prostornino 120 m^3 se lahko dezinficira največ 12 m^2.

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 7.

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 7.

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 7.

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Dezinfekcija velikih neprehrambenih kontaktnih površin v institucionalnih/komercialnih stavbah z brisanjem s ploskim brisalom in vedrom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje s ploskim brisalom in vedrom Podroben opis: Rutinska dezinfekcija velikih površin na velikih neprehrambenih območjih. Čas stika za brisanje z brisalom pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke (10-% redčenje); — 15 min za bakterije (7.5-% redčenje).
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 20 ml/m^2 Redčenje (%): Redčenje (%): 7.5–10 Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 10-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,5–5 l Posoda HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–100 l Vreča HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,01–1 l Vrč HDPE, zaščiten pred svetlobo, 0,5–5 l

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je namenjen čiščenju in dezinficiranju v enem koraku. Pred nanosom proizvoda očistiti površino. Vedro napolniti z razredčenim proizvodom in razporediti po tleh s ploskim brisalom, površino obrisati s čistim, suhim brisalom za tla in pustiti, da se posuši na zraku. Po uporabi ne spirajte.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 7.

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 7.

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 7.

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 7.

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Dezinfekcija velikih neprehrambenih kontaktnih površin v institucionalnih/komercialnih stavbah s pršenjem z napravo, pritrjeno na steno

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje z napravo, pritrjeno na steno Podroben opis: Rutinska dezinfekcija velikih površin na velikih neprehrambenih in prehrambenih območjih. Čas stika za pršenje pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke (10-% redčenje); — 15 min za bakterije (7.5-% redčenje). Čas stika za pršenje pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije (10-% redčenje); — 5 min za kvasovke (15-% redčenje); — 15 min za bakterije (7.5-% redčenje).

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 180 ml/m^2 Redčenje (%): Redčenje (%): 7.5–15 Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: enkrat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,5–5 l Posoda HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–100 l Vreča HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,01–1 l Vrč HDPE, zaščiten pred svetlobo, 0,5–5 l

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Nanesti proizvod z napravo, nameščeno na steni. Pri uporabi v čistih pogojih: pred nanosom proizvoda očistiti površino. Sprati po nanosu.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Ne vdihavati hlapov/razpršila.

Zagotoviti tehnično zračenje z vsaj 15 izmenjavami zraka/uro.

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 7.

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 7.

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 7.

4.5. **Opis uporabe**

Tabela 5.

Dezinfekcija velikih prehrambenih kontaktnih površin v institucionalnih/komercialnih stavbah s pršenjem z razpršilko

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih

Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje z razpršilko in brisanjem s suho krpo Podroben opis: Rutinska dezinfekcija velikih površin na velikih prehrambenih območjih (npr. kuhinje). Čas stika za pršenje pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke (10-% redčenje); — 15 min za bakterije (7.5-% redčenje). Čas stika za pršenje pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije (10-% redčenje); — 5 min za kvasovke (15-% redčenje); — 15 min za bakterije (7.5-% redčenje).
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 10 ml/m^2 Redčenje (%): Redčenje (%): 7.5–15 Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 10-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,5–5 l Posoda HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–100 l Vreča HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,01–1 l Vrč HDPE, zaščiten pred svetlobo, 0,5–5 l

4.5.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Pri uporabi v čistih pogojih: pred nanosom proizvoda očistiti površino. Najbolje je, da steklenico držite pokonci in pršite z razdalje 10 cm do 20 cm. Razredčen proizvod napršiti na površino, površino obrisati s čistim, suhim robčkom in pustiti, da se posuši na zraku. Po uporabi vedno zaprite šobo. Po uporabi ne spirajte. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

4.5.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Ne vdihavati hlapov/razpršila.

Hrane, krme ali pijač ne dajajte na obdelane površine, dokler se ne posušijo. Ne uporabljajte neposredno ali blizu hrane, krme ali pijače.

Površine, ki se dezinficirajo, (v m^2) ne smejo presegati 1/10 sobne prostornine (v m^3), npr. v sobi s prostornino 120 m^3 se lahko dezinficira največ 12 m^2.

4.5.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 7.

4.5.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 7.

4.5.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 7.

Poglavje 5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 7**

5.1. **Navodila za uporabo**

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila. Proizvod je treba nanesti na suho površino. Površino popolnoma namočiti z uporabo proizvoda. Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na oksidacijska sredstva, kot na primer marmor, baker ali medenina.

Navodila za redčenje (7.5 %): za pripravo 1 l razredčenega sredstva za dezinfekcijo, dodajte 75 ml koncentriranega proizvoda k približno 500 ml destilirane vode ali vode enake kakovosti (npr. demineralizirane), zmešajte in napolnite do 1 l z destilirano vodo ali vodo enake kakovosti.

Navodila za redčenje (10 %): za pripravo 1 l razredčenega sredstva za dezinfekcijo, dodajte 100 ml koncentriranega proizvoda k približno 500 ml destilirane vode ali vode enake kakovosti (npr. demineralizirane), zmešajte in napolnite do 1 l z destilirano vodo ali vodo enake kakovosti.

Navodila za redčenje (15 %): za pripravo 1 l razredčenega sredstva za dezinfekcijo, dodajte 150 ml koncentriranega proizvoda k približno 500 ml destilirane vode ali vode enake kakovosti (npr. demineralizirane), zmešajte in napolnite do 1 l z destilirano vodo ali vodo enake kakovosti.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Med ravnanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic mora navesti imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

Med ravnanjem s proizvodom je obvezna uporaba opreme za zaščito oči.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

UKREPI ZA PRVO POMOČ

V primeru stika z očmi: Takoj spirati z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

V primeru stika s kožo: Takoj vsaj 15 minut spirati z obilo vode. Uporabiti blago milo, če je na voljo. Obleko oprati pred ponovno uporabo. Čevlje temeljito očistiti pred ponovno uporabo. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

Pri zaužitju: Spirati usta z vodo. NE izzvati bruhanja. Nezavestni osebi ne dajati ničesar v usta. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

Pri vdihavanju: Prenesti osebo na svež zrak. Simptomatsko zdravljenje. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

OKOLJSKI UKREPI V SILI

Ne dopustiti stika z zemljo, površinsko vodo ali podzemnico.

Upoštevajte možnost kontaminacije okoli posod za skladiščenje.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Proizvod: Če je mogoče, je recikliranje boljše od odlaganja ali zažiganja. Če recikliranje ni mogoče, odložiti v skladu z nacionalnimi predpisi. Odstranite odpadke na odobrenem mestu za zbiranje odpadkov.

Kontaminirana embalaža: Posodo odložite skladno z nacionalnimi predpisi.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti v primernih, označenih posodah.

Temperatura skladiščenja: 0-25 °C. Zaščitite pred zmrzaljo.

Rok uporabe: 18 mesecev

Poglavje 6. **DRUGE INFORMACIJE**

Proizvod vsebuje vodikov peroksid (št. CAS: 7722-84-1), za katerega je bila za oceno tveganja tega proizvoda dogovorjena in uporabljena evropska referenčna vrednost 1.25 mg/m³ za poklicnega uporabnika.

Poglavje 7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 7**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Incidin OxyConcentrate		Področje trženja: EU		
	UltraSan Floor		Področje trženja: EU		
Številka dovoljenja	EU-0024303-0008 1-7				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	4,95 % (m/m)
Kaprilet-9 karboksilna kislina (zmes alkil etra karboksilne kisline)	Poli(oksi-1,2-etanediil), .alfa.-(karboksimetil)-.omega.-(oktiloksi)- (4-11 EO)	Neaktivna snov	53563-70-5		2,15 % (m/m)
Hekset-4 karboksilna kislina (zmes alkil etra karboksilne kisline)	Poli(oksi-1,2-etanediil), .alfa.-(karboksimetil)-.omega.-(heksiloksi)- (3 EO)	Neaktivna snov	105391-15-9		0,62 % (m/m)

7.2. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	KitchenPro Oxy Des Super Concentrate	Področje trženja: EU
	Incidin OxyConcentrate FF	Področje trženja: EU
	CidalSan Large Area	Področje trženja: EU

Številka dovoljenja	EU-0024303-0009 1-7				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	4,95 % (m/m)
Kaprilet-9 karboksilna kislina (zmes alkil etra karboksilne kisline)	Poli (oksi-1,2-etanediil), .alfa.-(karboksimetil)-.omega.-(oktiloksi)-(4-11 EO)	Neaktivna snov	53563-70-5		2,15 % (m/m)
Hekset-4 karboksilna kislina (zmes alkil etra karboksilne kisline)	Poli (oksi-1,2-etanediil), .alfa.-(karboksimetil)-.omega.-(heksiloksi)- (3 EO)	Neaktivna snov	105391-15-9		0,62 % (m/m)

Poglavje 1. **META SPC 8 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. Identifikator 8 meta SPC

Identifikator	Meta SPC: META SPC 8

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-8

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

Poglavje 2. **SESTAVA META SPC 8**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 8**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 8**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

Poglavje 3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 8**

Stavki o nevarnosti	
Previdnostni stavki	

Poglavje 4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Dezinfekcija površin v industriji (npr. jedilnice, kopalnice) z brisanjem z impregniranimi robčki RTU

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: Mycobacteria Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje z impregniranimi robčki RTU Podroben opis: Dezinfekcija površin v industriji (npr. jedilnice, kopalnice). Čas stika za brisanje pri 10°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke. Čas stika za brisanje pri 20°C v umazanih pogojih: — 2 min za bakterije; — 5 min za kvasovke; — 15 min za glive; — 60 min za mikobakterije.

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 1 robček na m^2 (ustreza 10 ml/m^2) Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 10-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Vedro PP, zaščiteno pred svetlobo, z 10–5 000 impregniranimi robčki iz mešanice 60 % poliestra/40 % liocela ali netkanih robčkov iz 100 % polipropilena (velikost robčka: 200 x 250 mm ali 200 x 200 mm). Vreča PP, zaščitena pred svetlobo, z 10–5 000 impregniranimi robčki iz mešanice 60 % poliestra/40 % liocela ali netkanih robčkov iz 100 % polipropilena (velikost robčka: 200 x 250 mm ali 200 x 200 mm).

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 8.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

-

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 8.

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 8.

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 8.

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Dezinfekcija majhnih prehrambenih kontaktnih površin v prehrambeni industriji in industriji pijač z brisanjem z impregniranimi robčki RTU

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: Mycobacteria Razvojna faza: ni podatkov

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje z impregniranimi robčki RTU Podroben opis: Dezinfekcija majhnih površin v živilsko-predelovalnem obratu. Čas stika za brisanje pri 10°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke. Čas stika za brisanje pri 20°C v umazanih pogojih: — 2 min za bakterije; — 5 min za kvasovke; — 15 min za glive; — 60 min za mikobakterije.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 1 robček na m^2 (ustreza 10 ml/m^2) Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 10-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Vedro PP, zaščiteno pred svetlobo, z 10–5000 impregniranimi robčki iz mešanice 60 % poliestra/40 % liocela ali netkanih robčkov iz 100 % polipropilena (velikost robčka: 200 x 250 mm ali 200 x 200 mm). Vreča PP, zaščitena pred svetlobo, z 10–5000 impregniranimi robčki iz mešanice 60 % poliestra/40 % liocela ali netkanih robčkov iz 100 % polipropilena (velikost robčka: 200 x 250 mm ali 200 x 200 mm).

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 8.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Hrane, krme ali pijač ne dajajte na obdelano površino, dokler se ne posuši. Ne uporabljajte neposredno ali blizu hrane, krme ali pijače.

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 8.

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 8.

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 8.

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Dezinfekcija majhnih neprehrambenih kontaktnih površin v zdravstvu z brisanjem z impregniranimi robčki RTU

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: Mycobacteria Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje z impregniranimi robčki RTU Podroben opis: Rutinska dezinfekcija manjših površin v bolnišničnih sobah in zdravniških ordinacijah, ki se jih ljudje ne dotikajo pogosto. Čas stika za brisanje pri 10°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke. Čas stika za brisanje pri 20°C v umazanih pogojih: — 15 min za bakterije, kvasovke in glive; — 60 min za mikobakterije.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 1 robček na m^2 (ustreza 10 ml/m^2) Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 2-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Vedro PP, zaščiteno pred svetlobo, z 10–5000 impregniranimi robčki iz mešanice 60 % poliestra/40 % liocela ali netkanih robčkov iz 100 % polipropilena (velikost robčka: 200 x 250 mm ali 200 x 200 mm). Vreča PP, zaščitena pred svetlobo, z 10–5000 impregniranimi robčki iz mešanice 60 % poliestra/40 % liocela ali netkanih robčkov iz 100 % polipropilena (velikost robčka: 200 x 250 mm ali 200 x 200 mm).

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Rutinska dezinfekcija: Redna dezinfekcija površin, ki bi se lahko kontaminirale s patogeni med medicinskimi postopki ali postopki nege, da se zmanjša tveganje prenosa takih organizmov prek površin.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

-

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 8.

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 8.

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 8.

Poglavje 5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 8**

5.1. **Navodila za uporabo**

Proizvod je namenjen čiščenju in dezinficiranju v enem koraku. Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila. Proizvod je treba nanesti na suho površino. Površino popolnoma namočiti z uporabo proizvoda. Po uporabi proizvoda pustiti, da se površina posuši na zraku. Po uporabi ne spirajte. Ko ni v uporabi, naj bo posoda zaprta. Ne uporabljati krp za brisanje, ki so bile dehidrirane. Zavreči posodo, ko je prazna. Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na oksidacijska sredstva, kot na primer marmor, baker ali medenina. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

-

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

UKREPI ZA PRVO POMOČ

V primeru stika z očmi: Sprati z obilo vode.

V primeru stika s kožo: Sprati z obilo vode.

Pri zaužitju: Izprati usta. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Pri vdihavanju: Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

OKOLJSKI UKREPI V SILI

Ne dopustiti stika z zemljo, površinsko vodo ali podzemnico.

Upoštevajte možnost kontaminacije okoli posod za skladiščenje.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Proizvod: Če je mogoče, je recikliranje boljše od odlaganja ali zažiganja. Če recikliranje ni mogoče, odložiti v skladu z nacionalnimi predpisi. Odstranite odpadke na odobrenem mestu za zbiranje odpadkov.

Kontaminirana embalaža: Posodo odložite skladno z nacionalnimi predpisi.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti v primernih, označenih posodah.

Temperatura skladiščenja: 0-35 °C. Zaščitite pred zmrzaljo.

Rok uporabe: 18 mesecev

Poglavje 6. **DRUGE INFORMACIJE**

Proizvod vsebuje vodikov peroksid (št. CAS: 7722-84-1), za katerega je bila za oceno tveganja tega proizvoda dogovorjena in uporabljena evropska referenčna vrednost 1.25 mg/m³ za poklicnega uporabnika.

Poglavje 7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 8**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	DrySan Oxy Wipes		Področje trženja: EU		
	IncidinOxyWipe		Področje trženja: EU		
Številka dovoljenja	EU-0024303-0010 1-8				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	1 % (m/m)

Poglavje 1. **META SPC 9 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 9 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: META SPC 9

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-9

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

Poglavje 2. **SESTAVA META SPC 9**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 9**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	7 - 7,7 % (m/m)
Fosforna kislina	Ortožveplova kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	1,5 - 1,5 % (m/m)
Dušikova kislina	Dušikova kislina	Neaktivna snov	7697-37-2	231-714-2	3,71 - 3,71 % (m/m)
Alkohol EO fosfat ester	Poli(oksi-1,2-etanediil), .alfa.-hidro-.omega.-hidroksi-, mono-C8-10-alkil etri, fosfati	Neaktivna snov	68130-47-2		14,625 - 14,625 % (m/m)
Alkilpoliglikozid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dekoksi-6-(hidroksimetil) oksan-3,4,5-triol	Neaktivna snov	68515-73-1	500-220-1	6,35 - 6,35 % (m/m)
Alkoholi, C10-C16 etoksilirani propoksilirani (Dehydol 980)	Alkoholi, C10-C16 etoksilirani propoksilirani	Neaktivna snov	69227-22-1		3 - 3 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 9**

Vrsta(-e) formulacije	SL Topen koncentrat

Poglavje 3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 9**

Stavki o nevarnosti	H290: Lahko je jedko za kovine. H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Previdnostni stavki	P234: Hraniti samo v originalni embalaži. P264: Po uporabi temeljito umiti roke . P260: Ne vdihavati hlapov. P260: Ne vdihavati razpršila. P280: Nositi zaščito za obraz. P280: Nositi zaščitne rokavice. P280: Nositi zaščito za oči. P280: Nositi zaščitno obleko.

	P301 + P330 + P331: PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P310: Takoj pokličite zdravnika. P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P321: Posebno zdravljenje (glejte navodila za prvo pomoč na tej etiketi). P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. P390: Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. P406: Hraniti v odporni proti koroziji, z odporno notranjo oblogo. P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Odstraniti vsebino v skladu z nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Poglavje 4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Dezinfekcija majhnih neprehrambenih kontaktnih površin v zdravstvu z brisanjem s čisto krpo/robčkom za enkratno uporabo in vedrom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje s krpo/robčkom in vedra Podroben opis: Rutinska in nerutinska dezinfekcija manjših površin v bolnišničnih sobah in zdravniških ordinacijah, ki se jih ljudje pogosto dotikajo in ki se jih ljudje ne dotikajo pogosto. Čas stika za brisanje pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije (5-% redčenje); — 5 min za kvasovke (3-% redčenje); — 5 min za glive (4-% redčenje); — 50 min za viruse (5-% redčenje).

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 10 ml/m^2 Redčenje (%): Redčenje (%): 3–5 Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 10-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,5–5 l Vrč HDPE, zaščiten pred svetlobo, 0,5–5 l Vreča HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,01–1 l

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Rutinska dezinfekcija: Redna dezinfekcija površin, ki bi se lahko kontaminirale s patogeni med medicinskimi postopki ali postopki nege, da se zmanjša tveganje prenosa takih organizmov prek površin.

Nerutinska dezinfekcija: Dezinfekcija v posebnih tveganih situacijah (razen če nacionalni organ za javno zdravje predpiše drugače).

Proizvod je namenjen čiščenju in dezinficiranju v enem koraku. Natočiti razredčen proizvod v čisto vedro in razporediti po površini z uporabo krpe/robčka za enkratno uporabo, obrisati površino s čisto krpo/robčkom in pustiti, da se posuši na zraku. Po uporabi ne spirajte. Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na oksidacijska sredstva, kot na primer marmor, baker ali medenina. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Dezinfekcija velikih neprehrambenih kontaktnih površin v zdravstvu z brisanjem s ploskim brisalom in vedrom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov

	Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje s ploskim brisalom in vedrom Podroben opis: Rutinska in nerutinska dezinfekcija večjih površin v bolnišničnih sobah in zdravniških ordinacijah, ki se jih ljudje pogosto dotikajo in ki se jih ljudje ne dotikajo pogosto. Čas stika za brisanje z brisalom pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije (5-% redčenje); — 5 min za kvasovke (3-% redčenje); — 5 min za glive (4-% redčenje); — 50 min za viruse (5-% redčenje).
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 20 ml/m^2 Redčenje (%): Redčenje (%): 3–5 Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 10-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,5–5 l Vrč HDPE, zaščiten pred svetlobo, 0,5–5 l Vreča HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,01–1 l

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Rutinska dezinfekcija: Redna dezinfekcija površin, ki bi se lahko kontaminirale s patogeni med medicinskimi postopki ali postopki nege, da se zmanjša tveganje prenosa takih organizmov prek površin.

Nerutinska dezinfekcija: Dezinfekcija v posebnih tveganih situacijah (razen če nacionalni organ za javno zdravje predpiše drugače).

Proizvod je namenjen čiščenju in dezinficiranju v enem koraku. Vedro napolniti z razredčenim proizvodom in razporediti po tleh s ploskim brisalom, površino obrisati s čistim, suhim brisalom in pustiti, da se posuši na zraku. Po uporabi ne spirajte.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Dezinfekcija majhnih in/ali velikih neprehrambenih kontaktnih površin v institucionalnih/komercialnih stavbah s pršenjem z razpršilko in brisanjem s suho krpo ali z brisanjem s krpo za enkratno uporabo in vedrom in/ali tal z brisanjem s ploskim brisalom in vedrom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje z razpršilko in brisanjem s suho krpo Podroben opis: Rutinska dezinfekcija majhnih površin na majhnih neprehrambenih območjih (npr. kopalnice). Čas stika za pršenje in brisanje pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke (5-% redčenje); — 5 min za kvasovke (3-% redčenje); — 5 min za glive (4-% redčenje); — 50 min za viruse (5-% redčenje). Metoda: Brisanje s krpo/robčkom za enkratno uporabo in vedrom Podroben opis: Rutinska dezinfekcija majhnih površin na majhnih neprehrambenih območjih (npr. kopalnice). Čas stika za brisanje pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke (5-% redčenje);

	— 5 min za kvasovke (3-% redčenje); — 5 min za glive (4-% redčenje); — 50 min za viruse (5-% redčenje). Metoda: Brisanje s ploskim brisalom in vedrom Podroben opis: Rutinska dezinfekcija velikih površin na majhnih neprehrambenih območjih (npr. kopalnice). Čas stika za brisanje z brisalom pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke (5-% redčenje); — 5 min za kvasovke (3-% redčenje); — 5 min za glive (4-% redčenje); — 50 min za viruse (5-% redčenje). Metoda: Pršenje z razpršilko in suho krpo ter brisanje s ploskim brisalom in vedrom Podroben opis: Rutinska dezinfekcija majhnih in velikih površin na majhnih neprehrambenih območjih (npr. kopalnice). Čas stika za pršenje in brisanje, brisanje z brisalom pri 20° C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke (5-% redčenje); — 5 min za kvasovke (3-% redčenje); — 5 min za glive (4-% redčenje); — 50 min za viruse (5-% redčenje). Metoda: Brisanje s krpo/robčkom in vedrom ter brisanje s ploskim brisalom in vedrom Podroben opis: Rutinska dezinfekcija majhnih in velikih površin na majhnih neprehrambenih območjih (npr. kopalnice). Čas stika za brisanje in brisanje z brisalom pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke (5-% redčenje); — 5 min za kvasovke (3-% redčenje); — 5 min za glive (4-% redčenje); — 50 min za viruse (5-% redčenje).
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos s pršenjem: 10 ml/m^2 Redčenje (%): Redčenje (%): 3–5 Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa s pršenjem z razpršilko: do 10-krat na dan na sobo Odmerek: Odmerek za nanos z brisanjem: 10 ml/m^2 Redčenje (%): Redčenje (%): 3–5 Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa za brisanje: do 10-krat na dan na sobo Odmerek: Odmerek za nanos z brisanjem z brisalom: 20 ml/m^2

	Redčenje (%): Redčenje (%): 3–5 Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa za brisanje z brisalom: do 2-krat na dan na sobo Odmerek: Odmerek za nanos s pršenjem: 10 ml/m²; Odmerek za nanos z brisanjem z brisalom: 20 ml/m² Redčenje (%): Redčenje (%): 3–5 Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa za kombinirano pršenje z razpršilko in brisanje z brisalom: enkrat na dan na sobo. Odmerek: Odmerek za nanos z brisanjem: 10 ml/m²; Odmerek za nanos z brisanjem z brisalom: 20 ml/m² Redčenje (%): Redčenje (%): 3–5 Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa za kombinirano brisanje in čiščenje z brisalom: enkrat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,5–5 l Vrč HDPE, zaščiten pred svetlobo, 0,5–5 l Vreča HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,01–1 l

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Po uporabi ne spirajte.

Pršenje: Najbolje je steklenico držati pokonci in pršiti z razdalje 30 cm. Razredčen proizvod napršiti na suho krpo in obrisati majhne površine, kot so delavni pulti in oprema, ali napršiti razredčen proizvod na površino, obrisati površino s čisto, suho krpo ali pustiti, da se posuši na zraku. Po uporabi vedno zaprite šobo. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

Brisanje: Natočiti razredčen proizvod v čisto vedro in razporediti po površini z uporabo krpe/robčka za enkratno uporabo, obrisati površino s čisto krpo/robčkom in pustiti, da se posuši na zraku. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

Brisanje z brisalom: Vedro napolniti z razredčenim proizvodom in razporediti po tleh s ploskim brisalom, površino obrisati s čistim, suhim brisalom in pustiti, da se posuši na zraku.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Ne vdihavati hlapov/razpršila.

Za pršenje: Površina, ki se dezinficira (v m^2), ne sme presegati 1/10 sobne prostornine (v m^3), npr. v sobi s prostornino 120 m^3 se lahko dezinficira največ 12 m^2.

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Dezinfekcija velikih neprehrambenih kontaktnih površin v institucionalnih/komercialnih stavbah z brisanjem s ploskim brisalom in vedrom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje s ploskim brisalom in vedrom Podroben opis: Rutinska dezinfekcija velikih površin na velikih neprehrambenih območjih. Čas stika za brisanje z brisalom pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke (5-% redčenje); — 5 min za kvasovke (3-% redčenje); — 5 min za glive (4-% redčenje); — 50 min za viruse (5-% redčenje).
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 20 ml/m^2 Redčenje (%): Redčenje (%): 3–5 Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 10-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,5–5 l Vrč HDPE, zaščiten pred svetlobo, 0,5–5 l Vreča HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,01–1 l

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Vedro napolniti z razredčenim proizvodom in razporediti po tleh s ploskim brisalom, površino obrisati s čistim, suhim brisalom in pustiti, da se posuši na zraku. Po uporabi ne spirajte.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Zagotoviti tehnično zračenje z vsaj 15 izmenjavami zraka/uro.

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

4.5. **Opis uporabe**

Tabela 5.

Dezinfekcija velikih neprehrambenih kontaktnih površin v institucionalnih/komercialnih stavbah s pršenjem z napravo, pritrjeno na steno

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje z napravo, pritrjeno na steno Podroben opis: Rutinska dezinfekcija velikih površin na velikih neprehrambenih in prehrambenih območjih. Čas stika za pršenje pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke (3-% redčenje). Čas stika za pršenje pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke (1,5-% redčenje); — 15 min za kvasovke (2-% redčenje).
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 180 ml/m^2 Redčenje (%): Redčenje (%): 1.5-3 Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: enkrat na dan na sobo

Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,5–5 l Vrč HDPE, zaščiten pred svetlobo, 0,5–5 l Vreča HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,01–1 l

4.5.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Pri uporabi v čistih pogojih: pred nanosom proizvoda očistiti površino. Nanesti proizvod z napravo, nameščeno na steni. Sprati po nanosu.

4.5.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Ne vdihavati hlapov/razpršila.

Zagotoviti tehnično zračenje z vsaj 15 izmenjavami zraka/uro.

4.5.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

4.5.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

4.5.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

4.6. **Opis uporabe**

Tabela 6.

Dezinfekcija velikih prehrambenih kontaktnih površin v institucionalnih/komercialnih stavbah s pršenjem z razpršilko in brisanjem s suho krpo

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje z razpršilko in brisanjem s suho krpo Podroben opis:

	Rutinska dezinfekcija velikih površin na velikih prehrambenih območjih (npr. kuhinje). Čas stika za pršenje in brisanje pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke (5-% redčenje); — 5 min za kvasovke (3-% redčenje); — 5 min za glive (4-% redčenje); — 50 min za viruse (5-% redčenje).
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 10 ml/m^2 Redčenje (%): Redčenje (%): 3–5 Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 10-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,5–5 l Vrč HDPE, zaščiten pred svetlobo, 0,5–5 l Vreča HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,01–1 l

4.6.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Najbolje je steklenico držati pokonci in pršiti z razdalje 30 cm. Razredčen proizvod napršiti na suho krpo in obrisati majhne površine, kot so delavni pulti in oprema, ali napršiti razredčen proizvod na površino, obrisati površino s čisto, suho krpo in pustiti, da se posuši na zraku. Po uporabi vedno zaprite šobo. Po uporabi ne spirajte. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

4.6.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Ne vdihavati hlapov/razpršila.

Hrane, krme ali pijač ne dajajte na obdelano površino, dokler se ne posuši. Ne uporabljajte neposredno ali blizu hrane, krme ali pijače.

Površina, ki se dezinficira (v m^2), ne sme presegati 1/10 sobne prostornine (v m^3), npr. v sobi s prostornino 120 m^3 se lahko dezinficira največ 12 m^2.

4.6.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

4.6.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

4.6.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

4.7. **Opis uporabe**

Tabela 7.

Dezinfekcija velikih prehrambenih kontaktnih površin v institucionalnih/komercialnih stavbah z brisanjem s krpo za enkratno uporabo in vedrom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje s krpo/robčkom za enkratno uporabo in vedrom Podroben opis: Rutinska dezinfekcija velikih površin na velikih prehrambenih območjih (npr. kuhinje). Čas stika za brisanje pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke (5-% redčenje); — 5 min za kvasovke (3-% redčenje); — 5 min za glive (4-% redčenje); — 50 min za viruse (5-% redčenje).
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 10 ml/m^2 Redčenje (%): Redčenje (%): 3–5 Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 10-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,5–5 l Vrč HDPE, zaščiten pred svetlobo, 0,5–5 l Vreča HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,01–1 l

4.7.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Natočiti razredčen proizvod v čisto vedro in razporediti po površini z uporabo krpe/robčka za enkratno uporabo, obrisati površino s čisto krpo/robčkom in pustiti, da se posuši na zraku. Po uporabi ne spirajte. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

4.7.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Hrane, krme ali pijač ne dajajte na obdelano površino, dokler se ne posuši. Ne uporabljajte neposredno ali blizu hrane, krme ali pijače.

4.7.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

4.7.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

4.7.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 9.

Poglavje 5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 9**

5.1. **Navodila za uporabo**

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila. Proizvod je treba nanesti na suho površino. Površino popolnoma namočiti z uporabo proizvoda. Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na oksidacijska sredstva, kot na primer marmor, baker ali medenina.

Navodila za redčenje (15 %): za pripravo 1 l razredčenega sredstva za dezinfekcijo, dodajte 15 ml koncentriranega proizvoda k približno 500 ml destilirane vode ali vode enake kakovosti (npr. demineralizirane), zmešajte in napolnite do 1 l z destilirano vodo ali vodo enake kakovosti.

Navodila za redčenje (2 %): za pripravo 1 l razredčenega sredstva za dezinfekcijo, dodajte 20 ml koncentriranega proizvoda k približno 500 ml destilirane vode ali vode enake kakovosti (npr. demineralizirane), zmešajte in napolnite do 1 l z destilirano vodo ali vodo enake kakovosti.

Navodila za redčenje (3 %): za pripravo 1 l razredčenega sredstva za dezinfekcijo, dodajte 30 ml koncentriranega proizvoda k približno 500 ml destilirane vode ali vode enake kakovosti (npr. demineralizirane), zmešajte in napolnite do 1 l z destilirano vodo ali vodo enake kakovosti.

Navodila za redčenje (4 %): za pripravo 1 l razredčenega sredstva za dezinfekcijo, dodajte 40 ml koncentriranega proizvoda k približno 500 ml destilirane vode ali vode enake kakovosti (npr. demineralizirane), zmešajte in napolnite do 1 l z destilirano vodo ali vodo enake kakovosti.

Navodila za redčenje (5 %): za pripravo 1 l razredčenega sredstva za dezinfekcijo, dodajte 50 ml koncentriranega proizvoda k približno 500 ml destilirane vode ali vode enake kakovosti (npr. demineralizirane), zmešajte in napolnite do 1 l z destilirano vodo ali vodo enake kakovosti.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Med ravnanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic mora navesti imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

Med ravnanjem s proizvodom je obvezna uporaba opreme za zaščito oči.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

UKREPI ZA PRVO POMOČ

V primeru stika z očmi: Takoj spirati z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

V primeru stika s kožo: Takoj vsaj 15 minut spirati z obilo vode. Uporabiti blago milo, če je na voljo. Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. Čevlje temeljito očistiti pred ponovno uporabo. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

Pri zaužitju: Spirati usta z vodo. NE izzvati bruhanja. Nezavestni osebi ne dajati ničesar v usta. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

Pri vdihavanju: Prenesti osebo na svež zrak. Simptomatsko zdravljenje. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

OKOLJSKI UKREPI V SILI

Ne dopustiti stika z zemljo, površinsko vodo ali podzemnico.

Upoštevajte možnost kontaminacije okoli posod za skladiščenje.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Proizvod: Če je mogoče, je recikliranje boljše od odlaganja ali zažiganja. Če recikliranje ni mogoče, odložiti v skladu z nacionalnimi predpisi. Odstranite odpadke na odobrenem mestu za zbiranje odpadkov.

Kontaminirana embalaža: Posodo odložite skladno z nacionalnimi predpisi.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti v primernih, označenih posodah.

Temperatura skladiščenja: 0-25 °C. Zaščitite pred zmrzaljo.

Rok uporabe: 18 mesecev

Poglavje 6. **DRUGE INFORMACIJE**

Proizvod vsebuje vodikov peroksid (št. CAS: 7722-84-1), za katerega je bila za oceno tveganja tega proizvoda dogovorjena in uporabljena evropska referenčna vrednost 1.25 mg/m³ za poklicnega uporabnika.

Poglavje 7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 9**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	KitchenPro Oxy Des Concentrate	Področje trženja: EU
	Incidin OxyPro	Področje trženja: EU
	Sirafan Oxy Conc	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0024303-0011 1-9	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	7 % (m/m)
Fosforna kislina	Ortožveplova kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	1,5 % (m/m)
Dušikova kislina	Dušikova kislina	Neaktivna snov	7697-37-2	231-714-2	3,71 % (m/m)
Alkohol EO fosfat ester	Poli(oksi-1,2-etanediil), .alfa.-hidro-.omega.-hidroksi-, mono-C8-10-alkil etri, fosfati	Neaktivna snov	68130-47-2		14,625 % (m/m)
Alkilpoliglikozid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dekoksi-6-(hidroksimetil) oksan-3,4,5-triol	Neaktivna snov	68515-73-1	500-220-1	6,35 % (m/m)
Alkoholi, C10-C16 etoksilirani propoksilirani (Dehydol 980)	Alkoholi, C10-C16 etoksilirani propoksilirani	Neaktivna snov	69227-22-1		3 % (m/m)

7.2. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Oasis Pro Oxy Des	Področje trženja: EU			
	Maxx Oxy Des 2	Področje trženja: EU			
Številka dovoljenja	EU-0024303-0012 1-9				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	7 % (m/m)
Fosforna kislina	Ortožveplova kislina	Neaktivna snov	7664-38-2	231-633-2	1,5 % (m/m)
Dušikova kislina	Dušikova kislina	Neaktivna snov	7697-37-2	231-714-2	3,71 % (m/m)

Alkohol EO fosfat ester	Poli(oksi-1,2-etanediil), .alfa.-hidro-.omega.-hidroksi-, mono-C8-10-alkil etri, fosfati	Neaktivna snov	68130-47-2		14,625 % (m/m)
Alkilpoliglikozid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dekoksi-6-(hidroksimetil) oksan-3,4,5-triol	Neaktivna snov	68515-73-1	500-220-1	6,35 % (m/m)
Alkoholi, C10-C16 etoksilirani propoksilirani (Dehydol 980)	Alkoholi, C10-C16 etoksilirani propoksilirani	Neaktivna snov	69227-22-1		3 % (m/m)

Poglavje 1. **META SPC 10 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 10 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: META SPC 10

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-10

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena

Poglavje 2. **SESTAVA META SPC 10**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 10**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 % (m/m)
Monohidrat citronske kisline	2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilna kislina	Neaktivna snov	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 % (m/m)

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Fenoksietanol	2-Fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 % (m/m)
Natrijev lavril sulfat	Natrijev dodecil sulfat	Neaktivna snov	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 % (m/m)
L-Glutaminska kislina, deriv. N-koko acil, mononatrijeve soli	Natrijev;(4S)-4-amino-5-hidroksi-5-okso-pentanoat	Neaktivna snov	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 % (m/m)
Žveplova kislina, mono-C12-14-alkil estri, amonijeve soli (Texapon ALS)	Žveplova kislina, mono-C12-14-alkil estri, amonijeve soli	Neaktivna snov	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 10**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

Poglavje 3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 10**

Stavki o nevarnosti	H290: Lahko je jedko za kovine. H319: Povzroča hudo draženje oči.
Previdnostni stavki	P234: Hraniti samo v originalni embalaži. P264: Po uporabi temeljito umiti roke . P280: Nositi zaščito za oči. P280: Nositi zaščito za obraz. P390: Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. P406: Hraniti v odporni proti koroziji, z odporno notranjo oblogo. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha,: poiščite zdravniško oskrbo/ pomoč.

Poglavje 4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Higiensko umivanje rok

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Neposredni nanos na kožo Podroben opis: Antimikrobno milo za roke, namenjeno samo higienskemu umivanju rok v prehrambeni industriji in industriji pijač. Čas stika pri 20°C v umazanih pogojih: — 60 sekund za bakterije in kvasovke.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 3 ml proizvoda na nanos Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: 1–10-krat na dan
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Vrč HDPE, zaščiten pred svetlobo, 1–100 l Kanta HDPE, zaščitena pred svetlobo, 1–100 l IBC HDPE, zaščiten pred svetlobo, 600–1000 l Sod HDPE, zaščiten pred svetlobo, 60–220 l Steklenica HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,1–5 l Vreča HDPE, zaščitena pred svetlobo, 0,5–100 l

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 10.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 10.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 10.

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 10.

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 10.

Poglavje 5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 10**

5.1. **Navodila za uporabo**

Nanesti približno 3 mlproizvoda na kore roke in drgniti 60 sekund. Temeljito spirati s tekočo vodo iz pipe vsaj 30 sekund.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Izogibati se pljuskanju in polivanju.

Izogibajte se prenosu z rok na oči.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

UKREPI ZA PRVO POMOČ

V primeru stika z očmi: Sprati z vodo.

V primeru stika s kožo: Sprati z vodo.

Pri zaužitju: Izprati usta. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Pri vdihavanju: Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

OKOLJSKI UKREPI V SILI

Ne dopustiti stika z zemljo, površinsko vodo ali podzemnico.

Upoštevajte možnost kontaminacije okoli posod za skladiščenje.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Proizvod: Če je mogoče, je recikliranje boljše od odlaganja ali zažiganja. Če recikliranje ni mogoče, odložiti v skladu z nacionalnimi predpisi. Odstranite odpadke na odobrenem mestu za zbiranje odpadkov.

Kontaminirana embalaža: Posodo odložite skladno z nacionalnimi predpisi.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti v primernih, označenih posodah.

Temperatura skladiščenja: 0-25 °C

Rok uporabe: 18 mesecev

Poglavje 6. **DRUGE INFORMACIJE**

Proizvod vsebuje vodikov peroksid (št. CAS: 7722-84-1), za katerega je bila za oceno tveganja tega proizvoda dogovorjena in uporabljena evropska referenčna vrednost 1.25 mg/m^3 za poklicnega uporabnika.

Poglavje 7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 10**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Manosan Oxy	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0024303-0013 1-10	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	1,4 % (m/m)
Monohidrat citronske kisline	2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilna kislina	Neaktivna snov	5949-29-1	201-069-1	0,9 % (m/m)
Fenoksietanol	2-Fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0,9 % (m/m)
Natrijev lavril sulfat	Natrijev dodecil sulfat	Neaktivna snov	151-21-3	205-788-1	3,88 % (m/m)
L-Glutaminska kislina, deriv. N-koko acil, mononatrijeve soli	Natrijev;(4S)-4-amino-5-hidroksi-5-oksopentanoat	Neaktivna snov	68187-32-6	269-087-2	2 % (m/m)
Žveplova kislina, mono-C12-14-alkil estri, amonijeve soli (Texapon ALS)	Žveplova kislina, mono-C12-14-alkil estri, amonijeve soli	Neaktivna snov	90583-11-2	292-209-0	1,12 % (m/m)

Poglavje 1. **META SPC 11 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 11 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: META SPC 11

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-11

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

Poglavje 2. **SESTAVA META SPC 11**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 11**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 11**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

Poglavje 3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 11**

Stavki o nevarnosti	
Previdnostni stavki	

Poglavje 4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Dezinfekcija čistih sob za biološke vede z brisanjem z impregniranimi robčki RTU

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Bakterijske spore Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Clostridium difficile Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: Mycobacteria Razvojna faza: ni podatkov

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje z impregniranimi robčki RTU Podroben opis: Dezinfekcija majhnih površin, materialov in opreme v čistih sobah za biološke vede in podpornih okoljih (npr. farmacevtska industrija) in dezinfekcija prenosa. Čas stika za brisanje pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije, kvasovke, glive in mikobakterije; — 30 min za viruse; — 60 min za bakterijske spore. Čas stika za brisanje pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 1 robček na m^2 (ustreza 10 ml/m^2) Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 2-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Vedro iz PET ali PE, zaščiteno pred svetlobo, z 10–5000 impregniranimi robčki iz mešanice 45 % poliestra/55 % celuloze (velikost robčka: 420 x 250 mm ali 200 x 200 mm). Vreča iz PET/PE ali EVA/PP ali aluminija/PE, zaščitena pred svetlobo, ali vreča iz PE z 10–100 impregniranimi robčki iz mešanice 45 % poliestra/55 % celuloze (velikost robčka: 420 x 250 mm ali 200 x 200 mm)

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 11.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

-

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 11.

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 11.

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 11.

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Dezinfekcija čistih sob za biološke vede z brisanjem z brisalom z impregniranimi robčki RTU

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Bakterijske spore Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Clostridium difficile Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: Mycobacteria Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje z brisalom z impregniranimi robčki RTU Podroben opis: Dezinfekcija tal v čistih sobah za biološke vede in podpornih okoljih (npr. farmacevtska industrija). Čas stika za brisanje pri 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije, kvasovke, glive in mikobakterije; — 30 min za viruse; — 60 min za bakterijske spore. Čas stika za brisanje pri 20°C v čistih pogojih: — 5 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 1 robček na m^2 (ustreza 10 ml/m^2) Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 2-krat na dan na sobo

Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Vedro iz PET ali PE, zaščiteno pred svetlobo, z 10–5000 impregniranimi robčki iz mešanice 45 % poliestra/55 % celuloze (velikost robčka: 420 x 250 mm ali 200 x 200 mm) Vreča iz PET/PE ali EVA/PP ali aluminija/PE, zaščitena pred svetlobo, ali vreča iz PE z 10–100 impregniranimi robčki iz mešanice 45 % poliestra/55 % celuloze (velikost robčka: 420 x 250 mm ali 200 x 200 mm)

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 11.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

-

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 11.

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 11.

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 11.

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Dezinfekcija majhnih neprehrambenih kontaktnih površin v zdravstvu z brisanjem z impregniranimi robčki RTU

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: Ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: Mikobakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Bakterijske spore Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov

	Znanstveno ime: Clostridium difficile Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje z impregniranimi robčki RTU Podroben opis: Rutinska dezinfekcija manjših površin v bolnišničnih sobah in zdravniških ordinacijah, ki se jih ljudje ne dotikajo pogosto. Čas stika za brisanje pri 20°C v čistih pogojih: — 15 min za Clostridium difficile; — 30 min za bakterijske spore, mikobakterije in viruse. Čas stika za brisanje pri 20°C v umazanih pogojih: — 15 min za bakterije in kvasovke; — 30 min za glive, mikobakterije in viruse.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 1 robček na m^2 (ustreza 10 ml/m^2) Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 2-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Vreča s potiskom, zaščitena pred svetlobo, z 10–100 impregniranimi robčki iz mešanice 60 % poliestra/40 % liocela (velikost robčka: 420 x 250 mm ali 200 x 200 mm). Posoda PET, zaščitena pred svetlobo, z 10–1000 impregniranimi robčki iz mešanice 60 % poliestra/40 % liocela (velikost robčka: 420 x 250 mm ali 200 x 200 mm). Vedro PET, zaščiteno pred svetlobo, z 10–1000 impregniranimi robčki iz mešanice 60 % poliestra/40 % liocela (velikost robčka: 420 x 250 mm ali 200 x 200 mm). Vreča PET, zaščitena pred svetlobo, z 10–1000 impregniranimi robčki iz mešanice 60 % poliestra/40 % liocela (velikost robčka: 420 x 250 mm ali 200 x 200 mm).

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Rutinska dezinfekcija: Redna dezinfekcija površin, ki bi se lahko kontaminirale s patogeni med medicinskimi postopki ali postopki nege, da se zmanjša tveganje prenosa takih organizmov prek površin.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

-

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 11.

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 11.

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 11.

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Dezinfekcija majhnih neprehrambenih kontaktnih površin v institucionalnih/komercialnih stavbah z brisanjem z impregniranimi robčki RTU

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: Ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: Mikobakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Bakterijske spore Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Clostridium difficile Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje z impregniranimi robčki RTU Podroben opis: Rutinska dezinfekcija majhnih površin na majhnih neprehrambenih območjih (npr. kopalnice). Čas stika za brisanje pri 20°C v čistih pogojih: — 15 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore, mikobakterije in viruse.

	Čas stika za brisanje pri 20°C v umazanih pogojih: — 2 min za bakterije; — 15 min za kvasovke; — 30 min za glive, mikobakterije in viruse.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 1 robček na m^2 (ustreza 10 ml/m^2) Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 10-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Vreča s potiskom, zaščitena pred svetlobo, z 10–100 impregniranimi robčki iz mešanice 60 % poliestra/40 % liocela (velikost robčka: 420 x 250 mm ali 200 x 200 mm). Posoda PET, zaščitena pred svetlobo, z 10–1000 impregniranimi robčki iz mešanice 60 % poliestra/40 % liocela (velikost robčka: 420 x 250 mm ali 200 x 200 mm). Vedro PET, zaščiteno pred svetlobo, z 10–1000 impregniranimi robčki iz mešanice 60 % poliestra/40 % liocela (velikost robčka: 420 x 250 mm ali 200 x 200 mm). Vreča PET, zaščitena pred svetlobo, z 10–1000 impregniranimi robčki iz mešanice 60 % poliestra/40 % liocela (velikost robčka: 420 x 250 mm ali 200 x 200 mm).

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 11.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

-

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 11.

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 11.

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 11.

4.5. **Opis uporabe**

Tabela 5.

Dezinfekcija majhnih prehrambenih kontaktnih površin v institucionalnih/komercialnih stavbah z brisanjem z impregniranimi robčki RTU

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: Ni podatkov Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: Mikobakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Bakterijske spore Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Clostridium difficile Splošno ime: Bakterijske spore Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Virusi Splošno ime: Virusi Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje z impregniranimi robčki RTU Podroben opis: Rutinska dezinfekcija majhnih površin na majhnih prehrambenih območjih (npr. kuhinje). Čas stika za brisanje pri 20°C v čistih pogojih: — 15 min za spore Clostridium difficile ; — 30 min za bakterijske spore, mikobakterije in viruse. Čas stika za brisanje pri 20°C v umazanih pogojih: — 2 min za bakterije; — 15 min za kvasovke; — 30 min za glive, mikobakterije in viruse.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 1 robček na m^2 (ustreza 10 ml/m^2) Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 10-krat na dan na sobo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Vreča s potiskom, zaščitena pred svetlobo, z 10–100 impregniranimi robčki iz mešanice 60 % poliestra/40 % liocela (velikost robčka: 420 x 250 mm ali 200 x 200 mm). Posoda PET, zaščitena pred svetlobo, z 10–1000 impregniranimi robčki iz mešanice 60 % poliestra/40 % liocela (velikost robčka: 420 x 250 mm ali 200 x 200 mm).

	Vedro PET, zaščiteno pred svetlobo, z 10–1000 impregniranimi robčki iz mešanice 60 % poliestra/40 % liocela (velikost robčka: 420 x 250 mm ali 200 x 200 mm). Vreča PET, zaščitena pred svetlobo, z 10–1000 impregniranimi robčki iz mešanice 60 % poliestra/40 % liocela (velikost robčka: 420 x 250 mm ali 200 x 200 mm).

4.5.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 11.

4.5.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Hrane, krme ali pijač ne dajajte na obdelano površino, dokler se ne posuši. Ne uporabljajte neposredno ali blizu hrane, krme ali pijače.

4.5.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 11.

4.5.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 11.

4.5.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 11.

Poglavje 5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 11**

5.1. **Navodila za uporabo**

Proizvod je namenjen čiščenju in dezinficiranju v enem koraku. Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila. Pri uporabi v čistih pogojih: pred nanosom proizvoda očistiti površino. Proizvod nanesti na suho površino. Površino popolnoma namočiti z uporabo proizvoda. Pustite, da se površina posuši na zraku. Po uporabi ne spirajte. Ko ni v uporabi, naj bo posoda zaprta. Ne uporabljati krp za brisanje, ki so bile dehidrirane. Zavreči posodo, ko je prazna. Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na oksidacijska sredstva, kot na primer marmor, baker ali medenina. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

-

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

UKREPI ZA PRVO POMOČ

V primeru stika z očmi: Sprati z obilo vode.

V primeru stika s kožo: Sprati z obilo vode.

Pri zaužitju: Izprati usta. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Pri vdihavanju: Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

OKOLJSKI UKREPI V SILI

Ne dopustiti stika z zemljo, površinsko vodo ali podzemnico.

Upoštevajte možnost kontaminacije okoli posod za skladiščenje.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Proizvod: Če je mogoče, je recikliranje boljše od odlaganja ali zažiganja. Če recikliranje ni mogoče, odložiti v skladu z nacionalnimi predpisi. Odstranite odpadke na odobrenem mestu za zbiranje odpadkov.

Kontaminirana embalaža: Posodo odložite skladno z nacionalnimi predpisi.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti v primernih, označenih posodah.

Temperatura skladiščenja: 0-35 °C. Zaščitite pred zmrzaljo.

Rok uporabe: 18 mesecev

Poglavje 6. **DRUGE INFORMACIJE**

Proizvod vsebuje vodikov peroksid (št. CAS: 7722-84-1), za katerega je bila za oceno tveganja tega proizvoda dogovorjena in uporabljena evropska referenčna vrednost 1.25 mg/m³ za poklicnega uporabnika.

Poglavje 7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 11**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide	Področje trženja: EU			
	Anios Low Peroxide IP sterile wipes	Področje trženja: EU			
Številka dovoljenja	EU-0024303-0014 1-11				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (m/m)

7.2. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Incidin OxyWipe S	Področje trženja: EU
	KitchenPro Oxy Wipes S	Področje trženja: EU
	Sirafan Oxy Wipes	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0024303-0015 1-11	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (m/m)

Poglavje 1. **META SPC 12 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 12 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: META SPC 12

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-12

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

Poglavje 2. **SESTAVA META SPC 12**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 12**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 % (m/m)
N-propanol	Propan-1-ol	Neaktivna snov	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 12**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

Poglavje 3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 12**

Stavki o nevarnosti	H226: Vnetljiva tekočina in hlapi. H318: Povzroča hude poškodbe oči.
Previdnostni stavki	P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P233: Hraniti v tesno zaprti posodi. P240: Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine ter izenačiti potenciale.

	P241: Uporabiti električno opremo, odporno proti eksplozijam. P241: Uporabiti prezračevalno opremo, odporno proti eksplozijam. P241: Uporabiti opremo za razsvetljavo, odporno proti eksplozijam. P242: Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. P243: Preprečiti statično naelektrenje. P280: Nositi zaščito za oči. P280: Nositi zaščito za obraz. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P310: Takoj pokličite zdravnika. P370 + P378: V primeru požara: za gašenje uporabiti voda . P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501: Odstraniti vsebino v skladu z nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Poglavje 4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Dezinfekcija površin v industriji (npr. jedilnice, kopalnice) z brisanjem z impregniranimi robčki RTU

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje z impregniranimi robčki RTU Podroben opis: Dezinfekcija površin v industriji (npr. jedilnice, kopalnice). Čas stika za brisanje pri 10°C in 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 1 robček na m^2 (ustreza 10 ml/m^2) Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 3-krat na dan
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak

Velikosti in material embalaže	Vedro PP, zaščiteno pred svetlobo, z 10–5000 impregniranimi netkanimi robčki iz 100 % polipropilena (velikost robčka: 200 x 250 mm). Vreča PP, zaščitena pred svetlobo, z 10–5000 impregniranimi netkanimi robčki iz 100 % polipropilena (velikost robčka: 200 x 250 mm).

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 12.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 12.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 12.

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 12.

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 12.

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Dezinfekcija prehrambenih kontaktnih površin v prehrambeni industriji in industriji pijač z brisanjem z impregniranimi robčki RTU

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bacteria Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Brisanje z impregniranimi robčki RTU Podroben opis: Dezinfekcija majhnih površin v živilsko-predelovalnih obratih. Čas stika za brisanje pri 10°C in 20°C v umazanih pogojih: — 5 min za bakterije in kvasovke.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek za nanos: 1 robček na m^2 (ustreza 10 ml/m^2) Redčenje (%): proizvod RTU Število in časovni razpored uporabe: Pogostost nanosa: do 4-krat na dan

Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Vedro PP, zaščiteno pred svetlobo, z 10–5000 impregniranimi netkanimi robčki iz 100 % polipropilena (velikost robčka: 200 x 250 mm). Vreča PP, zaščitena pred svetlobo, z 10–5000 impregniranimi netkanimi robčki iz 100 % polipropilena (velikost robčka: 200 x 250 mm).

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 12.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Hrane, krme ali pijač ne dajajte na obdelano površino, dokler se ne posuši. Ne uporabljajte neposredno ali blizu hrane, krme ali pijače.

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 12.

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 12.

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 12.

Poglavje 5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 12**

5.1. **Navodila za uporabo**

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila. Proizvod je treba nanesti na suho površino. Površino popolnoma namočiti z uporabo proizvoda. Po uporabi proizvoda pustiti, da se površina posuši na zraku. Po uporabi ne spirajte. Ko ni v uporabi, naj bo posoda zaprta. Ne uporabljati krp za brisanje, ki so bile dehidrirane. Zavreči posodo, ko je prazna. Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na oksidacijska sredstva, kot na primer marmor, baker ali medenina. Uporabljene robčke je treba odložiti v zaprto posodo.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Izogibajte se prenosu z rok na oči.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

UKREPI ZA PRVO POMOČ

V primeru stika z očmi: Takoj spirati z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

V primeru stika s kožo: Sprati z obilo vode.

Pri zaužitju: Izprati usta. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Pri vdihavanju: Prenesti osebo na svež zrak. Simptomatsko zdravljenje. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

OKOLJSKI UKREPI V SILI

Ne dopustiti stika z zemljo, površinsko vodo ali podzemnico.

Upoštevajte možnost kontaminacije okoli posod za skladiščenje

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Proizvod: Če je mogoče, je recikliranje boljše od odlaganja ali zažiganja. Če recikliranje ni mogoče, odložiti v skladu z nacionalnimi predpisi. Odstranite odpadke na odobrenem mestu za zbiranje odpadkov.

Kontaminirana embalaža: Posodo odložite skladno z nacionalnimi predpisi.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti v primernih, označenih posodah. Hraniti pred vročino in viri vžiga. Hraniti v hladnem, dobro zračenem prostoru. Hraniti pred oksidacijskimi sredstvi.

Temperatura skladiščenja: 0-30 °C.

Rok uporabe: 12 mesecev

Poglavje 6. **DRUGE INFORMACIJE**

Proizvod vsebuje vodikov peroksid (št. CAS: 7722-84-1), za katerega je bila za oceno tveganja tega proizvoda dogovorjena in uporabljena evropska referenčna vrednost 1.25 mg/m³ za poklicnega uporabnika.

Poglavje 7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 12**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	OxyDes Maxi Wipes		Področje trženja: EU		
Številka dovoljenja	EU-0024303-0016 1-12				
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	2 % (m/m)
N-propanol	Propan-1-ol	Neaktivna snov	71-23-8	200-746-9	17,5 % (m/m)