Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►**B**

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1206/2005,

27. juuli 2005,

teatavate söödalisandite alalise lubamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 197, 28.7.2005, lk 12)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►**M1**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 403/2013, 2. mai 2013	L 121	26	3.5.2013
►**M2**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 290/2014, 21. märts 2014	L 87	84	22.3.2014

▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1206/2005,

27. juuli 2005,

teatavate söödalisandite alalise lubamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiivi 70/524/EMÜ söödalisandite kohta, ([1]) eriti selle artiklit 3 ja artikli 9d lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ([2]) eriti selle artiklit 25,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud söödalisandite kasutamise lubamine loomasöötades.

(2) Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 25 on ette nähtud üleminekumeetmed söödalisandite loataotluste jaoks, mis on esitatud vastavalt direktiivile 70/524/EMÜ enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva.

(3) Käesoleva määruse lisades loetletud söödalisandite loataotlused on esitatud enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva.

(4) Vastavalt direktiivi 70/524/EMÜ artikli 4 lõikele 4 esitati esialgsed märkused kõnealuste taotluste kohta komisjonile enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva. Neid taotlusi käsitletakse seega jätkuvalt vastavalt direktiivi 70/524/EMÜ artiklile 4.

(5) Komisjoni määrusega (EÜ) nr 937/2001 ([3]) lubati esmakordselt ajutiselt kasutada *Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 742 52) toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi, endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja endo-1,4-beeta-ksülanaasi ensüümpreparaati broilerkalkunite puhul. Kõnealuse ensüümpreparaadi kasutamise tähtajatu loa andmise toetuseks on esitatud uusi andmeid. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sellise loa väljastamiseks sätestatud tingimused on täidetud. Sellest tulenevalt tuleks anda tähtajatu luba kõnealuse ensüümpreparaadi kasutamiseks lisas täpsustatud korras.

([1]) EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1800/2004 (ELT L 317, 16.10.2004, lk 37).
([2]) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).
([3]) EÜT L 130, 12.5.2001, lk 25.

▼B

(6) Komisjoni määrusega (EÜ) nr 418/2001 ([1]) lubati esmakordselt ajutiselt kasutada *Penicillium funiculosum*'ist (IMI SD101) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja endo-1,4-beeta-ksülanaasi ensüümpreparaati nuumsigade puhul. Kõnealuse ensüümpreparaadi kasutamise tähtajatu loa andmise toetuseks on esitatud uusi andmeid. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sellise loa väljastamiseks sätestatud tingimused on täidetud. Sellest tulenevalt tuleks anda tähtajatu luba kõnealuse ensüümpreparaadi kasutamiseks lisas täpsustatud korras.

(7) Määrusega (EÜ) nr 937/2001 lubati esmakordselt ajutiselt kasutada *Bacillus subtilis*'est (LMG S-15136) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ensüümpreparaati põrsaste puhul. Kõnealuse ensüümpreparaadi kasutamise tähtajatu loa andmise toetuseks on esitatud uusi andmeid. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sellise loa väljastamiseks sätestatud tingimused on täidetud. Sellest tulenevalt tuleks anda tähtajatu luba kõnealuse ensüümpreparaadi kasutamiseks lisas täpsustatud korras.

(8) Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1636/1999 ([2]) lubati esmakordselt ajutiselt kasutada *Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2106) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, *Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2105) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja *Bacillus subtilis*'est (ATCC 2107) toodetud subtilisiini ensüümpreparaati broilerkanade puhul. Kõnealuse ensüümpreparaadi kasutamise tähtajatu loa andmise toetuseks on esitatud uusi andmeid. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sellise loa väljastamiseks sätestatud tingimused on täidetud. Sellest tulenevalt tuleks anda tähtajatu luba kõnealuse ensüümpreparaadi kasutamiseks lisas täpsustatud korras.

(9) Kõnealuste taotluste hindamine on näidanud, et töötajate kaitsmiseks lisades loetletud söödalisanditega kokkupuutumise eest on vaja teatavaid menetlusi. Selline kaitse tuleks tagada nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ (töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta) ([3]) kohaldamisega.

(10) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

([1]) EÜT L 62, 2.3.2001, lk 3.
([2]) EÜT L 194, 27.7.1999, lk 17.
([3]) EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

▼B

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas täpsustatud ensüümide rühma kuuluvaid preparaate on tähtajatult lubatud kasutada loomasöötades söödalisanditena määruse lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼B

LISA

EÜ nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimu-m-sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsuse ühikuid täis-sööda kg kohta			
Ensüümid								
▼M1 ———								
▼B E 1604	►M2 ——— ◄	*Penicillium funiculosum*'ist (IMI SD101) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja endo-1,4-beeta-ksülanaasi preparaat minimaalse aktiivsusega: pulbrina: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 2 000 U ([4])/g endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 400 U ([5])/g vedelal kujul: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 500 U/ml endo-1,4-beeta-ksülanaas: 350 U/ml	Nuumsead	—	endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 70 U	— —	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 70 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % otra või 20 % nisu	Tähtajatu
E 1606	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Bacillus subtilis*'est (LMG S-15136) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi preparaat minimaalse aktiivsusega: tahkel ja vedelal kujul: 100 IU ([6])/g või ml	Põrsad (võõrutatud)	—	10 IU	—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	Tähtajatu

▼B

EÜ nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimu-m-sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsuse ühikuid täis-sööda kg kohta			
							2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 10 IU 3. Kasutamiseks arabiinoksülaaniderikkas segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab vähemalt 40 % nisu või otra 4. Kuni umbes 35 kg kaaluvate võõrutatud põrsaste puhul	
E 1633	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Subtilisiin EC 3.4.21.62	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2106) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, *Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2105) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja *Bacillus subtilis*'est (ATCC 2107) toodetud preparaat minimaalse aktiivsusega: tahkel kujul: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U ([7])/g endo-1,4-beeta-ksülanaas: 300 U ([8])/g subtilisiin: 800 U ([9])/g	Broilerkanad	—	endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 30 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 90 U subtilisiin: 240 U	— — —	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 30–100 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 90–300 U subtilisiin: 240–800 U 3. Kasutamiseks segajõusöödas, näiteks sellises, mis sisaldab üle 60 % otra	Tähtajatu

►M1 ——— ◄

([4]) Üks U on ensüümi hulk, mis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 50 °C juures vabastab odra beeta-glükaanist 5,55 mikromooli redutseerivaid suhkruid (maltoosi ekvivalente) minutis.
([5]) Üks U on ensüümi hulk, mis pH taseme 5,5 ja temperatuuri 50 °C juures vabastab kasepuidu ksülaanist 4,00 mikromooli redutseerivaid suhkruid (maltoosi ekvivalente) minutis.
([6]) Üks IU on ensüümi hulk, mis pH taseme 4,5 ja temperatuuri 30 °C juures vabastab kasepuidu ksülaanist ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalente) minutis.
([7]) Üks U on ensüümi hulk, mis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 30 °C juures vabastab odra beeta-glükaanist ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalente) minutis.
([8]) Üks U on ensüümi hulk, mis pH taseme 5,3 ja temperatuuri 50 °C juures vabastab kaera/speltnisu ksülaanist ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalente) minutis.
([9]) Üks U on ensüümi hulk, mis pH taseme 7,5 ja temperatuuri 40 °C juures vabastab kaseiini substraadist ühe mikrogrammi fenoolühendeid (türosiini ekvivalente) minutis.