Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►**B**

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/2261,

15. detsember 2016,

milles käsitletakse loa andmist vask(I)oksiidi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 342, 16.12.2016, lk 18)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►**M1**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1039, 23. juuli 2018	L 186	3	24.7.2018

▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/2261,

15. detsember 2016,

milles käsitletakse loa andmist vask(I)oksiidi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1

Lisas nimetatud ained, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“ ja funktsionaalrühma „mikroelementide ühendid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Vasesisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: toitainelised lisandid. Funktsionaalrühm: mikroelementide ühendid									
3b412	—	Vask(I)oksiid	*Söödalisandi kirjeldus* Järgmise koostisega vask(I)oksiidi valmistis: — vasesisaldus vähemalt 73 %, — naatriumlignosulfonaatide sisaldus 12–17 %, — bentoniidisisaldus 1 % Graanulitena; osakesi suurusega < 50 μm: alla 10 % *Toimeaine kirjeldus* Vask(I)oksiid Keemiline valem: Cu_2O CASi number: 1317-39-1 *Analüüsimeetodid* ([1]) Cu_2O sisalduse määramine söödalisandis: — röntgendifraktsioonanalüüs (XRD)	Kõik loomaliigid	—	—	►**M1** Veised: — veised enne mäletsema hakkamist: 15 (kokku); — muud veised: 30 (kokku). Lambad: 15 (kokku). Kitsed: 35 (kokku). Põrsad: — piimapõrsad ja võõrutatud põrsad kuni nelja nädala jooksul pärast võõrutamist: 150 (kokku); — põrsad viis kuni kaheksa nädalat pärast võõrutamist: 100 (kokku). Koorikloomad: 50 (kokku). Muud loomad: 25 (kokku) ◄	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.	5. jaanuar 2027

▼B

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Vasesisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
			Vase üldsisalduse määramine söödalisandis: — tiitrimine või — induktiivsidestunud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES) – EN 15510 Vase üldsisalduse määramine eelsegus: — induktiivsidestunud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES) – EN 15510, või — induktiivsidestunud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES) pärast rõhu all lagundamist – EN 15621 Vase üldsisalduse määramine söödamaterjalis ja segasöödas: — aatomiabsorptsioonspektromeetria (AAS) – komisjoni määrus (EÜ) nr 152/2009 – või				3. Etiketil esitatakse järgmine teave: — lammaste sööda puhul, mille vasesisaldus on suurem kui 10 mg/kg: „Vasesisaldus selles söödas on selline, et see võib teatavatel lambatõugudel põhjustada mürgistust.“; — mäletsema hakanud veistele ette nähtud sööda puhul, mille vasesisaldus on väiksem kui 20 mg/kg: „Vasesisaldus selles söödas on selline, et see võib põhjustada vasepuudust veistel, kes söövad karjamaadel, kus leidub palju molübdeeni või väävlit.“	

▼B

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Vasesisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
			— induktiivsidestunud plasma aatomiemissioonspektrometria (ICP-AES) – EN 15510, või — induktiivsidestunud plasma aatomiemissioonspektrometria (ICP-AES) pärast rõhu all lagundamist – EN 15621						

([1]) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.