# RÈGLEMENT (CEE) N° 1505/85 DU CONSEIL

## du 23 mai 1985

## fixant, pour la récolte 1985, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, ainsi que les qualités de référence

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu le règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1461/82 (2), et notamment son article 2 paragraphe 5, son article 4 paragraphe 4 et son article 6 paragraphe 8,

vu la proposition de la Commission (3),

vu l'avis de l'Assemblée (4),

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que, lors de la fixation des prix dans le secteur du tabac brut, il y a lieu de tenir compte tant des objectifs de la politique agricole commune que de la contribution que la Communauté entend apporter au développement harmonieux du commerce mondial; que la politique agricole commune a notamment pour objectifs d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs;

considérant que les prix d'objectif et les prix d'intervention du tabac en feuilles doivent être fixés selon les critères visés à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 727/70 en vue d'encourager l'orientation de la production, notamment dans le sens de la conversion des cultures vers les variétés les plus demandées et les plus compétitives;

considérant qu'il est indiqué de fixer, pour la récolte 1985 également, des prix d'intervention dérivés pour les variétés qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés ou, pour les variétés cultivées en Grèce, avant l'adhésion, d'une garantie de prix au stade du tabac emballé, ainsi que pour les variétés principalement cultivées en république fédérale d'Allemagne, afin de tenir compte des usages de commercialisation existant dans ce pays;

considérant que la prime accordée aux acheteurs du tabac communautaire est destinée à leur permettre de payer aux producteurs de tabac en feuilles un prix qui se situe au niveau du prix d'objectif en tenant compte de l'évolution des prix sur le marché mondial, ainsi que du niveau des prix résultant du jeu de l'offre et de la demande sur le marché communautaire;

considérant que les prix susvisés ainsi que le montant de la prime doivent être fixés pour chaque variété par rapport à une qualité de référence définie de manière à permettre une appréciation aussi objective que possible de la qualité du tabac; qu'il convient, pour la récolte 1985, de reprendre les définitions des qualités de référence qui ont été introduites par le règlement (CEE) n° 1029/84 du Conseil, du 31 mars 1984, fixant, pour la récolte 1984, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, ainsi que les qualités de référence (5);

considérant que l'acte d'adhésion de 1979 prévoit, à son article 87 paragraphe 3, que les prix d'objectif à appliquer en Grèce sont fixés conformément aux critères prévus à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) n° 727/70 et augmentés en quatre étapes de l'incidence de la diminution des aides nationales que la République hellénique est autorisée à maintenir de manière dégressive pour le tabac en application de l'article 69 dudit acte; que la quatrième augmentation doit intervenir pour la cinquième récolte suivant l'adhésion,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

*Article premier*

Pour la récolte 1985, les qualités de référence pour chacune des variétés de tabac en feuilles de la production communautaire, visées à l'article 2 paragraphe 3 point c) du règlement (CEE) n° 727/70, sont fixées à l'annexe I.

*Article 2*

Pour la récolte 1985, les qualités de référence, visées à l'article 6 paragraphe 3 point c) du règlement (CEE) n° 727/70, pour chacune des variétés de tabac emballé de la production communautaire pour lesquelles est fixé un prix d'intervention dérivé, sont fixées à l'annexe II.

*Article 3*

Pour la récolte 1985, les prix d'objectif et d'intervention et les montants de la prime accordée aux acheteurs de tabac en feuilles, visés aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 727/70, ainsi que les prix d'intervention dérivés du tabac amballé visés à l'article 6 dudit règlement, sont fixés à l'annexe III.

(1) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 1.
(2) JO n° L 164 du 14. 6. 1982, p. 27.
(3) JO n° C 67 du 14. 3. 1985, p. 42.
(4) JO n° C 94 du 15. 4. 1985.
(5) JO n° L 107 du 19. 4. 1984, p. 19.

*Article 4*

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel des Communautés européennes*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 1985.

*Par le Conseil*

*Le président*

C. SIGNORILE

*ANNEXE I*

**Tabac en feuilles: variétés et leurs qualités de référence pour la récolte 1985**

| Numéro d'ordre | Variété | Qualité de référence |
|---|---|---|
| 1 | Badischer Geudertheimer | Hauptgut (Leaves) de classe 1<br>Classe 1: feuilles mûres, saines, intactes, de couleur marron foncé à bigarré, de longueur uniforme<br>Présentation: tabac trié, en manoques ou en balles provisoires, avec un lien étranger<br>Humidité: 26 % |
| 2 | Badischer Burley E | Hauptgut (Leaves) de classe 1<br>Classe 1: feuilles mûres, saines, intactes, nourries, de couleur marron rougeâtre à marron clair, de longueur uniforme<br>Présentation: tabac trié, en manoques ou en balles provisoires, avec un lien étranger<br>Humidité: 25 % |
| 3 | Virgin D | Feuilles de classe 1<br>Classe 1: feuilles mûres, saines, intactes, de couleur jaune à rouge jaune; des écarts tels que des colorations brunâtres à jaune verdâtre sont admis jusqu'à concurrence du tiers de la surface de la feuille<br>Présentation: tabac trié, en manoques ou en balles provisoires, avec un lien étranger<br>Humidité: 19 % |
| 4 | a) Paraguay et ses hybrides<br>b) Dragon vert et ses hybrides, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre | Feuilles médianes (Leaves) de classe 2<br>Classe 2: feuilles saines présentant de légers défauts de coloration, de nature de tissu, de maturité, mais de combustibilité satisfaisante<br>Présentation: tabac trié et manoqué ou capsé<br>Humidité: 27 % |
| 5 | Nijkerk | Feuilles de tête (Tips) de classe 2<br>Classe 2: — soit feuilles de 2e longueur (inférieure ou égale à 45 cm), au tissu très gommeux, nourri, intègre, résistant et élastique, à nervures noyées, de bonne maturité se traduisant par une coloration marron à marron foncé, de tonalité chaude<br>— soit feuilles de 1re longueur (supérieure à 45 cm), au tissu encore gommeux, nourri, encore intègre, résistant, à nervures plus ou moins accusées, de toutes colorations, à l'exclusion du vert poireau<br>Présentation: tabac trié et manoqué ou capsé<br>Humidité: 27 % |

| Numéro d'ordre | Variété | Qualité de référence |
|---|---|---|
| 6 | a) Misionero et ses hybrides<br>b) Rio Grande et ses hybrides | Feuilles de deuxième qualité<br>2e qualité: feuilles développées, de plus de 45 cm, au tissu non grossier, de coloration claire un peu jaunâtre, de tonalité chaude ou assez chaude, ayant suffisamment de tenue et assez intègre, de combustibilité passable<br>Présentation: tabac trié et manoqué ou capsé<br>Humidité: 27 % |
| 7 | Bright | Feuilles de catégorie A<br>Catégorie A: feuilles de maturité suffisante, sans défaut de séchage, de texture ouverte, aux côtes et nervures pas trop accentuées, saines, couleur jaune dans les différentes gradations<br>Présentation: en balles provisoires de 30 à 40 kg<br>Humidité: 16 % |
| 8 | Burley I | Feuilles de catégorie A<br>Catégorie A: feuilles de maturité suffisante, sans défaut de séchage, de texture ouverte, même consistantes, avec des côtes et nervures pas trop accentuées, saines, de couleur noisette plus ou moins chaude<br>Présentation: en balles provisoires de 30 à 40 kg ou en manoques avec lien étranger *(fascicoli)* de 25 à 30 feuilles<br>Humidité: 19 % |
| 9 | Maryland | Feuilles de catégorie A<br>Catégorie A: feuilles de maturité suffisante, présentant de légers défauts de séchage avec très peu de teintes bronzées, au tissu de texture moyenne avec des côtes et nervures pas trop accentuées, saines, de coloration marron rougeâtre, plutôt chaude<br>Présentation: en balles provisoires de 30 à 40 kg ou en manoques avec lien étranger *(fascicoli)* de 25 à 30 feuilles<br>Humidité: 19 % |
| 10 | a) Kentucky et ses hybrides<br>b) Moro di Cori<br>c) Salento | Feuilles de catégorie B<br>Catégorie B: feuilles mûres à point, d'un tissu consistant, sans défaut de séchage et de conservation, de couleur marron, présentant quelques défauts d'intégrité, de bonne combustibilité<br>Présentation: en manoques avec un lien étranger *(fascicoli)* de 25 à 30 feuilles<br>Humidité: 23 % |

| Numéro d'ordre | Variété | Qualité de référence |
|---|---|---|
| 11 | a) Forchheimer Havanna II c<br>b) Nostrano del Brenta<br>c) Resistente 142<br>d) Gojano | Feuilles de catégorie B<br>Catégorie B: feuilles d'un tissu consistant ou léger, saines, sans défaut de séchage, de couleur marron à verdâtre, présentant des défauts d'intégrité<br>Présentation: tabac trié, en manoques ou en balles provisoires, avec un lien étranger<br>Humidité: 26 % |
| 12 | a) Beneventano<br>b) Brasile Selvaggio et variétés similaires | Feuilles de catégorie B<br>Catégorie B: feuilles de maturité suffisante, d'un tissu consistant ou même grossier ou maigre, présentant des défauts non accentués de séchage, de fermentation et d'intégrité<br>Présentation: en manoques avec un lien étranger *(fascicoli)* de 25 à 30 feuilles<br>Humidité: 24 % |
| 13 | Xanti-Yakà | Feuilles de catégorie B<br>Catégorie B: feuilles suffisamment saines et mûres, sessiles, de forme ovale elliptique, avec des côtes peu accentuées et des nervures secondaires à angle plutôt ouvert, pouvant présenter quelques défauts de séchage, d'un tissu le plus souvent léger, de couleur allant du jaune au marron, avec des défauts marqués d'intégrité, mais bien conservées, provenant de tous les étages foliaires, de goût discret, d'arôme suffisant et de bonne combustibilité<br>La longueur des feuilles médianes ne dépasse pas 20 cm<br>Présentation: en balles provisoires de 15 à 20 kg ou en caisses de guirlandes de feuilles de 30 à 40 kg<br>Humidité: 17 % |
| 14 | a) Perustitza<br>b) Samsun | Feuilles de catégorie B<br>Catégorie B: feuilles suffisamment saines et mûres, sessiles (Perustitza) ou pétiolées (Samsun), de forme elliptique lancéolée à pointe effilée (Perustitza) ou elliptique arrondie (Samsun), avec des côtes peu accentuées et des nervures secondaires à angle tendant vers l'aigu, pouvant présenter quelques défauts de séchage, d'un tissu le plus souvent léger, de couleur allant du jaune au marron (Perustitza) ou tendant au roussâtre (Samsun) avec des défauts marqués d'intégrité, mais bien conservées, provenant de tous les étages foliaires, de goût discret, d'arôme suffisant et de bonne combustibilité<br>La longueur des feuilles médianes ne dépasse pas 25 cm<br>Présentation: en balles provisoires de 15 à 20 kg ou en caisses de guirlandes de feuilles de 30 à 40 kg<br>Humidité: 17 % |

| Numéro d'ordre | Variété | Qualité de référence |
|---|---|---|
| 15 | Erzegovina et variétés similaires | Feuilles de catégorie B<br>Catégorie B: feuilles suffisamment saines et mûres, sessiles, de forme ovale ou elliptique, avec des côtes moyennement accentuées et des nervures secondaires à angle plutôt ouvert, pouvant présenter quelques défauts de séchage, d'un tissu le plus souvent léger, de couleur allant du jaune au marron, avec des défauts marqués d'intégrité, mais bien conservées, provenant de tous les étages foliaires, de goût discret, d'arôme suffisant et de bonne combustibilité<br>La longueur des feuilles médianes ne dépasse pas 35 cm<br>Présentation: en balles provisoires de 15 à 20 kg ou en caisses de guirlandes de feuilles de 30 à 40 kg<br>Humidité: 17 % |
| 16 | a) Round Tip<br>b) Scafati<br>c) Sumatra I | Feuilles de catégorie B<br>Catégorie B: feuilles médianes inférieures, triées par longueur suivant les proportions suivantes:<br>1re longueur (égale ou supérieure à 38 cm) 60 %<br>2e longueur (de 32 à moins de 38 cm) 35 %<br>3e longueur (de 25 à moins de 32 cm) 5 %<br>Feuilles de dimension convenable, mûres à point et de couleur uniforme, saines, sans défaut d'intégrité, d'un tissu fin, élastique et résistant, avec des côtes et nervures noyées, fermentées à point et bien conservées, de bonne combustibilité, de goût et d'arôme typiques, utilisables pour capage de cigares, comprenant environ 25 % de feuilles non intègres<br>Présentation: en manoques avec un lien étranger *(fascicoli)*<br>Humidité: 22 % |
| 17 | Basmas | Feuilles de la qualité I/III<br>Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, sans défaut de séchage, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 15 cm de longueur, de couleur jaune or, orangée à rouge-jaune, d'une bonne élasticité et brillantes, assez nourries; structure lâche et de bonne texture; d'arôme typique et prononcé, de bonne combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 45 % de la qualité I/III<br>Feuilles mûres, présentant quelques légers défauts d'intégrité et/ou de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 20 cm de longueur, de couleur jaune clair, vert-jaune, rougeâtre ou marron clair, de structure assez lâche et de bonne texture, d'une élasticité moyenne, modérément brillantes, modérément nourries, d'arôme typique et prononcé, de très bonne combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 55 % de la qualité I/III<br>Présentation: en balles-planteurs de 15 à 25 kg, présentées selon le mode traditionnel en deux rangées de pastèles (à feuilles capsées). (Il convient de noter que dans les districts d'Astakos et de Chrysoupolis la présentation est faite en armathodema)<br>Humidité: 17 % |

| Numéro d'ordre | Variété | Qualité de référence |
|---|---|---|
| 18 | Katerini et variétés similaires | Feuilles de la qualité I/III<br>**Qualité I/III:** feuilles mûres, intègres, saines, sans défaut de séchage, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 20 cm de longueur, de couleur jaune clair ou orangée à rougeâtre, de structure lâche, d'une bonne élasticité, brillantes, assez nourries, de bonne texture et de très bonne combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 45 % de la qualité I/III<br>Feuilles mûres, présentant quelques légers défauts d'intégrité et/ou de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 25 cm de longueur, de couleur jaune, orangée, vert-jaune, rougeâtre ou marron clair, de structure lâche, modérément nourries, d'élasticité moyenne et brillantes, de bonne texture et d'une très bonne combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 55 % de la qualité I/III<br>**Présentation:** les guirlandes sont généralement rassemblées selon le mode de présentation «Baski» avant l'emballage. Présentation en balles de 25 à 35 kg selon le mode traditionnel appelé «Kaloup»<br>**Humidité:** 16 % |
| 19 | a) Kaba Koulak classic<br>b) Elassona | Feuilles de la qualité I/III<br>**Qualité I/III:** feuilles mûres, intègres, saines, sans défaut de séchage provenant de tous les étages foliaires à l'exception des feuilles de tête, ayant jusqu'à 25 cm de longueur pour Macedonia Kaba Koulak et jusqu'à 20 cm de longueur pour Elassona, Karatzova et Kontoula, de couleur jaune moyen à foncé, d'une bonne élasticité et brillantes, de structure lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 47 % de la qualité I/III<br>Feuilles mûres, présentant quelques légers défauts d'intégrité et/ou de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 30 cm de longueur pour Macedonia Kaba Koulak et 25 cm de longueur pour Elassona, Karatzova et Kontoula, de couleur jaune, vert-jaune, rougeâtre, de structure assez lâche et d'assez bonne texture, d'une élasticité moyenne et modérément brillantes, d'une excellente combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 53 % de la qualité I/III<br>**Présentation:** en balles-planteurs de 15 à 30 kg, présentées selon le mode traditionnel en deux rangées d'armathodema<br>**Humidité:** 17 % |
| 20 | a) Kaba Koulak non classic<br>b) Myrodata Smyrne, Trapezous et Phi 1 | Feuilles de la qualité I/III<br>**Qualité I/III:** feuilles mûres, intègres, saines, sans défaut de séchage, provenant de tous les étages foliaires à l'exception des feuilles de tête, ayant jusqu'à 30 cm de longueur pour Macedonia Kaba Koulak et Trapezous, jusqu'à 20 cm pour Phi 1, et jusqu'à 15 cm pour Myrodata Smyrne, de couleur jaune clair à rougeâtre, d'une bonne élasticité et brillantes, de structure assez lâche, de bonne texture et excellente combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 47 % de la qualité I/III |

| Numéro d'ordre | Variété | Qualité de référence |
|---|---|---|
| 20 *(suite)* | a) Kaba Koulak non classic<br>b) Myrodata, Smyrne Trapezous et Phi I | Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant quelques légers défauts de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 35 cm de longueur pour Macedonia Kaba Koulak et Trapezous, jusqu'à 25 cm pour Phi I et jusqu'à 20 cm pour Myrodata Smyrne, de couleur jaune, vert-jaune ou marron clair, de texture, assez lâche, d'assez bonne texture, assez élastiques et brillantes, de très bonne combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 53 % de la qualité I/III<br>Présentation: en balles-planteurs de 25 à 35 kg, présentées selon le mode traditionnel en armathodema, ou de 35 à 50 kg sous la forme de Kaloup<br>Humidité: 17 % |
| 21 | Myrodata Agrinion | Feuilles de la qualité I/III<br>Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, sans défaut de séchage, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 25 cm de longueur, de couleur jaune à orange foncé, d'une bonne élasticité et brillantes, de texture lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 47 % de la qualité I/III<br>Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant de légers défauts de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 30 cm de longueur, de couleur jaune, vert-jaune ou rougeâtre clair, de structure assez lâche et d'assez bonne texture, assez élastiques et brillantes, d'excellente combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 53 % de la qualité I/III<br>Présentation: en balles-planteurs de 15 à 30 kg présentées selon le mode traditionnel en deux rangées d'armathodema<br>Humidité: 15 % |
| 22 | Zichnomyrodata | Feuilles de la qualité I/III<br>Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, sans défaut de séchage, provenant de tous les étages foliaires à l'exception des feuilles de tête, ayant jusqu'à 20 cm de longueur, de couleur jaune clair à orange clair, d'une bonne élasticité et brillantes, de structure lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 47 % de la qualité I/III<br>Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant quelques légers défauts de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 25 cm de longueur, de couleur jaune, vert-jaune ou rougeâtre clair, de structure assez lâche et d'assez bonne texture, assez élastiques et assez brillantes, d'excellente combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 53 % de la qualité I/III<br>Présentation: en balles-planteurs de 15 à 30 kg présentées selon le mode traditionnel en deux rangées d'armathodema<br>Humidité: 17 % |
| 23 | Tsebelia | Feuilles de la qualité I/III<br>Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, sans défaut de séchage, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier, ayant jusqu'à 35 cm de longueur, de couleur rouge-jaune orange à rougeâtre, de structure lâche, de bonne élasticité et brillantes, assez nourries, de bonne texture et de très bonne combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 45 % de la qualité I/III |

| Numéro d'ordre | Variété | Qualité de référence |
|---|---|---|
| 23 *(suite)* | Tsebelia | **Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant quelques légers défauts de séchage, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 40 cm de longueur, de couleur jaune** clair, vert-jaune, rougeâtre ou marron clair, de structure assez lâche, assez élastiques et d'un brillant moyen, assez nourries, d'assez bonne texture et de très bonne combustibilité. Cette catégorie inclut également les feuilles légèrement atteintes et/ou présentant de légers défauts d'intégrité<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 55 % de la qualité I/III<br>**Présentation:** **en balles-planteurs de 30 à 40 kg, présentées en deux rangées d'armathodema**<br>Humidité: 14 % |
| 24 | Mavra | Feuilles de la qualité I/III<br>Qualité I/III: **feuilles mûres, intègres, saines, sans défaut de séchage, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana) ayant jusqu'à 30 cm de longueur, d'une couleur allant du rougeâtre jaune à l'orange et au rougeâtre, de structure lâche, de bonne texture, de bonne élasticité et brillantes, assez nourries et de bonne combustibilité**<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 45 % de la qualité I/III<br>Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant de légers défauts de séchage, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 40 cm de longueur, de couleur jaunâtre, vert-jaune (citron), rougeâtre ou marron clair, de structure assez lâche et d'assez bonne texture, assez élastiques et brillantes, assez nourries et de bonne combustibilité. Cette catégorie inclut également les feuilles légèrement atteintes et/ou présentant de légers défauts d'intégrité<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 55 % de la qualité I/III<br>Présentation: en balles-planteurs de 30 à 50 kg présentées en deux rangées d'armathodema<br>Humidité: 14 % |
| 25 | Burley GR | Feuilles de la qualité A<br>Qualité A: feuilles complètement mûres, complètement développées, intègres, saines, sans défaut de séchage, provenant de l'étage médian, de couleur uniforme marron noisette moyen à rouge noisette, de structure lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité<br>Présentation: en balles-planteurs de 40 kg présentées en deux rangées d'armathodema, sans ficelle (feuilles en vrac)<br>Humidité: 22 % |
| 26 | Virginia GR | Feuilles de la qualité A<br>Qualité A: feuilles complètement mûres, complètement développées, saines, intègres, sans défaut de séchage, de couleur uniforme jaune citron à orange moyen, nourries, de bonne texture et de bonne combustibilité, provenant essentiellement de l'étage médian<br>Présentation: en balles-planteurs de 30 à 40 kg, présentées en deux rangées d'armathodema, sans ficelle (feuilles en vrac)<br>Humidité: 19 % |

*ANNEXE II*

**Tabac emballé: variétés et leurs qualités de référence pour la récolte 1985**

| Numéro d'ordre | Variété | Qualité de référence |
|---|---|---|
| 1 | Badischer Geudertheimer | Hauptgut (Leaves) de la classe 1<br>Classe 1: feuilles mûres, saines, intactes, de couleur légèrement bigarrée à marron foncé, de longueur uniforme, normalement fermentées<br>Présentation: en balles, en caisses ou en cartons de 75 à 200 kg environ ou en boucauts de 225 à 450 kg environ<br>Humidité: 16 % |
| 2 | Badischer Burley E | Hauptgut (Leaves) de la classe 1<br>Classe 1: feuilles mûres, saines, intactes, nourries, de couleur marron clair, marron rougeâtre à marron foncé, de longueur uniforme; normalement fermentées<br>Présentation: en balles ou en caisses de 75 à 175 kg environ ou en boucauts de 225 à 450 kg environ<br>Humidité: 15 % |
| 3 | Virgin D | Feuilles de la classe 1<br>Classe 1: feuilles mûres, saines, intactes, de couleur jaune, rouge-jaune à jaune brunâtre, normalement fermentées<br>Présentation: en balles ou en caisses de 75 à 175 kg environ ou en boucauts de 225 à 450 kg environ<br>Humidité: 13 % |
| 7 | Bright | Feuilles de catégorie A<br>Catégorie A: feuilles de maturité suffisante, bien soignées, de texture ouverte, aux côtes et nervures pas trop accentuées, saines, de couleur jaune dans les différentes gradations<br>Présentation: en boucauts de 280 à 450 kg environ ou en cartons de 150 à 210 kg environ<br>Humidité: 13 % |
| 8 | Burley I | Feuilles de catégorie A<br>Catégorie A: feuilles de maturité suffisante, bien soignées, de texture ouverte, même consistantes, avec des côtes et nervures pas trop accentuées, saines, de couleur noisette plus ou moins chaude<br>Présentation: en boucauts de 280 à 450 kg environ ou en cartons de 150 à 210 kg environ<br>Humidité: 13 % |

| Numéro d'ordre | Variété | Qualité de référence |
|---|---|---|
| 9 | Maryland | Feuilles de catégorie A<br>Catégorie A: feuilles de maturité suffisante, présentant de légers défauts de séchage, même avec très peu de teintes bronzées, au tissu de texture moyenne avec des côtes et nervures pas trop accentuées, saines, de coloration marron rougeâtre plus ou moins chaude<br>Présentation: en boucauts de 280 à 450 kg environ ou en cartons de 150 à 210 kg environ<br>Humidité: 13 % |
| 10 | a) Kentucky et ses hybrides<br>b) Moro di Cori<br>c) Salento | Feuilles de catégorie B<br>Catégorie B: feuilles mûres à point, d'un tissu consistant, sans défaut de séchage et de conservation, de couleur marron, présentant quelques défauts d'intégrité, de bonne combustibilité<br>Présentation: en boucauts de 280 à 450 kg environ ou en balles de 170 à 200 kg environ<br>Humidité: 16 % |
| 11 | a) Forchheimer Havanna II c<br>b) Nostrano del Brenta<br>c) Resistente 142<br>d) Gojano | Feuilles de catégorie B<br>Catégorie B: feuilles d'un tissu consistant ou léger, saines, sans défaut de séchage, de couleur marron à verdâtre, présentant des défauts d'intégrité<br>Présentation: en balles, en caisses ou en cartons de 75 à 200 kg environ ou en boucauts de 225 à 450 kg environ<br>Humidité: 16 % |
| 12 | a) Beneventano<br>b) Brasile Selvaggio et variétés similaires | Feuilles de catégorie B<br>Catégorie B: feuilles de maturité suffisante, d'un tissu consistant ou même grossier ou maigre, présentant des défauts de soin, de fermentation et d'intégrité pas trop accentués<br>Présentation: en balles de 120 kg environ ou en boucauts de 330 kg environ<br>Humidité: 16 % |
| 13 | Xanti-Yakà | Feuilles de catégorie B<br>Catégorie B: feuilles suffisamment saines et mûres, sessiles, de forme ovale elliptique, avec des côtes peu accentuées et des nervures secondaires à angle plutôt ouvert, pouvant présenter quelques défauts de séchage, d'un tissu le plus souvent léger, de couleur allant du jaune au marron, avec des défauts marqués d'intégrité, mais bien conservées, provenant de tous les étages foliaires, de goût discret, d'arôme suffisant et de bonne combustibilité<br>La longueur des feuilles médianes ne dépasse par 20 cm<br>Présentation: petites balles de 18 à 50 kg environ<br>Humidité: 13 % |

| Numéro d'ordre | Variété | Qualité de référence |
|---|---|---|
| 14 | a) Perustiza<br>b) Samsun | Feuilles de catégorie B<br>Catégorie B: feuilles suffisamment saines et mûres, sessiles (Perustitza, ou pétiolées (Samsun), de forme elliptique lancéolée à pointe effilée (Perustitza) ou elliptique arrondie (Samsun), avec des côtes peu accentuées et des nervures secondaires à angle tendant vers l'aigu, pouvant présenter quelques défauts de séchage, d'un tissu le plus souvent léger, de couleur allant du jaune, avec des défauts marqués d'intégrité, mais bien conservées, provenant de tous les étages foliaires, de goût discret, d'arôme suffisant et de bonne combustibilité<br>La longueur des feuilles médianes ne dépasse pas 25 cm<br>Présentation: petites balles de 18 à 50 kg environ<br>Humidité: 13 % |
| 15 | Erzegovina et variétés similaires | Feuilles de catégorie B<br>Catégorie B: feuilles suffisamment saines et mûres, sessiles, de forme ovale ou elliptique, avec des côtes moyennement accentuées et des nervures secondaires à angle plutôt ouvert, pouvant présenter quelques défauts de séchage, d'un tissu le plus souvent léger, de couleur allant du jaune au marron, avec des défauts marqués d'intégrité, mais bien conservées, provenant de tous les étages foliaires, de gout discret, d'arôme suffisant et de bonne combustibilité<br>La longueur des feuilles médianes ne dépasse pas 35 cm<br>Présentation: petites balles de 18 à 50 kg environ<br>Humidité: 13 % |
| 16 | a) Round Tip<br>b) Scafati<br>c) Sumatra I | Feuilles de catégorie B<br>Catégorie B: feuilles médianes inférieures triées par longueur selon les proportions suivantes:<br>1re longueur (égale ou supérieure à 38 cm) 60 %<br>2e longueur (de 32 à moins de 38 cm) 35 %<br>3e longueur (de 25 à moins de 32 cm) 5 %<br>Feuilles de dimension convenable, mûres à point et de couleur uniforme, saines, sans défauts d'intégrité, d'un tissu fin, élastique et résistant, avec des côtes et nervures noyées, fermentées à point et bien conservées, de bonne combustibilité, de goût et d'arôme typiques, utilisables pour capage de cigares, comprenant environ 25 % de feuilles non intègres<br>Présentation: en balles de 70 à 90 kg environ ou en cartons de 180 à 210 kg environ<br>Humidité: 16 % |

| Numéro d'ordre | Variété | Qualité de référence |
|---|---|---|
| 17 | Basmas | Feuilles de la qualité I/III<br>Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, bien séchées, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 15 cm de longueur, de couleur jaune or, orangée à rouge jaune, d'une bonne élasticité et brillantes, assez nourries, de structure lâche et de bonne texture, d'arôme typique et prononcé, de bonne combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant (I/II) constituent 45 % de la qualité I/III<br>Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant quelques légers défauts de séchage, quelques traces de maladie, ayant jusqu'à 20 cm de longueur, de couleur jaune clair, rougeâtre ou marron clair, de structure assez lâche et de bonne texture, d'une élasticité et d'un brillant moyens, modérément nourries, d'arôme typique et prononcé, de très bonne combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant (III) constituent 55 % de la qualité I/III<br>Présentation: en balles dites «Tongas» d'environ 30 kg<br>Humidité: 13 % |
| 18 | Katerini et variétés similaires | Feuilles de la qualité I/III<br>Qualité I/III: Feuilles mûres, intègres, saines, bien séchées, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 20 cm de longueur, de couleur jaune clair ou orangée à rougeâtre, de structure lâche, d'une bonne élasticité et brillantes, assez nourries, de bonne texture et de très bonne combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant (I/II) constituent 45 %, de la qualité I/III<br>Feuilles mûres présentant quelques légers défauts d'intégrité et de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 25 cm de longueur, de couleur jaune, orangée, vert jaune, rougeâtre ou marron clair, de structure lâche, d'élasticité moyenne et brillantes, assez nourries, de bonne texture et de très bonne combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 55 % de la qualité I/III<br>Présentation: en balles dites «Tongas» d'environ 30 kg chacune<br>Humidité: 13 % |
| 19 | a) Kaba Koulak classic<br>b) Elassona | Feuilles de la qualité I/III<br>Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, bien soignées, provenant de tous les étages foliaires à l'exception des feuilles de tête, ayant jusqu'à 25 cm de longueur pour Macedonia Kaba Koulak et jusqu'à 20 cm de longueur pour Elassona, Karatzova et Kontoula, de couleur jaune moyen à foncé, d'une bonne élasticité et brillantes, de structure lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 47 % de la qualité I/III<br>Feuilles mûres, présentant quelques légers défauts d'intégrité et/ou séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 30 cm de longueur pour Macedonia Kaba Koulak et 25 cm de longueur pour Elassona, Karatzova et Kontoula, de couleur jaune à rougeâtre, de structure assez lâche et d'assez bonne texture, d'une élasticité moyenne et brillantes, excellente combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 53 % de la qualité I/III<br>Présentation: en balles dites «Tongas» d'environ 30 kg chacune<br>Humidité: 13 % |

| Numéro d'ordre | Variété | Qualité de référence |
|---|---|---|
| 20 | a) Kaba Koulak non classic<br>b) Myrodata Smyrne, Trapezous et Phi 1 | Feuilles de la qualité I/III<br>Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, bien séchées, provenant de tous les étages foliaires à l'exception des feuilles de tête, ayant jusqu'à 30 cm de longueur pour Kaba Koulak Macedonia et Trapezous; jusqu'à 20 cm pour Phi 1, et jusqu'à 15 cm pour Myrodata Smyrne, de couleur jaune clair à rougeâtre, d'une bonne élasticité et brillantes, de structure assez lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant (I/II) constituent 47 % de la qualité I/III<br>Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant de légers défauts de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 35 cm de longueur pour Kaba Koulak Macedonia et Trapezous, jusqu'à 25 cm pour Phi 1, et juesqu'à 20 cm pour Myrodota Smyrne, de couleur jaune à marron clair, de structure assez lâche, d'assez bonne texture, assez élastiques et brillantes, de très bonne combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant (III) constituent 53 % de la qualité I/III<br>Présentation: en balles dites «Tongas» d'environ 30 kg<br>Humidité: 13 % |
| 21 | Myrodata Agrinion | Feuilles de la qualité I/III<br>Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, bien soignées, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 25 cm de longueur, de couleur jaune à orange foncé, d'une bonne élasticité et brillantes, de structure lâche, de bonne texture et d'une excellente combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant (I/II) constituent 47 % de la qualité I/III<br>Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant de légers défauts de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 30 cm de longueur, de couleur jaune à rougeâtre clair, de structure assez lâche et de texture assez bonne, assez élastiques et brillantes, d'une excellente combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant (III) constituent 53 % de la qualité I/III<br>Présentation: en balles dites «Tongas» d'environ 30 kg<br>Humidité: 14 % |
| 22 | Zichnomyrodata | Feuilles de la qualité I/III<br>Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, bien soignées, provenant de tous les étages foliaires, excepté les feuilles de tête ayant jusqu'à 20 cm de longueur, de couleur jaune clair à orange clair, d'une bonne élasticité et brillantes, de structure lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 47 % de la qualité I/III<br>Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant de légers défauts de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 25 cm de longueur, de couleur jaune à rougeâtre clair, de structure assez lâche et d'assez bonne texture, assez élastiques et brillantes, d'excellente combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant (III) constituent 53 % de la qualité I/III<br>Présentation: en balles dites «Tongas» d'environ 30 kg<br>Humidité: 13 % |

| Numéro d'ordre | Variété | Qualité de référence |
|---|---|---|
| 23 | Tsebelia | Feuilles de la qualité I/III<br>Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, bien soignées, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 30 cm de longueur, de couleur rouge-jaune, orange à rougeâtre, de structure lâche, élastiques et brillantes, assez nourries, de bonne texture et de très bonne combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant (I/II) constituent 45 % de la qualité I/III<br>Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant de légers défauts de séchage, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 40 cm de longueur, de couleur jaune clair à rougeâtre ou marron clair, de structure assez lâche, assez élastiques et assez brillantes, assez nourries, d'assez bonne texture et de très bonne combustibilité. Cette catégorie inclut également les feuilles légèrement atteintes par des maladies et/ou présentant de légers défauts d'intégrité<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 55 % de la qualité I/III<br>Présentation: en balles dites «Tongas» d'environ 30 kg<br>Humidité: 13 % |
| 24 | Mavra | Feuilles de la qualité I/III<br>Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, séchées avec soin, provenant de tous les étages foliaires, à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 30 cm longueur, de couleur allant du rouge jaune ou orange au rougeâtre, de structure lâche, de bonne texture, élastiques et brillantes, assez nourries et de bonne combustibilité<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 45 % de la qualité I/III<br>Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant de légers défauts de séchage, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 40 cm de longueur, de couleur jaunâtre à rougeâtre ou marron clair, de structure assez lâche et d'assez bonne texture, assez élastiques et brillantes, assez nourries et de bonne combustibilité. Cette catégorie inclut également des feuilles légèrement atteintes par les maladies et/ou présentant de légers défauts d'intégrité<br>Les feuilles décrites ci-avant constituent 55 % de la qualité I/III<br>Présentation: en balles dites «Tongas» d'environ 30 kg<br>Humidité: 13 % |
| 25 | Burley GR | Feuilles de la qualité A<br>Qualité A: feuilles complètement mûres, complètement développées, intègres, saines, bien séchées, provenant de l'étage médian, de couleur uniforme allant d'un marron noisette moyen à un rouge noisette moyen, de structure lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité<br>Présentation: en balles d'environ 100 kg ou en caisses d'environ 200 kg ou en tonneaux d'environ 240 à 280 kg<br>Humidité: 13 % |
| 26 | Virginia GR | Feuilles de la qualité A<br>Qualité A: feuilles complètement mûres, complètement développées, provenant de l'étage médian, saines, intègres, bien soignées, d'un jaune uniforme allant du jaune citron à l'orange moyen, de bonne texture et de bonne combustibilité<br>Présentation: en balles d'environ 100 kg<br>Humidité: 13 % |

*ANNEXE III*

**Prix d'objectif, prix d'intervention et primes pour les tabacs en feuilles de la récolte 1985**
**Prix d'intervention dérivés pour les tabacs emballés de la récolte 1985**

*(en Écus/kg)*

| Numéro d'ordre | Vaiétés | Prix d'objectif | Prix d'intervention | Montant de la prime | Prix d'intervention dérivés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badischer Geudertheimer | 3,721 | 3,163 | 2,587 | 4,725 |
| 2 | Badischer Burley E | 4,604 | 3,913 | 2,905 | 5,518 |
| 3 | Virgin D | 4,491 | 3,817 | 2,733 | 5,052 |
| 4 | a) Paraguay et ses hybrides<br>b) Dragon vert et ses hybrides, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre | 3,472 | 2,951 | 2,402 | – |
| 5 | Nijkerk | 3,428 | 2,914 | 2,177 | – |
| 6 | a) Misionero et ses hybrides<br>b) Rio Grande et ses hybrides | 3,195 | 2,716 | 2,205 | – |
| 7 | Bright | 3,951 | 3,358 | 2,298 | 4,650 |
| 8 | Burley I | 2,906 | 2,470 | 1,621 | 3,621 |
| 9 | Maryland | 3,313 | 2,816 | 1,802 | 4,014 |
| 10 | a) Kentucky et ses hybrides<br>b) Moro di Cori<br>c) Salento | 2,741 | 2,330 | 1,730 | 3,294 |
| 11 | a) Forchheimer Havanna II c<br>b) Nostrano del Brenta<br>c) Resistente 142<br>d) Gojano | 3,330 | 2,831 | 2,299 | 4,261 |
| 12 | a) Beneventano<br>b) Brasile Selvaggio et variétés similaires | 1,798 | 1,528 | 1,298 | 2,336 |
| 13 | Xanti-Yakà | 3,609 | 3,068 | 2,658 | 4,866 |
| 14 | a) Perustitza<br>b) Samsun | 3,417 | 2,904 | 2,530<br>2,463 | 4,250<br>4,274 |
| 15 | Erzegovina et variétés similaires | 3,070 | 2,610 | 2,279 | 3,833 |
| 16 | a) Round Tip<br>b) Scafati<br>c) Sumatra I | 16,246 | 13,809 | 9,813 | 21,113 |
| 17 | Basmas | 5,913 | 5,026 | 2,869 | 6,747 |
| 18 | Katerini et variétés similaires | 4,925 | 4,186 | 2,552 | 6,050 |
| 19 | a) Kaba Koulak classic<br>b) Elassona | 4,366 | 3,711 | 2,256 | 5,253 |
| 20 | a) Kaba Koulak non classic<br>b) Myrodata Smyrne, Trapezous et Phi 1 | 3,357 | 2,853 | 1,577 | 4,290 |
| 21 | Myrodata Agrinion | 4,340 | 3,689 | 2,279 | 5,162 |
| 22 | Zichnomyrodata | 4,509 | 3,833 | 2,403 | 5,390 |
| 23 | Tsebelia | 3,931 | 3,341 | 3,123 | 4,838 |
| 24 | Mavra | 3,837 | 3,261 | 2,553 | 4,748 |
| 25 | Burley GR | 2,297 | 1,952 | 0,972 | 3,084 |
| 26 | Virginia GR | 3,387 | 2,879 | 1,732 | 4,065 |