RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1505/85

af 23. maj 1985

om fastsættelse for 1985-høsten af målpriserne, interventionspriserne og de præmier, der ydes til købere af tobak i blade, de afledte interventionspriser for tobak i baller, samt referencekvaliteterne

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 727/70 af 21. april 1970 om oprettelse af en fælles markedsordning for råtobak (1), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1461/82 (2), særlig artikel 2, stk. 5, artikel 4, stk. 4, og artikel 6, stk. 8,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (3),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (4),

under henvisning til udtalelse fra Det monetære Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved fastsættelsen af priserne for råtobak bør der tages hensyn såvel til målsætningerne for den fælles landbrugspolitik som til det bidrag, Fællesskabet har til hensigt at yde til en harmonisk udvikling af verdenshandelen; den fælles landbrugspolitik har blandt andet til formål at sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard, at sikre forsyningerne og at sikre forbrugerne rimelige priser på landbrugsvarer;

målpriserne og interventionspriserne for tobak i blade bør fastsættes efter de kriterier, der omhandles i artikel 2, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 727/70, med henblik på at fremme en produktionsudvikling i retning af en omlægning af avlen henimod de sorter, der er mest efterspurgte og mest konkurrencedygtige;

for 1985-høsten bør der endvidere fastsættes afledte interventionspriser for de sorter, for hvilke der inden iværksættelsen af den fælles markedsordning eller, for sorter dyrket i Grækenland, inden tiltrædelsen fandtes en prisgaranti for tobak i baller, samt for de sorter, der hovedsagelig dyrkes i Forbundsrepublikken Tyskland, for at tage hensyn til handelssædvanerne i dette land;

formålet med den præmie, der ydes til køberne af den i Fællesskabet producerede tobak, er at gøre det muligt for dem at betale producenterne af tobak i blade en pris, som ligger på samme niveau som målprisen, under hensyntagen til prisudviklingen på verdensmarkedet og til det prisniveau, som er en følge af forholdet mellem udbud og efterspørgsel på Fællesskabets marked;

de ovennævnte priser og præmiebeløbet skal for hver sort fastsættes i forhold til en referencekvalitet, der er defineret således, at det er muligt at bedømme tobakkens kvalitet så objektivt som muligt; for 1985-høsten bør de ved Rådets forordning (EØF) nr. 1029/84 af 31. marts 1984 om fastsættelse for 1984-høsten af målpriserne, interventionspriserne og de præmier, der ydes købere af tobak i blade, de afledte interventionspriser for tobak i baller samt referencekvaliteterne (5) indførte definitioner af referencekvaliteterne anvendes;

ifølge artikel 87, stk. 3, i tiltrædelsesakten af 1979 skal de målpriser, der skal gælde i Grækenland, fastsættes efter kriterierne i artikel 2, stk. 2, første afsnit, i forordning (EØF) nr. 727/70 og forhøjes i fire omgange med et beløb svarende til nedsættelsen af den statsstøtte, som Den hellenske Republik ifølge artikel 69 i nævnte akt er bemyndiget til at yde for tobak, indtil støtten er helt aftrappet; den fjerde forhøjelse bør foretages for den femte høst efter tiltrædelsen –

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For 1985-høsten fastsættes de i artikel 2, stk. 3, litra c), i forordning (EØF) nr. 727/70 omhandlede referencekvaliteter for hver af de i Fællesskabet producerede sorter af tobak i blade som angivet i bilag I.

Artikel 2

For 1985-høsten fastsættes de i artikel 6, stk. 3, litra c), i forordning (EØF) nr. 727/70 omhandlede referencekvaliteter for hver af de i Fællesskabet producerede sorter af tobak i baller, for hvilke der er fastsat en afledt interventionspris, som angivet i bilag II.

Artikel 3

For 1985-høsten fastsættes de i artikel 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 727/70 omhandlede målpriser, interventionspriser og præmiebeløb, der ydes til køberne af tobak i blade, samt de i artikel 6 i samme forordning omhandlede afledte interventionspriser for tobak i baller som angivet i bilag III.

(1) EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 1.
(2) EFT nr. L 164 af 14. 6. 1982, s. 27.
(3) EFT nr. C 67 af 14. 3. 1985, s. 42.
(4) EFT nr. C 94 af 15. 4. 1985.
(5) EFT nr. L 107 af 19. 4. 1984, s. 19.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende.*

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 1985.

På Rådets vegne
C. SIGNORILE
Formand

BILAG I

Tobak i blade i sorter og deres referencekvalitet for 1985-høsten

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
1	Badischer Geudertheimer	Hauptgut (Leaves) af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde, ubeskadigede blade af mørkebrun til meleret farve, af ensartet længde. Præsentation: Sorteret tobak, i bundter eller i foreløbige baller, bundet med et andet materiale end tobak. Fugtighed: 26 %.
2	Badischer Burley E	Hauptgut (Leaves) af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde, ubeskadigede, skærefaste blade af rødligbrun til lysebrun farve, af ensartet længde. Præsentation: Sorteret tobak, i bundter eller i foreløbige baller, bundet med et andet materiale end tobak. Fugtighed: 25 %.
3	Virgin D	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde, ubeskadigede blade; afvigelser i brunlige til grønliggule farver er tilladt op til en tredjedel af bladfladen. Præsentation: Sorteret tobak i bundter eller i foreløbige baller, bundet med et andet materiale end tobak. Fugtighed: 19 %.
4	a) Paraguay og hybrider deraf b) Dragon vert og hybrider deraf Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre	Midterste blade (Leaves) af klasse 2 Klasse 2: Sunde blade med lette farvnings-, bladvævs- og modenheds-fejl, men med tilstrækkelig kombustibilitet. Præsentation: Sorteret og bundtet eller sammenrullet tobak. Fugtighed: 27 %.
5	Nijkerk	Øverste blade (Tips) af klasse 2 Klasse 2: — enten blade af anden længde (45 cm eller derunder) med meget trækfast, kødfuldt, ubeskadiget modstandsdygtigt og elastisk bladvæv, uden fremtrædende åring, af god modenhed, der viser sig ved en brun til mørkebrun farve, af varm tone — eller blade af første længde (over 45 cm), med trækfast, kødfuldt, endnu ubeskadiget, modstandsdygtigt bladvæv, med mere eller mindre fremtrædende åring, af alle farver med undtagelse af flaskegrøn. Præsentation: Sorteret og bundtet eller sammenrullet tobak. Fugtighed: 27 %.

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
6	a) Misionero og hybrider deraf b) Rio Grande og hybrider deraf	Blade af 2. kvalitet 2. kvalitet: Fuldt udviklede blade af længde over 45 cm, uden groft bladvæv, med en lys noget gullig farve, af en varm eller temmelig varm tone, tilstrækkeligt faste og stort set ubeskadigede, med forholdsmæssig god kombustibilitet. Præsentation: Sorteret og bundtet eller sammenrullet tobak, (capsé). Fugtighed: 27 %.
7	Bright	Blade af kategori A Kategori A: Blade af tilstrækkelig modenhed, omhyggeligt tørrede, af åben tekstur og ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af gul farve i forskellige schatteringer. Præsentation: I foreløbige baller på 30-40 kg Fugtighed: 16 %.
8	Burley I	Blade af kategori A Kategori A: Blade af tilstrækkelig modenhed, omhyggeligt tørrede, af åben tekstur, også faste, med ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af mere eller mindre varm nøddebrun farve. Præsentation: I foreløbige baller på 30-40 kg eller i bundter på 25-30 blade bundet med et andet materiale end tobak (fascicoli) Fugtighed: 19 %.
9	Maryland	Blade af kategori A Kategori A: Blade af tilstrækkelig modenhed, med lette tørringsfejl med meget få bronzefarvede nuancer, med et bladvæv af middel tekstur og ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af en rødligbrun, nærmest varm farve. Præsentation: I foreløbige baller på 30-40 kg eller i bundter på 25-30 blade bundet med andet materiale end tobak (fascicoli) Fugtighed: 19 %.
10	a) Kentucky og hybrider deraf b) Moro di Cori c) Salento	Blade af kategori B Kategori B: Fuldmodne blade med fast bladvæv, uden fejl som følge af behandling og opbevaring, af brun farve, med nogle beskadigelser, med god kombustibilitet. Præsentation: I bundter på 25-30 blade bundet med andet materiale end tobak (fascicoli) Fugtighed: 23 %.

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	Blade af kategori B Kategori B: Blade med fast eller magert bladvæv, sunde, uden tørringsfejl, af brun eller grønlig farve, med visse beskadigelser Præsentation: Sorteret tobak. I bundter eller i forløbige baller, bundet med et andet materiale end tobak. Fugtighed: 26 %.
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio o.l. sorter	Blade af kategori B Kategori B: Blade af tilstrækkelig modenhed, med fast eller endog groft eller magert bladvæv, med ubetydelige fejl som følge af behandling fermentering og beskadigelse. Præsentation: I bundter på 25-30 blade bundet med et andet materiale end tobak (fascicoli). Fugtighed: 24 %.
13	Xanti-Yakà	Blade af kategori B Kategori B: Tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse af oval-elliptisk form, med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god kombustibilitet. De midterste blades længde overstiger ikke 20 cm. Præsentation: I foreløbige baller på 15-20 kg eller i kasser med »guirlander« af blade på 30-40 kg. Fugtighed: 17 %.
14	a) Perustitza b) Samsun	Blade af kategori B Kategori B: Tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse (Perustitza) eller med stilk (Samsun), elliptisk-lancetformede med tynde spidser (Perustitza) eller elliptisk runde (Samsun), med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest skarpvinklede årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve (Perustitza) eller henimod det rødlige (Samsun), med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god kombustibilitet. De midterste blades længde overstiger ikke 25 cm. Præsentation: I foreløbige baller på 15-20 kg eller i kasser med »guirlander« af blade på 30-40 kg. Fugtighed: 17 %.

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
15	Erzogovins o.l. sorter	Blade af kategori B Kategori B: Tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse, af oval eller elliptisk form med nogenlunde fremtrædende ribber og nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god kombustibilitet. De midterste blades længde overstiger ikke 35 cm. Præsentation: I foreløbige baller på 15-20 kg eller i kasser med »guirlander« af blade på 30-40 kg. Fugtighed: 17 %.
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Blade af kategori B Kategori B: Midterste nedre blade, sorteret efter længde i følgende størrelsesforhold: første længde (38 cm og derover) 60 % anden længde (på 32 cm og derover, men under 38 cm) 35 % tredje længde (på 25 cm og derover, men under 32 cm) 5 % Blade af god form, fuldmodne og af ensartet farve, sunde, ubeskadigede, af fint bladvæv, elastiske og modstandsdygtige, uden fremtrædende ribber og årer, tilpas fermenteret og godt bevaret af god kombustibilitet, med typisk smag og aroma, egnet til cigardæksblad med ca. 25 % beskadigede blade. Præsentation: I bundter bundet med et andet materiale end tobak (fascicoli). Fugtighed: 22 %.
17	Basmas	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde blade uden tørringsfejl; tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«), længde op til 15 cm, farve: gylden, orange til rødgul, meget elastiske og med glans, temmelig kødfulde; tyndkornede og af god tekstur, med kraftig behagelig aroma, god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 45 % af kvalitet I/III. Modne blade med nogle lette beskadigelser og/eller tørringsfejl; nogle spor af sygdom; tages fra alle bladpositioner; op til 20 cm lange; farve: lysegul, gulgrøn, rødlig eller lysebrun; af temmelig løs struktur og god tekstur; middelelastiske; med moderat glans; moderat kødfulde, med kraftig behagelig aroma, meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne udgør 55 % af kvalitet I/III. Præsentation: Bondeballer på 15-25 kg, præsenteret på traditionel vis i to rækker pasteller (i lignende blade). (Det bør bemærkes, at områderne Astakos og Chrysoupolis præsenteres tobakken i »armathodom«). Fugtighed: 17 %.

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
18	Katerini og lignende sorter	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde og veltørrede blade, tages fra alle bladpositioner (protomana), op til 20 cm lange, farve: lysegul eller orange til rødlig, af løs struktur, meget elastiske og med glans, temmelig kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 45 % af kvalitet I/III. Modne blade med nogle beskadigelser og tørringsfejl, nogle spor af sygdom, stammer fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul, orange, gulgron, rodlig eller lysebrun, af løs struktur, temmelig kødfulde, god tekstur, gennemsnitlig elasticitet og skinnende og meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III. Præsentation: Guirlanderne samles for det meste efter præsentationsmåden »Baski« før emballeringen. Præsentation i baller på 25-35 kg efter den traditionelle metode kaldet »Kalup«. Fugtighed: 16 %.
19	a) Klassisk Kaba Koulak b) Elassona	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne ubeskadigede, sunde og velplejede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, op til 20 cm lange for Elassona, Karatzeva og Kontoula, farve: middelgul til mørkegul, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur, og udmærket kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III. Modne blade med lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og 25 cm for Elassona, Karatzova og Kontoula, farve: gul til rødlig, af temmelig god tekstur, middelelastiske og med glans, meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 53 % af kvalitet I/III. Præsentation: Bondeballer på 15-30 kg, præsenteret på traditionel vis i to rækker »armathodema«. Fugtighed: 17 %.
20	a) Ikke klassisk Kaba Koulak b) Myrodata Smyrna, Trapezous og Phil	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde og veltørrede blade, stammer fra alle bladpositioner, med undtagelse af topbladene, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 20 cm lange for Phi 1, og op til 15 cm lange for Myrodata Smyrna, farve: lysegul til rødlig, meget elastiske og med glans, af temmelig løs struktur, god tekstur og med god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 47 % af kvalitet I/III.

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
20 *(fortsat)*	a) Ikke-klassisk Kaba Koulak b) Myrodata Smyrna, Trapezous og Phi 1	Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor tages fra alle bladpositioner, op til 35 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 25 for Phi 1, og op til 20 cm for Myrodata Smyrna, farve: gul til lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 53 % af kvalitet I/III. Præsentation: Bondeballer på 23-35 kg, præsenteret på traditionel vis i »armathodema«, eller på 35-50 kg i form af »Kalup«. Fugtighed: 17 %.
21	Myrodata Agrinion	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde og velplejede blade, stammer fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (Protomana), op til 25 cm lange, farve: gul til mørk orange, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 47 % af kvalitet I/III. Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, stammer fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange, farve: gul til lys rødlig, temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 53 % af kvalitet I/III. Præsentation: I bondeballer på 15-30 kg præsenteret på traditionel vis i to rækker »armathodema«. Fugtighed: 15 %.
22	Zichomyrodata	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde og velplejede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, op til 20 cm lange, farve: lysegul til lys orange, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III. Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor, tages fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul til lys rødlig, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur temmelig elastiske og med glans, meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 53 % af kvalitet I/III. Præsentation: I bondeballer på 15-30 kg, præsenteret på traditionel vis i to rækker »armathodema«. Fugtighed: 17 %.
23	Tsebelia	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde og velplejede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (protomana), op til 30 cm lange, farve: rødgul, orange til rødlig, af løs struktur, elastiske og med glans, temmelig kødfulde, god tekstur, og megen god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 45 % af kvalitet I/III.

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
23 *(fortsat)*	Tsebelia	Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner, op til 40 cm, lange, farve: lysegul til rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig elastiske og med temmelig stærk glans, temmelig kødfulde, temmelig god tekstur og meget god kombustibilitet. Denne kategori omfatter endvidere lettere sygdomsangrebne blade og/eller blade med lette beskadigelser. De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III. Præsentation: I bondeballer på 30-40 kg, præsenteret i to rækker »armathodema«. Fugtighed: 14 %.
24	Mavra	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde og omhyggeligt tørrede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«) op til 30 cm lange, farve: fra rødgul eller orange til rødlig, af løs struktur, god tekstur, elastiske og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 45 % af kvalitet I/III. Modne, og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner, op til 40 cm lange, farve: gullig til rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet. Denne kategori omfatter også lettere sygdomsangrebne blade og/eller blade med lette beskadigelser. De ovenfor nævnte blade udgør 55 % af kvalitet I/III. Præsentation: I bondeballer på 30-50 kg, præsenteret i to rækker »armathodema«. Fugtighed: 14 %.
25	Burley GR	Blade af kvalitet A Kvalitet A: Helmodne, fuldstændigt udviklede, ubeskadigede, sunde og veltørrede blade, tages fra midterpositionen, farve: fra en ensartet middel nøddebrun til en ensartet middel rødbrun, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet. Præsentation: I bondeballer på 40 kg, præsenteret i to rækker »armathodema«, uden snor (i løse blade). Fugtighed: 22 %.
26	Virginia GR	Blade af kvalitet A Kvalitet A: Helt modne og fuldstændigt udviklede blade, tages fra midterpositionen, sunde, ubeskadigede, velplejede, farve: ensfarvet gul, der går fra citrongul til middelgul, af god tekstur og god kombustibilitet. Præsentation: I bondeballer på 30-40 kg, præsenteret i to rækker »armathodema«, uden snor (i løse blade). Fugtighed: 19 %.

BILAG II

Tobaksballer i sorter og deres referencekvaliteter for 1985-høsten

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
1	Badischer Geudertheimer	Hauptgut (Leaves) af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde, ubeskadigede blade af meleret til mørkebrun farve, af ensartet længde; normalt fermenteret. Præsentation: I baller eller kasser på ca. 75-200 kg eller i fade på ca. 225-450 kg. Fugtighed: 16 %.
2	Badischer Burley E	Hauptgut (Leaves) af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde, ubeskadigede, skærefaste blade af lysebrun, rødligbrun til mørkebrun farve, af ensartet længde; normalt fermenteret. Præsentation: I baller eller kasser på ca. 75-175 kg eller i fade på ca. 225-450 kg. Fugtighed: 15 %.
3	Virgin D	Blade af klasse 1 Klasse 1: Modne, sunde, ubeskadigede blade af gul, gulrød til brunlig-gul farve; normalt fermenteret. Præsentation: I baller eller kasser på ca. 75-175 kg eller i fade på ca. 225-450 kg. Fugtighed: 13 %.
7	Bright	Blade af kategori A Klasse A: Blade af tilstrækkelig modenhed, omhyggeligt behandlet, af åben tekstur og ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af gul farve i forskellige schatteringer. Præsentation: I fade på ca. 280-450 kg eller i kasser på ca. 150-210 kg. Fugtighed: 13 %.
8	Burley I	Blade af kategori A Klasse A: Blade af tilstrækkelig modenhed, omhyggeligt behandlet, af åben tekstur, også faste, med ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af mere eller mindre varm nøddebrun farve. Præsentation: I fade på ca. 280-450 kg eller i kasser på ca. 150-210 kg. Fugtighed: 13 %.

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
9	Maryland	Blade af kategori A Kategori A: Blade af tilstrækkelig modenhed, med lette tørringsfejl med meget få bronzefarvede nuancer, med et bladvæv af middel tekstur og ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af en rødligbrun mere eller mindre varm farve I fade på ca. 280-450 kg eller i kasser på 150-210 kg. Fugtighed: 13 %.
10	a) Kentucky og hybrider deraf b) Moro di Cori c) Salento	Blade af kategori B Kategori B: Fuldmodne blade med fast bladvæv uden fejl som følge af behandling og opbevaring, af brun farve, med nogle beskadigelser, med god kombustibilitet. Præsentation: I fade på ca. 280-450 kg eller i baller på ca. 170-200 kg. Fugtighed: 16 %.
11	a) Forchheimer Havanna II C b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	Blade af kategori B Kategori B: Blade med fast eller magert bladvæv, sunde, uden tørringsfejl, af brun til grønlig farve, med visse beskadigelser. Præsentation: I baller eller kasser på ca. 75-200 kg eller i fade på ca. 225-450 kg. Fugtighed: 16 %.
12	a) Beneventano b) Brasile, Selvaggio o.lign. sorter	Blade af kategori B Kategori B: Blade af tilstrækkelig modenhed, med fast eller endog groft eller magert bladvæv, med ubetydelige fejl som følge af tørring, fermentering og beskadigelse. Præsentation: I baller på ca. 120 kg eller i fade på ca. 330 kg. Fugtighed: 16 %.
13	Xanti-Yakà	Blade af kategori B Kategori B: Tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse, af oval-elliptisk form, med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god kombustibilitet. De midterste blades længde overstiger ikke 20 cm. Præsentation: I små baller på ca. 18-50 kg. Fugtighed: 13 %.

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
14	a) Perustitza b) Samsun	Blade af kategori B Kategori B: Tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse (Perustitza) eller med stilk (Samsun), elliptisk-lancetformede med tynde spidser (Perustitza) eller elliptisk-runde (Samsun), med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest skarpvinklede årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve (Perustitza) eller henimod det rødlige (Samsun), med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god kombustibilitet. De midterste blades længde overstiger ikke 25 cm. Præsentation: I små baller på ca. 18-50 kg. Fugtighed: 13 %.
15	Erzegovina og lign. sorter	Blade af kategori B Kategori B: Tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse, af oval eller elliptisk form med nogenlunde fremtrædende ribber og nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god kombustibilitet. De midterste blades længde overstiger ikke 35 cm. Præsentation: I små baller på ca. 18-50 kg. Fugtighed: 13 %.
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Blade af kategori B Kategori B: Midterste nedre blade sorteret efter længde i følgende størrelsesforhold: første længde (38 cm og derover) 60 % anden længde (på 32 cm og derover, men under 38 cm) 35 % tredje længde (på 25 cm og derover, men under 32 cm) 5 %. Blade af god form; fuldmodne og af ensartet farve, sunde, ubeskadigede, af fint bladvæv, elastiske og modstandsdygtige, uden fremtrædende ribber og årer, tilpas fermenteret og godt bevaret, af god kombustibilitet, med typisk smag og aroma egnet til cigardæksblad, med ca. 25 % beskadigede blade. Præsentation: I baller på ca. 70-90 kg eller i kasser på ca. 180-210 kg. Fugtighed: 16 %.

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
17	Basmas	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede, sunde blade uden tørringsfejl; tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«), længde op til 15 cm, farve: gylden, orange til rødgul, meget elastiske og med glans, temmelig kødfulde; tyndkornede og af god tekstur, med kraftig behagelig aroma god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 45 % af kvalitet I/III. Modne blade med nogle lette beskadigelser og/eller tørringsfejl; nogle spor af sygdom; tages fra alle bladpositioner; op til 20 cm lange; farve: lysegul, gulgrøn, rødlig eller lysebrun; af temmelig løs struktur og god tekstur; middel elastiske; med moderat glans; moderat kødfulde, med kraftig behagelig aroma meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 55 % af kvalitet I/III. Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg. Fugtighed: 13 %.
18	Katerini og lignende sorter	Blade af kvalitet I/III: Kvalitet I/III: Modne, beskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«), op til 20 cm lange, farve: lysegul eller orange til rødlig, af løs struktur, meget elastiske, med glans, temmelig kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet. De ovennævnte blade udgør 45 % af kvalitet I/III. Modne blade med nogle lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, nogle spor af sygdom, tages fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul, orange, gulgrøn, rødlig eller lysebrun, af løs struktur, gennemsnitlig elasticitet og skinnende moderat kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III. Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg. Fugtighed: 13 %.
19	a) Klassisk Kaba Koulak b) Elassona	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topblade, op til 25 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og op til 20 cm lange for Elassona, Karatzova og Kontoula, farve: middelgul til mørkegul, elastiske og med glans: af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III. Modne blade med nogle lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, med små sygdomsspor tages fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og 25 cm lange for Elassona, Karatzeva og Kontoula, farve: gul, gulgrøn, rødlig, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, middel elastiske og med moderat glans meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 53 % af kvalitet I/III. Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg. Fugtighed: 13 %.

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
20	a) Ikke-klassisk Kaba Koulak b) Myrodata Smyrna, Trapezous og Phi 1	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, og til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 20 cm for Phi 1 og op til 15 cm for Myrodata Smyrna, farve: lysegul til rødlig, meget elastiske og med glans, af temmelig løs struktur, god tekstur og udmærket kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgor 47 % af kvalitet I/III. Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor tages fra alle bladpositioner, op til 35 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 25 cm lange for Phi 1 og op til 20 cm for Myrodata Smyrna, farve: gul, gulgrøn eller lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med temmelig stærk glans, meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (III) udgor 53 % af kvalitet I/III. Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg. Fugtighed: 13 %.
21	Myridata Agrinion	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede og sunde uden tørringsfejl, stammer fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«), op til 25 cm lange, farve: gul til mørkorange, meget elastiske og med glans; af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 47 % af kvalitet I/III. Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor stammer fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange, farve: gul, gulgrøn eller lys rødlig, temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske med glans, meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 53 % af kvalitet I/III. Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg. Fugtighed: 14 %.
22	Zichnomyrodata	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, op til 20 cm lange, farve: lysegul til lys orange, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III. Modne, og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med få lette tørringsfejl, med små sygdomsspor tages fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul, gulgrøn eller lys rødlig, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med temmelig stærk glans, meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 53 % af kvalitet I/III. Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg. Fugtighed: 13 %.

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
23	Tsebelia	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, stammer fra alle bladpositioner med undtagelse af den første, op til 35 cm lange, farve: rødgul, orange til rødlig, af løs struktur, god elasticitet og med glans, temmelig kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 45 % af kvalitet I/III. Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med nogle lette tørringsfejl, stammer fra alle bladpositioner, op til 40 cm lange, farve: lysegul, gulgrøn rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig elastiske og med middel glans temmelig kødfulde, af temmelig god tekstur og meget god kombustibilitet. Denne kategori omfatter endvidere lettere angrebne blade og/eller blade med lette beskadigelser. De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III. Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg. Fugtighed: 13 %.
24	Mavra	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: Modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«) op til 30 cm lange, farve: fra rødlig gul til orange og det rødlige, af løs struktur, god tekstur, god elasticitet og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne udgør 45 % af kvalitet I/III. Modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, der stammer fra alle bladpositioner, op til 40 cm lange, farve: gullig, grøngul (citron), rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet. Denne kategori omfatter endvidere lettere angrebne blade og/eller blade med lette beskadigelser. De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III. Præsentation: I såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg. Fugtighed: 13 %.
25	Burley GR	Blade af kvalitet A Kvalitet A: Helmodne blade, fuldstændig udviklede, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra midterpositionen, farve: ensartet middelbrun til rødbrun, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet. Præsentation: I baller på ca. 100 kg eller i kasser på ca. 200 kg eller i fade på ca. 240-280 kg. Fugtighed: 13 %.
26	Virginia GR	Blade af kvalitet A Kvalitet A: Helmodne fuldstændigt udviklede, sunde og ubeskadigede blade uden tørringsfejl, farve: ensartet citrongul til middel orange, kødfulde, af god tekstur og god kombustibilitet, tages hovedsagelig fra midterpositionen. Præsentation: I baller på ca. 100 kg. Fugtighed: 13 %.

BILAG III

Målpriser, interventionspriser og præmier for tobak i blade for 1985-høsten

Afledte interventionspriser for tobak i baller for 1985-høsten

(ECU/kg)

Løbenr.	Sorter	Målpris	Interventions-pris	Præmie	Afledt interventions-pris
1	Badischer Geudertheimer	3,721	3,163	2,587	4,725
2	Badischer Burley E	4,604	3,913	2,905	5,518
3	Virgin D	4,491	3,817	2,733	5,052
4	a) Paraguay og hybrider deraf b) Dragon vert og hybrider deraf, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	3,472	2,951	2,402	–
5	Nijkerk	3,428	2,914	2,177	–
6	a) Misionero og hybrider deraf b) Rio Grande og hybrider deraf	3,195	2,716	2,205	–
7	Bright	3,951	3,358	2,298	4,650
8	Burley I	2,906	2,470	1,621	3,621
9	Maryland	3,313	2,816	1,802	4,014
10	a) Kentucky og hybrider deraf b) Moro di Cori c) Salento	2,741	2,330	1,730	3,294
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	3,330	2,831	2,299	4,261
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio og lignende sorter	1,798	1,528	1,298	2,336
13	Xanti-Yakà	3,609	3,068	2,658	4,866
14	a) Perustitza b) Samsun	3,417	2,904	2,530 2,463	4,250 4,274
15	Erzegovina og lignende sorter	3,070	2,610	2,279	3,833
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	16,246	13,809	9,813	21,113
17	Basmas	5,913	5,026	2,869	6,747
18	Katerini og lignende sorter	4,925	4,186	2,552	6,050
19	a) Klassisk Kaba Koulak b) Elassona	4,366	3,711	2,256	5,253
20	a) Ikke-klassisk Kaba Koulak b) Myrodata Smyrna, Trapezous og Phi 1	3,357	2,853	1,577	4,290
21	Myrodata Agrinion	4,340	3,689	2,279	5,162
22	Zichnomyrodata	4,509	3,833	2,403	5,390
23	Tsebelia	3,931	3,341	3,123	4,838
24	Mavra	3,837	3,261	2,553	4,748
25	Burley GR	2,297	1,952	0,972	3,084
26	Virginia GR	3,387	2,879	1,732	4,065