385R1505

10. 6. 85 Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº L 151/31

REGLAMENTO (CEE) Nº 1505/85 DEL CONSEJO

de 23 de mayo de 1985

por el que se fijan, para la cosecha de 1985, los precios de objetivo, los precios de intervención y las primas concedidas a los compradores de tabaco en hoja, los precios de intervención derivados del tabaco embalado, así como las calidades de referencia

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 43,

Visto el Reglamento (CEE) nº 727/70 del Consejo, de 21 de abril de 1970, por el que se establece una organización común de mercados en el sector del tabaco bruto (1), modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) nº 1461/82 (2), y, en particular, el apartado 5 de su artículo 2, el apartado 4 de su artículo 4 y el apartado 8 de su artículo 6,

Vista la propuesta de la Comisión (3),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (4),

Visto el dictamen del Comité monetario,

Considerando que, al fijar los precios en el sector del tabaco bruto, procede tener en cuenta tanto los objetivos de la política agrícola común como la aportación que la comunidad pretende realizar al desarrollo armonioso del comercio mundial; que la política agrícola común tiene por objetivos, en particular, garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables;

Considerando que los precios de objetivo y los precios de intervención del tabaco en hoja deben fijarse en función de los criterios contemplados en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CEE) nº 727/70 para estimular la orientación de la producción, en particular en el sentido de una conversión de los cultivos hacia las variedades más solicitadas y competitivas;

Considerando que es oportuno fijar asimismo, para la cosecha 1985, los precios de intervención derivados para las variedades que, antes de la entrada en vigor de la organización común de mercados o, respecto de las variedades cultivadas en Grecia, antes de la adhesión, se beneficiaban de una garantía de precios en la fase de tabaco embalado, así como para las variedades principalmente cultivadas en la República Federal de Alemania, con objeto de tener en cuenta los usos de comercialización existentes en dicho país;

Considerando que la prima concedida a los compradores de tabaco comunitario está destinada a que puedan pagar a los productores de tabaco en hoja un precio que se sitúe al nivel del precio de objetivo teniendo en cuenta la evolución de los precios del mercado mundial, así como el nivel de los precios resultante del juego de la oferta y la demanda en el mercado comunitario;

Considerando que los precios anteriormente mencionados, así como el importe de la prima, deben fijarse para cada variedad con relación a una calidad de referencia definida de forma que permita una evaluación lo más objetiva posible de la calidad del tabaco; que, para la cosecha de 1985, es conveniente mantener las definiciones de las calidades de referencia introducidas por el Reglamento (CEE) nº 1029/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, por el que se fijan, para la cosecha de 1984, los precios de objetivo, los precios de intervención y las primas concedidas a los compradores de tabaco en hoja, los precios de intervención derivados del tabaco embalado, así como las calidades de referencia (5);

Considerando que el Acta de adhesión de 1979 prevé, en el apartado 3 de su artículo 87, que los precios de objetivo que deben aplicarse en Grecia se fijarán con arreglo a los criterios previstos en el párrafo primero del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CEE) nº 727/70 y se aumentarán en cuatro etapas, en la cuantía de la incidencia de la disminución de las ayudas nacionales que la República Helénica está autorizada a mantener de manera decreciente para el tabaco en aplicación del artículo 69 de dicha Acta; que el cuarto aumento debe producirse para la quinta cosecha siguiente a la adhesión;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Para la cosecha 1985, se fijan en el Anexo I las calidades de referencia para cada una de las variedades de tabaco en hoja de producción comunitaria, contempladas en la letra c) del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (CEE) nº 727/70.

Artículo 2

Para la cosecha 1985, se fijan en el Anexo II las calidades de referencia, contempladas en la letra c) del apartado 3 del artículo 6 del Reglamento (CEE) nº 727/70, para cada una de las variedades de tabaco embalado de producción comunitaria para las que se ha establecido un precio de intervención derivado.

Artículo 3

Para la cosecha 1985, se fijan en el Anexo III los precios de objetivo y de intervención y los importes de la prima concedida a los compradores de tabaco en hoja, contemplados en los artículos 2 y 3 del Reglamento (CEE) nº 727/70, así como los precios de intervención derivados del tabaco embalado contemplados en el artículo 6 de dicho Reglamento.

(1) DO nº L 94 de 28. 4. 1970, p. 1.
(2) DO nº L 164 de 14. 6. 1982, p. 27.
(3) DO nº C 67 de 14. 3. 1985, p. 42.
(4) DO nº C 94 de 15. 4. 1985.
(5) DO nº L 107 de 19. 4. 1984, p. 19.

Artículo 4

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas.*

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 23 de mayo de 1985.

Por el Consejo

El Presidente

C. SIGNORILE

ANEXO I

Tabaco en hoja: variedades y calidades de referencia del mismo para la cosecha de 1985

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
1	Badischer Geudertheimer	Hauptgut (Leaves) de clase 1 Clase 1: hojas maduras, sanas, intactas de color marrón oscuro a moteado, de longitud uniforme Presentación: tabaco seleccionado, en manillas o en fardos provisionales, con ligaduras que no son tabaco Humedad: 26 %
2	Badischer Burley E	Hauptgut (Leaves) de clase 1 Clase 1: hojas maduras, sanas, intactas, carnosas, de color marrón rojizo a marrón claro, de longitud uniforme Presentación: tabaco seleccionado, en manillas o en fardos provisionales, con ligaduras que no son tabaco Humedad: 25 %
3	Virgin D	Hojas de clase 1 Clase 1: hojas maduras, sanas intactas, de color amarillo a rojo amarillo; se admiten, hasta un límite del tercio de la superficie de la hoja, diferencias tales como coloraciones parduzcas a amarillo verdoso Presentación: tabaco seleccionado, en manillas o en fardos provisionales, con ligaduras que no son tabaco Humedad: 19 %
4	a) Paraguay y sus híbridos b) Dragon vert y sus híbridos, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Hojas medianas (Leaves) de clase 2 Clase 2: hojas sanas que presenten ligeros defectos de coloración, del tipo de tejido, de madurez, pero de combustibilidad satisfactoria Presentación: tabaco seleccionado y en manillas o en hojas sueltas Humedad: 27 %
5	Nijkerk	Hojas de corona (Tips) de clase 2 Clase 2: — ya sea hojas de segunda longitud (inferior o igual a 45 cm), de tejido muy gomoso, carnoso, íntegro, resistente y elástico, con nervios poco pronunciados, de buena madurez que se traduzca en una coloración marrón a marrón oscuro, de color vivo — ya sea hojas de primera longitud (superior a 45 cm) de tejido todavía más gomoso, carnoso, más íntegro, resistente, con nervios más o menos pronunciados, de todas las coloraciones, con exclusión del verde botella Presentación: tabaco seleccionado y en manillas o en hojas sueltas Humedad: 27 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
6	a) Misionero y sus híbridos b) Rio Grande y sus híbridos	Hojas de segunda calidad 2ª calidad: hojas desarrolladas, de más de 45 cm, de tejido no grueso, de coloración clara un poco amarillenta, de color vivo o bastante vivo, que tenga suficiente firmeza y sea bastante íntegro, de combustibilidad pasable Presentación: tabaco seleccionado y en manillas o en hojas sueltas Humedad: 27 %
7	Bright	Hojas de categoría A Categoría A: hojas de madurez suficiente, sin defectos de curado, de textura abierta, con nervios centrales y nervios no demasiado acentuados, sanas, de color amarillo en sus diferentes gradaciones Presentación: en fardos provisionales de 30 a 40 kg Humedad: 16 %
8	Burley I	Hojas de categoría A Categoría A: hojas de madurez suficiente, sin defectos de curado, de textura abierta, incluso consistentes, con los nervios centrales y nervios no demasiado acentuados, sanas, de color avellana más o menos vivo Presentación: en fardos provisionales de 30 a 40 kg o en manillas con ligaduras que no son tabaco (*fascicoli*) de 25 a 30 hojas Humedad: 19 %
9	Maryland	Hojas de categoría A Categoría A: hojas de madurez suficiente que presenten ligeros defectos de secado con muy pocas tonalidades color avellana, de tejido de textura mediana con los nervios centrales y los nervios no demasiado acentuados, sanas, de coloración marrón rojizo, más bien vivo Presentación: en fardos provisionales de 30 a 40 kg o en manillas con ligaduras que no son tabaco (*fascicoli*) de 25 a 30 hojas Humedad: 19 %
10	a) Kentucky y sus híbridos b) Moro di Cori c) Salento	Hojas de categoría B Categoría B: hojas de buena madurez, de tejido consistente, sin defectos de curado y de conservación, de color marrón, que presenten algunos defectos de integridad, de buena combustibilidad Presentación: en manillas con ligaduras que no son tabaco (*fascicoli*) de 25 a 30 hojas Humedad: 23 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nonstrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	Hojas de categoría B Categoría B: hojas de tejido consistente o ligero, sanas, sin defectos de curado, de color marrón verdoso, que presenten defectos de integridad Presentación: tabaco seleccionado, en manillas o en fardos provisionales con ligaduras que no son tabaco Humedad: 26 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio y variedades similares	Hojas de categoría B Categoría B: hojas de madurez suficiente de tejido consistente o incluso grueso o fino, que presenten defectos no acentuados de curado, de fermentación y de integridad Presentación: en manillas con ligaduras que no son tabaco *(fascicoli)* de 25 a 30 hojas Humedad: 24 %
13	Xanti-Yaká	Hojas de categoría B Categoría B: hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles, de forma oval elíptica, con los nervios centrales poco acentuados y los nervios secundarios con un ángulo más bien abierto, que pueden presentar algunos defectos de curado, de tejido la mayoría de las veces ligero, de color que va del amarillo al marrón, con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliares, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad La longitud de las hojas medianas no supera los 20 cm Presentación: en fardos provisionales de 15 a 20 kg o en cajas que contengan guirnaldas de hojas de 30 a 40 kg Humedad: 17 %
14	a) Perustitza b) Samsun	Hojas de categoría B Categoría B: hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles (Perustitza) o pecioladas (Samsun) de forma elíptica lanceolada con la punta afilada (Perustitza) o elíptica redondeada (Samsun), con los nervios centrales poco acentuados y los nervios secundarios con un ángulo tendente al agudo, que pueden presentar algunos defectos de curado, de tejido la mayoría de las veces ligero de color que va del amarillo al marrón (Perustitza) o tendente al parduzco (Samsun) con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliados, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad La longitud de las hojas medianas no supera los 25 cm Presentación: en fardos provisionales de 15 a 20 kg o en cajas que contengan guirnaldas de hojas de 30 a 40 kg Humedad: 17 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
15	Erzegovina y variedades similares	Hojas de categoría B Categoría B: hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles, de forma oval o elíptica con los nervios centrales medianamente acentuados y con los nervios secundarios en ángulo más bien abierto, que puede presentar algunos defectos de curado, de tejido la mayoría de las veces ligero, de color que va del amarillo al marrón, con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliares, de gusto discreto de aroma suficiente y de buena combustibilidad La longitud de las hojas medianas no supera los 35 cm Presentación: en fardos provisionales de 15 a 20 kg o en cajas que contengan guirnaldas de hojas de 30 a 40 kg Humedad: 17 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Hojas de categoría B Categoría B: hojas medianas inferiores seleccionadas por longitud de acuerdo con las proporciones siguientes: 1ª longitud (igual o superior a 38 cm) 60 % 2ª longitud (de 32 a menos de 38 cm) 35 % 3ª longitud (de 25 a menos de 32 cm) 5 % Hojas de dimensión conveniente, de buena madurez y de color uniforme, sanas, sin defectos de integridad de textura fina, elástica y resistente, con los nervios centrales y los nervios poco pronunciados, de buena fermentación y bien conservadas de buena combustibilidad, de gusto y aroma típicos, utilizables para el encapado de cigarros, que incluyan aproximadamente un 25 % de hojas no íntegras Presentación: en manillas con ligaduras que no son tabaco (*fascicoli*) Humedad: 22 %
17	Basmas	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 15 cm de longitud, de color amarillo oro, anaranjado a rojo amarillo de buena elasticidad y brillantes, bastante carnosas; estructura floja y buena textura; de aroma típico y acusado, de buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 45 % de la calidad I/III Hojas maduras, que presenten ligeros defectos de integridad y/o curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro, verde claro, rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja y de buena textura, de elasticidad media, moderadamente brillantes, moderadamente carnosas de aroma típico y acusado, de muy buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III Presentación: en fardos de 15 a 25 kg, presentados de la forma trá dicional en dos filas de «pastali» (en hojas alineadas). (Es conveniente señalar que en los distritos de Astakós y Jrisúpoli la presentación se hace en armatodema) Humedad: 17 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
18	Katerini y variedades similares	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: hojas maduras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (Protomana), que tengan hasta 20 cm de longitud, de colo armarillo claro o anaranjado a rojizo, de estructura floja, de buena elasticidad, brillantes, bastantes carnosas, de buena textura y muy buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 45 % de la calidad I/III Hojas maduras, que presenten ligeros defectos de integridad y/o curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo, anaranjado, verde amarillo, rojizo o marrón claro, de estructura floja, moderadamente carnosas, de elasticidad media y brillantes, de buena textura y de muy buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III Presentación: generalmente las guirnaldas se juntan de acuerdo con la forma de presentación «Baski» antes del embalaje. Presentación en fardos de 25 a 35 kg de acuerdo con la forma tradicional llamada «Kaloup» Humedad: 16 %
19	a) Kaba Koulak clásico b) Elassona	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona que tengan hasta 25 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y hasta 20 cm de longitud para Elassona, Karatzova y Kontoula, de color amarillo medio a oscuro, de buena elasticidad y brillantes, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III Hojas maduras, que presenten ligeros defectos de integridad y/o curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 30 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y 25 cm de longitud para Elassona, Karatzova y Kontoula, de color amarillo, verde amarillo, rojizo, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, de elasticidad media y moderadamente brillantes, de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 53 % de la calidad I/III Presentación: en fardos de 15 a 30 kg, presentadas de la forma tradicional en dos filas de armatodema Humedad: 17 %
20	a) Kaba Koulak no clásico b) Myrodata Smyrne Trapezous y Phi I	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del Las hojas de corona, que tengan hasta 30 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y Trapezous, hasta 20 cm para Phi I y hasta 15 cm para Myrodata Smyrne, de color amarillo claro a rojizo, de buena elasticidad y brillantes de estructura bastante floja de buena textura y excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
20 *(cont.)*	a) Kaba Koulak no clásico b) Myrodata, Smyrne Trapezous y Phi I	Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten algunos defectos de curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 35 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y Trapezous, hasta 25 cm para Phi y hasta 20 cm para Myrodata, Smyrne, de color amarillo, verde amarillo o marrón claro de textura bastante floja, de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, de muy buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 53 % de la calidad I/III Presentación: en fardos de 25 a 35 kg, presentadas de la forma tradicional en armatodema, o de 35 a 50 kg en la forma de Kaloup Humedad: 17 %
21	Myrodata Agrinion	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: Hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana) que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo a anaranjado oscuro, de buena elasticidad y brillantes de textura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de secado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 30 cm de longitud, de color amarillo, verde amarillo o rojizo claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastantes elásticas y brillantes, de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 53 % de la calidad I/III Presentación: en fardos de 15 a 30 kg presentadas de la forma tradicional en dos filas de armatodema Humedad: 15 %
22	Zichnomyrodata	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: Hojas maduras, íntegras, sanas sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona, que tengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro a anaranjado claro, de buena elasticidad y brillantes, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado y algunas señales de enfermedad, procedentes de todos pisos foliares, que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo, verde amarillo o rojizo claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y bastante brillantes, de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 53 % de la calidad I/III Presentación: en fardos de 15 a 30 kg presentadas de la forma tradicional en dos filas de armatodema Humedad: 17 %
23	Tsebelia	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero, que tengan hasta 35 cm de longitud, de color rojo amarillo, naranja a rojizo, de estructura floja, de buena elasticidad y brillantes, bastante carnosas, de buena textura y de muy buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 45 % de la calidad I/III

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
23 *(cont.)*	Tsebelia	Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 40 cm de longitud, de color amarillo claro, verde amarillo, rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja, bastante elásticas y de brillo medio, bastante carnosas, de bastante buena textura y de muy buena combustibilidad. Esta categoría también comprende las hojas ligeramente desecadas y/o que presenten ligeros defectos de integridad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 por 100 de la calidad I/III Presentación: en fardos de 30 a 40 kg, presentadas en dos filas de armatodema Humedad: 14 %
24	Mavra	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: Hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado procedentes de todos los pisos foliares con excepción del primero (protomana) que tengan hasta 30 cm de longitud, de un color que va de rojizo amarillo al naranja y al rojizo, de estructura floja, de buena textura, de buena elasticidad y brillantes, bastantes carnosas y de buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 45 % de la calidad I/III Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 40 cm de longitud, de color amarillento, verde amarillo (limón), rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, bastantes carnosas y de buena combustibilidad. Esta categoría también comprende las hojas ligeramente desecadas y/o que presenten ligeros defectos de integridad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III Presentación: en fardos de 30 a 50 kg presentadas en dos filas de armatodema Humedad: 14 %
25	Burley GR	Hojas de la calidad A Calidad A: hojas completamente maduras, completamente desarrolladas, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes del piso medio, de color uniforme marrón avellana medio a rojo avellana, de estructura floja, de buena textura y excelente combustibilidad Presentación: en fardos de 40 kg presentada en dos filas de armatodema sin bramante (hojas sueltas) Humedad: 22 %
26	Virginia GR	Hojas de la calidad A Calidad A: hojas completamente maduras, completamente desarrolladas, sanas, íntegras, sin de fectos de curado de color uniforme amarillo limón a naranja medio, carnosas, de buena textura y de buena combustibilidad, procedentes esencialmente del piso medio Presentación: en fardos de 30 a 40 kg, presentadas en dos filas de armatodema, sin bramante (hojas sueltas) Humedad: 19 %

ANEXO II

Tabaco embalado: variedades y calidades de referencia del mismo para la cosecha de 1985

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
1	Badischer Geudertheimer	Hauptgut (Leaves) de la clase 1 Clase 1: Hojas maduras, sanas, intactas, de color ligeramente moteado a marrón oscuro, de longitud uniforme, normalmente fermentadas Presentación: en fardos, en cajas o en cartones de 75 a 200 kg aproximadamente o en barricas de 225 a 450 kg aproximadamente Humedad: 16 %
2	Badischer Burley E	Hauptgut (Leaves) de la clase 1 Clase 1: Hojas maduras, sanas, intactas, carnosas, de color marrón claro, marrón rojizo a marrón oscuro, de longitud uniforme; normalmente fermentadas Presentación: en fardos o cajas de 75 a 175 kg aproximadamente o en barricas de 225 a 450 kg aproximadamente Humedad: 15 %
3	Virgin D	Hojas de la clase 1 Clase 1: Hojas maduras, sanas, intactas, de color amarillo, rojo amarillo a amarillo parduzco, normalmente fermentadas Presentación: en fardos o en cajas de 75 a 175 kg aproximadamente o en barricas de 225 a 450 kg aproximadamente Humedad: 13 %
7	Bright	Hojas de categoría A Categoría A: Hojas de madurez suficiente, sin defectos de manipulación, de textura abierta, con los nervios centrales y los nervios no demasiado acentuados, sanas, de color amarillo en sus diferentes gradaciones Presentación: en barricas de 280 a 450 kg aproximadamente o en cartones de 150 a 210 kg aproximadamente Humedad: 13 %
8	Burley I	Hojas de categoría A Categoría A: Hojas de madurez suficiente, sin defectos de manipulación de textura abierta, incluso consistentes, con los nervios centrales y los nervios no demasiado acentuados, de color avellana más o menos vivo Presentación: en barricas de 280 a 450 kg aproximadamente o en cartones de 150 a 210 kg aproximadamente Humedad: 13 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
9	Maryland	Hojas de categoría A Categoría A: Hojas de madurez suficiente, que presenten ligeros defectos de curado, incluso con muy poca tonalidad color avellana, de tejido de textura media con los nervios centrales y los nervios no demasiado acentuados, sanas, de coloración marrón rojiza más o menos viva Presentación: en barricas de 280 a 450 kg aproximadamente o en cartones de 150 a 210 kg aproximadamente Humedad: 13 %
10	a) Kentucky y sus híbridos b) Moro di Cori c) Salento	Hojas de categoría B Categoría B: Hojas de buena madurez, de tejido consistente, sin defectos de curado y de conservación, de color marrón, que presenten algunos defectos de integridad, de buena combustibilidad Presentación: en barricas de 280 a 450 kg aproximadamente o en fardos de 170 a 200 kg aproximadamente Humedad: 16 %
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	Hojas de categoría B Categoría B: Hojas de tejido consistente o ligero, sanas, sin defectos de curado, de color marrón a verdoso, que presenten defectos de integridad Presentación: en fardos, cajas o cartones de 75 a 200 kg aproximadamente o en barricas de 225 a 450 kg aproximadamente Humedad: 16 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio y variedades similares	Hojas de categoría B Categoría B: Hojas de madurez suficiente, de tejido consistente o incluso grueso o fino, que presenten defectos de manipulación, de fermentación y de integridad no demasiado acentuados Presentación: en fardos de 120 kg aproximadamente o en barricas de 330 kg aproximadamente Humedad: 16 %
13	Xanti-Yakà	Hojas de categoría B Categoría B: Hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles, de forma oval elíptica, con los nervios centrales poco acentuados y los nervios secundarios de ángulo más bien abierto, que puedan presentar algunos defectos de curado, de tejido ligero la mayoría de las veces, de color que va del amarillo al marrón, con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliares, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad La longitud de las hojas medianas no supera los 20 cm Presentación: Fardos pequeños de 18 a 50 kg aproximadamente Humedad: 13 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
14	a) Perustitza b) Samsun	Hojas de categoría B Categoría B: Hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles (Perustitza) o pecioladas (Samsun), de forma elíptica lanceolada con la punta afilada (Perustitza) o elíptica redondeada (Samsun), con los nervios centrales poco acentuados y los nervios secundarios con un ángulo tendente al agudo, que puedan presentar algunos defectos de curado, de tejido la mayoría de las veces ligero, de color que va del amarillo al marrón (Perustitza) o tendente al rojizo (Samsun), con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliares, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad La longitud de las hojas medianas no supera los 25 cm Presentación: fardos pequeños de 18 a 50 kg aproximadamente Humedad: 13 %
15	Erzegovina y variedades similares	Hojas de categoría B Categoría B: Hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles, de forma oval o elíptica, con los nervios centrales medianamente acentuados y los nervios secundarios en ángulo más bien abierto, que puedan presentar algunos defectos de curado, de tejido la mayoría de las veces ligero, de color que va del amarillo al marrón, con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliares, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad La longitud de las hojas no medianas supera los 35 cm Presentación: fardos pequeños de 18 a 50 kg aproximadamente Humedad: 13 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Hojas de categoría B Categoría B: Hojas medianas inferiores seleccionadas por longitud de acuerdo con las proporciones siguientes: 1ª longitud (igual o superior a 38 cm) 60 % 2ª longitud (de 32 a menos de 38 cm) 35 % 3ª longitud (de 25 a de 32 cm) 5 % Hojas de dimensión conveniente, de buena madurez y de color uniforme, sanas, sin defectos de integridad, de textura fina, elástica y resistente, con los nervios centrales y los nervios poco pronunciados, de buena fermentación y bien conservadas, de buena combustibilidad, de gusto y aroma típicos, utilizables para el encapado de cigarros, que incluyan aproximadamente un 25 % de hojas no íntegras Presentación: en fardos de 70 a 90 kg aproximadamente o en cartones de 180 a 210 kg aproximadamente Humedad: 16 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
17	Basmas	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: Hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 15 cm de longitud, de color amarillo oro, anaranjado a rojo amarillo, de buena elasticidad y brillantes, bastante carnosas estructura floja y buena textura; de aroma típico y acusado, de buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas (I/II) constituirán el 45 % de la calidad I/III Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten unos ligeros defectos de curado, algunas señales de enfermedad, que tengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro, rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja y de buena textura, de elasticidad y brillo medios, moderadamente carnosas, de aroma típico y acusado, de muy buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas (III) constituirán el 55 % de la calidad I/III, Presentación: En fardos llamados «Tongas» de 30 kg aproximadamente Humedad: 13 %
18	Katerini y variedades similares	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: Hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro o anaranjado a rojizo, de estructura floja, de buena elasticidad, brillantes, bastante carnosas, de buena textura y muy buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas I/II constituirán el 45 % de la calidad I/III Hojas maduras, que presenten unos ligeros defectos de integridad y de curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo, anaranjado, verde amarillo, rojizo o marrón claro, de estructura floja, de elasticidad media y brillantes, bastante carnosas, de buena textura y de muy buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg cada uno aproximadamente Humedad: 13 %
19	a) Kaba Koulak clásico b) Elassona	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: Hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona, que tengan hasta 25 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y hasta 20 cm de longitud para Elassona, Karatzova y Kontoula, de color amarillo medio a oscuro, de buena elasticidad y brillantes, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III Hojas maduras, que presenten unos ligeros defectos de integridad y/o curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 30 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y 25 cm de longitud para Elassona, Karatzova y Kontoula, de color amarillo a rojizo, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, de elasticidad media y brillantes, de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 53 % de la calidad I/III Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg cada uno aproximadamente Humedad: 13 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
20	a) Kaba Koulak no clásico b) Myrodata Smyrne Trapezous y Phi I	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: Hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona, que tengan hasta 30 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y Trapezous, hasta 20 cm para Phi I y hasta 15 cm para Myrodata Smyrne, de color amarillo claro a rojizo, de buena elasticidad y brillantes, de estructura bastante floja, de buena textura y excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas (I/II) constituirán el 47 % de la calidad I/III Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 35 cm de longitud para Kaba Koulak Macedonia y Trapezous, hasta 25 cm para Phi I y hasta 20 cm para Myrodata Smyrne, de color amarillo a marrón claro, de estructura bastante floja, de bastante buena textura, bastante elasticas y brillantes, de muy buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas (III) constituirán el 53 % de la calidad I/III Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg cada uno aproximadamente Humedad: 13 %
21	Myrodata Agrinion	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: Hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo a anaranjado oscuro, de buena elasticidad y brillantes, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas (I/II) constituirán el 47 % de la calidad I/III Hojas maduras suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de secado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 30 cm de longitud, de color amarillo a rojizo claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas (III) constituirán el 53 % de la calidad I/III Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg aproximadamente Humedad: 14 %
22	Zichnomyrodata	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: Hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona, que lengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro a naranja claro, de buena elasticidad y brillantes, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo a rojizo claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas (III) constituirán el 53 % de la calidad I/III Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg aproximadamente Humedad: 13 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
23	Tsebelia	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: Hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 30 cm de longitud, de color rojo amarillo, naranja a rojizo, de estructura floja, elásticas y brillantes, bastante carnosas, de buena textura y de muy buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas I/II constituirán el 45 % de la calidad I/III Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 40 cm de longitud, de color amarillo claro a rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja, bastante elásticas y bastante brillantes, bastante carnosas, de bastante buena textura y de muy buena combustibilidad. Esta categoría también comprende las hojas ligeramente desecadas por enfermedades y/o que presenten ligeros defectos de integridad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg aproximadamente Humedad: 13 %
24	Mavra	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: Hojas maduras, íntegras, sanas sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con excepción del primero (protomana), que tengan hasta 30 cm de longitud, de un color que va del rojo amarillo o naranja al rojizo, de estructura floja, de buena de textura, elásticas y brillantes, bastante carnosas de buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 45 % de la calidad I/III Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 40 cm de longitud, de color amarillente a rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, bastante carnosas y de buena combustibilidad. Esta categoría también comprende las hojas ligeramente desecadas por las enfermedades y/o que presenten ligeros defectos de integridad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg aproximadamente Humedad: 13 %
25	Burley GR	Hojas de la calidad A Calidad A: Hojas completamente maduras, completamente desarrolladas, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes del piso medio, de color uniforme que va del marrón avellana medio al rojo avellana medio, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad Presentación: en fardos de 100 kg aproximadamente o en cajas de 200 kg aproximadamente o en barricas de 240 a 280 kg aproximadamente Humedad: 13 %
26	Virginia GR	Hojas de la calidad A Calidad A: Hojas completamente maduras, completamente desarrolladas, procedentes del piso medio, sanas, íntegras, sin defectos de curado, de color amarillo uniforme que va del amarillo limón al naranja medio, de buena textura y de buena combustibilidad Presentación: en fardos de 100 kg aproximadamente Humedad: 13 %

ANEXO III

Precios de objetivo, precios de intervención y primas para el tabaco en hoja de la cosecha de 1985
Precios de intervención derivados para el tabaco embalado de la cosecha de 1985

(en ECUS/kg)

Número de orden	Variedades	Precios de objetivo	Precios intervención	Importe de la prima	Precios de intervención derivados
1	Badischer Geudertheimer	3,721	3,163	2,587	4,725
2	Badischer Burley E	4,604	3,913	2,905	5,518
3	Virgin D	4,491	3,817	2,733	5,052
4	a) Paraguay y sus híbridos b) Dragon vert y sus híbridos, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	3,472	2,951	2,402	—
5	Nijkerk	3,428	2,914	2,177	—
6	a) Misionero y sus híbridos b) Rio Grande y sus híbridos	3,195	2,716	2,205	—
7	Bright	3,951	3,358	2,298	4,650
8	Burley I	2,906	2,470	1,621	3,621
9	Maryland	3,313	2,816	1,802	4,014
10	a) Kentucky y sus híbridos b) Moro di Cori c) Salento	2,741	2,330	1,730	3,294
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	3,330	2,831	2,299	4,261
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio y variedades similares	1,798	1,528	1,298	2,336
13	Xanti-Yakà	3,609	3,068	2,658	4,866
14	a) Perustitza b) Samsun	3,417	2,904	2,530 2,463	4,250 4,274
15	Erzegovina y variedades similares	3,070	2,610	2,279	3,833
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	16,246	13,809	9,813	21,113
17	Basmas	5,913	5,026	2,869	6,747
18	Katerini y variedades similares	4,925	4,186	2,552	6,050
19	a) Kaba Koulak clásico b) Elassona	4,366	3,711	2,256	5,253
20	a) Kaba Koulak no clásico b) Myrodata Smyrne, Trapezous y Phi I	3,357	2,853	1,577	4,290
21	Myrodata Agrinion	4,340	3,689	2,279	5,162
22	Zichnomyrodata	4,509	3,833	2,403	5,390
23	Tsebelia	3,931	3,341	3,123	4,838
24	Mavra	3,837	3,261	2,553	4,748
25	Burley GR	2,297	1,952	0,972	3,084
26	Virginia GR	3,387	2,879	1,732	4,065