Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►**B**

DYREKTYWA KOMISJI 93/49/EWG

z dnia 23 czerwca 1993 r.

określająca wykazy wskazujące warunki, jakie mają zostać spełnione przez materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych oraz rośliny ozdobne, zgodnie z dyrektywą Rady 91/682/EWG

(Dz.U. L 250 z 7.10.1993, s. 9)

zmieniona przez:

		Dziennik Urzędowy		
		nr	strona	data
►**M1**	Dyrektywa Komisji 1999/67/WE z dnia 28 czerwca 1999 r.	L 164	78	30.6.1999
►**M2**	Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2018/484 z dnia 21 marca 2018 r.	L 81	10	23.3.2018

▼B

DYREKTYWA KOMISJI 93/49/EWG

z dnia 23 czerwca 1993 r.

określająca wykazy wskazujące warunki, jakie mają zostać spełnione przez materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych oraz rośliny ozdobne, zgodnie z dyrektywą Rady 91/682/EWG

▼M1

_____

▼B

Artykuł 3

1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 2, materiał ten musi, co najmniej na podstawie kontroli wzrokowej, być uznany za rzeczywiście wolny od organizmów szkodliwych i chorób obniżających jakość lub wolny od jakichkolwiek oznak albo objawów występowania organizmów szkodliwych i chorób obniżających użyteczność materiału rozmnożeniowego lub roślin ozdobnych, w szczególności musi być wolny od tych organizmów i chorób, które są wymienione w Załączniku do niniejszej dyrektywy w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku.

▼M1

_____

▼M2

Artykuł 3a

Materiał rozmnożeniowy roślin z rodziny *Palmae*, należących do rodzajów i gatunków, o których mowa w załączniku, o średnicy łodygi u podstawy wynoszącej ponad 5 cm, spełnia jedno z następujących wymagań:

a) był uprawiany przez cały okres życia na obszarze, który został uznany za wolny od *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) przez właściwą urzędową instytucję zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych;

b) przez dwa lata przed wprowadzeniem do obrotu był uprawiany na terenie leżącym w obrębie Unii, na którym występuje całkowita ochrona fizyczna przed wprowadzeniem organizmu *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), lub na terenie leżącym w obrębie Unii, na którym zastosowano odpowiednie zabiegi zapobiegawcze w odniesieniu do przedmiotowego organizmu szkodliwego. Podlega on inspekcjom wzrokowym przeprowadzanym co najmniej raz na cztery miesiące w celu potwierdzenia, że materiał ten jest wolny od organizmu *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

Niniejszy artykuł stosuje się bez uszczerbku dla przepisów dotyczących stref chronionych przyjętych zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. h) oraz art. 5 ust. 3 dyrektywy 2000/29/WE.

▼B

Artykuł 4

1. Materiał cechuje się odpowiednią tożsamością i czystością rodzajową lub gatunkową albo, w odpowiednim przypadku, w stosunku do grupy roślin oraz o ile jest przedmiotem obrotu lub jest przeznaczony do obrotu, w stosunku do odmiany stosownie do art. 9 ust. 1 dyrektywy 91/682/EWG, cechuje się także jednolitością i czystością odmianową.

▼M1

_____

_____

▼B

Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów ustanowionych w rozporządzeniu Rady (EWG) 315/68 ([1]).

Artykuł 8

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawodawcze, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 31 grudnia 1993 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 9

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

([1]) Dz.U. L 71 z 21.3.1968, str. 1.

▼B

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SZCZEGÓLNYCH ORGANIZMÓW SZKODLIWYCH I CHORÓB W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYWAJĄCYCH NA JAKOŚĆ

Rodzaj lub gatunek	Szczególne organizmy szkodliwe i choroby
— *Begonia χ hiemalis* Fotsch	**Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju** — mącznikowate, w szczególności *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides*spp. — *Ditylenchus destructor* — *Meloidogyne* spp. — *Myzus ornatus* — *Otiorrhynchus sulcatus* — *Sciara* — przylżeńce, w szczególności *Frankliniella occidentalis* **Bakterie** — *Erwinia chrysanthemi* — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris*pv. *begoniae* **Grzyby** — mączniak właściwy — patogeny zgnilizny łodyg *(Phytophthora*spp., *Pythium*spp. i *Rhizoctonia*spp.) **Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności** — kędzierzawka liści — tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)
— *Cytrusy*	**Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju** — *Aleurothrixus floccosus* (Mashell) — *Meloidogyne* spp. — *Parabemisia myricae* (Kuwana) — *Tylenchulus semipenetrans* **Grzyby** — *Phytophthora*spp. **Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności** — wiroidy takie jak: exocortis, cachexia-xyloporosis — choroby wywołujące psorosis - jak objawy młodych liści takie jak: psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum — różnobarwność zakaźna — wirus szorstkości liści cytrusowych
— *Dendranthema χ Grandiflorum* (Ramat) Kitam	**Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju** — miniarkowate — mącznikowate, w szczególności — *Bemisia tabaci* — *Aphelencoides* spp. — *Diarthronomia chrysanthemi* łuskoskrzydłe, w szczególności: *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes Acerbella* — przylżeńce, w szczególności *Frankliniella occidentalis*

▼B

Rodzaj lub gatunek	Szczególne organizmy szkodliwe i choroby
	Bakterie — *Agrobacterium tumefaciens* — *Erwinia chrysanthemi* **Grzyby** — *Fusarium oxisporum*spp. *chrysanthemi* — *Puccinia chrysanthemi* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności** — wirus mozaiki B chryzantemy — tomato aspermy cucumovirus
— *Dianthus Caryophyllus* L. i hybryda	**Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju** — miniarkowate — mącznikowate, w szczególności *Bemisia tabaci* — przylżeńce, w szczególności *Frankliniella occidentalis* — łuskoskrzydłe, w szczególności: *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella* **Grzyby** — *Alternaria dianthi* — *Alternaria dianthicola* — *Fusarium oxisporum*f. spp. *dianthi* — *Mycosphaerella dianthi* — *Phytophthora nicotiana* spp. *parasitica* — *Rhizoctonia solani* — zgnilizna łodyg *Fusarium*spp. i *Pythium*spp. — *Uromyces dianthi* **Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności** — wirus wżerkowej pierścieniowej plamistości goździka — wirus pstrości goździka — wirus drobnej nekrotycznej plamistości goździka — tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)
— Euforbia pulcherrima (*Wild ex Kletzch*)	**Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju** — mącznikowate, w szczególności *Bemisia tabaci* **Bakterie** — *Erwinia chrysanthemi* **Grzyby** — *Fusarium* spp. — *Pythium ultimum* — *Pytophthora* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Thielaviopsis basicola* **Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności** tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)

▼B

Rodzaj lub gatunek	Szczególne organizmy szkodliwe i choroby
— *Gerbera* L.	**Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju** — miniarkowate — mącznikowate, w szczególności *Bemisia tabaci* — *Aphelencoides* spp. — *Lapidoptera* — *Meloidogyne* — przylżeńce, w szczególności *Frankliniella occidentalis* **Grzyby** — *Fusarium* spp. — *Phytophthora cryptogea* — Mączniak — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności** tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)
— *Gladiolus* L.	**Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju** — *Ditylenchus dipsaci* — przylżeńce, w szczególności *Frankliniella occidentalis* **Bakterie** — *Pseudomonas marginata* — *Rhodococcus fascians* **Grzyby** — *Botrytis gladiolorum* — *Curvularia trifolii* — *Fusarium oxisporum* spp. *gladioli* — *Pénicillium gladioli* — *Sclerotinia* spp. — *Septoria gladioli* — *Urocystis gladiolicola* — *Uromyces trasversalis* **Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności** — fitoplazmowa żółtaczka astra — czynnik korkowatości rdzenia łodygi — wirus mozaiki ogórka, — wirus pierścieniowej plamistości mieczyka (syn. utajony wirus narcyza białego) — wirus nekrotycznej kędzierzawki tytoniu **Inne organizmy szkodliwe** — *Cyperus esculentus*
— *Lilium* L.	**Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju** — *Aphelenchoides* spp. — *Rhysoglyphus* spp. — *Pratylenchus penetrans* — *Rotylenchus robustus* — przylżeńce, w szczególności *Frankliniella occidentalis*

▼B

Rodzaj lub gatunek	Szczególne organizmy szkodliwe i choroby
	Bakterie — *Envinia carotovora* podg. *carotovora* — *Rhodococcus fascians* **Grzyby** — *Cylindrocarpon destructans* — *Fusarium oxisporum* f. sp. *lilii* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia* spp. — *Rhizopus* spp. — *Sclerotium* spp. **Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności** — wirus mozaiki ogórka — wirus bezobjawowy lilii — wirus X lilii — wirus nekrotycznej kędzierzawki tytoniu — wirus pstrości tulipana **Inne organizmy szkodliwe** — *Cyperus esculentus*
— *Malus* Miller	**Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — czerwce, w szczególności *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bakterie** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Grzyby** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophtora cactorum* — *Rosellinia necatrix* — *Venturia* spp. — *Verticillium* spp. **Wirusy i organizmy wirusopodobne** wszystkie
— *Narcissus* L.	**Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju** — *Aphelenchoides subtenuis* — *Ditylenchus destructor* — *Eumerus* spp. — *Merodon equestris* — *Pratylenchus penetrans* — rozkruszkowate — trójpazurkowce **Grzyby** — *Fusarium oxysporum* f. sp. *narcissi* — *Sclerotinia* spp. — *Sclerotium bulborum*

▼B

Rodzaj lub gatunek	Szczególne organizmy szkodliwe i choroby
	Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności — wirus nekrotycznej kędzierzawki tytoniu — czynnik srebrzystej smugowatości narcyza — wirus żółtej pasiastości narcyza **Inne organizmy szkodliwe** — *Cyperus esculentus*
▼M2 — ***Palmae,* w odniesieniu do następujących rodzajów i gatunków** — *Areca catechu* L. — *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman — *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr. — *Bismarckia* Hildebr. i H.Wendl. — *Borassus flabellifer* L. — *Brahea armata* S. Watson — *Brahea edulis* H.Wendl. — *Butia capitata* (Mart.) Becc. — *Calamus merrillii* Becc. — *Caryota maxima* Blume — *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart. — *Chamaerops humilis* L. — *Cocos nucifera* L. — *Corypha utan* Lam. — *Copernicia* Mart. — *Elaeis guineensis* Jacq. — *Howea forsteriana* Becc. — *Jubaea chilensis* (Molina) Baill. — *Livistona australis* C. Martius — *Livistona decora* (W. Bull) Dowe — *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart. — *Metroxylon sagu* Rottb. — *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook — *Phoenix canariensis* Chabaud — *Phoenix dactylifera* L. — *Phoenix reclinata* Jacq. — *Phoenix roebelenii* O'Brien — *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb. — *Phoenix theophrasti* Greuter — *Pritchardia* Seem. i H.Wendl. — *Ravenea rivularis* Jum. & H.Perrier — *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. i Schult.f. — *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. — *Washingtonia* H. Wendl.	**Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju** — *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)
▼B — - *Pelargonium* L.	**Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju** — mącznikowate, w szczególności *Bemisia tabaci* — łuskoskrzydłe — przylżeńce, w szczególności *Frankliniella occidentalis* **Bakterie** — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *pelargonii*

▼B

Rodzaj lub gatunek	Szczególne organizmy szkodliwe i choroby
	Grzyby — *Puccinia pelargonii zonalis* — patogeny zgnilizny łodyg *(Botrytis* spp., *Pythium* spp.) — *Verticillium* spp. **Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności** — wirus pstrokatości pelargonii — wirus kędzierzawki pelargonii — wirus wstęgowej mozaiki pelargonii — tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)
— *Phoenix*	**Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju** — przylżeńce **Grzyby** — *Exosporium palmivorum* — *Gliocladium wermoeseni* — *Graphiola phoenicis* — *Pestalozzia Phoenicis* — *Pythium* spp. **Wirusy i organizmy wirusopodobne** Wszystkie
— *Pinus nigra*	**Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju** — *Blastophaga* spp. — *Rhyacionia buoliana* **Grzyby** — *Ophodermium seditiosum* **Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności** Wszystkie
Prunus L.	**Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju** — *Capnodis tenebrionis* — *Meloidogyne* spp. — czerwce, w szczególności *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bakterie** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Grzyby** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Rosellinia necatrix* — *Taphrina deformans* — *Verticillium* spp. **Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności** — wirus karłowatości śliwy — wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości śliwy

▼B

Rodzaj lub gatunek	Szczególne organizmy szkodliwe i choroby
— *Pyrus* L.	**Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — czerwce, w szczególności *Epidiaspis leperii*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Quadraspidiotus perniciosus* **Bakterie** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Grzyby** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophthora* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Verticillium* spp. **Wirusy i organizmy wirusopodobne** wszystkie
— *Rosa*	**Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju** — łuskoskrzydłe, w szczególności *Epichoristodes acerbella*, *Cacoecimorpha pronubana* — *Meloidogyne* spp. — *Pratylenchus* spp. — *Tetranychus urticae* **Bakterie** — *Agrobacterium tumefaciens* **Grzyby** — *Chondrostereum purpureum* — *Choristoneura* spp. — *Diplocarpon rosae* — *Peronospora sparsa* — *Phragmidium* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Sphaeroteca pannosa* — *Verticillium* spp. **Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności** — wirus mozaiki jabłka — wirus mozaiki gęsiówki — wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości śliwy