To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 358/2005

z dne 2. marca 2005

o dovoljenjih brez roka za nekatere dodatke in dovoljenju novih uporab dodatkov, ki so že dovoljeni v krmi

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 57, 3.3.2005, str. 3)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►M1	Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 643/2013 z dne 4. julija 2013	L 186	7	5.7.2013
►M2	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/429 z dne 10. marca 2017	L 66	4	11.3.2017

▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 358/2005

z dne 2. marca 2005

o dovoljenjih brez roka za nekatere dodatke in dovoljenju novih uporab dodatkov, ki so že dovoljeni v krmi

(Besedilo velja za EGP)

Člen 1

Pripravki, ki spadajo v skupino „Encimi“, kot je določeno v Prilogi I, se dovolijo za uporabo brez roka kot dodatki v prehrani živali pod pogoji, določenimi v navedeni Prilogi I.

Člen 2

Pripravki, ki spadajo v skupino „Barvila, vključno s pigmenti, druga barvila“, kot je določeno v Prilogi II, se dovolijo za uporabo brez roka kot dodatki v prehrani živali pod pogoji, določenimi v navedeni Prilogi II.

Člen 3

Pripravki, ki spadajo v skupino „Encimi“, kot je določeno v Prilogi III, se začasno dovolijo za štiri leta kot dodatki v prehrani živali pod pogoji, določenimi v navedeni Prilogi III.

Člen 4

Pripravek, ki spada v skupino „Mikroorganizmi“, kot je določeno v Prilogi IV, se začasno dovoli za štiri leta kot dodatek v prehrani živali pod pogoji, določenimi v navedeni Prilogi IV.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

PRILOGA I

Številka ES	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost živali	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enot aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
Encimi								
E 1619	Alfa-amilaza EC 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6	Pripravek alfa-amilaze in endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki ju proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) z najmanjšo aktivnostjo: Zaščitena oblika – prevlečena: Alfa-amilaza: 200 KNU ([1])/g Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 350 FBG ([2])/g Tekoča oblika: Alfa-amilaza: 130 KNU ([1])/ml Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 225 FBG/ml	Piščanci za pitanje	—	Alfa-amilaza: 10 KNU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: Alfa-amilaza: 20–40 KNU endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 35–70 FBG 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih s škrobom in beta-glukani, ki npr. vsebujejo več kakor 40 % žit (npr. ječmen, oves, pšenico, rž, tritikalo, ali koruzo).	Brez roka
					Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 17 FBG	—		
E 1620	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4 Alfa-amilaza EC 3.2.1.1 Bacilolizin EC 3.4.24.28 Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki ga proizvaja *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki ga proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki ga proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacilolizina, ki ga proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ga proizvaja *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 350 U ([3])/g Endo-1,4-beta-glukanaza: 4 000 U ([4])/g Alfa-amilaza: 400 U ([5])/g Bacilolizin: 450 U ([6])/g Endo-1,4-beta-ksilanaza:20 000 U ([7])/g	Piščanci za pitanje	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 587 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 175–2 350 U endo-1,4-beta-glukanaza: 2 000–4 000 U Alfa-amilaza: 200–400 U bacilolizin: 225–450 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 10 000–20 000 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma beta-glukani in arabinoksilani), npr. z vsebnostjo več kakor 45 % pšenice.	Brez roka
					Endo-1,4-beta-glukanaza: 1 000 U	—		
					Alfa-amilaza: 100 U	—		
					Bacilolizin: 112 U	—		
					Endo-1,4-beta-ksilanaza: 5 000 U	—		

▼B

Številka ES	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost živali	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enot aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
▼M2 ———								
▼B E 1622	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94) z najmanjšo aktivnostjo: V granulirani obliki: 6 000 FBG ([8])/g 8 250 U ([9])/g Tekoča oblika: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml	Piščanci za pitanje	—	endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 BGU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 BGU endo-1,4-beta-ksilanaza: 680 EXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma beta-glukani in arabinoksilani), npr. z vsebnostjo več kakor 30 % pšenice in 30 % ječmena ali 20 % rži.	Brez roka
					endo-1,4-beta-ksilanaza: 680 EXU	—		

([1]) 1 KNU je količina encima, ki sprosti 672 mikromolov reduktivnih sladkorjev (ekvivalenta glukoze) iz topnega škroba na minuto pri pH 5,6 in 37 °C.
([2]) 1 FBG je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 5,0 in 30 °C.
([3]) 1 U je količina encima, ki sprosti 0,0056 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 7,5 in 30 °C.
([4]) 1 U je količina encima, ki sprosti 0,0056 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz karboksimetilceluloze na minuto pri pH 4,8 in 50 °C.
([5]) 1 U je količina encima, ki hidrolizira 1 mikromol glukozidnih vezi iz v vodi netopnega navzkrižno vezanega škrobnega polimera na minuto pri pH 7,5 in 37 °C.
([6]) 1 U je količina encima, ki tvori 1 mikrogram azo-kazeina, topnega v triklorocetni kislini na minuto pri pH 7,5 in 37 °C.
([7]) 1 U je količina encima, ki sprosti 0,0067 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana iz brezovega lesa na minuto pri pH 5,3 in 50 °C.
([8]) 1 BGU je količina encima, ki sprosti 0,278 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 3,5 in 30 °C.
([9]) 1 EXU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz arabinoksilana iz pšenice na minuto pri pH 3,5 in 55 °C.

▼B

PRILOGA II

Številka ES	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost živali	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					mg/kg popolne krmne mešanice			
Barvila, vključno s pigmenti								
2. **Druga barvila**								
E 102	Tartrazin	$C_{16}H_9N_4O_9S_2Na_3$	Okrasne ptice, ki jedo zrnje	—	—	150	—	Brez roka
			Majhni glodavci	—	—	150	—	Brez roka
E 110	Oranžno FCF	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	Okrasne ptice, ki jedo zrnje	—	—	150	—	Brez roka
			Majhni glodavci	—	—	150	—	Brez roka
▼M1 _____								
▼B E 141	Klorofil bakrov kompleks	—	Okrasne ptice, ki jedo zrnje	—	—	150	—	Brez roka
			Majhni glodavci	—	—	150	—	Brez roka

▼B

PRILOGA III

Številka ES ali št.	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost živali	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enot aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
Encimi								
51	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ga proizvaja *Bacillus subtilis* (LMG S-15136) z najmanjšo aktivnostjo: Trdna in tekoča oblika: 100 IU ([1])/g ali ml	Kokoši nesnice	—	10 IU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. 2. Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice: 10 IU. 3. Za uporabo v krmnih mešanicah arabinoksilana, npr. z vsebnostjo najmanj 40 % pšenice ali ječmena.	6. marec 2009
28	3-fitaza EC 3.1.3.8	Pripravek iz 3-fitaze, ki ga proizvaja *Trichoderma reesei* (CBS 528.94) z najmanjšo aktivnostjo: Trdna oblika: 5 000 PPU ([2])/g Tekoča oblika: 1 000 PPU/g	Purani za pitanje	—	250 PPU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 250–1 000 PPU. 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kakor 0,22 % fitinsko vezanega fosforja	6. marec 2009
			Svinje	—	250 PPU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500–1 000 PPU. 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kakor 0,22 % fitinsko vezanega fosforja.	6. marec 2009

([1]) 1 IU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz brezovega lesa na minuto pri pH 4,5 in 30 °C.
([2]) 1 PPU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol anorganskega fosfata iz natrijevega fitata na minuto pri pH 5 in 37 °C.

▼B

PRILOGA IV

Številka ES	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost živali	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
Mikroorganizmi								
10	*Enterococcus faecium* NCIMB 10415	Pripravek *Enterococcus faecium*, ki vsebuje minimalno mikroinkapsulirano obliko: 5×10^9 CFU/g	Psi	—	$4{,}5 \times 10^6$	2×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	6. marec 2009
			Mačke	—	5×10^6	8×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	6. marec 2009