Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 358/2005 AL COMISIEI

din 2 martie 2005

privind autorizarea fără limită de timp a anumitor aditivi și autorizarea unor noi utilizări în hrana animalelor ale unor aditivi deja autorizați

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 57, 3.3.2005, p. 3)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 643/2013 al Comisiei din 4 iulie 2013	L 186	7	5.7.2013
►M2	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/429 al Comisiei din 10 martie 2017	L 66	4	11.3.2017

▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 358/2005 AL COMISIEI

din 2 martie 2005

privind autorizarea fără limită de timp a anumitor aditivi și autorizarea unor noi utilizări în hrana animalelor ale unor aditivi deja autorizați

(Text cu relevanță pentru SEE)

Articolul 1

Se autorizează fără limită de timp preparatele aparținând grupei „Enzime” menționate în anexa I, ca aditivi pentru hrana animalelor, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Se autorizează fără limită de timp substanțele aparținând grupei „Materii colorante inclusiv pigmenții” („Alți coloranți”) menționate în anexa II, ca aditivi pentru hrana animalelor, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 3

Se autorizează provizoriu, pe o perioadă de patru ani, preparatele aparținând grupei „Enzime” menționate în anexa III, ca aditivi pentru hrana animalelor, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 4

Se autorizează provizoriu, pe o perioadă de patru ani, preparatul aparținând grupei „Micro-organisme” menționat în anexa IV, ca aditiv pentru hrana animalelor, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

ANEXA I

Nr. CE	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					Unități de activitate/kg de furaj complet			
Enzime								
E 1619	Alfa-amilază EC 3.2.1.1. Endo-1,3 (4)-beta-glucanază EC 3.2.1.6.	Preparat de alfa-amilază și endo-1,3(4)-beta-glucanază produse de *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) având o activitate minimă de: comprimate acoperite: alfa-amilază: 200 KNU ([1])/kg endo-1,3(4)-beta-glucanază: 350 FBG ([2])/g formă lichidă: alfa-amilază: 130 KNU/ml endo-1,3(4)-beta-glucanază: 225 FBG/ml	Pui pentru îngrășare	—	Alfa-amilază: 10 KNU	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se menționează temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: alfa-amilază: 20-40 KNU endo-1,3(4)-beta-glucanază 35-70 FBG. 3. Se utilizează în furajele combinate bogate în amidon și în beta-glucani, de exemplu conținând mai mult de 40 % cereale (de exemplu orz, ovăz, grâu, secară, triticale sau porumb).	Fără limită de timp
					Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 17 FBG	—		
E 1620	Endo-1,3(4)-beta-glucanază EC 3.2.1.6. Endo-1,4-beta-glucanază EC 3.2.1.4. Alfa-amilază EC 3.2.1.1. Bacilolizină EC 3.4.24.28 Endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8	Preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanază produsă de *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilază produsă de *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacilolizină produsă de *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) și de endo-1,4-beta-xilanază produsă de *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) având o activitate minimă de: endo-1,3(4)-beta-glucanază: 2 350 U ([3])/g endo-1,4-beta-glucanază: 4 000 U ([4])/g alfa-amilază: 400 U ([5])/g bacilolizină: 450 U ([6])/g endo-1,4-beta-xilanază: 20 000 U ([7])/g	Pui pentru îngrășare	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 587 U	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se menționează temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: endo-1,3(4)-beta-glucanază: 1 175-2 350 U endo-1,4-beta-glucanază: 2 000-4 000 U alfa-amilază: 200-400 U bacilolizină: 225-450 U endo-1,4-beta-xilanază: 10 000-20 000 U. 3. Se utilizează în furajele combinate bogate în polizaharide neamilacee (în principal beta-glucani și arabino-xilani), de exemplu conținând mai mult de 45 % grâu.	Fără limită de timp
					Endo-1,4-beta-glucanază: 1 000 U	—		
					Alfa-amilază: 100 U	—		
					Bacilolizină: 112 U	—		
					Endo-1,4-beta-xilanază: 5 000 U	—		

▼B

Nr. CE	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					Unități de activitate/kg de furaj complet			
▼M2 ———								
▼B E 1622	Endo-1,3 (4)-beta-glucanază EC 3.2.1.6. Endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8	Preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază și de endo-1,4-beta-xilanază produse de *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94) având o activitate minimă de: granulate: 6 000 BGU ([8])/g 8 250 EXU ([9])/g lichid: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml	Pui pentru îngrășare	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 500 BGU	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se vor indica temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: endo-1,3(4)-beta-glucanază: 500 BGU endo-1,4-beta-xilanază: 680 EXU. 3. Se utilizează în furajele combinate bogate în polizaharide neamilacee (în principal beta-glucani și arabinoxilani), de exemplu conținând mai mult de 30 % grâu și 30 % orz sau 20 % secară.	Fără limită de timp.
					Endo-1,4-beta-xilanază: 680 EXU	—		

([1]) 1 KNU este cantitatea de enzimă care eliberează 672 micromoli de zahăr reducător (măsurați în echivalenți-glucoză) pe minut din amidon solubil la pH 5,6 și 37 °C.
([2]) 1 FBG este cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de zahăr reducător (măsurat în echivalenți-glucoză) pe minut din beta-glucan de orz la pH 5,0 și 30 °C.
([3]) 1 U este cantitatea de enzimă care eliberează 0,0056 micromoli de zahăr reducător (măsurați în echivalenți-glucoză) pe minut din beta-glucan de orz la pH 7,5 și 30 °C.
([4]) 1 U este cantitatea de enzimă care eliberează 0,0056 micromoli de zahăr reducător (măsurați în echivalenți-glucoză) pe minut din carboximetilceluloză la pH 4,8 și 50 °C.
([5]) 1 U este cantitatea de enzimă care hidrolizează 1micromol de legături glucozidice pe minut din polimer amilaceu legat transversal și insolubil în apă la pH 7,5 și 37 °C.
([6]) 1 U este cantitatea de enzimă care solubilizează 1microgram de substrat de azocazeină în acid tricloracetic pe minut la pH 7,5 și 37 °C.
([7]) 1 U este cantitatea de enzimă care eliberează 0,0067 micromoli de zahăr reducător (măsurați în echivalenți-xiloză) pe minut din xilan de lemn de mesteacăn la pH 5,3 și 50 °C.
([8]) 1 BGU este cantitatea de enzimă care eliberează 0,278 micromoli de zahăr reducător (măsurați în echivalenți-glucoză) pe minut din beta-glucan de orz la pH 3,5 și 40 °C.
([9]) 1 EXU este cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de zahăr reducător (măsurat în echivalenți-xiloză) pe minut din arabinoxilan de grâu la pH 3,5 și 55 °C.

▼B

ANEXA II

Nr. CE	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg/kg de furaj complet			
Coloranți, inclusiv pigmenți								
2. **Alți coloranți**								
E 102	Tartrazina	$C_{16}H_9N_4O_9S_2Na_3$	Păsări granivore ornamentale	—	—	150	—	Fără limită de timp
			Rozătoare mici	—	—	150	—	Fără limită de timp
E 110	Sunset Yellow FCF	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	Păsări granivore ornamentale	—	—	150	—	Fără limită de timp
			Rozătoare mici	—	—	150	—	Fără limită de timp
▼M1 _____								
▼B E 141	Complecși ai cuprului cu clorofila	—	Păsări granivore ornamentale	—	—	150	—	Fără limită de timp
			Rozătoare mici	—	—	150	—	Fără limită de timp

ANEXA III

Nr. CE sau nr.	Aditiv	Formulă chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					Unități de activitate/kg de furaj complet			
Enzime								
51	Endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8.	Preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de *Bacillus subtilis* (LMG S-15136) având o activitate minimă de: solid și lichid: 100 IU ([10])/g sau ml	Găini ouătoare	—	10 IU	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se vor indica temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: 10 IU. 3. Se utilizează în furajele combinate, bogate în arabinoxilani, de exemplu conținând minimum 40 % grâu sau orz.	6 martie 2009
28	3-fitază EC 3.1.3.8.	Preparat de 3-fitază produsă de *Trichoderma reesei* (CBS 528.94) având o activitate minimă de: solid: 5 000 PPU ([2])/g lichid: 1 000 PPU/g	Curci pentru îngrășare	—	250 PPU	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se vor indica temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet este de 250-1 000 PPU. 3. Se utilizează în furaje combinate, care conțin mai mult de 0,22 % fosfor legat de fitină.	6 martie 2009
			Scroafe	—	250 PPU	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se vor indica temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet este de 500-1 000 PPU. 3. Se utilizează în furaje combinate, care conțin mai mult de 0,22 % fosfor legat de fitină.	6 martie 2009

([1]) 1 IU este cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de zahăr reducător (echivalenți-xiloză) pe minut din xilan de lemn de mesteacăn la pH 4,5 și 30 °C.
([2]) 1 PPU este cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de fosfat anorganic pe minut din fitat de sodiu la pH 5 și 37 °C.

▼B

ANEXA IV

Nr. CE	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					UFC/kg de furaj complet			
Micro-organisme								
10	*Enterococcus faecium* NCIMB 10415	Preparat de *Enterococcus faecium* conținând cel puțin: microcapsule: 5×10^9 UFC/g de aditiv	Câini	—	$4{,}5 \times 10^6$	2×10^9	În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se vor indica temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.	6 martie 2009
			Pisici	—	5×10^6	8×10^9	În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se vor indica temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.	6 martie 2009