Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 358/2005

2005 m. kovo 2 d.

dėl neribotam laikui išduodamų leidimų naudoti tam tikrus priedus ir dėl leidimo naudoti tam tikrus pašaruose jau leidžiamus priedus

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 57, 2005 3 3, p. 3)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	2013 m. liepos 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 643/2013	L 186	7	2013 7 5
►M2	2017 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/429	L 66	4	2017 3 11

▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 358/2005

2005 m. kovo 2 d.

dėl neribotam laikui išduodamų leidimų naudoti tam tikrus priedus ir dėl leidimo naudoti tam tikrus pašaruose jau leidžiamus priedus

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

I priede nurodytai „fermentų“ grupei priskiriamą preparatą leidžiama neribotą laiką naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

II priede nurodytai „dažiklių, tarp jų pigmentų, kitų dažiklių“ grupei priskiriamas medžiagas leidžiama neribotą laiką naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

3 straipsnis

III priede nurodytai „fermentų“ grupei priskiriamą preparatą leidžiama laikinai naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

4 straipsnis

IV priede nurodytai „mikroorganizmų“ grupei priskiriamą preparatą leidžiama laikinai naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

I PRIEDAS

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro			
Fermentai								
E 1619	Alfa-amilazė EC 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6	Alfa-amilazės ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: Dengto pavidalo: alfa-amilazė: 200 KNU ([1])/g endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 350 FBG ([2])/g Skysto pavidalo: alfa-amilazė: 130 KNU/ml endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 225 FBG/ml	Mėsiniai viščiukai	—	alfa-amilazė: 10 KNU	—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro: alfa-amilazė: 20–40 KNU endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 35–70 FBG 3. Naudoti kombinuotuose pašaruose, turinčiuose daug krakmolingų ir beta gliukanų, kuriuose yra daugiau kaip 40 % javų (pvz., miežių, avižų, kviečių, rugių, kvietrugių arba kukurūzų).	Neribotam laikui
					endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 17 FBG	—		
E 1620	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-gliukanazė EC 3.2.1.4 Alfa-amilazė EC 3.2.1.1 Bacilolizinas EC 3.4.24.28 Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8	Fermentinis endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-gliukanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilazės, gautos iš *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacilolizino, gauto iš *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 2 350 U ([3])/g endo-1,4-beta-gliukanazė: 4 000 U ([4])/g alfa-amilazė: 400 U ([5])/g bacilolizinas: 450 U ([6])/g endo-1,4-beta-ksilanazė: 20 000 U ([7])/g	Mėsiniai viščiukai	—	endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 587 U	—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro: endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 1 175–2 350 U endo-1,4-beta-gliukanazė: 2 000–4 000 U alfa-amilazė: 200–400 U bacilolizinas: 225–450 U endo-1,4-beta-ksilanazė: 10 000–20 000 U 3. Naudoti kombinuotuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač beta-gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 45 % kviečių.	Neribotam laikui
					endo-1,4-beta-gliukanazė: 1 000 U	—		
					alfa-amilazė: 100 U	—		
					bacilolizinas: 112 U	—		
					endo-1,4-beta-ksilanazė: 5 000 U	—		

▼B

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro			
▼M2 ———								
▼B								
E 1622	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (CBS SD 357.94), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: Granulių pavidalo: 6 000 BGU ([8])/g 8 250 EXU ([9])/g Skysto pavidalo: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml	Mėsiniai viščiukai	—	endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 500 BGU	—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro: endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 500 BGU endo-1,4-beta-ksilanazė: 680 EXU 3. Naudoti kombinuotuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač beta-gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 30 % kviečių ir 30 % miežių arba 20 % rugių.	Neribotam laikui
					endo-1,4-beta-ksilanazė: 680 EXU	—		

([1]) 1 KNU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 672 mikromolius redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš tirpaus krakmolo, esant 5,6 pH ir 37 °C temperatūrai.
([2]) 1 FBG – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš miežių beta-gliukano, esant 5,0 pH ir 30 °C temperatūrai.
([3]) 1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 0,0056 mikromolio redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš miežių beta-gliukano, esant 7,5 pH ir 30 °C temperatūrai.
([4]) 1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 0,0056 mikromolio redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš karboksimetilceliuliozės, esant 4,8 pH ir 50 °C temperatūrai.
([5]) 1 U – tai fermento kiekis, hidrolizuojantis 1 mikromolį gliukozidų junginių iš vandenį netirpstančio tinklinio krakmolo polimero per minutę, esant 7,5 pH ir 37 °C temperatūrai.
([6]) 1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikrogramą azo-kazeino, tirpstančio trichloro acto rūgštyje, per minutę, esant 7,5 pH ir 37 °C temperatūrai.
([7]) 1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 0,0067 mikromolio redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę iš beržų ksilano, esant 5,3 pH ir 50 °C temperatūrai.
([8]) 1 BGU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 0,278 mikromolio redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš miežių beta-gliukano, esant 3,5 pH ir 40 °C temperatūrai.
([9]) 1 EXU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę iš kviečių arabinoksilano per minutę, esant 3,5 pH ir 55 °C temperatūrai.

▼B

II PRIEDAS

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg/kg visaverčio pašaro			
Dažikliai, tarp jų pigmentai								
2. **Kiti dažikliai**								
E 102	Tartrazinas	$C_{16}H_9N_4O_9S_2Na_3$	Grūdus lesantys dekoratyviniai paukščiai	—	—	150	—	Neribotam laikui
			Smulkūs graužikai	—	—	150	—	Neribotam laikui
E 110	Saulėlydžio geltonasis FCF	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	Grūdus lesantys dekoratyviniai paukščiai	—	—	150	—	Neribotam laikui
			Smulkūs graužikai	—	—	150	—	Neribotam laikui
▼M1 _____								
▼B E 141	Vario ir chlorofilo mišinys	—	Grūdus lesantys dekoratyviniai paukščiai	—	—	150	—	Neribotam laikui
			Smulkūs graužikai	—	—	150	—	Neribotam laikui

III PRIEDAS

Nr. (arba EB Nr.)	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro			
Fermentai								
51	Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8	Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Bacillus subtilis* (LMG S-15136), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: Kieto arba skysto pavidalo: 100 IU ([1])/g arba ml	Dedeklės vištos	—	10 IU	—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama norma 1 kg visaverčio kombinuotojo pašaro: 10 IU. 3. Naudoti kombinuotuose pašaruose, turinčiuose arabinoksilanų, pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 40 % kviečių arba miežių.	2009 m. kovo 6 d.
28	3-fitazė EC 3.1.3.8	3-fitazės, gautos iš *Trichoderma reesei* (CBS 528.94), preparatas, kurio aktyvumas ne mažesnis kaip: Kieto pavidalo: 5 000 PPU ([2])/g Skysto pavidalo: 1 000 PPU/g	Penimi kalakutai	—	250 PPU	—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro: 250–1 000 PPU. 3. Skirtas naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kuriuose daugiau kaip 0,22 % fitino, jungiančio fosforą.	2009 m. kovo 6 d.
			Paršavedės	—	250 PPU	—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro: 500–1 000 PPU. 3. Skirtas naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kuriuose daugiau kaip 0,22 % fitino, jungiančio fosforą.	2009 m. kovo 6 d.

([1]) 1 IU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę iš beržų ksilano, esant 4,5 pH ir 30 °C temperatūrai.
([2]) 1 PPU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį neorganinio fosfato iš natrio fitato per minutę, esant 5 pH ir 37 °C temperatūrai.

▼B

IV PRIEDAS

EB Nr	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Kolonijas sudarančio vieneto (KSV)/kg visaverčio pašaro			
Mikroorganizmai								
10	*Enterococcus faecium* NCIMB 10415	Preparatas, gautas iš *Enterococcus faecium*, kurio mažiausias mikrokapsulių pavidalo kiekis: 5×10^9 CFU/g	Šunys	—	$4{,}5 \times 10^6$	2×10^9	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant	2009 m. kovo 6 d.
			Katės	—	5×10^6	8×10^9	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant	2009 m. kovo 6 d.